LUNNAEANA
QK91
.G117
1788
t.1
pt.6

CAROLI A LINNÉ

SYSTEMA NATURAE.

TOM. I. PARS VI.

MISSOURI
BOTANICAL
GARDEN.

CLASSIS VI.

VERMES.

Mihi contuenti ſeſe perſuaſit rerum Natura nihil incredibile exiſtimare de ea.

PLIN. XI. 3.

TARDIGRADA, mollia, pandentia, vivaciſſima, redintegranda, humidi Animantia, multa *acephala et apoda plurima*, *androgyna vel neutra*, multa, *tentaculis* plurima dignoſcenda.

IMPERFECTA veteribus, nec adeo inepte, dicta animantia, deſtituuntur auribus, naſo, multa capite, oculis *a*) pedibusque diſtinctis, ab inſectis itaque diverſiſſima, a quibus dudum removi naturae cryptogama: ſunt *Inteſtina*, *Molluſca*, *Teſtacea*, *Zoophyta*, *Infuſoria*.

INTESTINA terrena quondam dicta, ſumma corporis ſimplicitate conſpicua, alia intra alia animantia vivunt, alia in aquis potiſſimum *dulcibus*, pauciora in terra habitant; perforat *Gordius* argillam, ut aqua tranet, *Lumbricus* humum, ne ſitu corrumpatur, *Teredo* ligna, ut deſtruantur, quemadmodum *Pholades et Mytili lithophagi* petras, ut ſolvantur.

MOLLUSCA nuda, brachiata, vagantur pleraque per maria, coelo reſplendentia, tanquam totidem lucernis tenebricoſum illuminant abyſſum phoſphorea.

TESTACEA, molluſca domiporta, calcareaque domuncula nobilitata, calcifica, et ipſa ſaepe calcivora, inſectis oppoſita ſpecierum numero, magna ludentis Naturae varietate *b*) multiplicata. TESTAS poly-

a) Vermium genus omne oculis carere, tradidit quidem *Plinius*, *at praeter maritimos multos, limacibus, nereidibus, hirudinibus, oculi ſunt, utique ab humanis diverſi.*

b) *Plin.* IX. 33. Tot *colorum* differentiae, tot *Figurae* planis, concavis, longis, lunatis, in orbem circumactis, dimidio orbe caeſis, in dorſum elatis, laevibus, rugatis, denticulatis, ſtriatis, *vertice muricatim* intorto, margine in mucronem emiſſo, foris effuſo, intus replicato; jam diſtinctione virgulata, crinita, criſpa; canaliculatim, pectinatim, imbricatim undata; cancellatim veticulata, in obliquum, in rectum expanſa, denſata, porrecta, ſinuata, brevi nodo ligatis, toto latere connexis, ad plauſum apertis, ad buccinum recurvis. *v. Bonanni, Rumpfii, Kleinii explicationem.*

polydaedalas Conchyliorum parium aeque attente legit ſumma ſapientia, ac care emit erudita luxuria, a quisquiliis *c*) ad Ammirales Scalaresve, margaritis *d*) ſuis pretioſiores, quas artificum politura vitiando nobilitat, ut pulchrius pateat in tritonis Cochleis vividis ad *Umbilicum* aut *Cardinem* poſteriorem *Apertura* rarius *Operculo* clauſilis, cum *Labro* exteriore interioreve, ſaepe dentato ad *Columellam*, circa quam *Spirae Anfractus* ſiniſtri, rarius contrarii dextri, *ſutura* connexi, rarius *varice* cincti; laeves, ſulcati, ſtriati, angulati, nodoſi, aculeati, ſpinoſi, frondoſi usque in *Mucronem* apicis rarius decollatum, et ut intueatur in Veneris Conchis vividis lectis teſtarum nativa paria, determinatam figuram, valvulas ſiniſtras et dextras, aequales vel inaequales, aequilateres vel inaequilateres; interius dentatos *Cardines* inter *Nates* infimas *Umbonum* tumentium; inferius *Ani* impreſſuram, anterius *Vulvae* rimam, *Labiis nymphis*que conniventem, *Hymene* obtectam, *Pube* interdum cinctam; harum *Limbus* exterior circumſcribitur *Margine* integerrimo, crenulato ſ. dentato: *ſuperiore* ante vulvam; *poſteriore* pone anum; *exteriore* natibus oppoſito. Decet inprimis inquirere in foſſilium incognita protypa, inprimis *anomiarum*, abyſſi cimelia, cum alia ſint *terreſtria*, *fluviatilia*, *lacuſtria*, *littorea*, *maritima*, *pelagica* alia.

ZOOPHYTA compoſita animantia, in bivio animalium vegetabiliumque conſtituta, *radicata* (plurima) *cauleſcunt* multiplicata vita *ramis*, *gemmis* caeduis, metamorphoſique *florum* animantium ſponte ſeſe moventium, eo ſi plantae eſſent Zoophyta, ſenſu motuque deſtituta, et Zoophyta verae plantae, ſed ſenſus motusque organo inſtructae (*equidem his ineſſe ſenſum*, *quae nec animalium*, *nec fruticum*, *ſed tertiam ex utroque naturam habent* Plin. *e*) adeoque vegetabilia naturali metamorphoſi mutanda in animalia. Horum alia mollia, nuda, Zoophyta ſtricto ſenſu audiunt; alia teſta quaſi dura obtecta *Lithophyta*. Haec priſci plantas aëris contactu lapideſcentes putabant, ſed recentioribus etiam ex ſuo ſemine lapides germinare, inprimis ob calcaream horum indolem viſi, usque dum *Marſiglii* diligentia extraxerat e mari corallia vegetantia floribus octandris octopetalis, a contactu aëris ſe contrahentibus, inque aqua denuo expandendis; at eodem tempore (1727) *Peyſſonnellus* corallia ab animalculis fabricari, ultra ſeculum poſt eandem apud ſapientiores indos ratam ſententiam *f*) primum vidit vix auditus,

---

c) *Speculatie-gods* vulgo.
d) *Margaritarum* dos in candore, magnitudine, orbe, laevore, pondere. *Plin.* IX. 35. Pretioſiſſima Cleopatrae Antonio expoſita. *Ibid.*
e) *Amoen. acad.* 5. *p.* 350.
f) Rumpf *muſ.* 152. *ad tab.* 16. F.

ditus, niſi *Tremblaeus* (1741) hydras omnium admiratione deteхiſſet, et ad littora curioſos allicuiſſet, quo via per *Elliſii* ſertularias ad corallia aperta fuit. *g*)

INFUSORIA animalcula omnium minima, plurima oculis nudis vix uſurpanda, tentaculis deſtituta, plurima in infuſis habitant, ſemel exſiccata denuoque humectata non reviviſcunt.

AUCTORES, haec animalia illuſtrantes pauci inter hos pretioſi; meritiſſimus *O. F. Müller*, tum *Bellonius* (1553) *Rondelet* (1554) *C. Geſner* (1558) Columna (1606), *Aldrovandi* (1606), *Jonſton* (1650), *Reimarus* (1773); de inteſtinalium hiſtoria meruere *Pallas* (1760), *Vereſtoi de Czer* (1772), *Happ* (1780), *Goeze* (1782), *Bloch* (1782), *Werner* (1782), *Retzius* (1786), *Schrank*, de reliquis inteſtinis vix ulli. De MOLLUSCIS *Bohadſch* (1761), *Klein* (1734), *Leske* (1776); de TESTACEIS primario ſobrius *Bonanni* (1681) ditiſſimus *Liſter* (1685) ſolidiſſimus *Rumpf* (1705), curioſiſſimus *Petiver* (1702), abſolutiſſimus *Gualtieri* (1742), nitidiſſimus *Argenville* (1742), pulcherrimus *Regenfus h*) (1758), locupletiſſimi *Martini* (1768), *Chemniz* (1784), *et Schroeter* (1784), nec non *Columna*, *Barrelies*, *Bianchi*, *Klein*, *Ginanni*, *Lange*, *Leſſer*, *Knorr*, *Geve*, *Geoffroy*, *Ad. Murray*, *Favart*, *d'Herbigny*, *Duchesne*, *Kaemmerer*, *Spengler*, *Adanſon* infelicique partu *Seba*, alii. De ZOOPHYTORUM hiſtoria meruere Comes *Marſigli*, oculatus *Donati*, lynceus *Ellis*, indefeſſus *Baſter*, acutiſſimus *Pallas*, *Solander*, *Cavòlini*, alii; de infuſoriorum princeps, *O. F. Müller*, tum *Goeze*, *Wrisberg*, *Terechowsky*, *Schranck*, *Baker*, *Hill*, *Joblot*, *Ledermüller*, *Hermann*, *Eichhorn*.

g) *Amoen. acad.* 5. *p.* 350.
h) *Regenfuſii* operis commentatore *Cl. Krazenſtein et Spengler* prodiere tantum tabulae XII.

GENERUM Characteres.

I. INTESTINA Animalia ſimplicia, nuda, artubus deſtituta.

* *intra alia animalia degentia, oculis nullis.*

276. ASCARIS. *Corpus* teres, poſterius attenuatum, capite trinodi.

TRICHOCEPHALUS. *Corpus* teres, capite filiformi longo.

UNCINARIA. *Corpus* filiforme elaſticum: capite labiato; labiis membranaceis angulatis, cauda (*feminae*) aciformi (*maris*) uncis 2 veſicae pellucidae incluſis armata.

TILARIA. *Corpus* filiforme totum.

SCOLEX. *Corpus* minimum gelatinoſum opacum, capite exſertili et retractili: auriculis 4 pellucidis.

LIGULA. *Corpus* lineare aequale elongatum.

LINGUATULA. *Corpus* depreſſum oblongum: ore anteriori oſtiis 4 cincto.

STRONGYLUS. *Corpus* teres elongatum: anterius globoſo-truncatum: apertura circulari margine ciliata, poſterius (*feminae*) acuminatum, (*mari*) cucullatum.

ECHINORHYNCHUS. *Corpus* teres: proboſcide cylindrica retractili aculeis uncinatis coronata.

HAERUCA. *Corpus* teres: capite aculeis coronata.

CUCULLANUS. *Corpus* poſterius acuminatum, anterius obtuſum: ore orbiculari.

CARYOPHYLLAEUS. *Corpus* teres laeve, ore amplo.

FASCIOLA. *Corpus* depreſſum ovatum gelatinoſum.

351. TAENIA. *Corpus* articulatum depreſſum, anterius tubulo inſtructum: poro ventrali duplici.

353. FURIA. *Corpus* lineare aculeis reflexis utrinque ciliatum.

281. MYXINE. *Corpus* teres ſubtus carinatum pinna adipoſa.

** *extra alia animalia habitantia.*

† *poro laterali nullo.*

275. GORDIUS. *Corpus* aequale filiforme totum, teres, laeve.

280. HIRUDO. *Corpus* anterius et poſterius truncatum, ore caudaque progrediendo dilatata.

†† *poro*

Vagientem etiamnum in cunis ſcientiam a matre lactante longius remotam mirentur adultiores. Cui ordini adſcribendum *Caſeinium* Solandri?

†† *poro laterali pertuſa.*

277.	LUMBRICUS.	*Corpus* teres annulatum: aculeis conditis.
279.	SIPUNCULUS.	*Corpus* teres: roſtro cylindrico anguſtato.
278.	PLANARIA.	*Corpus* depreſſum: poro ventrali.

II. MOLLUSCA. Animalia ſimplicia artubus inſtructa.

* *ore ſupero.*

288.	ACTINIA.	*Apertura* unica communi, dilatabili, nuda, baſi affixa.
	CLAVA.	*Apertura* unica communi, dilatabili verticali: tentaculis clavatis cincta.
	MAMMARIA.	*Apertura* unica, cirris nullis, laevis.
	PEDICELLARIA.	*Corpus* pedunculatum fixum: pedunculo rigido.
287.	ASCIDIA.	*Aperturis* duabus: altera humiliori affixa.
	SALPA.	*Aperturis* duabus: utraque terminali.
	DAGYSA.	*Aperturis* duabus. *Corpus* angulatum.

** *ore antico:*

† *pinna mobili ad abdomen vel caudam.*

	PTEROTRACHEA.	*Corpus* pervium, gelatinoſum tracheatum.

†† *corpore pertuſo foraminulo laterali.*

282.	LIMAX.	*Tentacula* 4. *Anus* communis cum poro laterali.
283.	APLYSIA.	*Tentacula* 4. *Anus* ſupra poſteriora.
284.	DORIS.	*Tentacula* 2. *Anus* ſupra poſteriora.
289.	TETHIS.	*Foramina* lateralia ſiniſtra gemina.

††† *corpore tentaculis anterius cincto.*

290.	HOLOTHURIA.	*Tentacula* carnoſa.
291.	TEREBELLA.	*Tentacula* capillaria.

†††† *corpore brachiato.*

292.	TRITON.	*Brachia* bipartita: quibusdam cheliferis.
296.	SEPIA.	*Brachia* 8-10, inſtructa cotylis.
295.	CLIO.	*Brachia* 2 dilatata.
	LOBARIA.	*Corpus* ſupra convexum, ſubtus planum lobatum.
293.	LERNAEA.	*Brachia* 2 ſ. 3. teretia.
294.	SCYLLAEA.	*Brachia* 6: remotis paribus.
	GLAUCUS?	*Brachia* 4 ramoſa.

†††††† *corpore pedato.*

285.	APHRODITA.	*Os* inerme. *Corpus* ovale, oculatum.
	AMPHITRITE.	*Os* inerme. *Corpus* ſubrotundum. *Oculi* nulli.
	SPIO.	
286.	NEREIS.	*Os* unguiculatum. *Corpus* elongatum. *Tentacula* ſimplicia.
	NAIS.	*Os* inerme. *Corpus* elongatum. *Tentacula* o.

*** *ore infero utplurimum centrali.*

	PHYSSOPHORA?	*Corpus* gelatinoſum e veſicula aërea pendens.
297.	MEDUSA.	*Corpus* gelatinoſum laeve.
	LUCERNARIA.	*Corpus* gelatinoſum rugoſum brachiatum.
298.	ASTERIAS.	*Corpus* coriaceum, muricatum.
299.	ECHINUS.	*Corpus* cruſtaceum, aculeatum.

III. TESTACEA. Molluſca ſimplicia, obtecta teſta calcarea.

* *Multivalvia.*

300.	CHITON.	*Teſta* multivalvis, longitudinaliter dorſalis.
301.	LEPAS.	*Teſta* multivalvis inaequivalvis, ſeſſilis.
302.	PHOLAS.	*Teſta* bivalvis: acceſſoriis poſterioribus.

** *Bivalvia:* Conchae.

303.	MYA.	*Teſtae cardines* (*ſaepius*) dente craſſo vacuo.
304.	SOLEN.	*Teſta* utrinque hians: cardinis dente ſubulato reflexo, ſaepe duplici.
305.	TELLINA.	*Cardinis* dentibus lateralibus alterius valvae utplurimum vacuis.
306.	CARDIUM.	*Cardinis* dentibus lateralibus remotis penetrantibus.
307.	MACTRA.	*Cardinis* dente intermedio complicato trigono cum adjecta foveola.
308.	DONAX.	*Cardinis* dente laterali (*utplurimum*) remoto vacuo.
309.	VENUS.	*Cardinis* dentibus approximatis divaricatis.
310.	SPONDYLUS.	*Cardinis* dentibus duobus diſtinctis foraminulo.
311.	CHAMA.	*Cardinis* dentibus (*in altera teſta*) duobus obliquis obtuſis.
312.	ARCA.	*Cardinis* dentibus numeroſis penetrantibus.
313.	OSTREA.	*Cardinis* dente o, ſcrobiculo ovato.
314.	ANOMIA.	*Cardinis* dente o, ſcrobiculo (*in multis*) lineari marginali.

315. MYTILUS. *Cardinis* dente o: ſcrobiculo ſubulato diſtincto.
316. PINNA. *Cardinis* dente o; margine altero coalito.

*** *Univalvia.*

† *ſpira regulari* Cochleae.

317. ARGONAUTA. *Teſta* unilocularis, ſpiralis, involuta.
318. NAUTILUS. *Teſta* multilocularis: loculis per foramen communicantibus.
319. CONUS. *Teſtae apertura* effuſa lineari edentula.
320. CYPRAEA. *Teſtae apertura* effuſa, lineari utrinque dentata.
321. BULLA. *Teſtae apertura* ſubcoarctata obliquata.
322. VOLUTA. *Teſtae apertura* effuſa: columella plicata.
323. BUCCINUM. *Teſtae apertura* canaliculo dextro.
324. STROMBUS. *Teſtae apertura* canaliculo ſiniſtro.
325. MUREX. *Teſtae apertura* canaliculo recto.
326. TROCHUS. *Teſtae apertura* coarctata ſubtetragona.
327. TURBO. *Teſtae apertura* coarctata orbiculari.
328. HELIX. *Teſtae apertura* coarctata lunari.
329. NERITA. *Teſtae apertura* coarctata ſemiorbiculari.
330. HALIOTIS. *Teſtae apertura* dilatata: *Spira* occultata.

†† *ſine ſpira regulari.*

331. PATELLA. *Teſta* patenti-conica, quieſcens.
332. DENTALIUM. *Teſta* libera ſubulata utroque fine aperta.
333. SERPULA. *Teſta* adnata (*utplurimum*) tubuloſa.
334. TEREDO. *Teſta* intruſa ligno.
335. SABELLA. *Teſta* granis arenaceis conflata.

IV. ZOOPHYTA. Animalia compoſita vegetabilium more efflореſcentia.

* *ſtirpe calcarea* Lithophyta.

336. TUBIPORA. *Corallium* tubis cylindricis.
337. MADREPORA. *Corallium* ſtellis concavis.
338. MILLEPORA. *Corallium* poris ſubulatis.
339. CELLEPORA. *Corallium* cellulis cavis.
340. ISIS. *Stirps* lapidea.

** *ſtirpe molliori.*

ANTIPATHES. *Stirps* cornea, ſpinulis obſita, carne gelatinoſa tecta.
341. GORGONIA. *Stirps* cornea, carne celluloſa vel vaſculoſa tecta.
342. ALCYONIUM. *Stirps* ſuberoſa.

343.	SPONGIA.	*Stirps* ſtupoſa.
344.	FLUSTRA.	*Stirps* poroſiſſima.
345.	TUBULARIA.	*Stirps* fiſtuloſa.
346.	CORALLINA.	*Stirps* articulis filiformibus calcareis.
347.	SERTULARIA.	*Stirps* articulis filiformibus fibroſis.
350.	PENNATULA.	*Stirps* coriacea penniformis.
349.	HYDRA.	*Stirps* medulloſa nuda.

V. INFUSORIA. Animalia minima ſimpliciora.

* *organis externis inſtructa.*

	BRACHIONUS.	*Corpus* teſta tectum apice ciliatum.
348.	VORTICELLA.	*Corpus* nudum apice ciliatum.
	TRICHODA.	*Corpus* altera parte crinitum.
	CERCARIA.	*Corpus* rotundato-caudatum.
	LEUCOPERA.	*Corpus* undique ciliatum.

** *organis externis nullis.*

ſ *complanata.*

	GONIUM.	*Corpus* angulatum.
	COLPODA.	*Corpus* ſinuatum.
	PARAMECIUM.	*Corpus* oblongum.
	CYCLIDIUM.	*Corpus* orbiculare vel ovatum.

ſſ *teretia.*

	BURSARIA.	*Corpus* cavum.
	VIBRIO.	*Corpus* elongatum.
	ENCHELIS.	*Corpus* cylindraceum.
	BACILLARIA.	*Corpus* ex trabeculis in varias formas accommodatis compoſitum.
352.	VOLVOX.	*Corpus* ſphaericum.
	MONAS.	*Corpus* punctiforme.

Admiranda tibi levium ſpectacula rerum.

VIRG.

I. IN-

I. INTESTINA.

Animalia *ſimplicia, absque artubus, nuda.*

276. ASCARIS. *Corpus* teres elaſticum utrinque attenuatum, capite trinodi, cauda obtuſa aut ſubulata.
Vaſa ſpiralia lactea pellucentia.

a. *hominis.*

vermicularis, 1. Aſc. cauda ſubulata, cute ad latera corporis ſubtiliſſime crenata. *Goeze Eingew. p.* 102. *t.* 5. *f.* 1-3.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1076. *n.* 1. *Fn. ſuec.* 1269. Aſcaris pollicaris.
Aldrov. inſ. 6. *p.* 651. 656.
Mouff. theatr. inſ. p. 297.
Valisn. op. 1. *t.* 20. *f.* 5-10.
Cleric. lumbr. t. 3. *f.* 5-10.
Bianch. hiſt. morb. t. 3. *f.* 20.
Pheſ. hiſt. aſcar. t. 1. *f.* 3-11. *t.* 2. *f.* 1-3.
Pall. inſ. viv. p. 12.
Müll. hiſt. verm. 1. 2. *p.* 6. *t.* 34.
Hill hiſt. anim. p. 14.
v. Doever. verm. p. 59. 60.
O. Fabr. Fn. groenl. 248.
Bloch Eingew. p. 31.
Happ verm. hom. int. p. 8.
Werner verm. inteſt. p. 72. *t.* 5. *f.* 133-137.
Habitat in puerorum, *etiam recens natorum,* inteſtinis, *potiſſimum recto, vivipara.*

lumbricoides. 2. Aſc. cauda obtuſa vel ſubincurva, ani rima transverſa, inteſtino aurantio. *Goeze Eingew. p.* 65.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1076. *n.* 2. Aſcaris ſpithamea.
Aldrov. inſ. l. 6. *p.* 652. *f.* 4. 5.
Jonſt. inſ. p. 158. *t.* 24. *n.* 1.
Mouff. theatr. inſ. p. 282. 296.
Red. anim. viv. negl. an. viv. p. 19. 20. *t.* 10. *f.* 2. 3. *opuſc.* 3. *t.* 10. *f.* 1-4.
Valisn. op. 1. *p.* 271. *t.* 34. 35.
Cleric. lumbr. p. 218. *t.* 4. *f.* 1-4. 1?. 10. 11.

Klein

Klein herpetol. p. 63. *t.* 1. *f.* 3. *t.* 2. *f.* 1-7.
Act. angl. 1678. *n.* 147.
Barthol. cent. 2. *h.* 23.
Pallas diſſ. de inf. viv. p. 13.
Odhel. act. Stockh. 1776. *p.* 140. *t.* 4. *f.* 1. 3. *et p.* 313.
Doeveren. verm. p. 68. *t.* 8. *f.* 1. 2.
Müller hiſt. verm. 1. 2. *p.* 35.
Naturf. 12. *p.* 180.
Bloch Eingew. p. 29. *t.* 8. *f.* 1-6.
Wern. verm. inteſt. p. 75. *t.* 6. *f.* 144-148. *t.* 7. *f.* 153-159.
Rauh de aſc. lumbric. Linn. Goett. 1779.
Pereboom deſcr. nov. gen. verm. Stomachida &c. Amſtel. 1780.
Habitat in hominis inteſtinis, *praeſertim tenuibus, aliquando in ductum pancreaticum penetrans ſetarum defectu facile a lumbrico terreſtri dignoſcendus, cingulo nullo,* σιϱογγυλος *Hippocratis, Lumbricus teres aliorum.*

veſpertilionis. 3. Aſc. *Goeze Eingew. p.* 86.
Habitat in veſpertilionis auriti inteſtinis.

b. *mammalium.*

phocae. 4. Aſc. pallida, inteſtino lacteo ſpirali. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 74. *f.* 1. *prodr.* 2590. *rar.* 2. *p.* 101. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 272. *n.* 250.
Goez. Eingew. p. 73. *t.* 2. *f.* 9. 10.
Habitat in phocarum, vitulinae, groenlandicae, hiſpidae inteſtinis, ½-8 *pollices longa, utroque fine attenuata, poſteriore acuminata, adunca, tota pellucida.*

bifida. 5. Aſc. poſterius furcata, anterius curva ſetiformis. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 74. *f.* 3. *rar.* 2. *p.* 102. *prodr.* 2592. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 273. *n.* 253.
Habitat in phocae groenlandicae inteſtinis, *aſc. phocae magnitudine, pallida, inteſtinis contortuplicatis, roſtro anterius acutiſſimo, ad cujus baſin porus pro proboſcide brevi.*

canis. 6. Aſc. cauda acuminata, capite applanato, membrana utrinque alato, vaſis ſpermaticis cincinnatis. *Wern. verm. inteſtin. cont.* 1. *p.* 11. *t.* 9. *f.* 38-40. *Goeze Eingew. p.* 81, 84.
Barth. anat. cent. 2. *p.* 318.
Red. opuſc. 3. *t.* 8. *f.* 1-4.
β) *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 75.
γ) *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 73. *t.* 13. *f.* 8?
opuſc. 3. *t.* 17. *f.* 3.
Habitat in canis familiaris inteſtinis.

viſceralis. 7. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 308. *t.* 8. *f.* 1.
Habitat in canis familiaris renibus.

lupi. 8. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 75.
Habitat in lupi inteſtinis.

vulpis. 9. Aſc. membranis capitis lateralibus retrorſum attenuatis. *Goeze Eingew. p.* 84.
Froelich Naturf. 24. *p.* 140. *t.* 4. *f.* 30. 31.
Klein herpet. p. 63.
Habitat in vulpis inteſtinis, *potiſſimum duodeno.*

leonis. 10. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 75. *et p.* 309. *t.* 9. *f.* 3.
Habitat ſub leonis pelle.

tigridis. 11. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 19.
Act. acad. pariſ. 1763. *p.* 47.
Habitat in tigridis inteſtinis.

felis. 12. Aſc. capite veſicula utrinque oblonga poſterius obtuſa pellucida ex albo cineraſcente. *Goeze Eingew. p.* 79. *t.* 1. *f.* 5. 9-13.
Froelich Naturf. 24. *p.* 141.
Red. anim. viv. n. an. viv. p. 12. *t.* 13. *f.* 8.
Habitat, utplurimum gregaria et taeniam ſerratam comitem habens, in felis cati ventriculo *et* inteſtinis, *praeſertim tenuibus.*

cati. 13. Aſc. *Goeze Eingew. p.* 80.
Habitat in felis cati inteſtinis, *veſicularum capitis defectu ab aſc. felis diſtincta.*

martis. 14. Aſc. *Goeze Eingew. p.* 84.
Habitat in martis inteſtinis.

bronchialis. 15. Aſc. albida contorta granulis quaſi infarcta. *Wern. verm. int. ant.* 1. *p.* 9. *t.* 8. *f.* 20. 21.
Habitat in martis pulmonibus, *bronchiorum dichotomiae glomeratim adhaerens.*

16. Aſc.

Aſcarides, *plurimae in inteſtinis obviae, utplurimum gregariae, valvula triplici ad caput inſtructae, qua ſe, dum nutrimentum hauriunt, affigant, femina a mare diſtincta, frequentius ovipara utero bicorni gaudet. Plures ſpecies adhuc ignotas, vel imperfectius juſto definitas et diſtinctas deteget dies; An quos* Red. *oper.* 3. *p.* 8. *in anguis bicipitis inteſtinis conſpexit albidi et rubelli vermes huc ſpectant? quo ſpectat aſcaris acuta, a* Müllero *zool. dan.* 3. *p.* 53. *dicta, et t.* 111. *f.* 1-5 *delineata?*

renalis. 16. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 309. *t.* 9. *f.* 1.
Habitat in martis renibus.

mephitidis. 17. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 14.
Habitat in mephitidis inteſtinis.

gulonis. 18. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 14.
Habitat in gulonis inteſtinis.

talpae. 19. Aſc. *Goeze Eingew. p.* 75. 87.
Habitat in talpae inteſtinis *et* ventriculo.

muris. 20. Aſc. cauda pennata, inteſtino obſcuriori. *Wern. verm. inteſt. cent.* 1. *p.* 10. *t.* 8. *f.* 1-7. *Goeze Eingew. p.* 86. 87.
Habitat in muſculi ventriculo, *annulata, feminae genitalibus triplici foramine hiantibus.*

hirci. 21. Aſc. *Soemmer. ap. Goeze Eingew. p.* 175.
Habitat in hirci inteſtinis.

vituli. 22. Aſc. filiformis cauda rotundata. *Goeze Eingew. p.* 91. *t.* 2. *f.* 7. B.
Camper. Schrift. berl. Naturf. 1. *p.* 115.
Pall. de inf. viv. p. 14.
Valisn. op. t. 34. 35. *f.* 2. 3.
Cleric. lumbr. t. 10. 11. *f.* 2. 3.
Habitat gregaria in vitulorum per artem infectorum pulmonibus et tracheis, *vivipara.*

equi. 23. Aſc. cylindrica magna. *Goeze Eingew. p.* 62. *t.* 1. *f.* 1-3.
Bloch Eingew. p. 30. *t.* 8. *f.* 4-6.
Pall. n. nord. Beytr. 1. *p.* 72.
Barthol. act. Havn. 1. *p.* 37.
Vandell. diſſ. p. 71. *t.* 2. *f.* 6.
Habitat in equi inteſtinis, *inter congeneres gigas, ut ſeſquipedalis digiti minimi craſſitie occurrat.*

ſuis. 24. Aſc. pallida, linea utrinque longitudinali ſubochracea. *Goeze Eingew. p.* 71. *Pall. inf. viv. p.* 14.
Doever. verm. int. p. 67.
Habitat in ſuis feroſae inteſtinis, *aſc. equi longitudine aequalis, at multo tenuior.*

apri. 25. Aſc. *Ebel Beſch. der berl. Naturf.* 3. *p.* 420. *Goeze Eingew. p.* 92. *t.* 2. *f.* 6.
Habitat in apri pulmone, *vivipara, friabilis, utrinque attenuata, fili tenuiſſimi craſſitie, pollicem circiter longa.*

c. *avium.*

aquilae. 26. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 81.
Habitat in falconis chryſaëti inteſtinis.

albicillae. 27. Aſc. *Bloch Eingew. p.* 31.
Habitat in Falconis Albicillae inteſtinis.

buteonis. 28. Aſc. *Goeze Eingew. p.* 85.
Habitat in buteonis inteſtinis, *ventriculo vicinis.*

milvi. 29. Aſc. *Goeze Eingew. p.* 85. 126.
Habitat ſatis magna ſpiraliter convoluta in milvi inteſtinis, *ventriculo et recto propinquis an forſan duae ſpecies diſtinctae?*

ſubbuteonis. 30. Aſc. *Bloch Eingew. p.* 31.
Habitat in ſubbuteonis inteſtinis, *acui affinis.*

hermaphrodita. 31. Aſc. poſterius oblique truncata obtuſa breviter mucronata, aculeis duobus incurvis pone aperturam poſteriorem prominentibus. *Froelich Naturf.* 24. *p.* 151. *t.* 4. *f.* 11-13.
Habitat in pſittaci aeſtivi inteſtinis tenuibus.

cornicis. 32. Aſc. *Soemmer. apud Goeze Eingew. p.* 75.
Red. anim. viv. n. an. viv. p. 83.
Habitat in cornicis ventriculo.

coraciae. 33. Aſc. alba laevis. *Friſch miſc. berol.* 3. *p.* 47. *Pallas inf. viv. p.* 61. *Goeze Eingew. p.* 90. *t.* 2. *f.* 5. *Bloch Eingew. p.* 31.
Habitat ſub cute jugulari coraciae garrulae.

cygni. 34. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 80?
Habitat in cygni inteſtinis.

anatis. 35. Aſc. alba poſterius planiuſcula. *Bloch Beſch. der berl. Naturf.* 4. *p.* 552.
Goeze Eingew. p. 85.
Habitat in anatis boſchadis inteſtinis, 4-6 *pollices longa vivipara.*

fuligulae. 36. Aſc. *Bloch Eingew. p.* 31.
Habitat in anatis fuligulae interaneis, *ovipara.*

lari. 37. Aſc. *Bloch Beſch. der berl. Naturf.* 4. *p.* 552.
Habitat in lari cinerei inteſtinis.

ciconiae. 38. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 86.
Habitat in ciconiae inteſtinis.

tardae. 39. Aſc. *Bloch Eingew. p.* 31.
Habitat in otidis tardae interaneis.

papilloſa. 40. Aſc. ſubtus papilloſus, cauda in ſetam abeunte aculeata. *Bloch Eingew. p.* 32. *t.* 9. *f.* 1-6.
Habitat in otidis tardae inteſtino, caeco *et* recto, 6-8 *lineas longa, crinis equini craſſitie, ovipara, cauda nunc una, nunc tribus ſetis terminata, mucronibus* 2 *inaequalibus prope caudam, papillis in abdomine utplurimum* 4, *cui interdum quinta, et* 3 *minores ad utrumque caudae latus accedunt.*

gallopavonis. 41. Aſc. *Goeze Eingew. p.* 85.
Habitat in gallopavonis inteſtinis.

galli. 42. Aſc. capite uncinato, cauda acuta. *Goeze Eingew. p.* 75. 76. 85. 86. *t.* 1. *f.* 4. 7. 8.
Habitat in galli *junioris et* gallinae inteſtinis.

gallinae. 43. Aſc. inteſtino clavato, cauda rotundata. *Goeze Eingew. p.* 86.
Habitat in gallinae inteſtino caeco.

phaſiani. 44. Aſc. inteſtino clavato, cauda rotundata. *Goeze Eingew. p.* 86.
Habitat in phaſiani picti inteſtino caeco, *an eadem cum aſc. gallinae?*

tetraonis. 45. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 82.
Habitat in tetricis interaneis.

columbae. 46. Aſc. *Goeze Eingew. p.* 84. 85. *t.* 1. *f.* 6.
Habitat in columbae domeſticae inteſtinis.

alaudae. 47. Aſc. *Vandell. diſſ. p.* 76.
Goeze Eingew. p. 125.
Habitat in alaudae interaneis.

ſturni. 48. Aſc. *Goeze Eingew. p.* 86.
Habitat in ſturni vulgaris inteſtinis.

turdi. 49. Aſc. *Goeze Eingew. p.* 75. 77. 78. 85. *t.* 2. *f.* 1-3.
Habitat in turdi iliaci, viſcivori, pilaris inteſtinis, hepate.

d. *repti-*

d. *reptilium.*

teſtudinis. 50. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 80.
Habitat in teſtudinis orbicularis interaneis.

lacertae. 51. Aſc. cauda ſubulata. *Goeze Eingew. p.* 108.
Doever. verm. p. 57.
Habitat in lacertae paluſtris inteſtinis.

bufonis. 52. Aſc. filiformis, cauda rotundata. *Goeze Eingew. p.* 93. 94. 434. *t.* 4. *f.* 1-3. *et t.* 35. *f.* 7-10.
Habitat in bufonis inteſtinis, *vivipara.*

pulmonalis. 53. Aſc. filiformis, inteſtino nigro, cauda rotundata. *Goeze Eingew. p.* 95-97. *t.* 5. *f.* 6-17.
Habitat in bufonis *et* rubetrae pulmonibus, *vivipara.*

rubetrae. 54. Aſc. cauda ſubulata. *Goeze Eingew. p.* 95. 97. 101.
Habitat in bufonis *et* rubetrae inteſtino recto, *vivipara.*

trachealis. 55. Aſc. cauda ſubulata. *Goeze Eingew. p.* 98. *t.* 2. *f.* 8.
Habitat in bufonis pulmonibus, *vivipara.*

ranae. 56. Aſc. cauda ſubulata, inteſtino clavato. *Goeze Eingew. p.* 101. *t.* 4. *f.* 4-9.
Doever. verm. p. 97.
Habitat in ranae temporariae inteſtino recto, *vivipara.*

inteſtinalis. 57. Aſc. filiformis, cauda rotundata. *Goeze Eingew. p.* 100.
Habitat in ranae temporariae inteſtinis.

dyſpnoos. 58. Aſc. cauda ſubulata. *Goeze Eingew. p.* 98.
Habitat in ranae temporariae pulmonibus, *reſpirationem et natationem impediens, vivipara, fertiliſſima, ſpiraliter convoluta.*

inſons. 59. Aſc. cauda rotundata. *Goeze Eingew. p.* 98.
Swammerd. bibl. nat. p. 317.
Habitat in ranae temporariae pulmonibus, *innoxia.*

e. *piſcium.*

anguillae. 60. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 86. *opuſc.* 3. *p.* 231?
Habitat in muraenae anguillae interaneis.

marina. 61. Aſc. filiformis albidus laevis, plano ſpirali convolutus, inteſtino tubuloſo.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1075. *n.* 4. *Müll. zool. dan. prodr.* 2578. O. *Fabr. fn. groenl. p.* 166. *n.* 241. Gordius (marinus) filiformis plano ſpirali convolutus.

Leeuwenh. arc. nat. p. 370.
Pall. inf. viv. intr. viv. p. 16.
Aſcan. ic. rer. nat. t. 7. *f.* a. b. c.
Müll. *Naturf.* 12. *p.* 183. *Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 208. 212.
Brit. zool. t. 20. *f.* 3.
Habitat in piſcibus marinis, *potiſſimum* gadis, *viſceribus utplurimum extus adhaerens, ad ſeſquipollicem longa, ſub tecto ſuo immobilis, at in aquam conjecta mirifice ſe torquens, leprae norwegicae nequaquam cauſa.*

blennii. 62. Aſc. *Müller Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 216.
Habitat ad et in blennii vivipari inteſtinis, *partim in nodos convoluta.*

rhombi. 63. Aſc. *Müll. Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 213.
Habitat in Pleuronecte Rhombo.

Percae. 64. Aſc. recta acicularis utroque fine incurva. *Goeze Eingew. p.* 90.
Habitat in perca fluviatili.

globicola. 65. Aſc. anterius obtuſior ſubbifida, globulum membranaceum inhabitans. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 268. *n.* 243.
Jonſt. inſ. 183? Vermis Bellonii in cernuis obvius.
Habitat nuda, et globulo incluſa in gaſteroſteo aculeato, *ventriculi cuti exteriori adhaerens, gelatinoſa, laevis, planiuſcula, aquea, utroque fine lineaque longitudinali dorſi lacteis,* 4 *lineas longa.*

lacuſtris. 66. Aſc. plano ſpirali convoluta utrinque attenuata. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 268. *n.* 242.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1076. *n.* 5. Gordius lacuſtris.
Habitat in gaſteroſtei aculeati inteſtinis, lucii hepate, *alba, laevis, an forte eadem cum globicola.*

ſiluri. 67. Aſc. recta acicularis utroque fine incurva. *Bloch Eingew. p.* 31.
Habitat in glanide.

farionis. 68. Aſc. teres cineraſcens. *Goeze Eingew. p.* 77.
Habitat in farionis inteſtinis.

truttae. 69. Aſc. filiformis, cauda rotundata. *Goeze Eingew. p.* 93.
Habitat in farionis inteſtinis.

70. Aſc.

maraenae. 70. Aſc. *Koelr. comm. petrop.* 18. *p.* 509.
Habitat in maraena.

Acus. 71. Aſc. recta rigida acicularis, utroque fine ſubincurvo. *Bloch Eingew. p.* 30. 31.
Beſch. der berl. Naturf. 4. *p.* 544. *Goeze Eingew. p.* 90.
Müll. Naturf. 14. *p.* 140. Aſcaris Seta.
Habitat in lucii inteſtinis, *alba, ad 2 pollices longa.*

halecis. 72. Aſc. filiformis plano ſpirali convoluta.
Bloch Eingew. p. 33. *t.* 8. *f.* 7-10. Gordius harengum.
Müll. berl. Naturf. Schr. 1. *p.* 212.
Habitat in halecis veſiculis ſeminalibus, *et extus ad* inteſtina, *ad pollicem longa, crinis equini craſſitie.*

argentinae. 73. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 88.
Habitat in argentina.

gobionis. 74. Aſc. cauda truncata. *Goeze Eingew. p.* 127. *t.* 8. *f.* 1-3.
Habitat circa cyprini gobionis hepar, *tenerrima.*

rajae. 75. Aſc. poſterius attenuata integra, anterius ſetiformis ſubcurva. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 273. *n.* 253. *Müll. zool. dan. prodr.* 2593. *ic.* 2. *t.* 74. *f.* 1-3.
Habitat in rajae fulloniae ventriculo, *bifidae ſimilis et aequalis, cauda tamen non fiſſa, et quaſi abrupta, roſtro longiori, compreſſo, linea longitudinali, quaſi fiſſo diſcernenda.*

ſquali. 76. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 89.
Habitat in ſqualo glaberrima.

lophii. 77. Aſc. rigida cornea glaberrima dilutius fuſca, inteſtino filoque multipliciter contorto lacteis, globulo minimo ad caudam. *Müller Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 211. *zool. dan.* 3. *p.* 53. *t.* 111. *f.* 1-4.
Habitat in lophii piſcatorii *canali cibario, magna.*

f. *vermium.*

lumbrici. 78. Aſc. minutiſſima, cauda ſubulata, punctorum obſcurorum ordinibus duobus. *Goeze Eingew. p.* 110. *t.* 4. *f.* 10.
v. Gleich. auserl. microſc. Entd. p. 58. *t.* 27. 28.
Habitat in lumbricis, *infra cutem et in humoribus, nudo oculo non uſurpanda.*

TRICHOCEPHALUS. *Corpus* elaſticum, contortum: parte poſteriori craſſo clavato; anteriori capillari duplo longiori, ad finem interdum nodoſa.

* *capite ſimplici.*

hominis. 1. Tr. ſupra ſubcrenatus, ſubtus laevis, anterius ſubtiliſſime ſtriatus.
Mant. 2. *p.* 543. Trichuris.
Roeder. et Wagler. de morb. mucoſ. ed. Wrisb. p. 62. *t.* 3. *f.* 4. Trichuris.
Roeder. Goett. gel. Anz. 1761. *St.* 25.
Wrisb. de animalc. infuſ. p. 6. *et Roeder. et Wagl. de morb. muc. praefat.*
Happ verm. inteſt. hom. hiſt. p. 21.
Wern. verm. inteſt. p. 84-86. *t.* 6. *f.* 138-143.
Müller Naturf. 12. *p.* 182.
Bloch Eingew. p. 32. *f.* 7-9.
Goeze Eingew. p. 113. &c. *t.* 6. *f.* 1-5.
Blumenb. Naturg. p. 410.
Habitat in hominis, *potiſſimum morbo mucoſo laborantis, inteſtinis, rarior in tenuibus, frequentiſſimus in caeco, ad* 2 *pollices longus.*

equi. 2. Tr. *Goeze Eingew. p.* 118. *t.* 6. *f.* 8.
Habitat in equo, $2\frac{1}{2}$ *pollices longus, parte poſteriore pollicari, anteriori ſeſquipollicari.*

apri. 3. Tr. cauda utrinque ſquamis crenatis ornata. *Goeze Eingew. p.* 122. *t.* 6. *f.* 6. 7.
Habitat in apro, *humano aequalis.*

muris. 4. Tr. capite trinodi. *Goeze Eingew. p.* 119. *t.* 7. A. *f.* 1-5.
Habitat in muris inteſtinis, *medio fere inter duodenum et rectum loco, parte tenuiore veſiculis albis obſeſſa.*

5. Tr.

Trichocephali *gregarii ovipari, quotquot hactenus novimus, in inteſtinis praeſertim mammalium habitant; mares cauda ſpiraliter convoluta diſtincti.*

vulpis. 5. Tr. capite acutiuſculo anguis, collo transverſim ſtriato: veſiculis unilateralibus. *Froelich Naturf.* 24. *p.* 142. *t.* 4. *f.* 25-29.
Habitat in vulpis inteſtino caeco.

** *capite uncinato.*

lacertae. 6. Tr. cauda utrinque ſquamata. *Goeze Eingew. p.* 123. *t.* 7. A. *f.* 6. 7.
Pallas nov. comm. petrop. 19. *t.* 10. *f.* 6. *n. nord. Beytr. p.* 111. Taenia Spirillum.
Müll. Naturf. 12. *p.* 182.
Habitat in lacertae apodis inteſtinis.

FILARIA. *Corpus* teres filiforme, aequale, laeviſſimum, ore dilatato: labio ſubrotundo concavo.

* *hominis.*

medinenſis. 1. F. tota pallida.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1075. *n.* 3. Gordius medinenſis.
Welſch monogr. Vena medinenſis.
Sloan. jam. 2. *p.* 190. *t.* 233. *f.* 1. Vena medinenſis.
Kaempf. amoen. exot. p. 524. Dracunculus perſarum.
Gallandat n. act. ac. caeſ. 5. *app. n.* 3.
Grun. act. ac. el. Erf. ad 1777. *med. n.* 3.
Habitat in Guinea, America *et* Aſia meridionali, *nudipedum obambulantium ſervorum pedes intrans, dolorem febremque excitans, caute extrahendus, ad* 12 *pedes longus; mercurio ſublimato corroſivo in ſpiritu frumenti ſoluto intra* 20 *dies, qui alius demum poſt* 40 *dies, educitur: An inter inteſtinales locum meretur?*

** *mammalium.*

equi. 18. F. poſterius attenuata, cauda acutiſſima incurvata.
Abildgeard apud Müll. zool. dan. 3. *p.* 49. *t.* 109. *f.* 12.
Habitat in equini corporis cavis variis telaque celluloſa.

Filariae, *a gordiis habitaculo et plurimae cauda non uncinata diſtinctae, ſaepius telam celluloſam, rarius inteſtina inhabitant, ex piſcibus, amphibiis, vermibus exules, an ſingulae pro animali, in quo degunt, diverſo, diverſae ſpecies?*

leonis. 2. F. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 14. *t.* 9. *f.* 2.
Habitat in leone.

martis. 3. F. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 15. *t.* 9. *f.* 1.
Habitat in marte.

leporis. 4. F. *Pall. n. nord. Beytr.* 1. *p.* 83.
Habitat in leporum coxae tela celluloſa.

*** *avium.*

falconis. 5. F. *Pall. n. nord. Beytr.* 1. *p.* 83.
Vandell. diſſ. p. 75.
Red. anim. viv. n. an. viv. p. 80.
Habitat in falconum tela celluloſa abdominali *et* crurali.

ſtrigis. 6. F. *Pall. n. nord. Beytr. p.* 83.
Habitat in ſtrigibus, *in tela celluloſa capitis et aures cingente.*

cornicis. 7. F. *Pall. n. nord. Beytr.* 1. *p.* 83.
Habitat in cornicis thorace *et* pulmonibus.

ciconiae. 8. F. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 83. *op.* 3. *p.* 223?
Habitat in ciconia.

gallinae. 9. F. *Goeze Eingew. p.* 126. *t.* 7. B. *f.* 8-10.
Müll. Naturf. 12. *p.* 187.
Habitat in gallinae inteſtinis tenuibus, 2 *pollices longa, capillaris.*

**** *inſectorum.*

† *perfectorum.*

ſcarabaei. 10. F. *Act. angl.* 1. *p.* 49.
Habitat in ſcarabaeo fimetario.

ſilphae. 11. F. *Goeze Eingew. p.* 128.
Habitat in ſilpha obſcura.

carabi. 12. F. *Pall. de inſ. viv. p.* 12.
Liſt. act. angl. n. 81.
Habitat in carabo.

grylli. 13. F. *Goeze Eingew. p.* 128.
Friſch inſ. 12. *p.* 3. *t.* 2. *f.* 1.
Roeſ. inſ. 2. *p.* 58.
Sulz. hiſt. inſ. p. 81.
Pall. it. 1. *p.* 26.
N. Mannigf. 4. 1. *p.* 55. 117.
Habitat in gryllis.

monoculi. 14. F. *Walch Naturf.* 12. *p.* 64.
Habitat in monoculo apode.

⊢⊢ *larvarum.*

lepidopterorum. 15. F. cauda uncinata. *Schranck Beytr. z. Naturg. p.* 98. *Goeze Eingew. p.* 127.
papilionum. α) F. *Wern. verm. inteſt. cont.* 1. *p.* 6.
polychlori. *a.* F. alba. *Wern. verm. inteſt. cont.* 1. *p.* 6.
urticae. *b.* F. ex flaveſcente cinerea. *Wern. verm. inteſt. cont.* 1. *p.* 6
betulae. *c.* F. alba. *Wern. verm. inteſt. cont.* 1. *p.* 6.
quercus. *d.* F. alba. *Wern. verm. inteſt. cont.* 1. *p.* 6.
ſphingum. β) F. ſphingis euphorbiae. *Roeſ. inſ.* 1. *phal.* 1. *p.* 20.
phalaenarum. γ) F. *N. Mannigf.* 4. *app. p.* 455.
quercus. *a.* F. alba. *Wern. verm. inteſt. cont.* 1. *p.* 6.
cajae. *b.* F. ſpadicea. *Wern. verm. inteſt. cont.* 1. *p.* 6.
Ziczac. *c.* F. *Degeer inſ.* 1. *p.* 309. *t.* 34. *f.* 6-8.
nuptae. *d.* F. *Goeze Eingew. p.* 127. *t.* 8. *f.* 4-6.
Pſi. *e.* F. *Roeſ. inſ.* 1. *phal.* 2. *p.* 65.
ponionellae. *f.* F. *Goeze Eingew. p.* 128.
Habitat ſub larvarum *cute, his perniciosiſſima, non rara ſolitaria,* 4, 5, 6, 7, *pollices longa, glaberrima, dura, utroque fine attenuata, anteriori obtuſiore, labiis quaſi* 3 *oblongis munito.*

tenthredinis. 16. F. *Act. Stockh.* 35. *p.* 181.
Habitat in tenthredinum larva.

phryganeae. 17. F. *Degeer inſ.* II. 1. *p.* 555. A. 14. *f.* 12-14.
Habitat in phryganearum larvis.

UNCINARIA.

Corpus filiforme elaſticum, antrorſum obſolete noduloſum: labiis membranaceis angulatis.

Cauda feminae aciculata, maris uncis 2 cuſpidatis veſicae pellucidae incluſis armata.

melis. 1. U. femina ſubrecta, maris uncis approximatis: veſica rotundata. *Froelich Naturf.* 24. *p.* 136.

 Goeze

Goeze Eingew. p. 106. A. B. *f.* 1-4. Aſcaris criniformis.
Müll. Naturf. 22. *p.* 55. Strongylus melis.
Habitat in melis inteſtinis craſſis.

vulpis. 2. U. femina ad angulum inflexa, maris uncis remotis quadricuſpidatis: veſica cordato-biloba. *Froelich Naturf.* 24. *p.* 137. *t.* 4. *f.* 18. 19.
Habitat in vulpis inteſtinis craſſis, *praecipue recto.*

SCOLEX. *Corpus* gelatinoſum, polymorphum, anterius latiuſculum, poſterius acuminatum, nunc lineare et elongatum, nunc rugoſum et breve, teres, flexuoſum vel depreſſum, capite exſertili et retractili.

pleuronectis. 1. Sc. capite auriculis quaternis. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 58. *par.* 2. *p.* 53. *Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 206. 207. 210. 213.
Habitat in Pleuronectis Rhombi, Linguatulae, Plateſſae, Salmonis Lavareti *et* Cyclopteri Lumpi *muco inteſtinali, nudo oculo non diſtinguenda, capite colloque pellucidis, illo pone punctis* 2 *ſanguineis, utplurimum oblongis ſplendidis picto: auriculis in varias formas plicatilibus; hoc brevi: margine lunato, in vivis ſanguineo, capite ad taenias accedens.*

lophii. 2. Sc. *Müll. berl. Naturf. Schr.* 1. *p.* 211.
Habitat in Lophii piſcatorii muco inteſtinali, *nudo oculo vix diſcernenda, an diverſa a ſc. pleuronectis ſpecies?*

LIGULA. *Corpus* lineare aequale elongatum; anterius obtuſum, poſterius acutum ſutura dorſali impreſſa.

inteſtinalis. 1. L. albiſſima anguſtiſſima.
Bloch Eingew. p. 4. *t.* 1. *f.* 1. 2.
Goeze Eingew. p. 183. *t.* 14. *f.* 1-3.
Habitat in mergi minuti, *albelli et* mergenſeris *colymbi auriti* inteſtinis, *abdomine adeo pectore ad pedem usque longa, faſciam exacte referens.*

abdominalis. 2. L. cineraſcens latiuſcula. *Goeze Eingew. p.* 187. *Syſt. nat.* VI. *p.* 70. *t.* 6. *f.* 1. XII. 2. *p.* 1078. *n.* 2. *Fn. ſuec.* 2076. *Amoen. acad.* 2. *p.* 71. *act. Stockh.* 1747. *t.* 5. *f.* 6. Faſciola (inteſtinalis) linearis longa. *Bloch Eingew. p.* 2. Ligula piſcium. *Bloch Beſch. berl. Naturf.* 4. *p.* 549. Fiek.

cobitidis. α) L. *Bloch Eingew. p.* 2.

cyprinorum. β) L. *Goeze Eingew. p.* 187. *Gronov. act. helv.* 2. *p.* 374. *Pall. n. nord. Beytr.* 1. *p.* 94. Taenia cingulum.

gobionis. *a.* L. *Bloch Beſch. der berl. Naturf.* 4. *p.* 549.

trincae. *b.* L. *Bonnet inſectol. Abh. p.* 62.

caraſſii. *c. Pallas n. nord. Beytr.* 1. *p.* 100.

leuciſci. *d. Pallas n. nord. Beytr.* 1. *p.* 95. *Bloch Beſch. d. berl. Naturf.* 4. *p.* 549.

alburni. *e. Bloch Eingew. p.* 2.

vimbae. *f. Pallas n. nord. Beytr.* 1. *p.* 94. *Bloch Eingew. p.* 2. *Goeze Eingew. p.* 189. *t.* 16. *f.* 7. 9.

bramae. *g. Pallas n. nord. Beytr.* 1. *p.* 96. *elench. zooph. p.* 414. *Bloch Eingew. p.* 2. *Beſchr. der berl. Naturf.* 4. *p.* 549. *Goeze Eingew. p.* 187. *t.* 16. *f.* 4-6. *Ruyſch obſerv. anat. n.* 64. *opp.* 1. *p.* 61. *t. f.* C.

Habitat in piſcium abdomine, *praeſertim* meſenterio, *piſces emacians, deformans, abitura cutem perterebrans, nunc ſolitaria, nunc gregaria,* ½ *lineam craſſa,* ½ - 5 *pedes longa.*

STRONGYLUS.

Corpus teres elongatum, pellucidum glabrum, anterius globoſa truncatum: apertura circulari margine ciliata, poſterius in femina integrum acuminatum, in mare in membranas pellucidiſſimas, laxas diſtantes dilatatum.

equinus. 1. Str. capite opaco, inteſtino nigro. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 42. *f.* 1-12. *rar.* 2. *p.* 6.

Kkk kkk kkk 5 *Barthol.*

Strongyli *ovipari, hactenus non niſi in mammalium canali cibario reperti.*

Barthol. act. havn. 1. *p.* 37.
Goeze Eingew. p. 137. *t.* 9. B. *f.* 10. 11.
Habitat gregarius in equi ventriculo; *mas pallide luteus, membrana flavicante ſubtiliſſima interanea involvente, cauda triphylla: inter membranulas nunc e papillula exeunte ſpiculo ſimplici appoſitis* 3 *laciniis munito, nunc praeter uncum ſpiculo duplici utroque tricuſpide, feminae inteſtinum involventibus vaſculis, filiformibus albis.*

ovinus. 2. Str. *O. Fabr. apud Müll. zool. dan. rar.* 2. *p.* 8.
Habitat in ovium inteſtinis.

ECHINORHYNCHUS. *Corpus* teres: proboſcide cylindrica retractili echinata.

a. *mammalium.*

phocae. 1. E. pallidus, inteſtino lacteo ſpirali.
Müll. zool. dan. 2. *t.* 74. *f.* 1. *prodr.* 2590. *rar.* 2. *p.* 101.
O. *Fabr. fn. groenl. p.* 272. *n.* 250. Aſcaris phocae.
Habitat gregarius in phocae groenlandicae *et* hiſpidae inteſtinis, *quam non raro fere conſumit,* $3\frac{1}{2}$ - 8 *pollices longus, pellucidus, membranaceus, utroque fine attenuatus, poſteriori acuminatus, aduncus.*

tubifer. 2. E. albidus glaber, poſterius in ſetam attenuatus.
Müll. zool. dan. 2. *t.* 74. *f.* 2. *prodr.* 2591. *rar.* 2. *p.* 101.
O. *Fabr. fn. groenl. p.* 273. *n.* 251. Aſcaris (tubifera) albida, antice roſtro cylindrico quaſi prolongata.
Habitat in phocae barbatae ventriculo, *vix pollicem longus.*

Gigas. 3. E. candidiſſimus, collo nullo proboſcide vaginata: aculeorum uncinatorum ordinibus pluribus, papillis ſuctoriis lenis. *Goeze Eingew. p.* 143. *t.* 10. *f.* 1-6.
Bloch Eingew. p. 26. *t.* 7. *f.* 1-8.
Pall. comment. Petrop. 19. *p.* 202. *t.* 11. *f.* 3. *et n. nord. Beytr.* 1. *p.* 107. Taenia hirudinacea.
Müll. Geſch. der daen. u. norw. Th. 1. *p.* 136. b.
Habitat in porcorum, *praeſertim in ſtabulo ſaginatorum,* inteſtinis, *gregarius, in apro magis caeruleſcens,* 12 *pollices ad* $1\frac{1}{2}$ *pedes longus, proboſcidis filamentis quaſi ligamentis duobus lateralibus, aculeis faucientibus, ovulis primo hyalinis, maturis margine fuſceſcentibus.*

balaenae. 4. E. *Phips it. p.* 103. *t.* 7. *f.* 1. A. B. C.
Habitat in balaenae inteſtinis.

b. *avium.*

buteonis. 5. E. candidiſſimus, veſiculis caudae caeruleſcentibus lentiformibus. *Goeze Eingew. p.* 154. *t.* 12. *f.* 1. 2. A.
Habitat in buteonis inteſtinis, 2¼ *pollices longus.*

ſcopis. 6. E. proboſcidis aculeis numeroſiſſimis. *Goeze Eingew. p.* 154. *t.* 11. *f.* 13.
Habitat in ſtrigis ſcopis inteſtinis craſſis.

aluconis. 7. E. corpore ſubrugoſo opaco, proboſcide incraſſata. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 69. *f.* 1-4. *inf. rar.* 2. *p.* 86.
Habitat in Strigis Aluconis inteſtinis, *flexuoſus, proboſcide aculeis innumeris armata, in centro apicis pertuſa.*

ſtrigis. 8. E. proboſcide clavata. *Goeze Eingew. p.* 153. *t.* 11. *f.* 8-12.
Habitat in ſtrigis ſtridulae inteſtinis craſſis.

pici. 9. E. candidus, collo nullo, proboſcidis aculeis ſerratis. *Goeze Eingew. p.* 150. *t.* 11. *f.* 1-5. *et* A.
Habitat in pici erythrocephali *et* viridis inteſtinis, *gregarius,* 1½ *pollices longus, proboſcidis aculeis minimis.*

borealis. 10. E. anatis molliſſimae.
Phips it. p. 103. *t.* 7. *f.* 1. Sipunculus Lendix.
Habitat in anatis molliſſimae inteſtinis.

boſchadis. 11. E. collo filiformi, proboſcide ſubechinata. *Goeze Eingew. p.* 163. *t.* 13. *f.* 6. 7.
Habitat in anatis domeſticae inteſtinis.

anatis. 12. E. coccineus ovatus, thorace proboſcideque undique uncinatis: collo longo laevi intermedio. *Goeze Eingew. p.* 164. *t.* 13. *f.* 1. 2.
Habitat in anatis fuſcae inteſtinis.

mergi. 13. E. capite colloque armato. *Bloch Eingew. p.* 28. *t.* 7. *f.* 9-11.
Habitat gregarius in mergi minuti inteſtinis, 1-1½ *pollicem longus.*

alcae. 14. E. anterius ſubtus rugis lateralibus medietatem elevatam includentibus.
Müll. zool. dan. 2. *t.* 74. *f.* 8. *prodr.* 2597. *rar.* 2. *p.* 106.
O. Fabr. fn. groenl. p. 276. *n.* 257. Alcaris alcae.
Habitat

Habitat in alcae picae inteſtinis, *ad* 4 *pollices longus, albus, dorſi linea longitudinali nigra, teretiuſculus, antrorſum acutiuſculus, ſubtus planus, poſterius ſubpriſmaticus fine exquiſite acuto, an hujus generis?*

ardeae. 15. E. ſtriatus, proboſcide clavata. *Goeze Eingew. p.* 152. *t.* 11. *f.* 6. 7.
Habitat in ardea cinerea, *poſterius conicus, medio utrinque ſinuato.*

gazae. 16. E. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 85. *t.* 15. *f.* 13. *opuſc.* 3. *p.* 229. *t.* 21. *f.* 9.
Habitat in ardea alba.

vanelli. 17. E. caudae veſica alba: centro albo. *Goeze Eingew. p.* 155.
Habitat in vanelli inteſtinis *mediis.*

merulae. 18. E. ovatus, thorace aculeato. *Goeze Eingew. p.* 165.
Habitat in merula, *et* fringilla montana.

c. *reptilium.*

ranae. 19. E. candidus, proboſcide intus filamentis duobus tenellis albis directa. *Goeze Eingew. p.* 159. *t.* 12. *f.* 10. 11.
Pall. Comment. petrop. 19. *p.* 452. *t.* 9. *f.* 2. a. A. *n. nord. Beytr.* 1. *p.* 109. *t.* 3. *f.* 37. Taenia haeruca.
Red. anim. viv. n. an. viv. p. 82. *opuſc.* 3. *p.* 221.
Habitat gregarius in ranarum, *praeſertim* temporariae, inteſtinis, *fixus interdum vireſcens aut cineraſcens.*

falcatus. 20. E. proboſcide longa longitudinaliter uncis multifariam armata, anteriori litura, poſteriori fine puncto pellucido. *Froelich Naturf.* 24. *p.* 117. *t.* 4. *f.* 22-24.
Habitat in ſolamandrae inteſtino duodeno prope pylorum.

d. *piſcium.*

anguillae. 21. E. corpore candido laevi, proboſcide globoſa. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 69. *f.* 1-3. *med. rar.* 2. *p.* 84. *Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 204.

Red.

Echinorhynchi *firmiſſime animalium, quae inhabitant viſceribus, utplurimum inteſtinis ſaepe per totam vitam uni eidemque loco infixi, utplurimum gregarii, in homine hactenus non inventi, corpore tereti non articulato ſatis a taenia diſtincti, proboſcidis uncinis nudis immobilibus; mares feminis utplurimum oviparis minores ſaepiſſime plane ſegregati in alio individuo habitant: An, quam* O. Fabricius *in blennio viviparo* Acharius *in lota* O. Fr. Müller *in belone, invenerunt, diſtinctae ſpecies?*

Red. anim. viv. n. an. viv. p. 87. *opuſc.* 3. *p.* 234.
Leeuwenh. arc. nat. ep. 313. 314. *f.* 1. 2.
Habitat in muraenae anguillae inteſtinis, *opacus*, *proboſcide collo ſuffulta, uncinorum quinorum vel ſenorum ſeriebus* 6-8 *armata*; *mas poſterius globulis* 7 *opacis, canaliculo ſerie duplici concatenatis conſpicuus, femina duplo longior, et ova continens ovalia, ob fetus lineares.*

xiphiae. 22. E. xiphiae gladii. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 89. *t.* 24. *f.* 7. *op.* 3. *t.* 19. *f.* 1.
Habitat in xiphiae inteſtinis, *quae ſaepe perforat.*

candidus. 23. E. corpore opaco ſubrugoſo albo. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 139. *t.* 37. *f.* 7-10. *et* 2. *t.* 34. *f.* 7. *rar.* 1. *p.* 92. *et* 2. *p.* 105. *Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 205. 209. 214.
O. Fabr. fn. groenl. p. 275. *n.* 256. Aſcaris verſipellis.
Acharius n. act. Stockh. 1780. I. 1. *n.* 5. Acanthrus ſipunculoides.
Goeze Eingew. p. 157.
Habitat in gadorum, callariae, barbati, merlangi, blennii ranini, pleuronectis plateſſoidis, parcae cernuae *et* fluviatilis, cyprini ibari inteſtinis, *ad* 3 *pollicum longitudinem ſe expandens, aequalis craſſitiei, interdum cineraſcens aut flaveſcens, fuſcus, fulvus, croceus, rubicundus, violaceus pro indole fluidi, in quo degit, proboſcide uncinorum* 9-15 *ordinibus* 9-16 *armata, mas minor, ſaepiſſime plane ſeparatus a femina habitans.*

lineolatus. 24. E. corpore lineolis transverſis fuſcis medio interruptis. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 142. *t.* 37. *f.* 11-14. *rar.* 1. *p.* 96.
Müll. zool. dan. prodr. 2599. Echinorhynchus (gadi) proboſcide cylindrica inflexa, corpore filiformi rugoſo.
Pallas zooph. 415. *n. nord. Beytr.* 1. *p.* 107. *t.* 3. *f.* 36. *nov. comm. Petrop.* 19. *p.* 452. *t.* 9. *f.* 2. Taenia Haeruca.
Habitat in gadorum inteſtinis, *ad* 2 *pollices longus, proboſcide minuta.*

longicollis. 25. E. albo-rufeſcens, capite rotundato longitudinaliter ſtriato, collo filiformi, proboſcide ſubechinata. *Goeze Eingew. p.* 162. *t.* 12. *f.* 12-14.
Habitat in Callariae inteſtinis, *proboſcidis uncis minimis.*

pleuronectis. 26. E. corporis lateribus undulatim impreſſis. *Müll. Naturf.* 10. *p.* 150.

Habitat

Habitat in pleuronectis maximi inteſtinis; *an vere diſtincta ſpecies?*

attenuatus. 27. E. globiferus, corpore aequali flavo laevi, collo filiformi. *Müll. zool. dan.* I. *p.* 137. *t.* 37. *f.* 1-3. *rar.* I. *p.* 89. *Pallas n. nord. Beytr.* I. *p.* 110. *t.* 3. *f.* 38. Taenia longicollis.
Habitat rarior et minus numeroſus in fleſi inteſtinis, *pellucidus, aequalis ubique craſſitiei, poſterius rotundatus obtuſus, proboſcide ligamento utrinque adnexo.*

annulatus. 28. E. globiferus, corpore acuminato, collo rugoſo. *Müll. zool. dan.* I. *p.* 138.
Müll. zool. dan. prodr. 2601. Echinorhynchus (laevis) proboſcide echinata prope apicem in ſphaeram laevem dilatata.
Habitat in Cotti Scorpii, Callariae *et* Bramae inteſtinis, *attenuato proxime affinis.*

plateſſoidae. 29. E. roſtro attenuato, poſterius cingulo elevato terminali. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 74. *f.* 5. *prodr.* 2594. *Schr. der berl. Naturf.* I. *p.* 207. O. *Fabr. fn. groenl. p.* 274. *n.* 254. Aſcaris pleuronectis.
Habitat in pleuronectis plateſſoidae ventriculo, $2\frac{1}{2}$ *pollices longus, pallidus laevis.*

percae. 30. E. mollis rugoſus utrinque obtuſus. *Pallas n. nord. Beytr.* I. *p.* 109.
Müll. zool. dan. I. *p.* 140. *par.* I. *p.* 92. *Schr. der berl. Naturf.* I. *p.* 205.
Habitat in percae fluviatilis inteſtinis, *an vere diſtincta ſpecies?*

cernuae. 31. E. percae cernuae. *Müll. zool. dan.* I. *p.* 140. *rar.* I. *p.* 92. *Schr. der berl. Naturf.* I. *p.* 214.
Habitat in percae cernuae inteſtinis, *uncinorum proboſcidi ſeriebus* 10-12; *an propria ſpecies?*

cobitidis. 32. E. ſtriatus, proboſcide clavata. *Goeze Eingew. p.* 158. *t.* 12. *f.* 7-9.
Habitat in cobitidis barbatulae inteſtinis.

Salmonis. 33. E. corpore clavato laevi, proboſcide cylindrica. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 69. *f.* 1-3. *ſuper. rar.* 2. *p.* 83.
Habitat in Salaris inteſtinis, *albus, glaber,* opacus, *anterius ventricoſus, poſterius acuminatus, proboſcide minus echinata, quam in congeneribus.*

ſubloba-tus. 34. E. albus globifer poſterius ad latera ſublobatus, collo cylindrico annulato, proboſcidis coronis uncinorum denorum ſedecim. *Herrmann Naturf.* 17. *p.* 172. *t.* 4. *f.* 8-10.
Habitat in ſalaris junioris inteſtinis, *candido quadruplo minor, annulato proxime affinis.*

quadriro-ſtris. 35. E. candidus, cauda rotunda corpori intruſa, proboſcide quadruplici. *Goeze Eingew. p.* 166. *t.* 12. *f.* 3-5.
Habitat in Salaris hepate, *proboſcidis uncinis innumeris, an hujus generis?*

truttae. 36. E. *Goeze Eingew. p.* 157. *t.* 12. *f.* 5. 6.
Habitat in farionis inteſtinis, *rubellus, praelongus.*

marae-nae. 37. E. fuſiformis laevis ſubrugoſus, pone attenuatus obtuſiuſculus.
Martin et Acharius n. act. Stockh. 1780. *p.* 44. &c. *t.* 2. *f.* 1. 2.
Acanthrus ſipunculoides.
Habitat in maraenae inteſtinis.

lucii. 38. E. corpore pellucido laevi. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 138. *t.* 37. *f.* 4-6. *rar.* 1. *p.* 90. *Naturf.* 12. *p.* 188. *t.* 5. *f.* 1-5. *Beſch. der berl. Naturf.* 4. *p.* 543. *Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 203.
Pall. n. nord. Beytr. 1. *p.* 109.
Goeze Eingew. p. 156. *t.* 12. *f.* 3. 4.
Habitat in lucii inteſtinis, *flavicans, poſterius anguſtior et obtuſus.*

argenti-nae. 39. E. *Barthol. act. havn.* 2. *p.* 225.
Red. anim. viv. n. an. viv. p. 87.
Habitat in argentina.

aloſae. 40. E. filiformis, anterius clavatus rubicundus, aculeorum ſeriebus ſex laxioribus armatus, proboſcide pallida, aculeorum ſeriebus octo denſioribus. *Herrmann Naturf.* 17. *p.* 177. *t.* 4. *f.* 11. 12.
Habitat in aloſae inteſtinis, 2 *pollices longus, proboſcide cylindrica, medio paulo craſſiori, collo brevi, ſaturatius rubro, aculeorum circulis* 2 *armato.*

barbi. 41. E. ovatus flavus, faſciatus, collo longo albo cylindrico ad finem cyathiformi. *Schranck Naturf.* 18. *p.* 83. *t.* 3. *f.* D-H.
Habitat in cyprini barbi inteſtinis, *e. lucii affinis.*

carpionis. 42. E. cyprini carpionis.
Koelreuter nov. comm. Petrop. 15. *p.* 500. *t.* 26. *f.* 5. Acanthocephalus.
Habitat in carpionis inteſtinis.

idbari. 43. E. cyprini idbari. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 140.
Habitat in idbari inteſtinis, *candido proxime affinis.*

affinis. 44. E. cyprini rutili. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 136.
Habitat in cyprini rutili inteſtinis.

rutili. 45. E. proboſcide tuberoſa apice aculeata, altero corporis latere unico, altero quatuor oſculis notato. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 61. *f.* 1-8. *rar.* 2. *p.* 61.
Habitat rariſſimus et ſolitarius in cyprini rutili inteſtinis, *elongatus, contractus utroque fine obtuſus, expanſus anteriore acuminatus, proboſcide poſterius anguſtata apice aculeis 6 rectis ſingulis globulo affixis armata.*

bramae. 46. E. collo filiformi, proboſcide aculeis minimis armata. *Goeze Eingew. p.* 163.
Habitat in bramae inteſtinis.

lophii. 47. E. lophii piſcatorii. *Müller Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 211.
Habitat in lophii piſcatorii inteſtinis, *albus, glomeratus.*

ſturionis. 48. E. rotundatus albus. *Goeze Eingew. p.* 157.
Habitat in ſturionis inteſtinis, *candido affinis.*

HAERUCA. *Corpus* rotundatum: fine anteriori bicolli ſimplici aculeorum corona cincto, proboſcide nulla.

muris. 1. H. ex albo cineraſcens rugoſa.
Goeze Eingew. p. 138. *t.* 9. B. *f.* 12. Pſeudoechinorhynchus.
Habitat in muſculi ventriculo, *proboſcidis retractilis defectu ab echinorhyncho diverſa.*

CUCUL-

CUCULLANUS. *Corpus* poſterius acuminatum, anterius obtuſum, ore orbiculari, cucullo ſtriato.

a. *mammalium.*

talpae. 1. C. talpae europaeae. *Goeze Eingew. p.* 130. *t.* 8. *f.* 7. 8.
Habitat gregarius membranae incluſus in adipe peritonaei talpae europaeae, *in ſpiram contortus.*

ocreatus. 2. C. corpore faſciolato, cauda ocreata.
Goeze Eingew. p. 182. *t.* 15. *f.* 6. 7.
Habitat in talpae europaeae inteſtinis, *gregarius, oviparus,* 2 *pollices longus, culmum ſtramineum mentiens.*

muris. 3. C. *Goeze Eingew. p.* 242.
Habitat in muris inteſtinis tenuibus.

b. *avium.*

buteonis. 4. C. falconis buteonis. *Goeze Eingew. p.* 85.
Habitat in buteonis inteſtinis.

c. *reptilium.*

ranae. 5. C. cauda foliacea. *Goeze Eingew. p.* 98.
Habitat in ranae temporariae inteſtinis.

d. *piſcium.*

lacuſtris. 6. C. rufus, anterius truncatus. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 146. *prodr.* 2596.
α. C. muraenae anguillae. *Goeze Eingew. p.* 130. *t.* 9. A. *f.* 1. 2.
Beſch. der berl. Naturf. 3. *p.* 493.
Leeuwenh. arc. nat. 2. *p.* 313.
percae. *β.* C. percae fluviatilis. *Goeze Eingew. p.* 132. *t.* 9. B. *f.* A, B. 4-9.
Müll. Schr. der berl. Naturf. 1. *p.* 205. 2. *p.* 133. *t.* 1. *f.* 8-14.
Bloch Eingew. p. 34. *t.* 10. *f.* 1-4.
lucioper-cae. *γ.* C. percae luciopercae. *Goeze Eingew. p.* 131. *t.* IX. a. *f.* 3.
Müll. Schr. berl. Naturf. 1. *p.* 217.
cernuae. *δ.* C. percae cernuae. *Müll. Schr. berl. Naturf.* 1. *p.* 214. 2. *p.* 133.
Pall. n. nord. Beytr. 1. *p.* 103. 104.

ε. C.

Cucullani *plurimi vivipari frequentiſſimo in inteſtinis, praeſertim piſcium, rarius in alio viſcere habitant.*

farionis. ε. C. ſalmonis farionis. *Goeze Eingew. p.* 133.
ſalaris. ζ. C. ſalmonis ſalaris. *Goeze Eingew. p.* 133. *t.* 8. *f.* 9. 10.
Habitat in piſcium *aquas dulces inhabitantium* inteſtinis, ζ) *etiam in* hepate, *fertiliſſimus.*

aſcaroides. 7. C. capite orbiculari utrinque uncinato, cauda rotundata brevi acuminata: ſpiculis binis exſertis. *Goeze Eingew. p.* 134. *t.* 8. *f.* 11-16.
Habitat in Siluri Glanidis ventriculo, *larvis muſcae ſimilis ad aſcarides accedens, pollicem longus, ex albo cineraſcens, gregarius.*

marinus. 8. C. cinereo luteus, anterius obtuſus. *Müller zool. dan.* I. *p.* 144. *f.* 1-11. *Schr. berl. Naturf.* I. *p.* 209.
cirratus. α. C. *Müll. zool. dan.* I. *p.* 144. *t.* 38. *f.* 1-7. *rar.* I. *p.* 99.
muticus. β. C. *Müll. zool. dan.* I. *p.* 144. *t.* 38. *f.* 8-11. *rar.* I. *p.* 99.
Habitat in gadorum *plurimorum* inteſtinis, *oviparus, elongatus, flexuoſus, teres, pellucidus ſubtiliſſime transverſe ſtriatus, inteſtino fuſco, capite latiore, ſuborbiculato, anterius quaſi aduſto, mare ad caudam prope anum aculeo nigricante ſetaceo bicuſpide armato, feminae in corporis medio tuberculo rima notato.*

CARYOPHYLLAEUS. *Corpus* teres: ore fimbriato.

piſcium. 1. C. *Goeze Eingew. p.* 180. *t.* 15. *f.* 4. 5. *Bloch Eingew. p.* 34. *t.* 6. *f.* 9-13.
Habitat in piſcium, *aquas dulces inhabitantium, potiſſimum* cyprinorum, carpionis, tincae, jeſis, bramae inteſtinis, *rarior, margaritaceus, ad pollicem longus, reliquis inteſtinalibus vitae tenacior, fine poſteriori rotundato, anteriore latiori.*

LINGUATULA. *Corpus* depreſſum oblongum. *Os* anterius oſtiis 4 cinctum.

ſerrata. 1. L. *Froelich Naturf.* 24. *p.* 148. *t.* 4. *f.* 14. 15.
Habitat in leporis timidi pulmonibus.

278. FASCIOLA. *Corpus* planiuſculum, poro duplici, rarius ſolitario.

a. *hominis.*

humana. 2. F. hominis. *Doever. verm. p.* 54. *Cleric. lumbr. p.* 119.

b. *mammalium.*

vulpis. 4. F. orbicularis, capite craſſo rotundato arcu circulari a trunco ſeparato, parte poſteriori ad latera repanda, caudae appendicibus utrinque duabus cylindricis membranaceis. *Goeze Eingew. p.* 176. *t.* 14. *f.* 11-13.
Habitat in vulpis inteſtinis, *an hujus generis?*

putorii. 5. F. minutus ſubrotunda, poris duobus approximatis. *Goeze Eingew. p.* 175. *t.* 14.
Habitat in Muſtelae Putorii inteſtinis, 1½ *lineas longa.*

melis. 6. F. craſſa, capite triangulari. *Goeze Eingew. p.* 176. *t.* 14. *f.* 9. 10.
Habitat in melis inteſtinis, *brevis.*

veſpertilionis. 3. F. elongata teres, inteſtinis rubris. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 72. *f.* 12-16.
Goeze Eingew. p. 171. *t.* 14. *f.* 1-3.
Habitat in veſpertilionis auriti inteſtinis, *quae ſaepe perforat, ex rubro fuſca, carnoſa, punctis minimis transverſim ſtriata, hermaphrodita.*

hepatica. 1. F. ovata ſubpetiolata. *Fn. ſuec.* 2075. *it. goth.* 200. *Pall. inſ. viv. p.* 27.
Müll. verm. terr. et fluviat. hiſt. 1. 2. *p.* 7. 52. *zool. dan.* 1. *p.* 103. *prodr.* 2707. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 327. *n.* 312. Faſciola depreſſa ovata fuſco albida, antice tubulo inſtructa.
Schaeffer monogr. von Egelſchn. f. 1-17.
Amoen. acad. 2. *p.* 86. 185. 186. Limax ovatus lividus margine acuto.
Bloch Eingew. p. 5. *t.* 1. *f.* 3. 4.
Goeze Eingew. p. 55. 179. Planaria latiuſcula.
Aldrov. inſ. l. 7. *p.* 722.
Leeuwenh. arc. nat. p. 147.
Barthol. act. Havn. 3. *p.* 133. f.
Cleric. lumbr. p. 141. *t.* 9. *f.* 2. *et t.* 12. *f.* H-M.
Brauners tank wid.
Smoetſ. och mytt. af boſk. och fiäderfä. p. 12. *t.* 3. *f.* 5.

Bianchi hep. p. 342.
Lesk. Naturg. p. 507.
Act. angl. 49. *p.* 248. *t.* 7. *f.* 1.
Bresl. Samml. p. 694. *f.* 1-4.
Act. helvet. 5. *p.* 374.

boum. *β.* F. *Goeze Eingew. p.* 170. 171. 205.
Müll. Naturf. 18. *p.* 35. *t.* 4. *f.* 11.
Aldrov. inſ. l. 7. *p.* 133. f.
Falck Viehſeuch. t. 2. *f.* 6. 7.

porcorum. *γ.* F. *Goeze Eingew. p.* 171.

apri. *δ.* F. *Cleric. lumbr. p.* 119.

cervi. *ε.* F. *Borlac. cornub. t.* 24. *f.* 10. Porus cervinus.
Cleric. lumbr. p. 119.

equi. *ζ.* F. *Buffon. hiſt. nat.* IV. *p.* 174. &c.
Habitat in ovium, boum, ſuum, equorum, elaphorum, capreolorum hepate *et* ducta choledocho, *androgyna, ovipara, poro duplici hepati infixa, hydropem aſcitem excitans, ad pollicem longa, anterius latior, tubuloque terminata, fuſca vel ex fuſco albida.*

elaphi. 7. F. conico ovata, ſphinctere ampliſſimo: ore aſſurgente remoto.
Zeder Schr. berl. Naturf. 10. *p.* 65. *t.* 3. *f.* 8-11. Feſtucaria cervi.
Habitat in cervi elaphi *ventriculo gregaria, poro unico, villis adhaerens.*

c. *avium.*

bilis. 8. F. toroſa. *Braun Schr. berl. Naturf.* 10. *p.* 61. *t.* 3. *f.* 4. 5.
Habitat in falconis melanuati *cyſtide felleo, gregaria.*

buteonis. 9. F. *Goeze Eingew. p.* 85.
Habitat in buteonis inteſtinis tenuibus, *poro duplici.*

milvi. 10. F. plana, poro duplici, inteſtinis frondoſis. *Goeze Eingew. p.* 173.
Habitat in milvi inteſtinorum tenuium muco, *minuta.*

11. F.

Faſciolae *androgynae, oviparae praeter inteſtina alia quoque frequenter, nonnullae ſpecies non niſi alia viſcera inhabitant, inteſtinis flexuoſis, ovariis lateralibus conſpicuae; an quas* Redi *in lepore,* Cl. Merrem *in mure* Θ. Fabricius *in perca fluviatili et trinca, alii in ſcombro invenerunt, diſtinctae a reliquis hujus generis ſpecies?*

ſtrigis. 11. F. teretiuſcula, poro ſimplici. *Goeze Eingew. p.* 174. *t.* 14. *f.* 4-6.
Habitat in ſtrigis inteſtinis, *an hujus generis?*

puſilla. 12. F. minutiſſima polymorpha vitae tenax cyſtidi incluſa. *Braun Schr. berl. Naturf.* 10. *p.* 63. *t.* 3. *f.* 6. 7.
Habitat in ſtrigis Aluconis *thorace in* erinaceo europhio *ſub cute, an hujus generis?*

anatis. 13. F. ruſeſcens teretiuſcula poro ſimplici. *Goeze Eingew. p.* 174. *t.* 13. *f.* 8-11. *Naturf.* 14. *p.* 137.
Bloch Eingew. p. 35. *t.* 10. *f.* 5-7. Cuculanus conoideus.
Müll. zool. dan. 2. *t.* 54. *f.* 1-3. *rar.* 2. *p.* 39. Hirudo faſciolaris.
Müll. Schr. berl. Naturf. 1. *p.* 206.
Habitat in et ad anatis domeſticae inteſtina; *parva, pellucidiſſima, interdum alba, antrorſum in triangulum apice truncatum terminata, poſterius rotundata, ſtatura media filiformi nigra transverſim curvata, margines verſus bifurca, inteſtino flexuoſo nigricante, ovariis lateralibus; an hujus generis?*

anſeris. 14. F. oblongo-ovata, ſubtus papillis oppoſitis bifariam digeſtis, poris approximatis. *Froelich Naturf.* 24. *p.* 112. *t.* 4. *f.* 5-7.
Habitat in anſeris domeſtici *paſcentis* inteſtino recto.

gruis. 15. F. *Bloch Eingew. p.* 35. *t.* 10. *f.* 5-7.
Habitat in gruis inteſtinis; *an diſtincta ab faſciola anatis?*

ardeae. 16. F. ſuborbicularis. *Goeze Eingew. p.* 177. *t.* 15. *f.* 1.
Habitat copioſiſſima in ardeae ſtellaris inteſtinis, *quae perforat.*

d. *reptilium.*

ſalamandrae. 17. F. oblonga ſublinearis, mota lagenam aemulans, poris remotis. *Froelich Naturf.* 24. *p.* 119. *t.* 4. *f.* 8-10.
Habitat in ſalamandrae nigrae inteſtino recto.

ranae. 18. F. ſubclavata ore ſeſſili. *Pallas inf. viv. p.* 29. *n.* 1. 2. *Goeze Eingew. p.* 93. 178. *t.* 15. *f.* 2. 3.
Swammerd. bibl. nat. p. 317.
Habitat in ranae pulmonibus, hepate, inteſtinis, *tardiſſime ſe movens, nunc in globum contrahens, nunc in faſciam expandens.*

uncinulata. 19. F. uncinulis duobus elaſticis in parte poſteriori armata. *Braun Schr. berl. Naturf.* 10. *p.* 58. *t.* 3. *f.* 1-3.
Habitat in rana eſculenta *ſub integumentis abdominis communibus, nunc ſolitaria, nunc gemina, nunc gregaria, gradiendo hirudinem aemulans.*

e. *piſcium.*

binodis. 20. F. elongata teres, poro laterali papillari caudata. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 108. *t.* 30. *f.* 8. *prodr* 2717. *rar.* 1. *p.* 69.
Habitat in piſcium inteſtinis, *aequalis, poris papillaribus, anteriori majore, finem anteriorem complectente, cauda filiformi, dimidia corporis longitudine.* Zoega.

diſticha. 21. F. elongata teres poro laterali porrecto excavato. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 108. *t.* 30. *f.* 9. *prodr.* 2716. *rar.* 1. *p.* 69.
Habitat in piſcium inteſtinis, *magnitudine ad f. lucii accedens, rugoſa, retrorſum attenuata, fine anteriori ſubbifido: laciniis inaequalibus apice excavatis.* Zoega.

anguillae. 22. F. *Leeuwenh. arc. nat. p.* 316. *f.* 6.
Habitat in anguilla.

ſcabra. 23. F. elongata teres, ſeriatim denticulata. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 51. *f.* 1-8. *rar.* 1. *p.* 31.
Habitat in gadi barbati ventriculo, *oculo nudo vix conſpicua, vivida, pellucida, ſphaerulam duriorem et foveatam ex ore protrudens, transverſim ſtriata, margine ſerrulata, vaſe duplici albo filiformi, alioque flexuoſo nigricante ovis farto per totam corporis longitudinem excurrente.*

aeglefini. 24. F. linearis depreſſiuſcula, collo nulla. *Müll. zool. dan. p.* 106. *t.* 30. *f.* 4. *prodr.* 2712. *rar.* 1. *p.* 65.
Habitat haud rara in aeglefini inteſtinis, *ſemipollicaris, cinerea, utroque fine rotundata.*

blennii. 25. F. linearis plana, collo elato baſi divergente truncato. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 106. *t.* 30. *f.* 5. 2. *t.* 78. *f.* 9. 14. *prodr.* 2711. *rar.* 1. *p.* 66. *et* 2. *p.* 116. *Schr. berl. Naturf.* 1. *p.* 217.
Bloch Eingew. t. 2. *f.* 10. 11.
Habitat in blennii vivipari muco inteſtinali, *oculo nudo non conſpicua, alba, pellucida, in angulum obtuſum utplurimum curvata, poro laterali majore in angulo corporis, ſaliente prominente, veſiculas albas 2, terminali unicam comprehendente.*

26. F.

ſcorpii. 26. F. elliptica, altero fine papilla minima perforata, collo nullo. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 105. *t.* 30. *f.* 1. *prodr.* 2709. *rar.* 1. *p.* 64.
Habitat in cotti Scorpii inteſtinis, *nudo oculo non uſurpanda, pellucida, utroque fine obtuſa, ex albo cinerea, ovulis farta.*

plateſſae. 27. F. elliptica viridis. *Müller zool. dan.* 2. *t.* 78. *f.* 1-5. *rar.* 2. *p.* 114.
Habitat in plateſſae muco inteſtinali, *minutiſſima, ut nudum oculum ſubterfugiat, opaca, in 3 areas virides totidemque albas alternantes diviſa, poro terminali amplo, laterali in medio, ovis ſaturate viridibus.*

lucioper-cae. 28. F. ovato oblonga ſubventricoſa, collo brevi, pori terminalis margine dilatato laevi. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 105. *t.* 30. *f.* 2. *prodr.* 2710. *rar.* 1. *p.* 64.
Habitat in luciopercae inteſtinis, *granuli arenae magnitudine, fuſceſcens, collo cylindrico, poro laterali prominulo, retrorſum anguſtior.*

percae. 29. F. ovata ventricoſa, collo brevi, poro terminali margine noduloſo. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 105. *t.* 30. *f.* 3. *prodr.* 2711. *rar.* 1. *p.* 65.
Habitat in percae cernuae inteſtinis, *f. luciopercae paulo major, fuſca, collo albo cylindrico, noduloſo, poro terminato, poro laterali ad baſin colli ſito, poſterius obtuſa.* Zoega.

Lagena. 30. F. corpore rotundato, collo longo. *Braun Schr. berl. Naturf.* 8. *p.* 236. *t.* 10.
Habitat in percae fluviatilis inteſtinis.

Varica. 31. F. linearis teres, collo divergente obtuſo infra apicem perforato. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 72. *f.* 8-11. *rar.* 2. *p.* 93.
Habitat in ſalaris ventriculo, *elongata, ſaepe in angulum acutum divergens, extenſa laevis, contracta ruguloſa, poro laterali in medio fere corporis poſito, vaſculo duplici filiformi albo utrinque decurrente, cum corpuſculis 2 ovatis albis opacis retrorſum cohaerente, ovulis innumeris ſparſis ex luteo viridibus canaliculo hyalino flexuoſo, ſingulisque membranae pellucidae incluſis.*

eriocis. 32. F. elliptica hyalina medio rufa. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 72. *f.* 4-7. *rar.* 2. *p.* 92.

Habitat in eriocis inteſtinis, *nudo oculo vix conſpicua, anteriore parte retractili et extenſili inteſtinum filiforme conglomeratum media ovula conferta vireſcentia, duasque veſiculas includente.*

farionis. 33. F. oblonga depreſſiuſcula, anterius lobis ſex aequalibus marginata. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 72. *f.* 1-3. *rar.* 2. *p.* 91.
Habitat in farionis muco inteſtinali, *flaveſcens, vix linea longior, margine obtuſe crenulata, lobis anterioribus ſubquadrangulis membranaceis.*

truttae. 34. F. oblonga, maculis duabus albis lucidis orbiculatis pone porum inferiorem. *Froelich Naturf.* 24. *p.* 126. *t.* 4. *f.* 16. 17.
Habitat in truttae inteſtino recto.

umblae. 35. F. oblonga plana, collo anguſtiore retractili. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 329. *n.* 314.
Habitat gregaria in umblae ſanguine dorſali, *albida,* 1½ *lineam longa, lagenam figura referens, poſterius latior obtuſe truncata, margine acuto.*

lucii. 36. F. lanceolata, margine depreſſo crenato, collo elongato tereti. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 107. *t.* 30. *f.* 7. 2. *t.* 78. *f.* 6-8. *prodr.* 2713. *rar.* 1. *p.* 67. 2. *p.* 115. *Schr. berl. Naturf.* 1. *p.* 203. *Naturf.* 14. *p.* 136.
Bloch Eingew. p. 6. *Beſch. berl. Naturf.* 4. *p.* 537. *t.* 14. *f.* 1-4.
Goeze Eingew. p. 172. *t.* 14. *f.* 3.
Habitat in lucii oeſophago et ventriculo, *in hujus plicis latens, vivida, rubra,* 1½ *pollicem longa, vitae tenacioris.*

halecis. 37. F. *Leeuwenh. epiſt.* 97. *p.* 47.
Habitat in halece.

bramae. 38. F. oblonga teres, baſi attenuata obtuſa, collo tereti ſubincurvo. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 107. *t.* 30. *f.* 6. *prodr.* 2714. *rar.* 1. *p.* 66.
Habitat in bramae inteſtinis, *alba, poro laterali ad baſin colli ſito, ovulis oblongis fuſcis.*

jeſis. 39. F. ovata anterius anguſtata. *Bloch Eingew. p.* 11. *t.* 2. *f.* 10. 11.
Habitat in jeſis inteſtinis, *lagenam forma ſua mentiens.*

ſ. *vermium.*

loliginis. 40. F. ore papillis faſciculato. *Müll. prodr. zool. dan.* 2708. *O. Fabr. fn groenl. p.* 328. *n.* 313.
Syſt. nat XII. 2. *p.* 1078. *Fn. ſuec.* 2077. Faſciola barbata.
Habitat in loliginis inteſtinis, *an hujus generis?*

351. TAENIA. *Corpus* depreſſum, articulatum.
Caput veſicis ſuctoriis quatuor.
† capite corona uncinorum vaginatorum exſertilium et retractilium duplici armato.

ſ *in aliis praeter inteſtina viſceribus habitantes, veſica ad partem poſteriorem auctae* Hydatulae ſ. Veſicariae, ſ. Viſcerales, ſ. Hydatigenae.

a. *hominis.*

viſceralis. 5. T. piſiformi, veſicae incluſa, anterius lata, poſterius acuminata. *Tyſon act. angl.* 43. *n.* 475. *p.* 305.
Haen rat. med. II. 3. *c.* 16. §. 2. *p.* 282.
Pall. miſc. zool. p. 174. *n. nord. Beytr.* 1. *p.* 83. *Stralſund. Magaz.* 1. *p.* 81.
Hoepfn Schrift. berl. Naturf. 1. *p.* 348.
Bloch Eingew. p. 24.
Goeze Eingew. p. 196. *et* 249. *t.* 20. B. *f.* 12. a. b.
Wern. verm. inteſt. p. 68. *t.* 9. *f.* 29-33.
Habitat in hepate, placenta uterina, ſacco hydropico, *aliisque* tumoribus morboſis hominis, *nunc ſolitaria*, *nunc gregatim incluſa veſicae*, *an una eademque ſpecies?*

celluloſae. 6. T. veſicae cartilagineae tunicaeque poſterius bicaudatae ſolitaria incluſa. *Werner verm. int. cont.* 2. *p.* 2. *ſqq. t.* 1. *f.* 1-8.
Goeze Entd. daſs die Finnen Blaſenw. ſind. Halle 1784.
Habitat in tela celluloſa muſculorum, *pollicem integrum longa, dimidium lata, et* ¼ *craſſa, capitis uncinulis obtuſis (an forſan intra vaginam retractis) vitae tenaciſſima.*

b. *mammalium.*

ſimiae. 7. T. *Bloch Eingew. p.* 24.
Habitat in ſimiae diaphragmate, *avellanae magnitudine; an eadem cum hydatula?*

veſpertilionis. 8. T. *Bloch Schr. berl. Naturf.* 1. *p.* 334.
Habitat in veſpertilionis hepate, *an eadem cum hydatigena?*

vulpis. 9. T. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 13.
Habitat in vulpe.

putorii. 10. T. *Goeze Eingew. p.* 206.
Habitat in putorii hepate, *an eadem cum t. ferarum?*

urſi. 11. T. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 74.
Habitat in urſo.

gulonis. 12. T. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 14. 15.
Habitat in gulone.

hydatigena. 13. T. ſimplex, corpore elongato ſenſim antrorſum lateſcente, veſicula parte anteriore duplo longiore et latiore terminato, capite ſeſſili diſtincto. *Batſch Bandw. p.* 100. *n.* 8. *f.* 46.
Pall. miſcell. zool. p. 168. *t.* 12. *f.* 12. 13. *n. nord. Beytr.* 1. *p.* 82.
Bloch Eingew. p. 23. *n.* 1. *Schrift. der berl. Naturf.* 1. *p.* 338. *t.* 10. *f.* 9.
Goeze Eingew. p. 223. *t.* 19. *f.* 1. 2.
Habitat in muris decumani, ratti, amphibii hepate, *fine poſteriore anteriore duplo et veſicula adhaerente quadruplo anguſtiori,* 1¼-8½ *pollices longa, capite fini anteriori aequali, collo nullo, corpore medio lineari.*

murina. 14. T. ſimplex corpore elongato ſenſim antrorſum lateſcente: articulis pone ad latera denticulatis, veſica caudali fini anteriori aequali capite ſeſſili diſtincto. *Batſch Bandw. p.* 100. *n.* VIII. *B. f.* 12-16. 18. 20. 29. 30. 47-49.
Maratt. zooph. p. 38.
Friſch miſc. Berol. 6. 1. *p.* 121.
Pallas inf. viv. p. 51. *elench. zooph. p.* 413. *n.* 5. *miſc. zool. p.* 160. 168. 171. *t.* 10. *f.* 12. 13.
Doever. verm. inteſt. p. 105.
Bloch Eingew. p. 23.
Goeze Eingew. p. 227-247. *t.* 18. B. *f.* 10-14. *t.* 19. *f.* 3-14.
Werner verm. inteſt. cont. 1. *p.* 13. *t.* 9. *f.* 22-33.
Habitat in muris terreſtris *et* muſculi hepatis *ſuperficie, piſi, aliquando avellanae magnitudine, articulis longioribus et magis diſtinctis, veſica caudali longe anguſtiori ab hydatigena dignoſcenda, an vere ſpecie diverſa?*

cordata. 15. T. ſimplex teres corpuſculo diſtincte inſerto in angulum infracto, veſica terminali ventricoſo cordata pone acuminata. *Batſch Bandw. p.* 94. *n.* 4. *f.* 42. 43.
Goeze Eingew. p. 218. *t.* 18. B. *f.* 6. 7. *et p.* 236. *t.* 18. B. *f.* 15-17.
Habitat in leporum muriumque hepate, *veſica minuta, an vere diſtincta a piſiformi ſpecies?*

piſiformis. 16. T. ſimplex teres turbinata, corpuſculo contiguo, inferius cum veſica ovato-ventricoſa confluente. *Batſch Bandw. p.* 96. *n.* 5. *f.* 44. 45.
Pall. miſc. zool. p. 158. *n. nord. Beytr.* 1. *p.* 82.
Red. anim. viv. n. an. viv. p. 73. *t.* 5. *f.* 6. *Opuſc.* 3. *t.* 1. *f.* 3.
Bloch Eingew. p. 25. *Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 338.
Goeze Eingew. p. 210-219. *t.* 18. A. *et t.* 19. B. *f.* 4. 5.
Habitat copioſiſſima in leporis, *potiſſimum ſeneſcentis,* hepate, *racematim ſaepius cohaerens, piſi circiter magnitudine, ex albo caeruleſcens.*

utricularis. 17. T. ſimplex teres corpuſculo diſtincte inſerto recto, veſica oblonga, retrorſum utriformi obtuſa. *Batſch Bandw. p.* 99. *n.* 7.
Goeze Eingew. p. 219. *n.* 3. *t.* 18. B. *f.* 8. 9.
Habitat in leporis uteri gravidi *tela celluloſa.*

ferarum. 18. T. ſimplex teres clavata, corpuſculo contiguo inferius cum veſica ovali oblonga confluente. *Batſch Bandw. p.* 98. *n.* 6.
α. Hydatula cervorum. *Goeze Eingew. p.* 205. 206.
Steno apud Barth. act. havn. 1. *n.* 36. *p.* 68.
β. Hydatula Saigae. *Pall. ſpicil. zool.* 12. *p.* 43. *t.* 3. *f.* 5. *n. nord. Beytr.* 1. *p.* 82.
Habitat in elaphi, capreoli, rangiferi, Saigae *etiam ſaniſſimorum* omento, peritonaeo, hepate, *avellanae, juglandis, ovi gallinacei magnitudine, veſica magis coriacea: ſtriis transverſis magis evidentibus, collique rugis diſtincta.*

caprina. 19. T. capri hirci.
Barthol. hiſt. anat. 2. *p.* 49.
Red. anim. viv. n. an. viv. p. 75.
Hartmann miſcel. Nat. Curioſ. 1705. *p.* 152. *f.* 21-24.
Habitat in caprae viſceribus.

ovilla. 20. T. ovis arietis.
Goeze Eingew. p. 257. *t.* 17. *f.* 10. 11.

Pall.

Pall. miſc. zool. p. 161. t. 12. f. 1-11. n. nord. Beytr. 1. p. 82.
Habitat in ovium *potiſſimum vertiginoſarum* peritonaeo, hepate, omento, *an ſatis diſtincta a reliquis ſpecies?*

cerebralis. 21. T. multiplex, corpuſculis pluribus baſi ſua veſicae communi magnae adnatis acervatim in ſuperficie diſtributis et in eandem retractilibus, veſica exteriore nulla. *Batſch Bandw. p. 84. n. 1. f. 34-36. Schr. der berl. Naturf. 1. p. 339.*
Bloch Eingew. p. 25. Vermis veſicularis ſocialis.
Leske Dreher der Schaafe Leipz. 1780. *t.* 1. *f.* 1-3.
Goeze Eingew. p. 248. *t.* 20. A. *f.* 1-5. *t.* 20. B. *f.* 6-8. *neuſt. Manigf.* 4. *p.* 619.
C. a Borke Naturf. 14. *p.* 142.
Fontana opuſc. ſcientif. Florenz. 1783. 8.
Boerner n. oecon. ſchleſ. Nachr. 1. *p.* 241.
Geutebrück Unterr. v. Schaef. 1. *p.* 277.
Haſtfer Unterr. v. Zucht u. Wart. der Schaafe p. 98.
Ranftler Anz. der leipz. oecon. Societ. 1776. *p.* 20.
Habitat in ovium vertiginoſarum, *potiſſimum annuarum* cerebro *inſigni ſua copia morbi hujus pecorini cauſa veſica evacuata, inſanabilis, ſingulis latice limpido repletis (veſiculis* 300-400-500) *vermiculis ſemen milii magnitudine aequantibus 2 ligamentorum ope adhaerentibus, qui omnes capite* 32-36 *uncinulis armato, cerebro potiſſimum ejus ſuperficiei, aut parti medullae ſpinali vicinae firmiſſime infiguntur, in illo caſu eam vertiginis ſpeciem, quae* Drehen *opilionibus audit, in hoc* Springen *cauſantes.*

vervecina. 22. T. veſica magna, corpore brevi rugoſo-imbricato. *Goeze Eingew. p.* 208. *t.* 17. A. *f.* 3-5.
Pallas Stralſ. Magaz. 1. *p.* 81.
Habitat in vervecum, *praeſertim impinguatorum,* peritonaeo, *an eadem cum globoſa?*

granuloſa. 23. T. multiplex, corpuſculis pluribus veſicae communis parietibus laxe adhaerentibus minutiſſimis granum referentibus, veſica externa internaque calloſis. *Batſch Bandw. p. 87. n. 2. f. 37.*
Goeze Eingew. p. 258. *t.* 20. B. *f.* 9-14.
Pall. n. nord. Beytr. 1. *p.* 85.
Habitat in vervecum hepate, *veſicis nunc avellanam, nunc ovum columbinum, nunc gallinaceum magnitudine aequantibus, plura millia vermiculorum continentibus, interiori caeru-*

caeruleſcente; vermiculis ipſis libere natantibus in fluido veſica contento, oculo nudo vix conſpicuis, brevibus, craſſis, punctatis, utroque fine obtuſis.

bovina. 24. T. ſimplex, veſica magna, corpore brevi rugoſo imbricato.
Barthol. hiſt. anat. cent. 4. *p.* 381.
Hartmann miſcell. Nat. Curioſ. dec. 2. *ann.* 4. *obſ.* 73.
Pall. miſc. zool. p. 172.
Goeze Eingew. p. 205.
Habitat in vitulorum boumque viſceribus thoracicis *et hepate, an a globoſa vere diſtincta?*

apri. 25. T. ſuis apri. *Goeze Eingew. p.* 205. 206. *t.* 17. B. *f.* I. II.
Habitat in apri hepate, *juglandis magnitudine, t. ferarum proxime affinis.*

globoſa. 26. T. ſimplex teres, corpuſculo diſtincte inſecto in angulum infracto, veſica terminali globoſa integra. *Batſch Bandw. p.* 89. *n.* 3. *f.* 38-41.
Bloch Eingew. p. 24. *n.* 2. *Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 337. *t.* 10. *f.* 1-8.
Pallas n. nord. Beytr. 1. *p.* 83.
α. Hydatula pulmonis. *Bloch Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 337.
β. Hydatula lienis. *Bloch Schr. berl. Naturf.* 1. *p.* 337.
γ. Hydatula hepatis. *Goeze Eingew. p.* 197. *t.* 17. *A. f.* 1. 2. 4. 5.
δ. Hydatula peritonaei. *Goeze Eingew. p.* 208. *t.* 17. B. *f.* 6-9.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1320. *n.* 5. Hydra (Hydatula) tentaculis quaternis obſoletis, corpore veſiculoſo.
Pallas miſcell. zool. p. 162. *t.* 12. *f.* 1-11. *Stralſ. Mag.* 1. *p.* 64. *t.* 1. 2.
Tyſon act. angl. vol. 17. *n.* 193. *p.* 506. Lumbricus hydropicus.
Payer miſc. nat. cur. dec. 1. *ann.* 7. *obſ.* 206. Hydatis animata.
Hartm. miſc. nat. cur. dec. 3. *ann.* 2. *obſ.* 193.
Barth. obſ. cent. 2. *n.* 87. *p.* 293. Ova in porcis.
Habitat in porci viſceribus, *praeſertim* abdominalibus, *ovi columbini malive citrei non raro magnitudine, diſtincte, at ſubtiliter rugoſa, veſica terminali corpus multoties ſuperante, caeruleſcente, poſt abitum animalculi flavicante.*

Finna. 27. T. conica, duplici veſicae incluſa, interiori baſi ſua adhaerens, capite collum veſicae verſus directo. *Fiſcher in Werner verm. inteſt. cont.* 3. *p.* 65. *t.* 5.
O. Fabr. nov. act. Soc. Hafn. 2. *p.* 287.
Goeze Entd, daß die Finnen Blaſenw. ſind. Halle 1784.

Habitat

Habitat fixa in tela celluloſa, ſuis carnibus intertexta, *morbum illum, quem* Finnen *nuncupant laniones, excitans, veſica ovali, ſemen milii aequante, exteriori ex tela celluloſa ipſa conflata, denſa, elaſtica, intus laevi, et ſeroſo latice madida, interiori pellucida, ſubtiliſſima rubello ſero repleta, qua nonniſi collabente vermiculus incluſus lobos oculis offert, vitae tenaciſſimus; an eadem ſpecies cum t. celluloſae?*

c. *amphibiorum.*

ſalamandrae. 28. T. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 12.
Habitat in Salamandra.

ſerpentum. 29. T. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 12.
Habitat in ſerpentibus.

d. *piſcium.*

truttae. 30. T. *Froelich Naturf.* 24. *p.* 127.
Habitat gregaria in truttae hepate.

† † *in inteſtinis ſolis habitantes, veſica terminali nulla.*
a. *hominis.*

ſolium. 1. T. articulis ſubvaginatis, ovario faſciculatim ramoſo: ramis ſublinearibus crebris, faſciculis transverſis compreſſis: margine articuli laterali anguſto compreſſo. *Batſch Bandw. p.* 117. *n.* 3. *f.* 1-6. 9-11. 21-23. 53.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1323. *n.* 1. *Fn. ſuec.* 2264. *Amoen. ac.* 2. *p.* 74. *t.* 1. *f.* 1. Taenia oſculis marginalibus ſolitariis.
Pall. inf. viv. p. 38. *elench. zooph. p.* 405. *n.* 1. *n. nord. Beytr.* 1. *p.* 46. *n.* 1. *t.* 2. *f.* 1-9. Taenia cucurbitina.
Andry gener. des vers 1. *p.* 195. *f. pag.* 33. 198. 200. 202. 205. 268. Ver ſolitaire ſans épine.
Tyſon act. angl. 1683. *n.* 146. *t.* 1. *et* 2. *f.* 2. 6. 10. Lumbricus latus.
F. Plater prax. 993. Vermis cucurbitinus.
Ernſt diſſ. de taenia Baſil. 1743. Taenia ſecunda Plateri.
Hayd exper. 47. *t.* 47. Lumbricus latus.
Bonnet mem. préſ. à l'acad. de Par. 1. *p.* 511. *et Journ. de phyſ.* 1777. *apr. p.* 277. Taenia à anneaux longs.
Coulet monogr. Lugdb. 172. *Lumbricus latus.*
Hill hiſt. an. p. 16. Sicyonia.
Dionis monogr. Taenia articulos demittens.
Beverw. theſ. p. 202. *t.* 202. *f.* 3.
Raul. morb. aer. 1752. *app. t. f.* 1-4.

Roederer

Roederer progr. de taenia. 1760.
Limburg act. angl. 56. *a.* 1766. *p.* 128. *t.* 6.
Goeze Eingew. p. 269. *ſqq.*
Bloch Eingew. p. 20. *n.* 20.
Müll. Naturf. 14. *p.* 134. 198-201.
v. Gleichen Beſch. berl. Naturf. 4. *p.* 203. *t.* 6. *f.* 10-13.
Werner verm. inteſt. p. 18.
Ariſtot. anim. l. 5. *c.* 19.
Aldrov. inſ. 6. *p.* 562. *t.* 1.
Valisn. op. p. 177.
Cleric. lumbr. t. 7. A. B.
Berthol. act. havn. 2. *p.* 148. 3. *p.* 116.

α) Taenia grandis. *Goeze Eingew. p.* 278. *t.* 21. *f.* 1-7.
β) Taenia plana pellucida. *Goeze Eingew. t.* 21. *f.* 9-12.
Wern. verm. inteſt. p. 18. *t.* 1. 2. *f.* 1-46

Habitat in hominis inteſtinis, *frequentior feminis, frequentior Saxonibus et Batavis, quam quidem aliis certe Europae gentibus, nimia copia duriſſima aliquando mala creans, non raro mortem, difficilius longe pellenda, quam alii hominem infeſtantes vermes, rariſſime ſolitaria, ut dentur exempla* 200 *ejusmodi vermium unius hominis inteſtina affligentium, a* 3-8, *imo, ut referunt ad* 60 *usque pedes longa, uncinis* 6-7 *priorem,* 8-9 *poſteriorem capitis coronam formantibus, cute alba pellucidiſſima, ut ovaria eleganter ramoſa transluceant, articulis primis ex oblongo quadratis, ſequentibus cucurbitae ſemen referentibus, poſtremis, quos crebrius, quam aliae ſpecies dimittit longioribus.*

vulgaris. 2. T. orificio ovorum duplici: altero in tergo ovarii punctiformi, altero ante illud poſito papilliformi expreſſili.
Batſch Bandw. p. 107 *n.* 1. *f.* 33. 50.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1323. *n.* 2. *Fn. ſuec.* 2262. *Amoen. acad.* 2. *p.* 7. *t.* 1. *f.* 2. *Müll. zool. dan. prodr.* 2654. Taenia oſculis lateralibus geminis.
Pallas inſ. viv. p. 30. *n.* 1. *el. zooph. p.* 408. *n.* 3. Taenia griſea.
Pall. n. nord. Beytr. 1. *p.* 59. *n.* 3. *t.* 3. *f.* 13-16. Taenia membranacea.
Plater prax. 992. Lumbricus latus ſ. Taenia inteſtinorum.
Spigel monogr. Lumbricus latus.
Schenck obſerv. 111. *p.* 408. Taenia.
Cleric. lumbr. p. 132. *t.* 6. *f.* 2. Lumbricus latus. *p.* 136. *c.* 7. *t.* 7. Taenia prima.

Plateri

Plateri p. 129. *t.* 5. *f.* 1. *p.* 159. *t.* 8 *f.* 1. B.
Fabric. obſerv. 2. *c.* 79. Lumbricus latus.
Barthol. act. Havn. 2. *p.* 148. *t.* 39. Lumbricus latus.
Andry gener. des vers. c. 3. *t.* 2. *f.* 9. *et t.* 3. *f.* 16.
Tulp obſerv. p. 170. *t.* 7. *f.* 1.
Bonnet journ. de phyſ. 1777. *p.* 243. *t.* 1. *f.* 3. 4.
Gadol ſatag. 88.
Goeze Eingew. p. 297.
Werner verm. inteſt. p. 49. *t.* 3, *f.* 47-57.
Habitat in hominum inteſtinis *in* Suecia *vulgatior, pertinaciſſime infixa ut violentioribus etiam remediis reſiſtat tenuis, laxa, quaſi membranacea, ſolio tenacior viva lacteſcens, ſubpellucida,* 10-16 *pedes longa, et ſine latiori ultra* $4\frac{1}{2}$ *lineas lata, articulis nunc quadratis, nunc paulo magis oblongis, medio ſecundum longitudinem ſubtiliter ſtriatis, ad latera transverſe rugoſis, ovariis ſlorum corollam referentibus.*

b. *mammalium.*

catenifor-mis. 4. T. articulis oblongis ellipticis: oſculis marginalibus ſolitariis. *Goeze Eingew. p.* 306.

canina. *α.* Taenia oſculis marginalibus oppoſitis. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1324. *n.* 4. *Fn. ſuec.* 2265. *Amoen. acad.* 2. *p.* 81. *t.* 1. *f.* 4. *Act. Stockh.* 1747. *t.* 5. *f.* 0.
Pall. inf. viv. p. 48. *n.* 5. *elench. zooph. p.* 408. *n.* 2. *n. nord. Beytr.* 1. *p.* 57. *n.* 2. *t.* 3. *f.* 10-12. Taenia canina.
Blumenb. Naturg. p. 412.
Goeze Eingew. p. 311. *t.* 23. *f.* A-C. *Naturf.* 14. *p.* 134.
Bloch Eingew. p. 17. *t.* 5. *f.* 6. 7. Taenia cucumerina.
Werner verm. inteſt. p. 58. *t.* 3. *f.* 64-69. 77-79. *cont.* 1. *t.* 9. *f.* 34-37.
Batſch Bandw. p. 129. *n.* 7. *f.* 7. 8. 24-26. 57. 65. 161. Taenia elliptica.
Wagler apud Goeze Eingew. p. 324. *t.* 23. *f.* D. E.
Ruyſch obſ. 84.

lupi. *β.* Taenia (marginata) articulis ſubvaginatis: laterali margine latiuſculo, ovario faſciculatim ramoſo: ramis ſublinearibus

---

Taeniae *cryanis in capite poſitis nutrimentum haurientes rariſſime ſolitariae, fertiliſſimae oviparae, ovis per canales proprios ductis, per oſcula marginalia exeuntibus, in articulis poſterioribus ſenioribus copioſioribus, ſpecies pauciores adhuc ſatis accurate definitae, plures incognitae, multae forſan pro diſtinctis habitae eaedem, diſcrimine ſolum a nutrimenti et habitaculi indole varia proficiſcente.*

bus divaricatis, faſciculis obliquis magis disjunctis. *Batſch Bandw. p.* 125. *n.* 4. *f.* 54.
Goeze Eingew. p. 307. *t.* 22. A. *f.* 1-5.
Bloch Eingew. p. 20. *t.* 6. *f.* 6-8.
Werner verm. inteſt. p. 59.
Red. anim. viv. et an. viv. p. 72.

vulpis. γ. Taenia (crataegaria) articulis ſubvaginatis non marginatis, ovario faſciculatim ramoſo: ramis inverſe ovatis ſubpetiolatis. *Batſch Bandw. p.* 126. *n.* 5. *f.* 55.
Bloch Eingew. p. 20. *n.* 19. *t.* 6. *f.* 6-8. Taenia canina.
Goeze Eingew. p. 310. *t.* 22. A. *f.* 6-9. *et Naturf.* 14. *p.* 144.

litterata. δ. Taenia articulis ſubvaginatis non marginatis, ovario anguſtato longitudinali ſerie linearum ſerpentiformium conflato. *Batſch Bandw. p.* 128. *n.* 6. *f.* 56.
Goeze Eingew. p. 310. *t.* 22. A. *f.* 10-12.

felis. ε. Taenia. *Goeze Eingew. p.* 315. *t.* 22. B. *f.* 13-22.

ſciuri. ζ. Taenia (floribunda) articulis leviter cohaerentibus elongatis, utroque fine rotundatis linearibus, ovario pinnato lobulato; lobis criſpatis, papillis ſolitariis. *Batſch Bandw. p.* 137. *n.* 10. *f.* 60.
Goeze Eingew. p. 332. *t.* 23. *f.* 14.

glirium. η. Taenia (puſilla) articulis conglutinatis oblongo-ellipticis, ovario vage pinnato: ramis gracillimis, papillis ſolitariis. *Batſch Bandw. p.* 134. *n.* 8. *f.* 58.
Goeze Eingew. p. 335. *t.* 23. *f.* 5. 6.
Habitat in canum (δ. *in* vulpis), cati, ſciuri, veſpertilionis, *et* murium ratti muſculique inteſtinis, 18-24 *pollices*, η) 1½ *pollicem longa, proboſcide tereti, collo non articulato, ovis piſi more rotundis, rufis vel fuſcis, albida.*

cucurbitina. 30. T. opaca ex albo flaveſcens proboſcide aequali, articulis omnibus quadratis: oſculis alternis. *Werner verm. inteſt. p.* 56. *t.* 3. *f.* 70-76.
Red. opuſc. 3. *t.* 17. *f.* 4.
Habitat in canum inteſtinis, *craſſior capite latiori, articulis magis aequalibus, retrorſum paulo latioribus et tumido margine cinctis, ovulis minoribus a ſolio diſtincta.*

ſerrata. 31. T. articulis ſerratis ſtriatis capite magno. *Goeze Eingew. p.* 337.
Batſch Bandw. p. 138. *n.* 11. *f.* 19. 32. 61. 63. 67.
Red. anim. viv. n. an. viv. p. 71. *t.* 13. *f.* 6. 7. *opuſc.* 3. *t.* 17. *f.* 1. 2.

canis. α. Taenia. *Goeze Eingew. p. 349. t. 25. B.*
Vandell. diſſ. tres p. 151. t. 5.

felis. β. Taenia collo breviſſimo. *Bloch Eingew. p. 19. n. 18. t. 6. f. 1-5.*
Goeze Eingew. p. 337. t. 24. f. 1-6. t. 25. A. f. 1-5.
Pall. n. nord. Beytr. p. 47. t. 2. f. 1. 2. A. B. 3.
Valisn. op. 1. p. 147.
Cleric. lumbr. p. 41. 47. 51. t. 3. f. 1. 2. t. 9. f. 3. 4.
Morgagn. opuſc. 1. p. 174.
Vandell. diſſ. p. 148.
Habitat in canis feliſque inteſtinis, *ad* 19 *pollices usque longa*, $3\frac{1}{4}$ *lineas lata, articulis rectangulis, anterioribus ſenſim latioribus et brevioribus, ovario minus diſtincto per paria pinnato.*

monili-formis. 32. T. articulis orbiculatis, ovario pinnato: pinnis vage ramoſis; ramis apice craſſiuſculis, capite rotundato, collo non articulato. *Batſch Bandw. p. 135. n. 9. f. 59.*
Goeze Eingew. p. 350. t. 26. f. 1-4.
Habitat cum cateniformi in felis inteſtinis, $22\frac{1}{2}$ *pollices longa, ad* $3\frac{1}{4}$ *lineas lata, colore margaritarum, linea longitudinali media, articulis ſubgloboſis.*

lineata. 33. T. articulis ſubquadratis truncatis, faſcia alba longitudinali, ovariis ſeriatis ſacciformibus conſtante, collo contorto. *Batſch Bandw. p. 143. n. 12. f. 68. 69.*
Goeze Eingew. p. 352. t. 25. A. f. 6-10.
Habitat in cati ſylveſtris inteſtinis, *ex albo caeruleſcens, ſex pollices longa, culmi ſtraminei latitudine; an hujus familiae?*

muſtelae. 34. T. *Goeze Eingew. p. 336.*
Batſch Bandw. p. 143.
Habitat in muſtelae vulgaris, martis, putorii inteſtinis, *pollicem longa,* $\frac{1}{6}$ *lineae lata; an propria, eadem ſpecies hujus familiae.*

filamentoſa. 35. T. articulis quadrangulis: ovariis lateralibus contortis ultra marginem lateralem elongatis oſculo terminatis, capite rotundato, proboſcide pyriformi. *Goeze Eingew. p. 360. t. 27. f. 6.*
Batſch Bandw. p. 160. n. 18. f. 84. 85.
Habitat in talpae inteſtinis tenuibus, *ſatis longa, articulis brevibus conico truncatis: diſco ovali diſtincto.*

36. T.

erinacei. 36. T. articulis ſerratis brevibus, collo nullo, capitis uncinulorum corona ſimplici. *Bloch Eingew. p.* 20. *t.* 6. *f.* 1. 2. 3. 7. 8.

Habitat in erinacei inteſtinis, *an diſtincta a ſerrata ſpecies?*

ſtraminea. 37. T. collo ſimplici tenuiſſimo, proboſcide pyriformi, articulorum latitudine longitudinem quater ſuperante. *Goeze Eingew. p.* 357. *t.* 27. *f.* 1-3.

Sulzer Naturg. Hamſt. p. 88. *not.* 1.

Batſch Bandw. p. 188. *n.* 31. *f.* 116. 163.

Habitat in criceti inteſtinis, *anteriori fine capillari, poſteriori conico, ad* 8 *pollices longa.*

magna. 87. T. articulis brevibus latiſſimis altero margine noduloſa, capite magno truncato-tetragono, plica gulari. *Abildg. ap. Müll. zool. dan.* 3. *p.* 50. *t.* 110. *f.* 1.

Pallas n. nord. Beytr. 1. *p.* 75. *t.* 3. *f.* 20.

Chabert malad. vermin. p. 22. *t.* 2. *f.* 1.

Habitat in equi ventriculo *et* inteſtino tenui, 26-30 *pollices longa.*

quadriloba. 88. T. lanceolata, articulis breviſſimis, capite truncato-tetragono: lobulis binis in utroque colli latere. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 51. *t.* 110. *f.* 2. 3.

Pallas n. nord. Beytr. 1. *p.* 71. *t.* 3. *f.* 21-24.

Habitat in equi inteſtinis tenui *et* ventriculo.

caprina. 89. T. terete-conica, articulis breviſſimis, oſculis quatuor lateralibus. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 52. *t.* 110. *f.* 4. 5.

Habitat in caprae hepatis ſuperficie.

c. *avium.*

pſittaci. 38. T. corpore filiformi, articulis breviſſimis, capite minutiſſimo. *Goeze Eingew. p.* 406.

Habitat copioſiſſima in pſittaci brachyuri inteſtinis, *ultra* 14 *pedes longa, capite rotundato, collo non articulato.*

cornicis. 39. T. articulis prioribus: infundibuliformibus, poſterioribus ellipticis. *Goeze Eingew. p.* 337. *t.* 23. *f.* 7.

Habitat in cornicis inteſtinis, *an propria ſpecies?*

ſerpentiformis. 40. T. proboſcide apice incraſſata, baſi dilatata, articulis cuneiformibus dilatatis abbreviatis. *Batſch Bandw. p.* 176.

Pall. n. nord. Beytr. 1. *p.* 87. *t.* 3. *f.* 29. 30. Taenia avium.
Bloch Eingew. 4. *p.* 556.

α. Taenia capite ſeſſili, proboſcide piſtillari apice convexa. *Goeze Eingew. p.* 391. a. *t.* 31. *f.* 7-9.
Batſch Bandw. f. 96-98.

β. Taenia collo non articulato, proboſcide piſtillari apice ſubumbonata. *Goeze Eingew. p.* 391. b. *t.* 31. *f.* 10. 11.
Batſch Bandw. f. 99. 100.

γ. Taenia capite ſeſſili, proboſcide ventricoſo pyriformi. *Goeze Eingew. t.* 31. *f.* 12. 13.
Batſch Bandw. f. 101. 102.

δ. Taenia galbulae. *Goeze Eingew. p.* 393.

ε. Taenia ſcolopacum. *Goeze Eingew. p.* 394.

ζ. Taenia fulicarum. *Goeze Eingew. p.* 394.

η. Taenia charadrii. *Goeze Eingew. p.* 394.

θ. Taenia vanelli. *Goeze Eingew. p.* 394.

ι. Taenia turturis. *Goeze Eingew. p.* 394.
Doever. verm. p. 130.

κ. Taenia turdorum. *Goeze Eingew. p.* 393.

λ. Taenia loxiae. *Blumenb. Naturg. p.* 412.

Habitat in Corvorum Corona, frugilegi, Cornicis, Monedulae, glandarii, Picae, Orioli Galbulae, ſcolopacum, fulicarum *quarundam*, charadrii haemantopodis, vanelli, turturis, turdorum pilaris, viſcivori, iliaci, muſici, migratorii, ſaxatilis, Merulae, *et* loxiae curviroſtrae inteſtinis, *alba, ad pedis longitudinem ſe expandens, capite tenuiſſimo; an una ſpecies?*

caryocatactis. 41. T. articulis utroque margine acutis prominentibus, ovariis inconſpicuis. *Müll. Naturf.* 14. *p.* 157.
Habitat in caryocatactis inteſtinis, *an diſtincta a ſerpentiformi ſpecies?*

crateriformis. 42. T. articulis crateriformibus, collo longiore ſimpliciſſimo proboſcide ſagittata. *Goeze Eingew. p.* 396. *t.* 31. B. *f.* 16-18.
Batſch Bandw. p. 180. *n.* 16. *f.* 103. 104.
Habitat in pici majoris inteſtinis, *fili tenuiſſimi forma, uncinorum capitis corona ſimplici.*

torquata. 43. T. capitis annulo nigro, collo capillari, articulis brevibus latis: ultimo acuto. *Bloch Eingew. p.* 16. *t.* 4. *f.* 11-13.
Habitat in anatis domeſticae pinguis inteſtinis, *copioſiſſima,* 8-9 *pollices longa, lineam lata.*

ſcolopacis. 44. T. alba. *Müller Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 218.
Habitat in ruſticolae inteſtinis; *an hujus familiae?*

Filum. 45. T. capite rotundato, proboſcide obtuſa collo ſimplici, articulis inconſpicuis. *Goeze Eingew. p.* 393. *n.* 8. *t.* 32. A. *f.* 1-7.
Werner verm. inteſt. p. 54. *t.* 3. *f.* 58-63.
Batſch Bandw. p. 163. *n.* 19. *t.* 86. 87.
Habitat copioſiſſima in ruſticolae inteſtinis, *fili craſſitie, vix ultra* 7 *pollices longa*, 560 *articulis tenuiſſimis, collo ſimplici punctato.*

infundibuliformis. 46. T. articulis infundibuliformibus ſerratis, proboſcide cylindrica elongata. *Goeze Eingew. p.* 386. *t.* 31. A. *f.* 1-6.
Bloch Eingew. p. 14. *n.* 8. *t.* 3. *f.* 3. 4. Taenia collo longiſſimo.
Beſch. berl. Naturf. 4. *p.* 555. *t.* 12. *f.* 3-5. Taenia Infundibulum.
Müller Naturf. 14. *p.* 179. Taenia anatis.
Pall. n. nord. Beytr. 1. *p.* 87. *t.* 3. *f.* 29. 30. Taenia avium.
Batſch Bandw. p. 172. *n.* 23. *f.* 31. 91-93. 164.
β) Taenia otidis. *Goeze Eingew. p.* 390.
Habitat copioſiſſima in galli anatis*que* domeſticae, *rarius in* ferae, anſeris*que*, β) *in* tardae inteſtinis, *expanſa ad* 13 *pollices longa, oſculis alternis, proboſcidis uncinis retroverſis acutiſſimis.*

ſturni. 47. T. articulis longioribus, poſtremis utrinque tumidis, collo breviore ſimplici, capite ſubquadrangulo. *Goeze Eingew. p.* 397. *n.* 31. B. *f.* 19-21.
Habitat in ſturni vulgaris inteſtinis, *tenuiſſima, ad* 5 *pollices longa, articulis prioribus rugas ſubtiles referentibus, mediis ex plano ovali globoſis.*

paſſeris. 48. T. craſſiuſcula, articulis breviſſimis poſterius ſulco fimbriatis. *Pall. n. nord. Beytr.* 1. *p.* 87. *n.* 10. *t.* 3. *f.* 29. 30.
Habitat in fringillae domeſticae *et* cannabinae inteſtinis; *an vere diſtincta ab infundibuliformi?*

Quorſum ſpectant taeniae *in* urogallo, tetrice, calidri *Squalo* acanthia *teſte* Müllero *Naturf.* 22. *p.* 44. *in* farione, umbla *p.* 47. belone *p.* 48. *repertae?* a Doeveren *verm. inteſt. p.* 151. *in* gobio nigro, *ab* aliis *in* cyprini tringa et alburno *notatae?*

hirundinis. 49. T. capillaris, collo ſimplici, articulis truncato-infundibuliformibus. *Goeze Eingew. p.* 390.
Habitat in hirundinis urbicae inteſtinis, *vix viſibilis*, $\frac{1}{4}$ *pollicis longa.*

d. *piſcium.*

nodulosa. 50. T. articulis nodulosis medio punctatis, capite bilabiato: labio utroque aculeis tricuſpidatis geminis. *Goeze Eingew. p.* 418. *t.* 34. *f.* 3-6.
Pallas inf. viv. p. 37. *n.* 3. Taenia rugoſa.
elench. zooph. p. 413. *n.* 6. Taenia piſcium.
n. nord. Beytr. 1. *p.* 90. *n.* 12. *t.* 3. *f.* 32. *et* 32. C. *et p.* 105. *t.* 3. *f.* 34. Taenia noduloſa, *et* 2. *p.* 62. Taenia lucii.
Bloch Eingew. p. 19. *et Beſchr. berl. Naturf.* 4. *p.* 541. *t.* 15. *n.* 4. *et p.* 547. Taenia tricuſpidata.
Müll. zool. dan. prodr. 2655. *et Naturf.* 14. *p.* 138. 141-143. Taenia lucii.
Batſch Bandw. p. 148. *n.* 15. *f.* 76-79. Taenia nodoſa.
β) Taenia cyſtica. *Pall. n. nord. Beytr.* 1. *p.* 101. *t.* 3. *f.* 33. Taenia hydatidis. *Bloch Beſch. berl. Naturf.* 4. *p.* 547. *n.* 3.
Habitat in lucii, percae fluviatilis, *et* cernuae anguillae, ſalaris, leuciſci inteſtinis, *β*) *in* percae fluviatilis hepate, *cyſtidi incluſa, articulis numeroſis, medio paululum elevatis, ad latera depreſſis et ſubcrenatis, poſterioribus paulo latioribus.*

†† *capite inermi.*

a. *hominis.*

lata. 3. T. candida, articulis breviſſimis medio nodoſis: oſculo ſolitario. *Pall. elench. zooph. p.* 110. *n.* 4. *infeſt. viv. p.* 35. *n.* 2. *n. nord. Beytr.* 1. *p.* 64. *t.* 3. *f.* 17. 18.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1324. *n.* 3. *Fn. ſuec.* 2263. *Amoen. acad.* 2. *p.* 80. *t.* 1. *f.* 3. Taenia (lata) oſculis lateralibus ſolitariis.
Plater prax. c. 14. Taenia prima.
Bonnet mem. préſent. de Paris 1. *p.* 478. *t.* 15. 16. *journ. de phyſ.* 1777. *p.* 262.
Bloch Eingew. p. 17. *n.* 16.
Goeze Eingew p. 298. *t.* 21. *f.* 8.
Müll. Naturf. 14. *p.* 160.
Gleichen Beſch. berl. Naturf. 4. *p.* 204. *t.* 6. *f.* 1-9.
Batſch Bandw. p. 111. *n.* 2. *f.* 51. 66.

β) Tae-

β) Taenia tenella. *Pall. n. nord. Beytr. p.* 69. *t.* 2. *f.* 19. A. B.
Habitat in hominis inteſtinis, *in* Helvetia *et* Ruſſia *aliis frequentior, facilius, ricini potiſſimum oleo, pellenda, ab* 18-120 *pedes longa, vulgari magis opaca, craſſior, latior, ut dimidium pollicem interdum ſuperet, articulis transverſim ſubtiliſſime ſtriatis, ſeſquilineam longitudine rariſſime ſuperantibus, ovariis petalorum roſae in modum diſpoſitis.*

dentata. 51. T. capite acuminato ſeſſili, articulis majoribus transverſe ſtriatis, omnibus dilatatis brevioribus: oſculo in marginis lateralis utriusque medio elatiore. *Batſch Bandw. p.* 184. *n.* 29. *f.* 110-113.
Werner verm. inteſt. p. 49. *t.* 3. *f.* 47-57. Taenia vulgaris.
Habitat in hominis inteſtinis, *elongata, anguſta*, 10-12 *pedes longa, antrorſum latior, ſolio craſſior, et tenacior, ovariis nudo oculo non conſpicuis, capite ſubtus cordis truncati formam referente.*

b. *mammalium.*

phocae. 52. T. capite longo tetragono: auriculis quatuor. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 316. *n.* 296. *O. Müll. Naturf.* 14. *p.* 179.
Habitat in phocae barbatae inteſtino recto, *foetida, flava, gregaria*, $3\frac{1}{2}$ *pedes longa*, 2 *lineas lata, articulis* 400 *et ultra, anterioribus confertiſſimis minutiſſimis, capite colli anguſtioris interventu cum trunco connexo; an hujus familiae?*

bacillaris. 53. T. capite rotundato: proboſcide pyriformi, articulis anguſtiſſimis bacillos ſibi appoſitos aemulantibus. *Goeze Eingew. p.* 359. *t.* 27. *f.* 4. 5.
Batſch Bandw. p. 191. *n.* 34. *f.* 122. 123.
Habitat in talpae inteſtinis, *fili tenuiſſimi craſſitie, collo non articulato.*

pectinata. 54. T. oblongo lanceolata, anterius in roſtrum breve coarctata, collo vix conſpicuo. *Batſch Bandw. p.* 168. *n.* 21. *f.* 89-168.
Goeze Eingew. p. 363. *t.* 27. *f.* 7-13. Taenia articulis latis pectiniformibus, apice acutiſſimo, capite inermi quadriveſiculato.
Pallas n. nord. Beytr. 1. *p.* 75. *n.* 7. *t.* 3. *f.* 25-27. Taenia acutiſſima.
Limburg act. angl. 56. *t.* 6. *f.* 1.

Red. anim. viv. n. an. viv. p. 74.
β) Taenia cuniculi. *Goeze Eingew. p.* 363.
Marigues journ. de phyſ. Sept. 1778. *p.* 229. *t.* 2. *f.* 3.
Buff. hiſt. nat. 12. *t.* 13. *p.* 103.
γ) Taenia marmotae. *Blumenb. Naturg. p.* 412.
Habitat in leporis, β) cuniculi, γ) marmotae inteſtinis *et* ventriculo, *gregaria, lanceolatae proxime affinis, vix ultra* 6 *pollices longa, plus quam* 200 *articulis conſtans.*

ovina. 55. T. longiſſima, articulis anguſtiſſimis brevibus utrinque rotundatis: vaſis lateralibus pellucidis diſtinctis oſculisque geminis marginalibus oppoſitis.
Bloch Eingew. p. 16. *n.* 14. *t.* 5. *f.* 1-5. Taenia vaſis nutritiis diſtinctis.
Goeze Eingew. p. 369. *n.* 10. *t.* 28. *f.* 1-12.
Batſch Bandw. p. 182. *n.* 28. *f.* 109. 162.
Rautin des malad. occaſ. par les var. de l'air. p. 444.
β) Taenia bovina? *Cleric. lumbr. p.* 74.
Habitat in ovium, *praecipue lactentium*, inteſtinis, *a lata, articulis ſibi propioribus, oſculis marginalibus oppoſitis, ovis obtuſe conicis, canalibus lateralibus luculentis, fine anteriori capillari, inſigni fertilitate et longitudine, quae ſaepius* 80, *aliquando* 200 *pedes aſſequitur, diſtincta.*

equina. 56. T. capite quadrangulo: foraminibus quatuor, articulis dilatatis breviſſimis: oſculis inconſpicuis. *Müller Naturf.* 14. *p.* 158-179.
Buff. hiſt. nat. 12. *tom.* 7. *p.* 444.
Pall. elench. zooph. p. 411. *n. nord. Beytr.* 1. *p.* 71. *n.* 6. *t.* 3. *f.* 20.
Goeze Eingew. p. 353. *t.* 25. B. *f.* 11-13.
Batſch Bandw. p. 201. *n.* 42. *f.* 137. 138.
Habitat in equi ventriculo, *ad* 10 *pollices longa, articulis lamellarum aut articulorum melolonthae inſtar ſuperficie ſua ſibi incumbentibus, capite magno, lobis membranaceis parti poſteriori utrinque* 2 *appoſitis acuto manifeſte diſtincta.*

ſuis. 57. T. *Pall. ſpic. zool.* 2. *p.* 22. *t.* 3. *f.* 13.
Habitat in ſue aethiopico, *an propria ſpecies hujus familiae?*

c. *avium.*

globifera. 58. T. articulis prioribus rhombeis, mediis ovalibus et pyriformibus, poſterioribus globoſis petiolatis.
Goeze Eingew. p. 402. *t.* 32. A. *f.* 13-16. Taenia brachium globuloſum.

Bloch

Bloch Eingew. p. 14. *t.* 3. *f.* 5-7. Taenia cylindracea.
Batſch Bandw. p. 191. *f.* 119-121. *et p.* 199. *f.* 134-136.
Habitat in falconum, Buteonis *et* Lanarii *juniorum etiam turdi viſcivori* inteſtinis, *ad* 12 *pollices longa, fine anteriori capillari: proboſcide brevi, obtuſa.*

perlata. 59. T. capite quadrangulari, articulis quadratis acute marginatis: nodo medio albo margaritae ſimili.
Goeze Eingew. p. 403. *t.* 32. B. *f.* 17-23.
Batſch Bandw. p. 146. *n.* 14. *f.* 73-75.
Habitat in buteonis inteſtinis, *tenuibus pedem longa, margaritae colore, per totam longitudinem nodoſa, articulis brevibus, collo aut ſimplici aut nullo.*

Flagellum. 60. T. parte poſteriori dilatata ſubito in capillarem anteriorem terminata. *Goeze Eingew. p.* 406. *t.* 32. B. *f.* 28-31.
Batſch Bandw. p. 170. *n.* 22. *f.* 90. 169.
Habitat in milvi inteſtinis, 2 *circiter pollices longa, proboſcide brevi, lata, truncato-conica.*

candelabraria. 61. T. articulis oblongis: mediis ſubcampanulatis; pictura pellucente margini parallela, fine anteriori capillari.
Goeze Eingew. p. 405. *t.* 32. B. *f.* 24-27.
Batſch Bandw. p. 144. *n.* 13. *f.* 70-72.
Habitat in aluconis inteſtinis, *collo longiſſimo ſubtiliſſime punctato, articulis collo proximis obtuſangulis, ſequentibus pictura candelabrum referentibus.*

crenata. 62. T. capite obtuſo, collo longiſſimo, articulis crenatis: latitudine longitudinem ſexies ſuperante.
Goeze Eingew. p. 395. *t.* 31. B. *f.* 14. 15.
Batſch Bandw. p. 187. *n.* 30. *f.* 114. 115.
Habitat in pici majoris inteſtinis, *collo punctato.*

lanceolata. 63. T. lanceolato-oblonga antrorſum aequabiliter decreſcens, capite papillae ſimili, articulis breviſſimis.
Bloch berl. Naturf. Beſch. 4. *p.* 553. *n.* 10. Taenia anſeris.
Eingew. p. 9. *t.* 1. *f.* 5. 6.
Müll. Naturf. 18. *p.* 27.
Goeze Eingew. p. 377. *t.* 29. *f.* 3-12.
Pallas n. nord. Beytr. 1. *p.* 78. *t.* 3. *f.* 26.
Friſch miſc. Berol. 1727. *p.* 42.
Batſch Bandw. p. 165. *n.* 20. *f.* 88. 167.
β) Taenia lanceolata nodoſa. *Bloch Eingew. p.* 10. *t.* 1. *f.* 9.

Habitat in anſeris domeſtici, *β*) *in* merganſeris *et* abbelli inteſtinis, *ad* 10 *pollices longa, modo pura ſit, albiſſima, tenera.*

ſetigera. 90. T. corpore ad unum latus ſetoſo: ſetis tenuiſſimis breviſſimis cylindricis truncatis. *Froelich Naturf.* 24. *p.* 106. *t.* 4. *f.* 1-7.

Habitat in anſeris domeſtici paſcentis inteſtinis, *tenuibus ad confinia craſſorum.*

anſeris. 64. T. minuta anguſtiſſima, fine anteriori capillari. *Goeze Eingew. p.* 380. *t.* 29. *f.* 1.

Habitat in anſeris domeſtici inteſtinis, *an diſtincta a trilineata?*

anatis. 65. T. capite obtuſo, articulis ſubtriangulis: oſculis lateralibus ſub margine. *Müll. Naturf.* 14. *p.* 156. 179.

faſciolaris. *α*) T. *Pall. n. nord. Beytr.* 1. *p.* 85. *t.* 2. *f.* 23.

lineata. *β*) T. *Bloch Eingew. p.* 12. *n.* 5. *Beſch. berl. Naturf.* 4. *p.* 555. *t.* 14. *f.* 5-7.

Batſch Bandw. p. 196. *n.* 38. *f.* 130. Taenia trilineata.

Malleus. *γ*) T. *Goeze Eingew. p.* 383. *t.* 30. *f.* 1-3.

avium. *δ*) T. *Pall. n. nord. Beytr. p.* 87. *t.* 3. *f.* 29.

Habitat in anatum inteſtinis, *α*) 6, *β*) 4, *γ*) *ad* 17, *pollices longa, ſatis laevis, γ*) *anterius malleolata.*

laevis. 66. T. capite cylindrico, collo tenuiſſimo longo, articulorum latitudine longitudinem ſexies ſuperante. *Bloch Eingew. p.* 15. *t.* 4. *f.* 4-6.

Batſch Bandw. p. 194. *n.* 36. *f.* 126. 127.

Habitat in anatum, clangulae *et* clypeatae inteſtinis, *articulis nudo oculo non conſpicuis.*

cuneata. 67. T. capite acuminato ſeſſili, articulis cuneatis. *Batſch Bandw. p.* 190. *n.* 32. *f.* 117. 118.

Bloch Eingew. p. 13. *t.* 3. *f.* 1. 2. Taenia articulis conoideis.

Habitat in tardae, anatumque fulicae *et* clangulae inteſtinis, 1-2 *pedes longa, proboſcide brevi.*

alcae. 68. T. articulis viminalibus, fine anteriore tenuiore cylindrico. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 318. *n.* 297. b.

Habitat gregaria in alcae picae inteſtinis, *albida, ad* 9 *pollices longa, poſterius latior, articulis circiter* 184, *ſingulis utrinque ad marginem papilla notatis.*

69. T.

tordae. 69. T. teretiuſcula, articulis cordatis, ſine anteriori filiformi acuminato. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 319. *n.* 298.
Habitat in alcae picae inteſtinis, *albicans, vix ultra* 3 *pollices longa, articulis circiter* 87, *margine utrinque papilla notatis.*

tardae. 70. T. articulis rhombeis: lineis in medio aliquot transverſis, ovariisque in margine poſteriori tumido.
Bloch Eingew. p. 12. *t.* 2. *f.* 5-9. Taenia villoſa.
Werner verm. inteſt. p. 54. *t.* 3. *f.* 58-63.
Batſch Bandw. p. 163. *n.* 19. *f.* 86. 87. Taenia fimbriata.
Habitat copioſiſſima in tardae inteſtinis, *crinis equini craſſitie, ad* 4 *pedes longa, capite oblongo, collo capillari, articulis circiter* 32000 *brevibus, latis, tenellis, altero latere denticulato, altero ovario, tanquam membrana articulo ipſo duplo latiore, acuto.*

Linea. 71. T. tenuiſſima, collo ſimplici, proboſcide ſubpetiolata capiteque globoſis, articulis brevibus dilatatis: angulo poſteriore prominente acuto. *Goeze Eingew. p.* 399. *t.* 32. A. *f.* 8-12.
Batſch Band. p. 194. *n.* 37. *f.* 28. 128. 129.
Red. opuſc. 3. *p.* 219?
Habitat numeroſiſſima in perdicum inteſtinis, *ad* 5 *lineas longa, in hac familia minima.*

maculata. 72. T. tenuis pellucida margine ſerrata, articulis breviſſimis dilatatis: eminentia media nigra et angulo poſteriore prominente acuto.
Bloch Eingew. p. 14. *t.* 4. *f.* 1-3. Taenia tenuis nodis inſtructa.
Batſch Bandw. p. 193. *n.* 35. *f.* 124. 125.
Habitat in turdi iliaci inteſtinis, *anguſtiſſima, alba.*

d. *reptilium.*

bufonis. 73. T. anterius ſubteres, poſterius filiformis, capite continuo obtuſo, articulis membrana tenella obvolutis cylindricis oblongis: margine argenteo.
Goeze Eingew. p. 425. *t.* 35. *f.* 1-6. Taenia diſpar.
Batſch Bandw. p. 216. *n.* 50. *f.* 155-163. 165.
Habitat in bufonis *et* ſalamandrae inteſtinis, *alba,* 6 *pollices circiter longa, opaca.*

e. *piſ-*

e. *piſcium.*

anguillae. 74. T. capite ſeſſili diſtincto craſſiore, articulis oblongis vage toruloſis: oſculis duobus in uno latere. *Batſch Bandw. p.* 211. *n.* 46. *f.* 148-150.

Beſch. berl. Naturf. 3. *p.* 490. *Goeze Eingew. p.* 414. *t.* 33. *f.* 6-8. Taenia claviceps.

Müll. Schr. berl. Naturf. 1. *p.* 208. *Naturf.* 14. *p.* 156.

Doever. verm. p. 130.

Red. an. viv. n. an. viv. p. 86. *t.* 14. *f.* 4. *opuſc.* 3. *p.* 252. *t.* 18. *f.* 4.

Habitat in anguillae inteſtinis, *ad* 4 *pedes longa, capite anterius truncato, articulis* 8 *proximis longiore, articulis circiter* 600, *prioribus ſubquadratis, latitudine longitudinem duplo, poſterioribus orbicularibus: latitudine longitudinem octuplo ſuperante.*

rugoſa. 75. T. ſerrata capite obtuſe conico: papillis binis utrinque ad apicem usque adnatis, articulis breviſſimis dilatatis. *Batſch Bandw. p.* 208. *n.* 44. *f.* 142-145.

Goeze Eingew. p. 410. *t.* 33. *f.* 1-5.

Red. an. viv. n. an. viv. p. 91. *t.* 15. *f.* 10. *op.* 3. *p.* 245. *t.* 21. *f.* 5.

Struſſenf. act. Stockh. 35. *n.* 2. *p.* 23.

Habitat in Gadorum, Muſtelae *et* Lotae inteſtinalis caecis, *capioſiſſima, tripedalis, collo ſub cylindrico articulato, in ſpiritu vini fuſceſcens, articulis poſterioribus ovorum plenis, capitis forma externa, totoque corporis habitu tetragonocephalae affinis, an vere diſtincta?*

ſcorpii. 76. T. capite carinato, oſculis lateralibus divergentibus, articulis inaequalibus. *Müll. zool. dan* 2. *t.* 44. *f.* 1-7. *rar.* 2. *p.* 13. *nov. act. ſoc. dan.* 1. *p.* 61-151. *Naturf.* 14. *p.* 144. 179.

Müll. zool. dan. prodr. 2656. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 319. *n.* 299. Taenia oſculis lateralibus, ultimo tenuioris extremitatis articulo tetragono.

Leeuwenh. arc. nat. p. 376. Vermes ex rhombi inteſtinis.

β) Taenia pleuronectis maximi. *Müll. Naturf. p.* 145-151. 18. *p.* 25.

Habitat in Cotti Scorpii *et* pleuronectis maximi ventriculo *et* inteſtinis, *capitis forma mutabili, corporis margine quaſi crenato, linea utrinque longitudinali, cauda obtuſa integra, articulorum anteriorum oſculo nullo.*

percae. 77. T. capite bulboſo, ocellis quatuor, articulis quadrangulis: oſculis marginalibus. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 44. *f.* 1-4. *rar.* 2. *p.* 11. *nov. act. ſoc. dan.* 1. *p.* 59. 64. 65. *Müll. Naturf.* 14. *p.* 152. 153. 179. *Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 206-209.

Pall. n. nord. Beytr. 1. *p.* 102.

β) Taenia lineolis lateralibus nullis. *Müll. zool. dan. rar.* 2. *p.* 12.

Goeze Eingew. p. 416. *t.* 33. *f.* 11-14. Taenia alternatim transverſe lineata, articulis quadrangularibus, capite quadriverrucoſo.

Batſch Bandw. p. 157. *n.* 16. *f.* 80-82. Taenia ſiluri.

Habitat rarior in percae marinae, β) *in* glanidis inteſtinis, *linea utrinque longitudinali candida, articulis craſſioribus et planioribus, quam in congeneribus, capite obtuſo inſequentibus articulis anguſtiore.*

erythrini. 78. T. latiſſima, capite brevi tetragono octolobato, ore antico punctato. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 317. *n.* 297.

Habitat in percae norwegicae inteſtinis, *vivax et in aqua quidem marina vitae tenax,* 6 *circiter pedes longa,* 4 *lineas lata, lactea, inteſtino ex griſeo violaceo, articulis margine papillari retrorſum tendente utrinque terminatis, anali margine decemſerrato.*

cernuae. 79. T. *Pallas elench. zooph. p.* 414.

Habitat in percae cernuae inteſtinis, *vix propria ſpecies.*

ſolida. 80. T. oſculis ſub margine articulorum: alterius extremitatis articulo acuto. *Müll. zool. dan. prodr.* 2657. *Naturf.* 18. *p.* 24-26. *t.* 3. *f.* 1-5.

Linn. it. goth. p. 268. Faſciola hepatica.

Pall. inf. viv. p. 135. *elench. zooph. p.* 410. *β. n. nord. Beytr.* 1. *p.* 76. 78. *t.* 3. *f.* 27.

O. Fabr. fn. groenl. p. 320. *n.* 300. *Batſch Bandw. p.* 224. *n.* 52. *f.* 179. Taenia gaſteroſtei.

Habitat in gaſteroſtei aculeati ventre, *quem tumidum reddit, ſaepius ſolitaria albiſſima, congeneribus durior et ſolidior, utrinque obtuſe marginata, articulis breviſſimis, linea utrinque longitudinali excavata.* Zoega.

gaſteroſtei. 81. T. tenuiſſima, cauda obtuſa. *Müll. Naturf.* 18. *p.* 28. *t.* 3. *f.* 6. 7.

Habitat in gaſteroſtei aculeati inteſtinis, *minima, articulis nudo oculo vix diſcernendis.*

ſiluri. 82. T. crenata, capite continuo, articulis brevibus parallelepipedis: oſculis binis bimarginatis.
Goeze Eingew. p. 415. *t.* 33. *f.* 9. 10. Taenia oſculata.
Batſch Bandw. p. 209. *n.* 45. *f.* 146. 147.
Habitat in glanidis inteſtinis craſſis, *minus capi ſa, nodulo-ſa minor, diſtincto in proboſcide retractili ore, articulis minus evidentibus.*

Salmonis. 83. T. capite globoſo mutabili, oſculis articulisque annularibus inconſpicuis. *Müll. Naturf.* 14. *p.* 179. 202. 18. *p.* 22. *nov. act. dan.* 1. *p.* 68.
Goeze Eingew. p. 417. *t.* 34. *f.* 1. 2. Taenia Proboſcis ſuilla.
Bloch Eingew. p. 15. *t.* 4. *f.* 7-10. Taenia capite truncato.
Beſch. berl. Naturf. 4. *p.* 545. *t.* 10 *f.* 8 9. Taenia craſſa.
Batſch Bandw. p. 212. *n.* 47. *f.* 151. 152. Taenia proboſcidea.
β) Taenia tetragonoceps. *Pall. n. nord. Beytr.* 1. *p.* 87. *t.* 3. *f.* 31. A-D.
Batſch Bandw. p. 204. *n.* 43. *f.* 139-141. 175.
Habitat in ſalmonis ſalaris *et* ariocis ventriculo *ac* inteſtinis, *a* 2 *lineis ad* ¾ *pedem longa, capite ovali articulum quinquies ſuperante, corpore teretiuſculo, articulis poſterioribus ſenſim anguſtioribus ultimo reliquis quinquies longiore.*

Froelichii. 91. T. capite cum collo longiſſimo tenuiſſimo inarticulato continuo, ovariis dendaticis linea laterali cinctis. *Froelich Naturf.* 24. *p.* 124. *t.* 4. *f.* 20. 21.
Habitat in Salmonis Wertmanni inteſtino duodeno.

84. T.

Cuinam hujus ſectionis generi adſcribendi ſunt vermes a Redi *in aquilae pedibus an. viv. n. an. viv. p.* 83. *op.* 3. *p.* 225. *in lari oeſophago an. viv. p.* 83. *op.* 3. *p.* 226. *t.* 21. *f.* 10. *in teſtudinibus variisque rajae ſqualique ſpeciebus an. viv. p.* 110- 111. 107. *op.* 3. *p* 296. 285. *in gadorum inteſtinis an. viv. p.* 90. *t.* 15. *f.* 6. *opuſc.* 3. *p.* 243. *t.* 21. *f.* 2. 3. 4. *in piſce tam baro an. viv. p.* 92. *t.* 15. *f.* 1-4. *op.* 3. *p.* 250. *t.* 20. *f.* 1-4. *in cancri ovariis an. viv. p.* 101. *t.* 17. *f.* 1. *op.* 3. *p.* 270. *t.* 24. f. e. *in aſcidiae ſpecie, (ſi quidem huc ſpectet) an. viv. p.* 105. *t.* 15. *f.* 7. *op.* 3. *p.* 276. *t.* 21. *f.* 7. *in aphrodite aculeata anim. viv. p.* 105. *t.* 17. *f.* 5. *op.* 3. *p.* 287. *t.* 25. *f.* 4. *in ſepia an. viv. p.* 95. *t.* 16. *f.* 6. *op.* 3. *p.* 255. *t.* 23. *f.* 1. *notati? cuinam, ſi quidem ſtructo ſit violentia vomitus et habitaculo inconſueto nequaquam deformata ſpecies vermis* a b. Scopoli *notatus et delic. inſubr. p.* 1. *t.* 20 *deſcriptus et delineatus: erat ille per vomitum in femina rejectus, in os amplum ſupra verrucoſum exeuntibus dentibus* 2, *quorum alter in veſicam ovi gallinacei magnitudine, alter in proceſſum capitis vermiformem corporis reliqui longitudine terminatur? An proprium genus echinorhyncho proximum pleurorynchus corpore filiformi, capite rotundo, proboſcide longa inermi, laterali diſtinctus, a* Cl. Nan. *in ſturionis inteſtinis repertus, et Schr. berl. Naturf.* 7. *p.* 471. *deſcriptus et t.* 7. *delineatus?*

Rectangu- 84. T. articulis transverſis margine rotundatis, ductu pelluci-
lum. diore in medio ad angulum ſubrectum flexo. *Batſch Bandw. p.* 159. *n.* 17. *f.* 83. 174.
Bloch Eingew. p. 11. *n.* 3. *t.* 1. *f.* 7. 8.
Habitat in Cyprini Barbi inteſtinis, *pollice vix longior, alba, tenuis, ſemipellucida, fine anteriori acutiore.*

toruloſa. 85. T. elongata toruloſa, capite obtuſo, collo crenato, articulis orbiculatis: oſculis geminis difformibus. *Batſch Bandw. p.* 181. *n.* 27. *f.* 105-108.
Bloch Eingew. p. 11. *n.* 4. *t.* 2. *f.* 1-4. 10. 11. Taenia articulis rotundis.
Habitat in Cyprino Jeſe, *ad 2 pedes longa, capite plano, anterius truncato, collo brevi, articulis brevibus craſſis.*

laticeps. 86. T. ſubtiliter transverſe rugoſa, parte poſteriori craſſiore: fine obtuſo anterius lobo contractili crenato terminata. *Pall. n. nord. Beytr. p.* 106. *n.* 16. *t.* 3. *f.* 35.
Habitat copioſa in bramae inteſtinis, *minuta, pollicem circiter longa, molliuſcula.*

353. FURIA. *Corpus* lineare, aequale, filiforme, utrinque ciliatum aculeorum reflexorum corpori appreſſorum ſerie ſimplici.

infernalis. 1. F. *Fn. ſuec.* 2070.* *Amoen. acad.* 3. *p.* 322.
Solander nov. act. Upſal. 1. *n.* 6.
Pallas nord. Beytr. 1. *p.* 113.
Habitat in Bathniae paludibus vaſtis ceſpiloſis, *unguis longitudine, carnea vel ochroleuca, apice ſaepius nigra, carices crebro fruticesque adſcendens, ventoque per aërem ducta hominum equorumque partes nudas non perpendiculariter ſitas per cutem intrans, ſenſationem primo acupuncturam mentientem, excitans, locoque, per quem introgreſſa eſt, punctum nigrum et vehementem pruritum, mox dolorem atrocem, maculam rubram, et gangraenam a puncto illo nigro undequaque progredientem, febrem inflammatoriam, frequentibus animi deliquiis et deliriis ſtipatum, altero, aliquando primo die, imo paucas poſt horas morte terminatam, niſi cito citius, quae ſumma diffi-* cul-

Furiae et Myxines genus *inter utramque ſectionem hujus ordinis ambigunt.*

cultas eſt, vermis extrahatur, aut ſi jam profundius penetraverit, caro, quam feriit, exſcindatur, oleumque, ut fertur, betulae empyreumaticum infundatur, vel lac coagulatum caſeusve imponatur.

281. MYXINE. *Corpus* teres ſubtus carinatum pinna adipoſa.
Os terminale cirroſum.
Maxillae binae pinnatae: dentibus plurimis acutis in fauce
Dens ſuperior ſolitarius acutus.

glutinoſa. 1. M. *Fn. ſuec.* 2086. *Muſ. Ad. Fr.* 1. *p.* 91. *t.* 8. *f.* 4. *Stroem ſondm.* 1. *p.* 287. *act. nidroſ.* 2. *p.* 250. *t.* 3. *Müll. zool. dan. prodr.* 2755. O. *Fabr. fn. groenl. p.* 344. *n.* 334.
Helm. it. 1. *p.* 100.
Will. ichth. 107. *Raj. piſc.* 36. Lampetra caeca, oculis carens.
Habitat in Oceano europaeo, *piſces intrans, devorans, aquam in gluten vertens.*

275. GORDIUS. *Corpus* teres aequale laeve.

aquaticus. 1. G. filiformis fuſcus.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1052. *Fn. ſuec.* 2068.* Gordius pallidus, extremitatibus nigris.
It. goth. 282. Gordius.
Müll. hiſt. verm. I. 2. *p.* 30. *n.* 161. Gordius Seta.
Geſn. ag. 463. Vitulus aquaticus, Seta, amphisbaera aquatica.
Aldr. inſ. 720. *t.* 765. Seta ſ. vitulus aquaticus.
Jonſt. inſ. t. 25. Meerwijn.
Klein tent. herpet. p. 68. Lumbricus aquaticus. 4.
Planc. conch. app. c. 22. *t.* 5. *f.* F. Seta paluſtris.
Hill. hiſt anim. p. 14. Chaetia.
Habitat in rivis, *aliisque* aquis *fundi potiſſimum* argillacei, *quem, uti piſcis aquam tranat, ſcaturiginum plurium auctor, opacus, ſaepe in ſpiram varie ſe contorquens, interdum pallidus, rarius altero fine parumper acuminatus, morſura paronychiam excitare, opio feliciſſime ſanandam fertur in* Waldai *piſces occidere, hominibus non perinde infeſtus.*

2. G.

argillaceus. 2. G. flaveſcens totus. *Fn. ſuec.* 2069.*
Habitat in argilla, proprio quaſi elemento, quam ubique tranat, adeoque ubi illa foditur, frequens; vix diſtinctus ab aquatico.

Filum. 3. G. filiformis candidus. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 31. *n.* 162.
Habitat in cuniculis, in cortice tubi abiegni, olim aquae ductui inſervientis, excavatis, ſubtiliſſimus, altero fine ſubattenuatus, hyalinus.

lacteus. 4. G. totus albus opacus. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 32. *n.* 163.
Habitat per myriades a Junio ad Septembrem in aquis, *in quibus* fagifolia *pubeſcunt, tactus momento citius ſe contrahens, rurſumque expandens.*

arenarius. 5. G. fulvus obtuſus. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 33.
Habitat in fundo ſabuloſo ſinus Chriſtianienſis Norwegiae.

277. LUMBRICUS. *Corpus* teres annulatum ſaepius cingulo elevato genitalium receptaculo cinctum, aculeis utplurimum conditis longitudinaliter exaſperatum, poro laterali inſtructum.

terreſtris. 1. L. ruber octofariam aculeatus. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 24. *n.* 157.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1076. *n.* 1. *Fn. ſuec.* 2073. Lumbricus trifariam retrorſum aculeatus.
Hill hiſt. anim. p. 15. Lumbricus laevis.
Aldrov. inſ. 693. Lumbricus terreſtris.
Raj. inſ. 2. Lumbricus terreſtris minor.
Sloan. jam. 2. *p.* 189. Lumbricus terreſtris minor rubicundus.
Petiv. gazoph. t. 130. *f.* 6.
Red. exper. 4. *t.* 15. *f.* 1.
Paulini de lumbr. terr. Francof. 1703.
Leſſer theolog. des inſ. par. Lyonnet. f. 1. 2. 3.
Vandelli diſſert. 3. *Patav.* 1748. *p.* 98 - 147. *t.* 4.
Klein tent. herpetol. p. 58.
Murrey de lumbric. ſet. obſerv. t. 2. *f.* 1 - 5.

Phelſam hiſt. aſcarid. t. 2. f. 4. 5.
Bonnet inſectol. 2. t. 4.
Wichmann Beſch. berl. naturf. Fr. 3. p. 231.
β) Lumbricus major. *Raj. inſ. 1.*
Habitat in ligno putrido *et* humo, *quam bibulam reddit, cotyledones plantarum conſumens, nocte pro copula exiens, a naſua, talpa, erinaceo, gallina, creoce, effoſſus fuligine, vino pellendus, 6-8. pollices longus 117-133. ſegmentis conflatus, ſingulis quatuor paribus aculeorum oculo nudo non conſpicuorum armatis, expanſus utrinque convexus, contractus ſubtus planiuſculus, canali rubro totum corpus percurrente, cingulo rugoſo, poroſo utrinque tumido ſubtus planiuſculo, ore infra proboſcidem poſito.*

marinus. 2. L. papillis dorſalibus geminatis ſetigeris. *It. wgoth.* 189. *t.* 3. *f.* 6. *It. ſcan.* 315. *Fn. ſuec.* 2074.*
Bell. aquat. 444. Lumbricus marinus.
Pallas nov. act. Petrop. 2. *p.* 233. *t.* 1. *f.* 19. 29. Nereis lumbricoides.
Habitat in maris Europaei *fundo ſub arena, nonne potius ad nereides relegandus?*

vermicularis. 3. L. albus bifariam aculeatus. *Müll. hiſt. verm.* 1. *p.* 26. *n.* 158.
Habitat haud infrequens in truncis humentibus *ac inter* folia madida, *in humidiuſculis commode repens, in ſiccis valde ſe torquens, glaber, nitidus.*

variegatus. 4. L. rufus maculatus ſexfariam aculeatus. *Müll. hiſt. verm.* I. 2 *p.* 26. *n.* 159.
Bonnet vers d'eau douce. t. 1. *f.* 1-5.
Habitat in alnetorum *et* nemorum limo aquoſo, *pulcherrimus, rubro colore teſſulis fuſcis minimis interſtincto, linea ſanguinea media totum corpus percurrente, facillime redintegrandus, et ſponte in fruſta diſſiliens, integrum animal referentia.*

tubifex. 5. L. rufeſcens bifariam aculeatus. *Müller hiſt. verm.* I. 2. *p.* 27. *n.* 160. *zool. dan.* 3. *p.* 4. *t.* 84. *f.* 1-3.
Bonnet vers d'eau douce. t. 3. *f.* 9. 10.
Trembley hiſt. des polyp. t. 7. *f.* 2.
β) L. ſeta anterius utrinque porrecta. *Müll. hiſt. verm.* 1. *p.* 27.
γ) *Schaeffer Armpolypen.* 1755. *t.* 3. *f.* 1-3?
Habitat in rivulorum fundo, *pellucidus, ſimpliciſſimus, tenuiſſimus, apice truncatus inteſtino obſcuro, ex terra tu-*

bu-

bulum perpendicularem erectum ſibi fingens, quem inhabitat.

lineatus. 6. L. albus, linea longitudinali rubra. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 29.
Müller v. Würm. p. 110. 118. *t.* 3. *f.* 4. 5.
Habitat frequentiſſimus ad littora maris Baltici, *copioſiſſimus inter fucos, pellucidus ſetis breviſſimis, arteria dorſi lutea, vena caput verſus bifida, ovario albo M jo pleno.*

ciliatus. 7. L. rufus ciliis annulatus. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 30.
Habitat in Norwegiae maritimis, *glaber, ſegmentis ultra* 40, *interſectionibus faſciculis* 4 *ſetarum breviſſimarum armatis.*

tubicola. 8. L. albus, macula ſegmentorum dorſali rubra. *Müll. zool. dan. prodr.* 2613 *zool. dan. rar.* 2. *t.* 75.
Habitat rarus in fundo argillaceo ſinuum Norwegiae, *tubulum, teretem, membranaceum, limo obductum, ſe uncia longiorem inhabitans, ſegmentis corporis* 25, *interſectionibus utrinque* 2 *ſetis armatis, inteſtino nigro totum corpus percurrente.*

echiurus. 9. L. ſeriatim granuloſus, poſterius obtuſe truncatus, duplicique ſetarum corona cinctus. *Pall. miſcell. zool. p.* 146. *t.* 11. *f.* 1-6. *ſpicil. zool.* 10. *p.* 3. *t.* 1. *f.* 1-5.
Habitat in maris fundo arenoſo, *frequens, hieme potiſſimum, in littore belgico, gadi morrhuae eſca, digiti medii magnitudine, lingua carnoſa, craſſiuſcula, ſcaphoidea, ex griſeo albidus: viſceribus fulvis.*

Thalaſſema. 10. L. ſtriatus ſordide ruber rutilo-maculatus, ſubtus griſeus, ore infundibulo intus rugoſo ad marginem plicato cincto.
Pall. miſc. zool. p. 147. *t.* 11. *f.* 9. *ſpicil. zool.* 10. *p.* 8. *t.* 1. *f.* 6.
Habitat in Cornubiae littore *profunde inter rimas rupium ſubmarinarum, glaber, mucoſus, altero fine craſſior, altero ſubacuminatus, ore ſupero: infundibulo croceo.*

edulis. 11. L. ex albido carneus poſterius ſubclavatus anterius dilatatus papilloſus, ore terminali papillari ruga villoſiſſima cincto. *Pall. ſpic. zool.* 10. *p.* 10. *t.* 1 *f.* 7.
Camell. act. angl. 26. *n.* 318. *p.* 248. Tambiloc?
Habitat in littore ſabuloſo inſularum Oceani indici, *fere pedalis, pennae anſerinae craſſitie, ad pedem vel ſeſquipedem*

dem intra arenam latens, pervio ad ſuperficiem canali ſe prodens, Sinenſibus eſculentus propriaque arte captus, annulis inter partem villoſam finemque poſteriorem 278 ſtria annulari diremtis, fine poſteriori bulboſo papilla gemina, anteriori carneis confertis per ſeries transverſas digeſtis obſeſſo.

oxyurus. 12. L. ex liveſcente albidus fine poſteriore acutiſſimus, anteriore obtuſus, roſtro tereti lateſcente retractili et exſertili. *Pall. miſcell. zool. p.* 146. 147. *t.* 11. *f.* 7. 8. *ſpicil. zool.* 10. *p.* 16.

Habitat in Suſſexiae *littore, ſubſesquipollicaris, ſtriis teneris annuloſus, roſtro truncato ſubtiliter granuloſo, poro vix conſpicuo ad baſin roſtri ſito.*

fragilis. 13. L. ruber, verrucis lateralibus fiſſis, ſetis faſciculatis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2611. *zool. dan. rar. deſcr.* 1. *p.* 45. *zool. dan.* 1. *p.* 73. *t.* 22. *f.* 1-3.

Habitat in fundo limoſo *ſinus* Norwegiae Droebacenſis, *terreſtris facie, nereidibus affinis at aculeis manifeſtis, annulis ultra* 500 *laevibus fragillimis, capite conico, ore huic proximo rugoſo.*

armiger. 14. L. ruber, lamellis ventris lanceolatis, geminatis, anterius nullis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2610. *zool. dan. rar.* 1. *p.* 46. *zool. dan.* 1. *p.* 73. *n.* 29. *t.* 22. *f.* 4. 5.

Habitat in fundo imparo ſinus marini inſularum Teiſt oceani Norwegici, *nereidibus proximus,* 20 *lineas longus, annulis ultra* 100 *conſtans.*

cirratus. 15. L. cirris longiſſimis. *Stroem. act. Nidr.* 4. *t.* 14. *f.* 7.

Habitat in mari Norwegico, *cirris annulatis* 3-24 *per totum corpus diſperſis.*

ſabellaris. 16. L. articulatus, altero fine truncatus, interſectionibus articulorum incraſſatis biaculeatis. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 37. *t.* 104. *f.* 5.

Habitat in ſinu Norwegiae Droebacenſi, *an forte cum tubicola diſtincti generis?*

278. PLANARIA. *Corpus* gelatinoſum planiuſculum: poro ventrali duplici; ore terminali.

* *oculis nullis.*

ſtagnalis. 1. Pl. ovata fuſca anterius pallida. *Müll. verm.* I. 2. *p.* 53. *n.* 178.
Pallas inf. viv. intra viv. p. 272. Faſciola ovata plana ſubpetiolata aquatica.
Habitat in ſtagnis, *opacus, ſupra et ſubtus aequalis antrorſum ſubacuminatus pellucens: maculis binis lacteis: ovis numeroſis albidis ad latera congeſtis.*

nigra. 2. Pl. oblonga nigra, anterius truncata. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 54. *n.* 179. *zool. dan.* 3. *p.* 48. *t.* 109. *f.* 3. 4.
Habitat in rivo, *ſubtus tota plana, poſteriora verſus poris duobus albidis ſecundum longitudinem diſpoſitis.*

brunnea. 3. Pl. oblonga brunnea: linea longitudinali nigra. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 54. *n.* 180.
Habitat - - - nigrae proxime affinis.

ciliata. 4. Pl. elongata depreſſa ciliis cincta. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 55. *n.* 181.
Joblot microſc. I. 2. *p.* 66. *t.* 8. *f.* 5-11. *et t.* 10. *f.* 13? Solea aurea et parva.
Habitat in aqua *ſub* lemna, *griſea, e granulis quaſi conflata, ciliis mobilibus, organo antico rotatorio vorticellam mentiens, an proprii generis?*

Gulo. 5. Pl. elongata pellucida, anterius truncata. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 56. *n.* 182.
Habitat rara in aquis *ſub* lemna *primo intuitu ciliatam referens, pellucida granuloſa, at ciliis orba, margine omni ſtriis tenerrimis teſſulato, pro lubitu lente celeriterve incedens, cyclidia cohabitantia uno hauſtu ingurgitans, et poſt aliquot horas ſimul iterum evomens.*

punctata. 6. Pl. elongata teres viridis. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 57. *n.* 183.
Habitat primo vere in pratis inundatis, *antrorſum obtuſa, poſterius ſubacuminata punctulis nigris conſperſa, et ova* 5 *rubra, ſphaerica undique pellucida continens.*

flaccida. 7. Pl. elongata brunnea: linea laterali transverſisque albis. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 57. *zool. dan. prodr.* 2678. *zool. dan. rar.* 2. *p.* 69. *zool. dan. t.* 64. *f.* 3. 4.
Habitat inter rudera teſtarum in ſinubus Norwegiae, *quietus ſpiraliter ſe convolvens, et partem corporis quamcunque pro lubitu attenuans, dilatans, corrugans, utroque fine ſubattenuata, ſupra convexiuſcula ſubtus plana, rubicunda, immaculata.*

roſea. 8. Pl. elongata rubra. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 58. *zool. dan. prodr.* 2679. *zool. dan. rar.* 2. *p.* 68. *zool. dan.* 2. *t.* 64. *f.* 1. 2.
Habitat in ſinubus Norwegiae *paſſim nigro-ſtriata, utroque fine obtuſa, ſupra convexa nigro-punctata, ſubtus pallidior: anterius pone caput lunula utrinque ex punctis nigris conflata.*

angulata. 9. Pl. elongata rufo fuſca: anterius angulis binis albis. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 58.
Habitat in fundo arenoſo Oceani, *ingens, anterius ſubacuminata, poſterius obtuſa, ſupra convexa ſubtus pallida, tubulo albo pellucido, inteſtino ſubrubente ſpirali inſtructo, ano terminali.* O. Fabricius.

rubra. 10. Pl. oblonga depreſſa pallide rubra. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 59. *zool. dan. prodr.* 2683. *zool. dan.* 2. *t.* 68. *f.* 9. 10. O. *Fabr. Fn. groenl. p.* 304.
Habitat in profundo littoris Groenlandici *ſuper ulvas et fucos frequens, ſupra lineis-transverſis tenerrimis exarata.* O. Fabricius.

viridis. 11. Pl. oblonga ſupra convexa viridis: ſtriis transverſis albis. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 59. *zool. dan. prodr.* 2684. *zool. dan.* 2. *p.* 77. *t.* 68 *f.* 1-4. *O. Fabr. Fn. groenl.* 305.
Habitat in radicibus fucorum marinorum, *craſſiuſcula, ſubtus pallidior, unicolor, antrorſum obtuſa: rima utrinque rubra; poſterius oblique truncata, ſubtus verſus medium foramine ovato, ano in dorſi medio.* O. Fabricius.

operculata. 12. Pl. ſubovata griſea ſubtus operculo tubulum exſertilem condente inſtructa. *Müll. zool. dan. rar.* 2. *p.* 78. *t.* 68. *f.* 5-8. *O. Fabr. Fn. groenl.* 307.
Habitat rara in littoribus arenoſis *et inter* fucos ſinuum minorum Norwegiae, *fabae coffeae non diſſimilis, marginem flectendo cito ſatis progrediens, plicarum marginalium ope*

ſuperis

ſuperis quoque corporibus ſe affigens et adſcendens, ex viridi griſea, ſubtus, dorſique linea longitudinali pallidiori, operculo candido, margine ſubtus plicato.

ſubulata. 13. Pl. elongata, anterius acuminata poſterius truncata. *Müll. zool. dan.* 2. *p.* 79. *t.* 68. *f.* 11. 12. *O. Fabr. Fn. groenl.* 308.

Habitat copioſa in conſervis Groenlandiae marinis *et fundo limoſo* cavernarum rupium aquam ſub aeſtu retinentium, *alba, ſupra griſea, motu roſtri ſerpentino celerrime ingrediens, roſtro autem tacto in cubum minutum ſe contrahens.*

ventricoſa. 14. Pl. ovata ventricoſa, anterius collo cylindrico-conico elongata, poſterius obtuſa.

Pall. ſpicil. zool. 10. *p.* 17. *t.* 1. *f.* 9. 10. Faſciola ventricoſa.

Habitat in Amboina, *praegrandis, ex livido exalbida, ſtriis rugisque tenuiſſimis exarata, poro utrinque ad foſſam colli baſilarem ampliſſimam circularem; nonne eadem cum tetragona?*

quadrangularis. 15. Pl. pallida ovata anterius acutiſſima membranulis quatuor longitudinalibus criſpulis alata.

Pall. ſpicil. zool. 10. *p.* 20. *t.* 1. *f.* 12. a-e. Faſciola quadrangularis.

Habitat haud infrequens prope Hagam Comitum *in foſſis inter lemnam, molliſſima, pellucida, forma mutabili, limacis more ingrediens, ſuper alia corpora gliſcens, et alteri animalculo obvia quaſi ſterrita contracta quieſcens: An hujus tribus?*

bicornis. 16. Pl. ovato-lanceolata utrinque obtuſa ex griſeo cinerea nigro-punctata: anterius tubulis binis breviſſimis divergentibus.

Pall. ſpicil. zool. 10. *p.* 23. *t.* 1. *f.* 14. a. b. Faſciola punctata.

Habitat in Belgii aquis lemna coopertis, *forma mutabili, laeſa aut irritata tubulorum ope hirudinis more corpus figens, ſubtus albidior: venis fuſceſcentibus; an hujus tribus et generis? an diverſa a tentaculata ſpecies?*

griſea. 43. Pl. corpore griſeo dilatato antrorſum elongato-acuminata, fine poſteriori abbreviata acuta. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 38. *t.* 105. *f.* 1.

Habitat in aquis lacuſtribus *inter conſervas.*

fulva. 44. Pl. depreſſa latiuſcula utroque fine acuta, macula longitudinali nigra elongata media. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 39. *t.* 105. *f.* 2.
Habitat - - -

viridata. 45. Pl. oblonga teres viridis utroque fine acutiuſcula. *Müll. zool. dan. prodr.* 3. *p.* 39. *t.* 105. *f.* 4.
Habitat auctumno in pratis inundatis.

** *oculo unico.*

glauca. 17. Pl. ſubelongata cinerea, iride alba. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 60 *n.* 184.
Habitat in aquis, *torvae affinis, lineam longa, anterius acuminata, poſterius latiuſcula, linea interdum duplici nigra in medio dorſi anterius et poſterius coeunte.*

lineata. 18. Pl. elongata ſupra convexa cinerea: linea longitudinali pallida. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 60.
Habitat vaga in littore maris Balthici, *ſesquilineam longa, ſubtus alba: area media fuſca, antrorſum attenuata, retrorſum dilatata.*

rutilans. 46. Pl. linearis, antrorſum acute attenuata, oculo nigro. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 49. *t.* 109. *f.* 10, 11.
Habitat in maris baltici *fucis.*

*** *oculis duobus.*

fuſca. 19. Pl. fuſca nigro-venoſa oblongo-lanceolata anterius truncato ſubretuſa, poſterius acuta.
Pall. ſpicil. zool. 10. *p.* 21. *t.* 1. *f.* 13. a. b. Faſciola fuſca.
Habitat vulgatiſſima in Europae aquis ſtagnantibus herboſis, *ad* Menyanthis, Sii aquatici, Nymphaeae folia, *tenerrima, limacis more in ſuperficie aliorum corporum gliſcens, per aquas ſat celeriter currens, dum quieſcit aut irritatur, ſe contrahens forma mutabili; nonne eadem cum torva?*

lactea. 20. Pl. depreſſa oblonga alba anterius truncata. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 61. *n.* 185. *zool. dan.* 3. *p.* 47. *t.* 109. *f.* 1. 2.
It. goth. p. 250. Hirudo depreſſa alba, lateribus acutis.
Habitat frequens in paluſtribus *ſub* nymphaeae foliis, *poſterius acuminata, margine laterali acuto, macula media lactea retrorſum in lineam pallidam extenſa, vaſis linearibus apice bifidis plurimis utrinque excurrentibus interaneis ſaepe lacte purpureis.*

torva. 21. Pl. depreſſa oblonga cinerea vel nigra ſubtus albida, iride alba. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 62. *n.* 186. *zool. dan.* 3. *p.* 48. *t.* 109. *f.* 5. 6.

Habitat in aquis, 4-5 *lineas longa, anterius obtuſa, poſterius ſubacuminata, oculis ſubtus pellucentibus, poris ventralibus albis interaneis pinnatis fuſcis, interdum nigricans, poris ſubtus tribus, et macula pone oculos angulari alba.*

tentaculata. 22. Pl. depreſſa oblonga cinerea anterius tubuloſa. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 63. *n.* 187.

Habitat in aquis paluſtribus, 7 *lineas longa, ſupra ſolida ventre repens, in aquis ventre dorſoque aeque mota, utrinque fere perinde obtuſa, marginibus lateralibus ſinuatis, macula dorſi media albida, ventre interdum albo dorſoque fuſco, rarius dorſo fuſco punctis nigris marginato et ventre cinereo, interaneis ſubtus nunc conſpicuis nunc inconſpicuis: pinnis nunc ſimplicibus nunc furcatis.*

crenata. 23. Pl. depreſſa ovato-oblonga pallida margine crenulato. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 64. *n.* 188.

Habitat rara in lacu vici Lyngbye Daniae, *lacteae facie, dorſo obſcure brunneo: macula media alba, interaneis ramoſiſſimis.*

Helluo. 24. Pl. ovata teres viridis. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 64. *n.* 189. *zool. dan.* 3. *p.* 39. *t.* 105. *f.* 3. *prodr. n.* 2692.

Habitat in pratis inundatis, *ad ſesquilineam longa, punctatae facie, anterius obtuſa, poſterius acuminata, dorſo obſcuro, ora candida.*

obſcura. 25. Pl. ovato-oblonga utrinque obtuſa alba. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 65. *n.* 190.

Habitat in piſcinis, *lineam longa, ſubpellucida.*

roſtrata. 26. Pl. oblonga hyalina, extremitate elongata, oculis rubris. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 65. *n.* 191. *zool. dan.* 3. *p.* 40. *t.* 105. *f.* 6.

Habitat in paludoſis, *lineam longa, candida, media maſſa helvola.*

atomata. 27. Pl. plana membranacea alba, ſuperne atomis ſparſis rufis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2706. *zool. dan. rar.* I. *p.* 73. *zool. dan.* I. *p.* 115. *t.* 32. *f.* 3. 4.

Habitat in ſinu Norwegiae Droebacenſi, *doridis obvelatae facie, ſubtus immaculata, punctorum nigrorum agminibus 2 oculos referentibus.*

cornuta. 28. Pl. plana oblongiuſcula, tentaculo ab utroque capitis latere. *Müll. zool. dan. prodr.* 2681. *zool. dan. rar.* 1. *p.* 74. *zool. dan.* 1. *p.* 116. *t.* 22. *f.* 5-7.

Habitat in ſinu Norwegiae Droebacenſi, *albida, ſubtus albo-punctata, fine anteriori proboſcidis inſtar exſertili et retractili, pone tentacula agmen punctorum nigrorum angulatum aliudque ad baſin utriusque.*

radiata. 29. Pl. oblonga rufa, dorſo roſula candida. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 66. *n.* 192. *zool. dan.* 3. *p.* 41. *t.* 106. *f.* 1. *et t.* 109. *f.* 7-9.

Habitat rara in aquis ſilvaticis, *prima facie vorticellam rotatoriam referens, ſesquilineam, longa, opaca: margine pellucido, antrorſum radiis pallidis, medio macula candida varia.*

ſtrigata. 30. Pl. oblonga pallida: lineis tribus longitudinalibus. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 66. *n.* 193. *zool. dan.* 3 *p.* 41. *t.* 105. *f.* 8.

Habitat in aquis paludoſis, *ſtrigis rufis.*

groſſa. 31. Pl. cylindracea alba, anterius et poſterius acuminata: oculis nigris. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 67. *n.* 194. *zool. dan.* 3. *p.* 40. *t.* 105. *f.* 5.

Habitat in plantis aquaticis, 2 *lineas longa, interdum decuplo minor, pellucida, ovis* 5-33 *magnis, ſphaericis, rubris, confertis.*

linearis. 32. Pl. elongata teretiuſcula pallide lutea. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 67. *n.* 195. *zool. dan.* 3. *p.* 42. *t.* 106. *f.* 2.

Habitat in ſilvarum foveis paluſtribus, *ſesquilineam longa, decuplo latitudine ſua longior: margine pellucido candido, obvia evitans.*

terreſtris. 33. Pl. linearis ſupra convexa cinerea ſubtus alba. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 68. *n.* 196.

Habitat in aſſeribus muſcisque humidis, *qua terram ſpectant, extra humiditatem paucorum minutorum intervallo periens, hirudinis inſtar ſe contrahens et expandens, limacis more progrediens, et viſcoſa, ut igitur utrumque genus jungat, opaca.*

tetragona. 34. Pl. lutea, lamellis quadrangulis quatuor. *Müll. hiſt. verm.* I 2. *p.* 69. *n.* 197. *zool. dan.* 3. *p.* 42. *t.* 106. *f.* 1-5.
Habitat rarior in ſtagnis foveisque aquae purioris, *lamellis ſubmembranaceis pellucidis, ſaepius octilatera, rarius bilatera.*

capitata. 35. Pl. oblonga cinerea, capite diſcreto. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 70.
Habitat in mari Balthico, *torvae affinis, at capite diſcreto fuſciolas limacibus aquaticis nectens, reſupinata quieſcens et utplurimum aquae innatans, viſcida, anterius obtuſa, poſterius acuminata, ſupra gibba nigricans: punctatis albis ſparſis, ſubtus plana alba; verſus oram utriusque lateris ſuperne macula alba, in cujus angulo externo oculus.*

caudata. 36. Pl. anterius rotundata, poſterius in caudam attenuata. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 70. *zool. dan. prodr.* 2702. *zool. dan. rar.* 2. *p.* 80. *zool. dan.* 2. *t.* 68. *f.* 13-15. *O. Fabr. Fn. groenl.* 310.
Habitat gregaria in Groenlandiae fucis ulvis*que* littoralibus, *vivaciſſima, 2 lineas longa, a flavo rufa ſubconvexa.*

auriculata. 37. Pl. oblonga anterius truncato-emarginata, poſterius acuta. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 68. *f.* 16. 17. *rar.* 2. *p.* 81.
Habitat in ſinuum Norwegiae aqua marina, *nudo oculo inconſpicua, gelatinoſa, pellucida, macula media opaca oblonga, in formam ſphaericam et ovatam paſſim ſe contrahens.*

filaris. 38. Pl. linearis, cauda filiformi contractili. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 68. *f.* 18-20. *rar.* 2. *p.* 82.
Habitat in madrepora prolifera, *limacis more vitri parietes adſcendens, pollicem longa, lineam lata, carnoſa, ex rufo fulva, anterius obtuſa, poſterius macula rufa notata, antrorſum ciliis breviſſimis micantibus obſita.*

Lingua. 47. Pl. pellucida fuſco cinerea utroque fine obtuſiſſima. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 40. *t.* 105. *f.* 7.
Habitat auctumno *in* piſcinis.

**** *oculis tribus.*

Gefferenſis. 39. Pl. elongata viridis pone caput rufa. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 64. *f.* 5-8. *rar.* 2. *p.* 70.
Habitat in littoris Geſſerenſis Falſtriae fuco furcellato, *teres, anterius obtuſa, poſterius acuminata, corporis ſegmentis*

inae-

inaequalibus, ſerie punctorum albidorum minimorum inſcriptis: interſectionibus pallidis.

***** *oculis quatuor.*

marmorata. 40. Pl. oblonga pallida. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 71. *n.* 198. *zool. dan.* 3. *p.* 43. *t.* 106. *f.* 2.
Habitat rara in foſſis aquaticis, *dimidiam lineam longa, ex caeruleo griſea, interaneis glomeratis albis: macula media magna rotunda flava.*

candida. 41. Pl. elongata albida. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 71.
Habitat in Groenlandiae *littore ſub* lapidibus, 2-3 *pollices longa, admodum glutinoſa, linea media longitudinali lactea, ore tubulum exſerente.* O. Fabricius.

truncata. 48. Pl. pallide rubens, antrorſum late truncata, poſterius acutiuſcula. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 43. *t.* 106. *f.* 1.

****** *oculis pluribus.*

tremellaris. 42. Pl. plana membranacea lutea, margine ſinuato. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 72. *zool. dan.* 1. *t.* 32. *f.* 1. 2. *prodr.* 2705. *var.* 1. *p.* 72.
Habitat in mari Balthico Hafniam *alluente in* ſinu Chriſtianenſi *et* Droebacenſi Norwegiae, *tremellam referens, 9 lineas longa, tarda ſupra cinereſcens, diſco ſubluteo: media linea pinnata infraque hanc lunulae duae albae, ſubtus albicans, maculis tribus lacteis.*

279. SIPUNCULUS.

Corpus teres elongatum.
Os anterius attenuatum cylindricum.
Apertura lateralis corporis verruciformis.

nudus. 1. S. epidermide ſtricta. *Martin on marin. verm. &c.* 1. *p.* 4. *t.* 1. *f.* 2.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1078. *n.* 1. Sipunculus corpore nudo.
Geſn. aq. 1026. Vermis macrorhynchopterus Rondeletii 2.
Bohadſch mar. 93. *t.* 7. *f.* 6. 7. Syrinx.
Habitat in Oceano europaeo *ſub lapidibus.*

2. S.

Faſciola cornuta Com. Raſumowsky *vix hujus generis.*

ſaccatus. 2. S. epidermide laxa.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1078. *n.* 2. Sipunculus corpore tunica laxa induto.
Martin. on mar. vermſ. 1. *p.* 6. *t.* 1. *f.* 3? Sipunculus reticulatus.
Amoen. acad. 4. *p.* 454. *t.* 3. *f.* 5. Nereis ſacculo induta.
Geſn. aq. 1026. Vermis macrorhynchopterus 1.
β) Lumbricus phalloides. *Pall. ſpic. zool.* 10. *p.* 12. *t.* 1. *f.* 8.
Habitat in Oceano indico, *etiam* Vitamnico β) americano, inſulam Granadam *alluente.*

280. HIRUDO. *Corpus* oblongum, anterius et poſterius truncatum, muticum, cartilagineum, os caudamque dilatando progrediens.

indica. 1. H. depreſſa fuſca, ſtriis transverſis muricatis centum.
Habitat in Indiae marinis, *ore admodum dilatato, ſtriis annularibus expanſis elevatis.*

medicinalis. 2. H. elongata nigricans: ſupra lineis verſicoloribus, ſubtus maculis flavis. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 37. *n.* 167.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1079. *n.* 2. *Fn. ſuec.* 2079. *Amoen. acad.* 7. *p.* 42. Hirudo depreſſa nigricans ſupra lineis flavis ſex intermediis nigro arcuatis, ſubtus cinerea nigro maculata.
Hill hiſt. anim. p. 16. Hirudo nigreſcens flavo variegata.
Raj. inſ. 3. *Schmuck chir. Schrift.* 1. Hirudo medicinalis.
Geſn. piſc. 425. *t.* 425. Hirudo major et varia.
Bergman act. Stockh. 1757. *p.* 308. *n.* 4. *t.* 6. *f.* 1. 2.
Gisler act. Stockh. 1758. *p.* 95. *n.* 1.
Salomon act. Stockh. 1760. *p.* 35.
Habitat in ſtagnis *et* paludoſis, *praeſtantiſſimus phlebotomus, inprimis haemorrhoidum, ſupra rugis plurimis annularibus pro lubitu dilatandis vel contrahendis conſtans, lineis in dorſo utrinque* 4, *prima rufa, altera rufa nigro maculata, tertia nigra; quarta flava, ventre flavo maculis nigris vario, oculis orisque uncis, ut videtur, nullis.*

ſanguiſuga. 3. H. elongata nigra, ſubtus cinereo-virens: maculis nigris. *Müll. hiſt. verm.* 1. 2. *p.* 38. *n.* 168.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1079. *n.* 3. *Fn. ſuec.* 2078. *Amoen. acad.* 7. *p.* 44. Hirudo depreſſa fuſca: margine laterali flavo.
Hill hiſt. anim. p. 16. Hirudo nigra abdomine plumbeo.
Raj. inſ. 3. Hirudo maxime vulgaris.

Petiv.

Petiv. gazoph. t. 130. *f.* 7.
Bergm. act. Stockh. 1757. *n.* 4. *t.* 6. *f.* 3. 4.
Giſl. act. Stockh. 1758. *p.* 95. *n.* 2.
Habitat in foſſis, ſtagnis, paluſtribus, *ultra* 4 *pollices interdum longa, ventris medio interdum immaculato, a Norlandis medicinalis inſtar adhibita, cruoris adeo avida, ut novem ſanguine et vita privare equum dicantur, a dyticorum larvis nonnunquam ad mortem usque exſucta.*

lineata. 10. H. elongata griſea, dorſo lineis quatuor longitudinalibus nigris. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 39. *n.* 169.
Habitat rara, primo vere in paludoſis, 16 *lineas longa rugis confertis annulata, oculis* 6 *aterrimis ſerie duplici transverſim diſpoſitis.*

vulgaris. 4. H. elongata flavo fuſca, oculis octo: ſerie lunata. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 40. *n.* 170.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1079. *n.* 4? *Fn. ſuec.* 2080. Hirudo (octoculata) depreſſa fuſca, punctis octo nigris ſupra os.
Bergm act. Stockh. 1756. *p.* 199. *et* 1757. *t.* 6. *f.* 5-8.
Habitat vulgatiſſima in plantis aquaticis, 15 *lineas longa monoculis et animalculis infuſoriis minimis, helicum quoque incolis victitans, ab his poſtremis jure talionis iterum exſucta, ovulis in gravida ſphaericis diaphani ad* 70, *oculis interdum* 9, *nunc fuſca immaculata, nunc cinerea punctis nigris ſuperius conſperſa, nunc fuſca, punctis flaveſcentibus ſupra conſperſa, nunc luteo-fuſca: linea media nodoſa, laterali nigricante anterius intus pinnata, nunc flaveſcens, lineis longitudinalibus, media nodoſa, lateralibus punctis remotis ſanguineis.*

bioculata. 5. H. elongata cinerea, oculis duobus. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 41. *n.* 171.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1079. *n.* 5. *Fn. ſuec.* 2081. Hirudo (ſtagnalis) depreſſa nigra, abdomine ſubcinereo.
Bergm. act. Stockh. 1757. *n.* 4. *t.* 6. *f.* 9-11.
Habitat frequens in paludoſis foveis nemoroſis, rivis, 9 *lineas longa, cum incola helicis planorbis ſaepe conflictans, tota albida, pellucida, punctis cinereis conſperſa, ad latus plicata, crenulata, ovis ad* 40 *ingravida, circulo pellucido cinctis, junioribus cinereis, maturioribus fuſcis, pullis jam excluſis cauda matris ventri adhaerentibus.*

6. H.

Non miſſura cutim, niſi plena cruoris hirudo pellitur inſperſa muria.

compla- nata. 6. H. dilatata cinerea, linea dorſi duplici tuberculata, margine ſerrato. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 47. *n.* 175.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1079. *n.* 6. *Fn. ſuec.* 2082. Hirudo depreſſa ovato-oblonga interaneis fuſcis pinnatis pellucentibus.
Hill anim. p. 16. Hirudo lateribus attenuatis.
Bergm. act. Stockh. 1757. *t.* 6. *f.* 12-14. Hirudo ſexoculata.
Habitat haud frequens in rivis 4 *lineas longa, deſes, helicum incolas aggrediens, faſciis transverſis e lineis* 3 *pallidis compoſitis varia, margine albido, ſubtus griſea, capite acuminato albo, oculis ſex, cauda orbiculata cinerea.*

hyalina. 7. H. dilatata pellucida flava: margine integro. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 49. *n.* 176.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1080. *n.* 7. Hirudo (heteroclyta) hyalina poſtice lutea.
Trembl. hiſt. polyp. t. 7. *f.* 7.
Ledermüll. microſcop. p. 165. *t.* 84. *f.* k-q. (Junior.)
Habitat in rivorum plantis aquaticis, *quieta,* 7 *lineas longa, ſaniem ex incolis helicis planorbis emanantem frequenter ingurgitans, planiuſcula, anterius acuminata, poſterius latiuſcula, ſupra ſtriis atomorum longitudinalibus cineraſcentibus, ſubtiliſſimis, confertis, et transverſis remotis fuſceſcentibus, remotioribus nigris punctisque fulvis ſparſis varia, capite albo, oculis* 4-6, *matre ova ſphaerica, viridia, annulo pellucido cincta ad* 100, *ex quibus pulli primi partus flavi, ſecundi virides prodeunt geſtante.*

piſcium. 8. H. elongata flavicans: linea dorſali pinnata alba. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 43. *n.* 172.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1080. *n.* 8. *Fn. ſuec.* 2083. Hirudo (geometra) teres, extremitatibus dilatatis.
Hill. hiſt. anim. p. 17. Hirudo dorſo elevato, cauda latiore.
Friſch inſ. 6. *p.* 25. *t.* 11. Hirudo ore caudaque ampla.
Roeſ. inſ. 3. *p.* 199. *t.* 32. Hirudo piſcium.
Bergm. act. Stockh. 1757. *p.* 310. *n.* 3.
Ledermüll. microſcop. t. 84. *f.* a-i.
Geſellſchaftl. Erzaehl. 4. *p.* 303.
Habitat in aquis dulcibus, 8 *lineas longa, piſces infeſtans, antrorſum attenuata, interdum cinerea: ſubtus flava, fuſce-*

co-punctata fine anteriori albo: margine diſcoque fuſceſcente, poſteriori albido, radiis fuſcis punctoque intermedio nigro, oculis 4.

tesſulata. 11. H. cinerea, margine teſſulato, oculis octo: ſerie duplici longitudinali. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 45. *n.* 173.
Habitat rara in rivis, *pro aetate admodum varia, raro quieta, junior elongata, provectior, dilatata, ad 18 lineas longa, atomis undique nigris, ſupra maculis aurantiis vel albis, margine maculis albis, vel partim griſeis partim aurantiis varia ſubtus griſea: maculis* 2 *mediis rotundis albis, femina interdum pullis* 300 *foeta.*

marginata. 12. H. dilatata fuſca, margine teſſulato, oculis quatuor. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 46. *n.* 174.
Habitat rara in rivo, *teſſulatae affinis,* 10 *lineas longa, capite candido pellucido: faſciis* 2 *transverſis fuſcis, anterius obtuſo poſterius coarctato, abdomine ex fuſco brunneo: ſtriis ſubtiliſſimis ſubtus in lineolas duplicatas fuſcas coeuntibus, punctorum alborum in dorſ. ſeriebus* 5, *margine laterali albo, lineola duplici fuſca in quadratas areas diviſo, cauda orbiculata pallida: marginis maculis fuſcis.*

groſſa. 13. H. dilatata flavicans anterius fiſſa *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 69. *n.* 27. *t.* 21. *f.* 1-5. *prodr.* 2668. *rar.* 1. *p.* 43.
Habitat in mari, *venerem exoletam intrans,* 12 *lineas longa, et* 7 *lata, ſtriis ſubtiliſſimis albis exarata, anterius anguſtata, obtuſa, matre ovulis pellucidis ſphaericis in latice gelatinoſo natantibus ad* 1000 *referta.*

hippoglosſi. 14. H. dilatata albida medio corporis ocello didymo candido. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 54. *f.* 1-4. *prodr. p.* 2669. *rar.* 2. *p.* 41. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 302. *t.* 1. *f.* 8.
Baſt. opuſc. ſubſec. 2. *p.* 138. *t.* 8. *f.* 11.
Habitat in cute Pleuronectis Hippogloſſi, *cui tuberculis, hamulis, cuſpidibus tenaciſſime adhaeret, ovalis, depreſſa, pellucida anterius ſubacuminata, poſterius in orbiculum deſinens, capite ſubtriangulari macula cinerea utrinque notato, oculis non conſpicuis, cauda ſubtus tuberculis ſeriatim a centro excurrentibus hamulis* 2, *ac verſus medium cuſpidibus* 2 *armata.*

muricata. 9. H. teres, corpore verrucoſo. *Fn. ſuec.* 2084. *Muſ. Ad. Fr.* 1. *p.* 93. *t.* 8. *f.* 3.
Rondel. aquat. 2. *p.* 111. Hirudo marina.
Baſt. opuſc. ſubſec. 1. *p.* 82. *t.* 10. *f.* 2. Hirudo piſcium.
Habitat in Oceano atlantico.

II. MOL-

II. MOLLUSCA.

Animalia ſimplicia, nuda (absque teſta inhabitata) artubus inſtructa.

282. LIMAX. *Corpus* oblongum repens: ſupra clypeo carnoſo: ſubtus diſco longitudinali plano.
Foramen laterale dextrum pro genitalibus et excrementis.
Tentacula 4 linearia ſupra os, oculis in apice majorum.

laevis. 8. L. niger glabriuſculus. *Müller hiſt. verm.* II. *p.* 1. *n.* 199.
Habitat haud frequens Octobri *in* muſcis, 5 *lineas longus, nitidus, clypei ſtriis transverſis undulatis, atro anguſtior.*

ater. 1. L. niger rugoſus. *Müll. hiſt. verm.* II. *p.* 2. *n.* 200.
α) Limax aterrimus ſubtus pallidus.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1081. *n.* 1. *Fn. ſuec.* 2088. *Liſt. anim. angl. p.* 131. *t.* 2. *f.* 17. *ſynopſ. f.* 102. *tab. anat.* 5. *f.* 1. 23. *exerc. anat. t.* 3. *f.* 1-5. Limax ater.
Aldrov. inſ. 702. Limax tota nigra.
Geſn. aquat. p. 254. Cochlea nuda.
Argenv. conch. t. 28. *f.* 28.
Sibbald. prodr. hiſt. nat. Scot. 2. *l.* 3. *p.* 34.
Hill hiſt. anim. p. 87. *t.* 3.
Berl. Magaz. 3. *p.* 341. *t.* 5. *f.* 72.
β) Limax ater, dorſi carina pallide virente.
γ) Limax niger, ore luteſcente ſubtus albus.
Swammerd. bibl. nat. t. 9. *f.* 1.
δ) Limax ex fuſco caſtaneus, ore luteſcente ſubtus albus.
Liſter ſynopſ. t. 101. a. *f.* 103. *et. app. t.* 2. *f.* 1. Limax ſubrufus.
Berl. Magaz. 3. *p.* 339. *t.* 6. *f.* 71.
ε) Limax obſcure fuſcus, ore ſtrigaque utrinque luteſcente.
Habitat α) *vulgaris in* ſilvaticis, β) *in nemoroſis,* γ, δ, ε *rariores in* hortis, *a* 16 *lineis ad* 5 *pollices longus, tentaculis ſemper nigris, clypeo punctis confertis ſcabriuſculo,* abdo-

abdominis dorſo ſulcis rugoſo, corporisque ora lineolis nigris transverſis teſſulata.

albus. 2. L. albus. *Müll. hiſt. verm.* II. *p.* 4. *n.* 201.
α) Limax totus albus.
β) Limax albus, margine flavo. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1081. *n.* 2. *Müller Eſterv. an. Swamp. Hafn.* 1763. *p.* 61.
γ) Limax albus, margine et ſyncipite aurantio.
δ) Limax albus, tentaculis nigris.
Habitat in nemoribus ſilvisque, 3 *lineas ultra* 5 *pollices longus, colore conſtante.*

ſuccineus. 3. L. ſupra ſubrufus, ſubtus albus. *Müll. hiſt. verm.* II. *p.* 7. *n.* 203.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1081. *n.* 3. Limax (rufus) ſubrufus.
Aldrov. inſ. 702. Limax magna colore rufo.
Hill hiſt. an. p. 87. *t.* 3.
Habitat in umbroſis, ad montium radices, *ſesquipollicaris, ſine maculis aut cingulo, tentaculis majoribus ſupra nigris.*

cinereus. 4. L. cinereus maculatus et immaculatus. *Müll. hiſt. verm.* II. *p.* 5. *n.* 202.
Liſter exerc. anat. t. 3. *f.* 6. 7. 9. 10. Limax maximus cinereus ſtriatus.
α) Limax immaculatus, clypeo nigro-caeruleo.
β) Limax clypeo maculis, abdomine faſciis longitudinalibus nigris.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1081. *n.* 4. *Fn. ſuec.* 2090. *It. oel.* 61. Limax (maximus) cinereus maculatus.
Liſter anim. angl. p. 127. *t.* 2. *f.* 15. Limax cinereus maximus ſtriatus et maculatus.
Swammerd. bibl. nat. t. 8. *f.* 7. Cochlea nuda domeſtica.
Sibb. prodr. hiſt. nat. Scot. 2. l. 3. *p.* 33.
Schirach von Erdſchneck. t. 2. *f.* 10.
Berl. Magaz. 3. *p.* 336. *t.* 9. *f.* 69.
γ) Limax clypeo abdomineque maculis nigris.
Liſt. ſynopſ. f. 104. *tab. anat.* 5. *f.* 6-10. Limax variegatus ſive faſciatus cellarius.

Argenv.

Limaces *voraces, hortis, agris, pratis infeſti, a cornicibus, anatibus, aliisque volucribus et mammalibus ſaepius devorati, cineribus, fuligine arcendi pellendi, crebrae experimentorum redintegrationem vermium teſtantium victimae, gelatina ſua viſcida glutinant, nutriunt, involvunt, hinc nuperius a medicis commendati, diſcutiente etiam vicelebrati; an diſtincti a reliquis faſciatus et luteus a* Com. Raſumowsky *hiſtor. natur. Jorat.* 1. *p.* 267, *et* 269. *memorati?*

Argenv. conchyl. t. 28. *f.* 31. Limax cellaria.

δ) Limax abdomine ſtriis quinque albidis: infima abrupta.

ε) Limax abdomine rugis albis cinereisque ac maculis nigris ordine duplici.

ζ) Limax margine albo.

Habitat α) *vulgaris* β) *rarior in* nemoroſis, *reliquae rariores* γ) *in* hortis, ε) *in* ſilvis, δ) *et* ζ) *in* umbroſis, *ultra* 5 *pollices longus*, ζ) *minor.*

hyalinus. 5. L. hyalinus, tentaculis obſoletis: lineola fuſca a tentaculis ad clypeum.

Habitat in muſcis, *phaſeoli cotyledonibus infeſtus, cineribus clavellatis pellendus, rugis ventris creberrimis interruptis.* Scopoli.

agreſtis. 6. L. albidus, tentaculis nigris. *Müll. hiſt. verm.* II. *p.* 8. *n.* 204.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1082. *n.* 6. Limax cinereus immaculatus.

Liſt. anim. angl. p. 130. *t.* 2. *f.* 16. Limax cinereus parvus immaculatus pratenſis.

Liſt. ſynopſ. f. 101. *tab. anat.* 5. *f.* 11. *exerc. anat. t.* 3. *f.* 11. Limax parvus cinereus.

Argenv. conchyl. t. 28. *f.* 27.

Berl. Magaz. 36. *p.* 345. *t.* 8. *f.* 74.

Schirach von Erdſchn. t. 1.

Blanka inſ. 151. *t.* 13. *f.* X.

α) Limax totus albidus immaculatus.

β) Limax albidus clypeo flaveſcente.

γ) Limax albidus, capite nigro.

δ) Limax albidus, dorſo cinereo.

ε) Limax albidus, atomis nigris ſparſis.

Habitat in hortis, pratis, agris nemoribus*que a* Majo *ad* Decembrem *usque*, 2-9 *lineas longis, auctumno ſecale recens ſatum depaſcens, in hortis ſaepius nocte helianthum annuum adſcendens, ejusque folia conſumens, tactus digito quaſi mortuus viſcoſitate ſua adhaerens, occidente ſole reviviſcens, victumque quaerendo vagans, ſi digito rurſus tangatur, tentacula quidem condens, mox vero exſertis pergens, clypei et abdominis linea longitudinali nulla, tentaculis minoribus minimis, medicato uſu celebris.*

cinctus. 9. L. flaveſcens, clypeo abdomineque cingulo cinereo. *Müll. hiſt. verm.* II. *p.* 9. *n.* 205.

Habitat haud frequens in nemoroſis, *immaculatus*, *ſubtus albus*, 2 *pollices longus.*

marginatus. 10. L. cinereus, clypeo utrinque ſtriga obſcura, abdomine pallide caeruleſcente. *Müll. hiſt. verm.* II. *p.* 10. *n.* 206.

Habitat in fago, *primo vere et Novembri vulgaris*, *colore cum aetate non mutato*, *dorſi carina alba*, *utrinque ex cinereo ſubcaeruleſcente*, *abdomine interdum nigro-maculato.*

reticulata. 11. L. fuſcus, clypeo punctis, abdomine lineolis nigris. *Müll. hiſt. verm.* II. *p.* 10. *n.* 207.

Schaeff. Verſ. mit Schneck. 1. *t.* 1. *et t.* 2. *f.* 1-3.

Habitat vulgaris in Daniae *et* Germaniae hortis, *ſeſquipollicaris.*

flavus. 7. L. flavus maculatus. *Fn. ſuec.* 2092.

Liſt. exerc. anat. 1. *t.* 1. Limax ſuccini colore, albidis maculis inſignitus.

Habitat inter herbas; *an propria ſpecies?*

aureus. 12. L. flavus immaculatus. *Müll. hiſt. verm.* II. *p.* 10. *n.* 208.

Habitat in Daniae *et* Norwegiae umbroſis, *ſeſquipollicaris*, *ſubtus albus*, *linea inter tentacula intermedia tentaculisque ipſis nigris.*

fuſcus. 13. L. rufeſcens, linea laterali dorſoque nigricante. *Müll. hiſt. verm.* II. *p.* 11. *n.* 209.

Habitat in nemoroſis, *ſubtus albus*, *abdominis macula longitudinali fuſca*, 8 *lineas longus.*

tenellus. 14. L. vireſcens, capite tentaculisque nigris. *Müll. hiſt. verm.* II. *p.* 11. *n.* 210.

Habitat primo vere in nemorum foſſulis *foliis aridis repletis*, 10 *lineas longus*, *clypeo albido in luteum vergente.*

lanceolaris. 15. L. lineari lanceolatus utrinque acutiſſimus, margine undique limbo membranaceo aucto, tentaculis nullis. *Pall. ſpic. zool.* 10. *p.* 19. *t.* 1. *f.* 11.

Habitat in mari Cornubiam *alluente*, *margine ſubtus bilabiato et ſulcato*, *laterum ſtriis obſoletis antrorſum obliquatis*, *prope dorſum angulo recurvatis: vix hujus generis*, *ſed cujus?*

283. APLYSIA. *Corpus* repens, obvelatum membranis reflexis: *Clypeo* dorſali membranaceo pulmones obtegente.
Foramen laterale dextrum pro genitalibus.
Anus ſupra extremitatem dorſi.
Tentacula quatuor anterius ſita.

depilans. 1. Apl. tentaculorum membranarumque margine cum diſco concolore.
Syſt. nat. X. *p.* 653. Tethys limacina.
Rondel. piſc. 1. *p.* 520. Lepus marinus.
Geſn. aquat. 475. Lepus marinus Rondeletii.
Bohadſch. marin. 3. *t.* 1. 2. 3. Lernea (graphice.)
Seb. muſ. 3. *t.* 1. *f.* 8. 9.
Habitat in Mari mediterraneo, *ſanie depilans tactu* (B. 51.) *foetidiſſima ad nauſeam usque.*

faſciata. 2. Apl. nigra unicolor, membranis tentaculisque margine coccineis. *Poiret voy. en* Barbarie. 2. *p.* 2.
Habitat ad Barbariae *littora, ſub rupibus degens, contacta laticem nigrum rubrumque, nequaquam tamen foetidum aut depilantem eructans.*

284. DORIS. *Corpus* repens, oblongum, ſubtus planum.
Os anterius ſubtus.
Anus poſterius in dorſo, ſupra cinctus ciliis.
Tentacula duo ad quatuor, ſupra corpus antrorſum intra foramina retractilia.

* *corpore retrorſum acuminato, ſupra convexo nudo,* Limaciae Mülleri.

verrucoſa. 1. D. corpore ſupra undique tuberculato.
Rumpf muſ. 38. Limax marina verrucoſa.

 Seb.

Seb. muſ. 2. *t.* 61. *f.* 5. Mitella verrucoſa.
Habitat in oceano indico, *ſemicylindrica, fine anteriori rotundato, tentaculis breviſſimis, margine laterali deflexo, pede ovali, oblongo, margine plano.*

clavigera. 5. D. ovalis candida, pedicellis dorſi clavatis croceis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2770. *zool. dan.* 1. *p.* 58. *n.* 22. *t.* 17. *f.* 1-3. *Act.* Nat. *Curioſ.* 6. *p.* 118.
Bommé act. Vliſſ. 3. *p.* 296. *n.* 4. *f.* 3? geknootide Zee-Slakje met *vie.* Hoornen.
Habitat in fucis maris Norwegici, *gelatinoſa, ſubpellucida, cauda acuta: macula flava; capitis verruca laterali flava, truncata, tentaculis* 2 *croceis.*

quadrilineata. 6. D. alba, lineis quatuor nigris, auriculis ſulphureis. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 59. *n.* 23. *t.* 17. *f.* 4-6. *prodr.* 2771. *Act. nat. Cur.* 6. *p.* 50.
Habitat in ſinuum maris Norwegici *fucis, congeneribus agilior, ſulphureis maculis varia, tentaculis* 2 *albis, brevibus diſtantibus.*

faſciculata. 7. D. linearis ex cinereo ferruginea, papillis dorſi acutiuſculis ſubferrugineis.
Forſk. Fn. arab. p. 99. *n.* 3. *anim. t.* 26. *f.* 5. Limax marinus.
Habitat in mari mediterraneo, *fruſtulis ligneis natantibus adhaerens, pollicem longus, ſubtus pallidus, tentaculis* 4 *pallidis, pellucidis.*

papilloſa. 8. D. ſupra papillis tecta: linea dorſali laevi.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1082. *n.* 8. *Fn. ſuec.* 2093.* Limax papilloſus.
Baſter op. ſubſ. 1. *p.* 81. *t.* 10. *f.* 1. Doris ſpinis mollibus hirſuta.
Forsk. anim. mar. t. 26. *f.* H? Limax marinus.
Act. havnienſ. 10. *f.* 11-16. Doris bodoenſis.
Act. Vliſſing. 3. *p.* 318. *f.* 2.
Habitat in Oceano europaeo.

auriculata. 9. D. alba, faſciculis dorſalibus rubris apice albis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2778.
Act. havn. 10. *p.* 16. *t.* 5. *f.* 6.
Habitat in mari Norwegico.

10. D.

Dorides, *in mari habitantes ſtructurae quoque majori elegantia a limacibus in terra degentibus diſtant, plures jam, ſed imperfectius juſto ab* Aldrovando *deſcriptae, prima ab* Aeliano.

laciniulata. 10. D. albida, papillis dorſi obovatis utrinque ſex.
Forsk. Fn. arab. p. 99. *n.* 4. *anim. t.* 26. *f.* 4. Limax tergipes.
Habitat in fundo maris ad fretum Oereſund *inter* fucos, *magnitudine pediculi majoris, forma variabili, plurium vermium more ſupinus reptans.*

minima. 11. D. pallide cinerea, papillarum dorſalium ſeriebus quatuor.
Forsk. Fn. arab. p. 100. *n.* 5.
Habitat in mari mediterraneo, *fucis natantibus incumbens, ſeminis oryzae magnitudine, ſubtus pallidior, oblongo-arctata, tentaculis* 4, *juxta caput albis, papillis plurimis ex ovato oblongis, obtuſis, cineraſcentibus.*

cervina. 12. D. ex rubeſcente cinerea, papillis dorſi octonis ramoſis.
Bommé act. Vliſſ. 3. *p.* 290. *n.* 2. *f.* 1. Haarts hoorn gèlyk-getakte Zee-ſlakje.
Habitat in ſertularia abietina, ⅓ *pollicis longa, capite etiam caudaque papillis ramoſis ornata, clavigerae affinis.*

radiata. 13. D. ex argenteo caerulea, ſubtus alba, papillis lateralibus quaternis radiato-dentatis. *du Pont act. angl.* 53. *p.* 57. 58. *t.* 3.
Habitat in Oceano, *ultra pollicem longa, faſciculatae affinis, tentaculis* 4, *linea dorſi media argentea, lateralibus* 2 *apice profunde caeruleis.*

coronata. 14. D. lactea, ſubtus hyalina, papillis dorſi rubro punctati pyramidalibus utrinque ſex apice rubris.
Bommé act. Vliſſ. 1. *p.* 394. *t.* 3. *f.* 1-3. *et* 3. *p.* 288. Geknifde of gekroonde Zeeſlakje.
Habitat ad littus inſulae Walcheren Seelandiae, ⅜-⅝ *pollicis longa.*

pennata. 15. D. dorſo papillis retrorſum incumbentibus ſubcylindricis tecto.
Bommé act. Vliſſ. 3. *p.* 292. *t.* 3. *f.* 2. Gevederde of zacht gedoornte Zeeſlakje.
Habitat ad Seelandiae *littus in zoophytis, quorum quoque colorem nunc ex cinereo album, nunc rubeſcentem refert,* ⅜-¾ *pollicis longa, fertiliſſima, tentaculis* 4.

peregrina. 16. D. tentaculis quatuor non retractilibus, corpore lacteo, cirrorum ex fuſco caeruleorum in dorſo ſeriebus decem.
Cavolin. polip. mar. 3. *p.* 190. *t.* 7. *f.* 3.
Habitat in mari mediterraneo, *ad* promontorium Miſenenſe.

affinis. 17. D. purpurea, dorſo cirrorum ſeriebus ſeptem, tentaculis quatuor non retractilibus annulatis apice albis. *Cavol. polip. mar.* 3. *p.* 193. *t.* 7. *f.* 4.

Habitat in mari mediterraneo, *circa promontorium* Miſenenſe.

tetraquetra. 18. D. quadrangularis coriacea, poſterius acuminata ſupra plana: angulis carunculato-hiulcis. *Pallas nov. act. Petrop.* 2. *p.* 237. *t.* 5. *f.* 22.

Habitat in mari Kurilas *inſulas alluente, a quarum incolis conda coctaque comeditur, media inter utrumque tribum.*

** *corpore utrinque obtuſo, plano, tecto.*

fuſca. 2. D. ovalis, lamella ſcabra punctata. *Müll. zool. dan.* 2. *p.* 22. *t.* 47. *f.* 6-8. *prodr.* 2768. *rar.* 2. *p.* 22.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1083. *n.* 2. Doris (bilamellata) corpore ſupra lamella plana ſcabra.

Fn. ſuec. 2094. Limax bilamellatus.

Habitat in mari Norwegico, *limacis more incedens, glaber, ſupra pallide fuſcus cinereo punctatus, ſubtus albus, lamella tegente ſupra ſulphureo punctata, ſubtus alba, glabra, tentaculis 2 fuſcis, ano transverſo plumis 6 ſulphureis cincto.*

obvelata. 19. D. alba, corpore elongato: lamella repanda ſupra punctata. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 47. *f.* 1. 2. *prodr.* 2768. *rar.* 2. *p.* 19.

Planc. conch. min. not. p. 105. *t.* 5. *f.* G. H. Concha ſine teſta.

Habitat in fundo ſinus Droebacenſis Norwegiae, *limacis inſtar incedens, ſubpellucida, ſubtus glabra, lamina ſupra punctis convexis aſpera, tentaculis 2 ſimplicibus.*

muricata. 20. D. ovalis ſupra undique verrucis luteis. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 7. *t.* 85. *f.* 2-4. *prodr.* 2773.

Habitat in mari Norwegico.

piloſa. 21. D. corpore ovato luteo pilis mollibus albis tecto, tentaculis occultis. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 7. *t.* 85. *f.* 5-8.

laevis. 22. D. ovalis alba, corpore ſupra planiuſculo laevi. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 47. *f.* 3-5. *prodr.* 2774. *rar.* 2. *p.* 21.

Habitat in mari Norwegico atlantico, *carnoſa, glabra, ano plumis* 8 *cincto.* Koenig.

arboreſcens. 23. D. tentaculis ramoſis, dorſo gibbo fruticante. *Müll. zool. dan. prodr.* 2776. *Act. havn.* 10. *p.* 14. *t.* 5. *f.* 5.
Habitat in mari Norwegico.

frondoſa. 24. D. corpore utrinque cirrhis plurimis ramoſis.
Aſcan. act. Dronth. 5. *p.* 155. *t.* 5. *f.* 2. Amphitrite frondoſa.
Habitat in mari Norwegico, *tentaculis* 2.

Argo. 4. D. ovalis, corpore laevi, tentaculis duobus ad os, ano ciliato phrygio.
Bohadſch mar. 65. *t.* 5. *f.* 4. 5. Argo.
Columm. ecphr. *t.* 32. Lepus marinus alter major.
Dicquemere, journ. de phyſ. 1779. *jul. p.* 56. *t.* 2. *f.* 16. Limace à plante.
Habitat in mari mediterraneo, *coccinea, ano cincto ramis, quaſi opere phrygio laceris.*

ſtellata. 25. D. ovalis, ſtella ad anum octoradiata: radiis ramoſis.
Bommé act. Vliſſing 3. *p.* 298. *n.* 5. *f.* 4. Eegeltje met eene ſter op de ſtuit.
Habitat ad littora Seelandiae *in alcyoniis, ex albo cinerea, ſubtus plana, ſupra tuberculis obtuſis aſpera, tentaculis* 2.

285. APHRODITA. *Corpus* repens oblongum, ſquamis tectum: pedibus utrinque ſetoſis.

Os terminale, cylindricum.

Tentacula duo ſetacea annulata.

Oculi quatuor.

aculeata. 1. Aphr. ovalis hirſuta aculeata. *Fn. ſuec.* 2099. *Gunner. act. Nidroſ.* 3. *p.* 59. *Pall. miſc. zool. p.* 77. *t.* 7. *f.* 1-13. *Baſter opuſc. ſubſ.* 2. *p.* 62. *t.* 6. *f.* 12.
Muſ. Ad. Frid. 1. *p.* 93. Aphrodita nitens.
Jacob apud Barthol. act. Hafn. 3. *p.* 88. *t.* 88. Vermis aureus.
Barrel. ic. plant. rar. p. 131. *t.* 1284. Eruca marina.
Swammerd. bibl. nat. t. 10. *f.* 8. Phyſalus.
Red. opuſc. 3. *p.* 276. *t.* 25. Hyſtrix marina.
Molyn. act. angl. vol. 19. *n.* 225. *p.* 405.

Ruyſch theatr. an. 1. p. 23. n. 49.
Dale hiſt. of Harwich and Doverc. p. 394.
Seb. muſ. 1. *t.* 53. *f.* 3. *et t.* 90. *f.* 1. 2. *et* 3. *t.* 3. *f.* 7. 8.
Columu. ecphr. 25. *t.* 26.
Habitat in Oceano europaeo, *4-7 pollices longa, teſtaceis victitans, craſſa utrinque 40-41 pedunculis ornata, et ſupra pedunculos faſciculo villorum aureo, cupreo et viridi-caeruleo colore ſplendentium.*

ſcabra. 2. Aphr. oblonga, dorſo ſquamato ſcabro.
Habitat in mari belgico, *oniſco paulo longior, ſquamis 20 alternis, ſcabris obtecta, pedibus utrinque circiter* 20; *an vere diſtincta ſpecies?*

ſquamata. 3. Aphr. oblonga ſquamis aſperis unicoloribus nigro punctatis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1084. *n.* 3. Aphrodita oblonga, dorſo ſquamato: ſquamis XXIV.
Müll. von Würmern &c. p. 170. *t.* 13. *zool. dan.* 3. *p.* 25. *t.* 96. *f.* 1-4. *prodr. n.* 2642. Gedüpfelte Aphrodite.
Pallas miſc. zool. p. 91. *t.* 7. *f.* 14. a-d.
Baſt op. ſubſ. 2. *l.* 3. *t.* 6. *f.* 5.
Habitat in Oceano europaeo, mari glaciali *et ad* promontorium bonae ſpei, *inter fucos et ſertularias libera vagans, et per maris fundum circumrepens,* 11 *lineas ad pollicem usque longa, ventre medioque dorſo laevi et nudo, reliquo dorſo ſquamis piſcinarum aemulis rigidis ſemipellucidis ochroleucis tecto.*

imbricata. 4. Aphr. oblonga, ſquamis glabris variegatis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1084. *n.* 4. Aphrodita oblonga, dorſo ſquamato: ſquamis XXXVI.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *an propria ſpecies diverſa a ſequenti?* Koenig.

plana. 5. Aphr. oblonga, ſquamis laevibus bicoloribus. *Müll. von Würmern. p.* 180. *t.* 14. *f.* 1-5.
Müll. prodr. zool. dan. 2644. Aphrodita (cirrata) poſtice acuminata, pedibus cirratis.
Habitat in mari boreali, *praeſertim* Islandiam *alluente,* 8-20 *lineas longa, utrinque plana, caudam verſus anguſtata, ſegmentis* 36, *totidem utrinque pedibus, totidemque caudam*

Aphroditae *per mare vagantur, ſexu diſtincto, ſiccae facile cum crepitu in fruſta diſſiliunt.*

dam verſus decreſcentibus in 2 ſeries digeſtis ſquamis dorſum contegentibus inſtructa, proboſcide magna craſſa.

lepidota. 6. Aphr. oblonga, faſcia dorſi longitudinali ſanguinea. *Pall. miſc. zool. p.* 94. *t.* 7. *f.* 15. a. b. *t.* 8. *f.* 1. 2.
Baſt. opuſc. ſubſ. 1. *l.* 1. *t.* 4. *f.* 3. A-C.
Habitat ſatis copioſa in mari *inter* Angliam *et* Belgium *intermedio, pedunculis* 16, *ſquamis ſubtiliſſime punctatis imbricatis* 14 *parium, an ſatis diſtincta a plana?*

cirrhoſa. 7. Aphr. lineari-attenuata, pedunculis compreſſis apice bipartitis, ſquamis veſiculoſis. *Pall. miſc. zool. p.* 95. *t.* 8. *f.* 3-6.
Habitat in mari ſeptentrionali, *tenerrima, ſquamis ſubrotundis* 11 *parium, pedunculis utrinque* 35 *productioribus; an ſatis diſtincta ſpecies?*

violacea. 8. Aphr. oblonga violacea, ſquamis dorſalibus utrinque quindecim. *Müll. prodr. zool. dan.* 2645. *Act. Nidroſ.* 4. 93.
Habitat - - -

longa. 9. Aphr. ſquamis concoloribus, medio dorſi nudo, pedibus papilla ſimplici ſetigera, cirris lateralibus nullis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2646.
Habitat in mari Groenlandiam *alluente, inter ſquamatam et lepidotam media.*

SPIO. *Corpus* protenſum in tubulo, articulatum: filis dorſalibus.
Pedunculi ſetis hiſpidi dorſum verſus poſiti.
Tentacula 2 longa ſimplicia.
Oculi 2 oblongi.

ſeticornis. 1. Sp. tentaculis tenuibus ſtriatis. *O. Fabric. Schr. der berl. naturf. Geſ.* 6. *p.* 259. *n.* 1. *t.* 5. *f.* 1-7.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1085. *n.* 4. Nereis (ſeticornis) tentaculis capitis binis longitudine fere corporis.
O. *Fabric. Fn. groenl. ſp.* 288. Nereis ſeticornis.
Baſter op. ſubſ. 2. *p.* 134. *t.* 12. *f.* 2.
Habitat gregaria in Oceano, *potiſſimum ſinus* Groenlandiae *fundo argillaceo, rarius arenoſo, ad* 3 *pollices longa, tubulo e particulis terreis formato tenui erecto triplo longiore, e quibus animalcula piſcatura exſerit tentacula capillaria,*

pillaria, alba, ceterum ex albido viridis: linea dorſi media ſanguinea, poſterius thalaſſina, anterius ex nigro cinerea: ſtriis transverſis albis, capite pallido.

filicornis. 2. Sp. tentaculis craſſis annulatis. *O. Fabr. Schr. der berl. naturf. Geſ. 6. p. 264. n. 2. t. 5. f. 8-12.*

Habitat gregaria in ſinu Groenlandiae, *oblonga, pollicem longa, flavicans aut rubicunda, linea media et utroque fine cinereis, tubulo fragili, erecto, vireſcente, quem non niſi invita relinquit, tentaculis exſertis et circumvolutis planarias piſcans.*

AMPHITRITE.

Corpus protenſum in tubulo, annulatum.

Pedunculi verrucoſi.

Tentacula acuminata approximata, plumoſa.

Oculi nulli.

reniformis. 1. A. corpore rotundato, palpis ſimplicibus. *Müll. von Würm. p.* 194. *t.* 16. *f.* 1-3.

Müll. zool. dan. 3. *p.* 13. *t.* 89. *f.* 1. 2. *prodr.* 3063. Tubularius unicillus.

Habitat gregaria in fundo maris Islandiam *alluentis, pulcerrima, rubra,* 3 *pollices longa, capite arcubus duobus ſemicircularibus munito, plumis* 14 *colore rubro alboque alternante amoeniſſimis ornatis, corporis annulis* 80-90, *utrinque tuberculis minimis appoſitis, cauda acuta non articulata, tubulo, quem vix relinquit, rubro, tenaci, coriaceo, ſimplici,* 4 *pollices longo; an ad tubulariam referenda?*

Penicillus. 2. A. ſcuto aculeato, proboſcide clavata. *Müll. von Würm. p.* 8. *n.* 3.

Columm. aquat. et terr. c. 11. *p.* 22. Προβοσκιπλεκτανος.

Habitat in ſyrtibus maris Neapolin *alluentis ultra* 2 *pollices longa linea media nigra, per totam corporis longitudinem excurrente, faſciculo plumarum numeroſiſſimarum tentacula exornante rubro flavo maculato, proboſcide huic aequali; pedunculo albo tubuloſo, clava rubra ſtriata, tubulo albo, laevi firmo, interdum inflexo.*

Ventilabrum. 3. A. corpore verrucoſo, proboſcide nulla. *Müller von Würmern. p. 8. n. 4.*
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1269. *n.* 814. Sabella (Penicillus) teſta membranacea erecta radicata.
Ellis corall. 92. *t.* 34. Corallina tubularia melitenſis.
O. *Fabr. Fn. groenl. p.* 438. *n.* 449. Tubularia Penicillus.
β) *Baſter opuſc. ſubſec.* 2. *p.* 178 *t.* 9. *f.* 1.
Habitat in mari mediterraneo, *faſciculo plumarum tentacula exornante in 2 brachia diviſo.*

auricoma. 4. A. cirris binis utrinque, anterius flabellis duobus aureis rigidis. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 87. *t.* 26. *f.* 1-6. *prodr.* 2622. *rar.* 1. *p.* 54. O. *Fabr. Fn. groenl.* 272.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1268. *n.* 809. Sabella (granulata) teſta ſolitaria libera ſimplici curvata granis arenaceis fulcis.
Pall. miſcell. zool. p. 117. *t.* 9. *f.* 1-13. Nereis cylindraria.
Martin. Conchyl. p. 18. *et p.* 69-72. *t.* 4. *f.* 26. 27. Tubulus vermicularis.
Klein tubul. mar. p. 21. *t.* 1. *f.* 5. *et echinod. p.* 62. *t.* 33. *f.* A. B. Solen fragilis.
Brit. zool. 4. *p.* 130. *t.* 92. *f.* 163. Sabella tubiformis.
Dicquemar. journ. de phyſiq. 1779. *Jul. p.* 54. *t.* 2. *f.* 1-12. Ver à foureau conique.
Martin. Conchyl. 1. *t.* 4. *f.* 26.
Habitat in mari ſeptentrionali, glaciali atlantico, indico, *tubulo fuſco, diaphano, fragili: altero fine cuneato anguſto, intus laevigato, capite ramoſo albo: anterius uncis* 16 *albis armato, trunco inverſe conico, chalybeo, laeviſſimo, ad marginem utrinque faſciculis ſetarum ternarum quaternarumve aurearum* 14, *cauda ex lamellis tribus ovalibus minutis duris conflata.*

criſtata. 5. A. corniculis ramoſis binis. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 70. *f.* 1-4. *prodr.* 2620. *rar.* 2. *p.* 87.
Habitat in oſtreis vetuſtis ſinuum maris Norwegici, *elongata, teres, flexuoſa, ex rubro flava, poſterius acuminata, ſegmentis* 17, *anterioribus utrinque verruca ſetaque inſtructis, capitis cirris pluribus, corpore ſextuplo brevioribus, tubulo fragili flexuoſo, e limo teſtarumque rejectamentis compoſito.*

chryſocephala. 6. A. capitis diſcreti vertice paleolis aureis confertis bifariam coronato.
Pall. nov. act. Petrop. 2. *p.* 235. *t.* 5. *f.* 20.* Nereis chryſocephala.

Habitat

Habitat in indici maris *fundo, ſabellae alveolatae affinis, mollis attenuata, ſupra planiuſcula, 4 circiter pollices longa, pedunculis criſtam aemulantibus, penicilligeris, cirrigeris, mucrone carneo et 2-4 tum retrorſum brachiolo terminatis, tentaculis numeroſis.*

plumoſa. 7. A. tentaculis binis articulatis ſub faſciculis ſetarum porrectarum, corpore tereti caput verſus incraſſato clavato hiſpidulo. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 16. *t.* 90. *f.* 1. 2. *prodr. n.* 2621.

Habitat in maris Norwegici *argilla inter mytilos edules.*

291. TEREBELLA. *Corpus* oblongum repens nudum, branchiis ad latera inſtructum, ſaepius in tubulo.

Os anterius labiatum edentulum, proboſcidem clavatam exſerens.

Tentacula circum os capillaria plura, ciliata.

cirrata. 1. T. corpore tereti, penicillis corporis lateralibus triplicibus. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1085. *n.* 3. Nereis (cirrola) tentaculis oris longiſſimis, capite utrinque cirris X.

Müller von Würmern p. 188. *t.* 15. *f.* 1. 2. *prodr. zool. dan.* 2617. Amphitrite cirrata.

Dicquemare Journ. de phyſ. 1777. *Mars. p.* 215. *t.* 1. *f.* 10. 11. Ver-meduſa.

Habitat in maris Islandiam alluentis, *fundo arenoſo*, *a* Koenigio *detecta, et* Spio *cirrata nuncupata, rubra*, 3-4 *pollices longa, ſenſim retrorſum attenuata, annulis conſtata* 60-70 *retrorſum decreſcentibus, labio ſuperiori cirris protenſis, dorſi ſuperioris lateribus breviorum ſerie ornatis, tubulo craſſo, fragili, incolae longitudine, laeſa rubrum ſuccum fundens, quo aquam tingit et opacat.*

lapidaria. 2. T. cirris ad anteriora corporis octo, circa os quatuor. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1092. *n.* 1. Terebella.
Kaehl. act. Stockh. 1754. *p.* 144. *t.* 3. *f.* A-E.

Habitat

Habitat in mari mediterraneo, *intra rupium foramina, quae jam excavata deprehendit.*

conchilega. 3. T. albida, cirris oris numeroſis filiformibus: ſuperioribus longiſſimis, branchiis ruberrimis.

Pall. miſc. zool. p. 131. *t.* 8. *f.* 17-22. Nereis conchilega.

Habitat in mari Belgium *affluente copioſa, ad quinque pollices longa, lumbrici aemula, taenia ſubtus rubra, capite ſubtus ſquamis* 4 *munito, tubulos e teſtaceorum fragmentis calami anſerini craſſitie et ad* $\frac{1}{2}$ *pedem longos ſtruens.*

complanata. 4. T. depreſſa, cirris oris quatuor, corporis verrucis lateralibus penicilligeris duplici utrinque ſerie digeſtis.

Pall. miſc. zool. p. 109. *t.* 8. *f.* 19-26. Aphrodita complanata.

Brown jam. p. 395. *t.* 39. *f.* 1. Nereis tentaculis capitis binis tripartitis, corporis pluribus penicilliformibus duplici ſerie ad latera poſitis.

Habitat in mari inſulis caribaeis *circumfuſo, corporis ſegmentis* 130 *minutis, dorſi criſtula carnoſa, obtuſa, longitudinaliter adnata.*

carunculata. 5. T. depreſſo-quadrangula, penicillorum corporis ſerie quadruplici ventralium cirris nullis.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1086. *n.* 10. Nereis (gigantea) tentaculorum faſciculis triplici ordine.

Pall. miſc. zool. p. 102. *t.* 8. *f.* 12. 13. Aphrodita carunculata.

Seba muſ. 2. *p.* 31. *t.* 81. *f.* 7. Millepeda marina amboinenſis.

Habitat in mari americano *et* indico, *tenera*, 9-14 *pollices longa, penicillis lateralibus flaveſcentibus papillae transverſae inſidentibus, ventralium cirris nullis, pone cirros dorſi caruncula ovali depreſſa, branchiis ramoſiſſimis, ſegmentis corporis ultra* 90.

roſtrata. 6. T. tetraëdra, penicillorum corporis ſerie quadruplici, palato quaſi elongato.

Pall. miſc. zool. p. 106. *t.* 8. *f.* 14-18. Aphrodita roſtrata.

Habitat in mari indico, *carunculatae affinis, at cute rudiori, penicillis magis prominentibus, omnibus cirro inſtructis, branchiis inſignibus diſtincta,* 8 *pollices ad pedem longa, penicillorum ſetis rigidis, ventralium ex fuſco aureolis, dorſalium ex ferrugineo fuſceſcentibus.*

7. T.

flava. 7. T. depreſſa, branchiis utrinque 37, cauda biſurca. *Pall. miſc. zool. p.* 97. *t.* 8. *f.* 7 11. Aphrodita flava.

Habitat in mari indico, $2\frac{1}{2}$ - $4\frac{1}{2}$ *pollices longa, ſegmentis corporis* 33 - 40, *penicillorum cirratorum pilis tenuiſſimis flavicantibus, dorſi criſtula ex triquetro compreſſa, cirris duobus anterius ornata.*

rubra. 8. T. rubra, depreſſa, cauda cirris duobus terminata, capite maxillis duabus corneis mobilibus.

Bommé act. Vliſſing. 6. *p.* 379. *f* 4. A. B. Rood-glinſterende Nereide of Zee-duezend-been.

Habitat in mari, Seelandiae *inſulis circumfuſo, branchiis oculorumque defectu ad hoc genus accedens,* 3 *circiter pollices longa, ſtria dorſali nigra, capite albo cylindrico, quaſſata ſaniem mucoſam albidam fundens, nitens, corporis ſegmentis* 144.

aphroditois. 9. T. teres retrorſum lente attenuata, ſubtus depreſſiuſcula ſulco obſoleto exarata: branchiis in ſegmentis octo prioribus nullis, in ſequentibus tribus ſimplicibus, in poſtremis ſenſim majoribus uno verſu pinnatis.

Pall. nov. act. Petrop. 2. *p.* 229. *t.* 5. *f.* 1-7. Nereis aphroditois.

Habitat in Oceano indico, *ſesquipedalis ſegmentis* 148 *et ultra, pedunculis carnoſis cirro inſtructis, papilla penicilligera, capite bicirrato.*

bicornis. 10. T. proboſcidis diſco ſimplici terminali bicorni. *Abildg. Schr. berl. Naturf.* 9. *p.* 138. *t.* 3. *f.* 4.

Seb. muſ. 3. *t.* 16. *f.* 17.

Habitat in Oceano americano.

ſtellata. 11. T. proboſcidis diſco triplici perfoliato, anteriore armato cornu truncato aculeis radiato. *Abildg. Schr. berl. Naturf.* 9. *p.* 138. *t.* 3. *f.* 5.

Habitat in Oceano americano.

286.

An hujus generis vermis a M. Slabbero, *act. Vliſſingenſ.* 1. *p.* 387. ſqq. *deſcriptus, et t.* 2. *delineatus indicus?*

286. NEREIS. *Corpus* repens longum.
Pedunculi laterales penicillati.
Tentacula ſimplicia, rarius o.
Oculi quatuor aut duo, rarius o.

* *ore unguiculato* ſ. forcipato.

verſicolor. 2. N. ſubdepreſſa, pedunculis acuminatis ſetiferis. *Müll. von Würm. p.* 104. *t.* 6. *f.* 1-6. *zool. dan. prodr.* 2624.
Syſt. nat. XII. 2 *p.* 1064. *n.* 11. *It. wgoth.* 191. *Stroem. ſondm.* 1. *p.* 160. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 534. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 341. *n.* 13. Scolopendra (marina) pedibus utrinque, corpore pallido, linea dorſali rubra.
Habitat in mari ſeptentrionali, *male pro cauſſa mali haleces infeſtantis habita, corporis articulis* 85, *poſterioribus ſenſim minoribus, ochroleuca, ſtria media obſcure rubra, cauda ſegmentisque corporis anterioribus ſordide viridibus, medium verſus iridis coloribus ludentibus, tentaculis ſuperioribus brevibus ſubulatis* 3, *inferioribus pellucidis conicis* 2, *lateralibus corneis* 4, *ſanguine rubro.*

noctiluca. 1. N. corpore vix conſpicuo. *Fn. ſuec.* 2098. *Müll. zool. dan. prodr.* 2623. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 291. *n.* 273.
Amoen. acad. 3. *p.* 203. *t.* 3. Noctiluca marina.
Griſl. venet. quart. Scolopendra marina lucida.
Vianell. monogr. Luciolella aquae marinae.
Habitat in omni facile mari, *minutiſſima, agiliſſima, fulgore e caeruleo viridi micans, et aquas perfundens.*

fimbriata. 3. N. ſubdepreſſa, pedunculis cirratis lentigeris. *Müller von Würm. p.* 144. *t.* 8. *f.* 1-3. *prodr. zool. dan.* 2627.
Habitat in mari Balthico, *linearis,* 3 *pollices longa, fulva, dorſo medio ventrisque linea longitudinali media caeruleis, tentaculis capitis* 8, *cauda* 2 *filis terminata.*

armillaris. 4. N. ſubdepreſſa, pedunculis conicis: cirris lenticularibus. *Müll. von Würm. p.* 150. *t.* 9. *f* 1-5. *zool. dan. prodr.* 2626. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 294. *n.* 276.
Habitat in mari ſeptentrionali, *in ſabulo littorum profunde ſe condens, agiliſſima, filiformis,* 15 *lineas longa, tentaculis ad utrumque capitis latus* 3 *moniliformibus, corporis articulis* 120, *ſingulis utrinque pedunculo munitis, cauda filis* 2 *longis terminata.*

mollis. 5. N. faſciculis pilorum lateralibus ſupra pedunculos. *Fn. ſuec.* 2097.
Habitat in mari norwegico; *an hujus generis et tribus?*

delagica. 6. N. ſupra convexa, pedunculis cirratis verrucoſis. *Müller von Würm. p.* 140. *t.* 7. *f.* 1-3.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1086. *n.* 6. *Fn. ſuec.* 2096. Nereis ſegmentis XL., ſubtus ſulcata.
O. Fabr. Fn. groenl. p. 292. *n.* 275.
Müll. prodr. zool. dan. 2628. Nereis verrucoſa.
Act. Havn. 10. *p.* 169. *t.* e. *f.* 10. Nereis ferruginea.
Baſter op. ſubſ. 2. *p.* 133. *t.* 6. *f.* 6.
Habitat in Oceani europaei *fundo, inter radices ulvarum, ſub lapidibus et intra teſtas vacuas, motu flexuoſo ingrediens, et urceolis frontis fundum perfodiens, ſpadicea, tentaculis, cirris frontalibus, caudalibus lateralibusque et pedunculis albidis, maxillis ex fuſco nigricantibus, linea dorſi coccinea; ad 7 pollices longa, macula capitis inter oculos trigona alba, 2 aliis ad latera, ſetis ferrugineis, cauda binis cirris terminata.*

tubicola. 10. N. ſubdepreſſa, pedunculis ſubcirratis globoſis. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 60. *t.* 18. *f.* 1-6. *rar.* 1. *p.* 38. *prodr.* 2625.
Habitat in mari ſeptentrionali, *linearis, tentaculis capitis* 5 *rectis, tubulum tenacem ex proprio ſucco indurato ſtruens.*

norwegica. 11. N. convexa, pedunculis cirratis pennigeris.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1086. *n.* 11. Nereis glabra, ſegmentis CXV. annularibus, ore dentato dupliciter forcipato.
Müll. zool. dan. 1. *p.* 99. *t.* 29. *f.* 1-3. *rar.* 1. *p.* 60. *prodr.* 2630. Nereis pennata.
Gunner act. Nidroſ. 4. *p.* 51. *t.* 2. *f.* 7-12. Nereis madreporae pertuſae glabris ſegmentis CXX. annularibus, ore dentato et dupliciter forcipato.
Muſ. Kirch. cl. 13. *p.* 412. *f.* 8-10.
Habitat in maris norwegici *ſinubus, calami anſerini craſſitie, flavicans, linea dorſi obſcure rubra, capitis tentaculis* 5, *aequalibus, collo ſuperne utrinque cornuto, corporis articulis* 126, *cauda filis* 2 *ſubtilibus terminata, tentaculis triplo longioribus.*

pinnata. 12. N. convexa, pedibus cirratis pinnigeris. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 102. *t.* 29. *f.* 4-7. *rar.* 1. *p.* 62. *prodr.* 2629.

Habitat

Habitat in ſinuum maris norwegici *limo caeruleſcente, ſpadicea, nitoris chalybei, tentaculis capitis, 5 articulatis, ſegmentis corporis* 106 - 122, *cauda filis* 2 *craſſis breviſſimis terminata, norwegicae proxime affinis.*

corniculata. 13. N. ſubdepreſſa pinnata, pedunculis cirro ſetaque longa ſimplici. *Müll. zool. dan.* 2: *t.* 52. *f.* 1 - 4. *rar.* 2. *p.* 33.

Habitat in mari Norwegico, *minima, ſplendida, agilis, albida, utrinque inciſa, capitis tentaculis* 6, *oculis glomeratis ruberrimis, corporis ſegmentis* 28, *cauda cirris* 2 *longioribus terminata.*

puſilla. 14. N. depreſſa, pedunculis cirratis: filamentis articulatis. *Müll. zool. dan. prodr* 2631.

Habitat in mari norwegico.

inciſa. 15. N. convexa, ſegmentis diſtantibus, pedunculis ſimplicibus cirratis. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 295. *n.* 277.

Habitat rara in mari Groenlandiam *alluente procul a littore inter radices ulvarum maximarum,* $2\frac{1}{3}$ *pollices longa, elongata, ſubtus ex albido rubicunda, ſulco medio longitudinali exarata, ſupra pallida, ferruginea, medio ſubgriſea, capitis tentaculis* 4, *frontis cirris* 2, *maxillis flavis, corporis ſegmentis* 80.

aphroditoides. 16. N. depreſſa, non ſulcata, pedunculis cirratis papilligeris. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 296. *n.* 278.

Habitat haud frequens in maris Groenlandiam *alluentis fundo limoſo, admodum vivida, vix pollice longior, capite albo: maxillis oculisque nigris, tentaculis* 4, *frontis cirris* 2, *pellucida anterius ochroleuca, ceterum rubicunda, lineis abdominis* 2 *ferrugineis, rarius viridans, lineis abdominalibus, dorſi et transverſalibus rubris.*

** *ore proboſcideo.*

caerulea. 7. N. glabra caeruleſcens. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 198. *n.* 280. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1086. *n.* 7. *Amoen. acad.* 4. *p.* 254. *n.* 38. *Fn. ſuec.* 2095. Nereis glabra caeruleſcens ſegmentis CLXXXIV.

Muſ. Ad. Fr. 1. *p.* 93. Nereis tentaculorum 184 paribus.

Habitat in Oceano *ſplendida.*

viridis. 8. N. depreſſa, lamellis pedunculorum lanceolatis. *Müll. von Würm. p.* 162. *t.* 11. *f.* 1 - 6. *zool. dan. prodr.* 2636. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 297. *n.* 279.

Habitat in mari Islandiam *et* Groenlandiam *alluente, in foraminibus lavae a monte* Hecla *ejectae, 3 pollices longa, graminea (junior rubicunda, linea dorſi longitudinali viridi, capite, tentaculis cirris lamelliſque niveis) filiformis, capitis tentaculis utrinque 3, oculis 2 nigris, proboſcide clavata, quam laeſa protrudit, corporis ſegmentis 130 aequalibus, caudae cirris 2 brevibus.*

maculata. 9. N. convexa, lamellis pedunculorum ſubcordatis. *Müll. von Würm. p.* 156. *t.* 10. *f.* 1-6. *zool. dan. prodr.* 2635. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 298. *n.* 281.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1086. *n.* 9. Nereis viridis, dorſo nigropunctato, articulis CC.

Habitat ad Islándiae *et* Groenlandiae *littora*, 2½-4 *pollices longa, ſupra vireſcens: linea utrinque longitudinali obſcuriore, ſubtus caudaeque cirris brevibus pallidior unicolor, collo et parvo capite cum frontis cirris brevibus utrinque 2, et tentaculis 4 albis, pedunculorum ſetis et lamellis ex flavo viridibus, oculis tantum 2, proboſcide clavata longa, alba, rubro ſtriata.*

craſſa. 17. N. depreſſa, proboſcide cylindrica, pedunculis ſanguineis: ſetis ramoſis. *Müller von Würm. p.* 166. *t.* 12. *f.* 1-3.

Habitat in Oceani fuco natante, 4 *pollices longa, aequalis, capitis parvi tentaculis* 4 *cirris* 2 *frontalibus rubris brevioribus, oculis* 2 *nigris, proboſcide truncata emiſſili, caudae ſetis* 2 *rigidis inaequalibus.*

ſtellifera. 18. N. depreſſa, pedunculorum lamellis ellipticis. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 62. *f.* 1-3. *prodr.* 2632. *rar.* 2. *p.* 62.

Habitat in maris Norwegici *ſinubus, proboſcide ſquamiſque dorſi oblongis, nereides aphroditis jungens, at flexilis, filiformis, alba, ſubtus linea media longitudinali rubra, capitis tentaculis ſex, oculis* 2, *pedunculis conicis, retrorſum curvatis: apicis alteriusque lateris ſetis in ventilabrum diſpoſitis.*

punctata. 19. N. ſubdepreſſa, pedunculis longiſſime cirratis. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 62. *f.* 4. 5. *prodr.* 2633. *rar.* 2. *p.* 63.

O. *Fabr. Fn. groenl. p.* 301. *n.* 284? Nereis roſea.

Habitat in Norwegiae *et* Groenlandiae *ſinubus, in teſtis oſtrearum aut ſabulo ſub lapidibus latens, flaveſcens: ſtriis transverſis fuſcis, lineaque dorſi longitudinali rubra, ca-*

pitis

pitis cirris, oculiſque 4, pedunculorum cono punctis 4 nigris notato, corporis ſegmentis 40 et ultra, caudae cirris 2.

alba. 20. N. convexa, fronte cornuta, pedunculis bifidis. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 62. *f.* 6. 7. *prodr.* 2634. *rar.* 2. *p.* 64.
Habitat in Norwegiae *ſinuum fundo argilloſo, alba, annulata, retrorſum attenuata, oculis nullis, proboſcide membranacea, pellucidiſſima, in duplam corporis latitudinem inflanda, pedunculis utrinque 77, verrucoſis.*

flava. 21. N. depreſſa, pedunculorum lamellis oblongo-ovatis. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 299. *n.* 282.
Habitat in mari ſeptentrionali *procul a littore* Groenlandiae *inter radices ulvarum, 27 lineas longa, viridi affinis, tota flava, ſolis pedunculorum ſetis, 2 oculis caudaeque cirris nigris, roſtri cirris 2 breviſſimis, tentaculis 2 baſi unitis, corporis ſegmentis 140.*

longa. 22. N. ſubdepreſſa, papillis mammillaribus pro lamellis pedunculorum. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 300. *n.* 283.
Habitat ad littora ſinuum Groenlandiae *in fundo argillaceo vel arenoſo, praeſertim ad fluviorum oſtia, ad 9 pollices longa, nunc alba, ſetis modo caudaeque cirris nigricantibus, nunc ſupra rubicunda vel ex griſeo viridis, nunc ſupra vireſcens: lateribus obſcurioribus, ſubtus ex aeneo albida, corporis ſegmentis 190, 200, 240, pedunculis bifidis.*

prismatica. 23. N. triquetra, pedunculis diſtantibus: papilla ſimplici ſetigera ſupra cirrata. *Müll. prodr. zool. dan.* 2637. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 302. *n.* 285.
Habitat in maſſa flava ſpongioſa foetida, quae lapides majores ad littus Groenlandiae *ſubtus veſtit, rarius in arena, 6 lineis vix longior ochroleuca, lineis dorſi 3 griſeis, capitis collique cirris 11, plurimis, caudaeque 2 albis, oculis 4, corporis ſegmentis 25.*

bifrons. 24. N. depreſſa, pedunculis papilla ſimplici ſetigera ſupra cirrata, mediis ſimul ramigeris. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 303. *n.* 286. *Müll. prodr. zool. dan.* 2638.
Habitat cum prismatica, *continuo ſe movens, pollicem longa, ex fulvo brunnea, prismaticae affinis, capite albo, oculis 4, cirris 7, corporis utrinque attenuati ſegmentis 56.*

caeca. 25. N. ſubconvexa, tentaculis duobus breviſſimis, lamellis pedunculorum duplicatis ciliatis. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 304. *n.* 287.

Habitat in Groenlandiae *littoribus arenoſis ſub lapidibus more lumbrici papilloſi cuniculos profundos agens, 8 pollices longa, candide lineatis, tentaculis obtuſe conicis, proboſcide ampla, ſphaerica, corporis ſegmentis 86-100, oculis nullis; an eadem cum naide caeca.*

ebranchiata. 26. N. teres annuloſa utrinque attenuata: pedunculis cylindricis brevibus utrinque bifariam pinnata, tentaculis nullis.
Pall. nov. act. Petrop. 2. p. 231. t. 5. f. 8-10.
Habitat (caeruleſcens) in mari germanico, *(ex griſeo fuſca) in* indico, *pinnis ſegmentis corporis 269, ultimo crenato.*

lamelligera. 27. N. teres utrinque attenuata: proboſcide mucronibus quatuor carneis ſtellata, pedunculis compreſſis folio ſupra ſemilunato ſubtus majore ſemicordato auctis.
Pall nov. act. Petrop. 2. p. 233. t. 5. f. 11-17.
Habitat in mari indico, mediterraneo *et* ſeptentrionali, *inter plantas et quisquilias marinas, bipedalis, ſegmentis 200-550, capitis tentaculis 4, oculis 2 nigris.*

ciliata. 28. N. depreſſa, ore cylindrico retractili, margine anteriori ciliato, tentaculis nullis.
Müll. zool. dan. 3. p. 14. t. 89. f. 1-4.

*** *ore tubulato.*

prolifera. 29. N. depreſſa, pedunculis cirratis, tentaculo frontis ſolitario. *Müll. zool. dan. 2. t. 52. f. 5-9. rar. 2. p. 34.*
Habitat rara in Norwegiae *ſinubus, generationis modo naidibus ſimilis, rufa, capitis tentaculis 3, oculis 4 nigris, forcipe et proboſcide nulla, ſed loco ejus tubulo pellucido craſſo flexuoſo, corporis ſegmentis 32-46, caudae cirris 2.*

NAIS. *Corpus* repens, longum, lineare, pellucidum, depreſſum.
Pedunculi ſetis ſimplicibus.
Tentacula nulla.
Oculi duo aut nulli.

vermicularis. 1. N. ſetis lateralibus nullis, mento barbato. *Müll. von Würm. t. 4. f. 1. 2. hiſt. verm. 1. 2. p. 20. n. 151. zool. dan. prodr.* 2647.
Roeſ. inſ. 3. p. 578. t. 93. f. 1-7.

Habitat

Habitat in aquis ſtagnantibus, *lemnae adhaerens, 2 lineas longa, capite ſubclavato, oculis nullis, verrucis pedunculorum ſetis 5-6.*

ſerpentina. 2. N. ſetis lateralibus nullis, collari triplici nigro. *Müller von Würm. p. 84. t. 4. f. 3. 4. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 20. *n.* 152. *zool. dan. prodr.* 2648.

Roeſ. inſ. 3. *p.* 567. *t.* 92.

Habitat in Europae *aquis* ſtagnantibus *ad radices lemnae, vermiculari minus depreſſa et longior, 9 quippe lineas longa, pedunculis verrucoſis: ſetis 3 uncinatis.*

proboſcidea. 3. N. ſetis lateralibus ſolitariis, proboſcide longa. *Müll. von Würm. p.* 14. *t.* 1. *f.* 1-4. *verm. hiſt.* I. 2. *p.* 21. *n.* 153. *zool. dan. prodr.* 2649.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1085. *n.* 2. Nereis (lacuſtris) linearis, lingua exſerta.

Roeſ. inſ. 3. *p.* 483. *t.* 78. *f.* 16. 17. *et t.* 79. *f.* 1.

Trembley hiſt. polyp. t. 6.

Lederm. microſc. t. 82. *f.* f. *et* h.

Schaeff. Armpolyp. 1754. *t.* 3.

Habitat in Europae aquis *paludoſis, rivis,* piſcinis &c. 2½-4 *lineas longa, hyalina, inteſtino flexuoſo nigricante, ſegmentis ſingulis utrinque ſeta ſimpliciſſima munitis, capite forficato, oculis 2 nigris, ore linguaque inſtructo, ano terminali, partibus et incolis aquae inviſibilibus victitans.*

elinguis. 4. N. ſetis lateralibus ſolitariis, proboſcide nulla. *Müll. von Würm. p.* 74. *t.* 2. *f.* 1-4. *hiſt. verm.* I. 2. *p.* 22. *n.* 154. *zool. dan. prodr.* 2650.

Habitat rarior in aqua rivulari, *proboſcideae affinis, at anguſtior,* 4-5 *lineas longa, ore anterius obtuſo, forficis et proboſcidis experte, ano laterali.*

digitata. 5. N. ſetis lateralibus ſolitariis, cauda laciniata. *Müller von Würm. p.* 90. *t.* 5. *f.* 1-4. *hiſt. verm.* I. 2. *p.* 22. *n.* 155. *zool. dan. prodr.* 2651.

Habitat in rivorum ſedimento arenoſo, *capite in limo condito, oculis nullis 5 lineas longa, ſubtus duplici verrucarum puſillarum ciliatarum inſtructa, cauda in 6 lacinias inaequales ſurſum porrectas diviſa, vena rubra.*

Naides *partitione transverſa naturali et artificiali mirifice multiplicandae, plurimae in aquis dulcibus degunt;* Nereides, Terebellae, Amphitritae, Spiones, Aphroditae *omnes in aqua ſalſa.*

barbata. 6. N. ſetis lateralibus faſciculatis, proboſcide nulla. *Müller von Würm. p. 80. t. 3. f. 1-3. hiſt. verm. I. 2. p. 23. n. 156. zool. dan. prodr.* 2652.
Bonnet tr. d'inſectol. obſ. 21.
Habitat in foveis ſilvarum aquoſis, *helicibus planorbibus ſaepe adhaerens, digitatae ſimilis, at ſubtus pilis, et ad ſingula ſegmenta corporis utrinque ſetis* 4 *divergentibus munita, oculisque* 2 *nigris gaudens,* 4 *lineas longa.*

caeca. 7. N. verrucis lateralibus ſetoſis, oculis nullis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2653.
Habitat in ſinubus Islandiae, *et* Chriſtianienſi Norwegiae, *an propria ſpecies hujus generis?*

littoralis. 8. N. ſetis lateralibus nullis ſolitariis geminatis faſciculatis varia. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 80. *f.* 1-8. *rar.* 2. *p.* 120.
Habitat in Havniae *littore ſabuloſo, marina aqua tecto, fragiliſſima, elongata, filiformis, aequalis, rubra, raro ex albo griſea, ſegmentis plurimis* 16, 30, 37 *ſeta marginali diſtinguendis, ex annulis confertis compoſita.*

marina. 9. N. ſetis lateralibus ſolitariis tubulo exſerendo. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 315. *n.* 295.
Habitat in Groenlandiae littoribus *ſub confervis marinis, vix* 10 *lineis longior, ſupra convexa, ſubtus plana, poſterius acuminata, albicans, linea media longitudinali ex flavo griſea, oculis* 2; *an vere diſtincta a nereide prolifera?*

quadricuſpidata. 10. N. verrucis lateralibus bifidis ſetoſis, cirris abdominalibus et cauda quadrifida. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 315. *n.* 296.
Habitat ſatis frequens in Islandiae *ſabulo maritimo ſub lapidibus, gordiis minutis victitans,* 2⅓ *pollices longa, utrinque attenuata, ſubtus magis plana, oculis tentaculisque carens, nunc pallide rubra, nunc ex rubicundo griſea, linea longitudinali, ſubtus praeſertim pulchre purpurea, corporis ſegmentis* 104 *annularibus, caudae brevis cylindricae, cirris* 4.

Mneſtia

287. ASCIDIA.

Corpus fixum, teretiuſculum, vaginans.

Aperturae binae utplurimum ad ſummitatem: altera humiliore.

papilloſa. 1. A. ſcabra, tuberculis coccineis.
Bohadſch mar. 130. *t.* 10. *f.* 1. Tethyum coriaceum.
Habitat in mari adriatico.

gelatinoſa. 2. A. laevis coccinea ſubdiaphana.
Bohadſch mar. 131. *t.* 10. *f.* 3. Tethyum gelatinoſum.
Gunn. act. Nidroſ. 3. *p.* 101. Tethyum elegans.
Habitat in mari mediterraneo; *nonne eadem cum venoſa?*

inteſtinalis. 3. A. elongata laevis alba, ſacculo in collum producto. *Müll. zool. dan. prodr.* 2733.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1087. *n.* 3. Aſcidia laevis alba membranacea.
Gunn. act. Nidroſ. 3. *p.* 81. *t.* 3. *f.* 3. 4. Tethyum ſociabile, Soepungen.
Bohadſch mar. 132. *t.* 10. *f.* 4.
Baſter opuſc. ſubſ. 2. *p.* 84. *t.* 10. *f.* 5.
Habitat in Oceano europaeo.

quadridentata. 4. A. laevis alba, aperturis quadridentatis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2721. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 330. *n.* 317.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *ſubgloboſa, roſtris 2 prominentibus, balanis adhaerens, 4 lineas longa.* Koenig.

ruſtica. 5. A. ſcabra ferruginea aperturis incarnatis. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 49. *n.* 18. *t.* 15. *f.* 1-5. *prodr.* 2720. *rar.* 1. *p.* 30. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 330. *n.* 316.
Olaſſ. reſ. isl. 900. C. b. Tethya corpore ovato rubro, auriculis duabus.
Rondel. piſc. 2. *c.* 19. *poiſſ. p.* 87. *Aldrov. zooph. p.* 583. *Geſn. Fiſch. anh. p.* 82. Tethya.
Jonſt. exang. t. 19. *f.* 8. Tethyorum ſpecies.
Habitat in mari ſeptentrionali *et* mediterraneo, *edulis, teſtaceis, lapidibus, fucis adhaerens, ſubdiaphana, dolioli facie,* 2 *pollices circiter longa, cute exteriori craſſa coriacea, intus laevi albida, ſacculo molli laevi carnoſo, roſeo, infra flaveſcente, aqua a cute exteriori diſcreto.* Koenig.

echinata. 6. A. hemiſphaerica hiſpida, oſculis hiantibus coccineis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2722. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 331. *n.* 318. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1087. *n.* 6. Aſcidia verrucoſa hiſpida.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *fuco ſcopario aliisque adhaerens, albida, verrucis adſperſa, ſingulis apice armatis, cacti inſtar, aculeis divergentibus ſubciliatis, ſupremis 2 majoribus incarnatis in aperturas terminatis.* Koenig.

Mentula. 7. A. compreſſa piloſa, ſacculo rubro, aperturarum altera laterali. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 24. *n.* 6. *t.* 8. *f.* 1-4. *prodr.* 2724. *rar.* 1. *p.* 24. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 331. *n.* 319.
Rondel. piſc. c. 2. *p.* 129. *poiſſ.* 2. *p.* 81. Pudendum alterum.
Aldrov. zooph. p. 589. Mentula marina altera.
Geſn. Fiſchb. p. 154. *f.* 1. *Anh.* 4. *p.* 84. Mentula marina, pudendi marini altera ſpecies.
Jonſt. exſang. t. 20. *f.* 2. Mentula marina.
Planc. conch. p. 109. *t.* 7. *Comment. Bonon.* 5. *p.* 243. *t.* 2. *f.* 4-7. Mentula marina informis.
Hill. anim. 1. *t.* 5. Salecia.
Dicquemar. Journ. de phyſ. 1777. *Mai. p.* 356. *t.* 2. *f.* 1. 2. 3. Reclus marin.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *rudis quaſi et indigeſta, ochroleuca, pellucida, gelatinoſa,* 5-6 *pollices longa, confervarum fibrillis veſtita.*

venoſa. 8. A. elongata ſubcompreſſa toroſa rubra, ſacculo concolore. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 85. *t.* 25. *f.* 1-3. *prodr.* 2736. *rar.* 1. *p.* 52.
Habitat in mari Norwegico, *fucis in fundo ſinuum naſcentibus adhaerens, firma, aperturis ſanguineis.*

Prunum. 9. A. ovata laevis hyalina, ſacculo albo, aperturarum altera laterali. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 127. *n.* 61. *t.* 34. *f.* 1-3. *prodr.* 2730. *rar.* 1. *p.* 83.
Habitat in maris Norwegici ſinu Chriſtianenſi *et* glacialis Karikenſi, *pruni figura et magnitudine, cute lactea ſubtiliſſime rugoſa, aperturarum radiis fuſcis.*

conchilega. 10. A. fruſtulis teſtarum veſtita, ſacculo albo in caeruleum transeunte. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 128. *n.* 62. *p.* 34. *f.* 4-6. *prodr.* 2724. *rar.* 1. *p.* 84.
Muſ. Ad. Fr. p. 96. Microcoſmus gelatinoſus pellucidus.
Habitat in Norwegiae ſinu Droebacenſi, *gelatinoſa, ſubdiaphana, cylindrica vel ovalis.*

11. A.

parallelogramma. 11. A. candida convexa hyalina, ſacculo reticulato luteſcente, aperturarum altera laterali. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 49. *f.* 1-3. *prodr.* 2737. *rar.* 2. *p.* 25.
Habitat haud frequens in fucis ſinus Norwegiae Laurwigenſis, *oblonga, ſubquadrata; angulis obtuſis, lineis interdum coccineis picta.*

virginea. 12. A. elongato-compreſſa cryſtallina laevis: ſtriis transverſis coccineis, ſacculo rubente. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 49. *f.* 4. *prodr.* 2732. *rar.* 2. *p.* 27.
Habitat ſub initium Julii ad rupes orientales arcis Norwegicae Stavern, *glaciem referens, parallelogramma durior; apertura utraque punctis raris coccineis cincta.*

canina. 13. A. elongata teres flaccida: ſacculo rubro. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 55. *f.* 1-6. *prodr.* 2734. *rar.* 2. *p.* 43.
Red. opuſc. 3. *t.* 21. *f.* 6. *et anim. viv. negl. anim. p.* 101. *t.* 15. *f.* 6. Mentula marina.
Planc. conch. p. 45. *t.* 5. *f.* 5. Tethyum ſ. mentula marina penem caninum referens.
Bohadſch anim. mar. p. 132. *t.* 10. *f.* 4. 5. Tethyum faſciculatum.
Dicquemar. journ. de. phyſ. 1777. *Fabr. p.* 137. *t.* 1. *f.* 1-7. Sac-animal.
Habitat in mari Norwegico *et* atlantico, *cute ampla, glabra, alba, ſubpellucida, aperturarum anteriorum ambitu ruberrima.*

patula. 14. A. teretiuſcula luteſcens ſcabra, ſacculo rufo, orificiis coccineis patulis: altero laterali. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 65. *f.* 1. *prodr.* 2729. *rar.* 2. *p.* 71.
Habitat in fucis rupium Suenerne oceani norwegici, *pellucida, ſacculo lagenae formam mentiente.*

aſperſa. 15. A. ſubcompreſſa ſcabriuſcula alba, ſacculo maculis rubris. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 65. *f.* 2. *prodr.* 2728. *rar.* 2. *p.* 72.
Dicquemar. journ. de phyſ. Oct. 1780. *p.* 304. *t.* 2. *f.* 1-3?
Habitat in mari Norwegico, *fucis racematim adhaerens, cordiformis, cute pellucida intus laevi, ſacculo flavicante.*

16. A.

Aſcidiae, *in mari modo obviae, ſe dilatant alternatim et contrahunt, exſpuunt tanquam e ſiphone aquam, magis minusve gelatinoſae, lapidibus, fucis, teſtaceis affixae, mytilum interdum includentes, piſcium frequens eſca, nonnullae etiam hominibus eſculentae, paucae olim officinales.*

ſcabra. 16. A. compreſſa albida ſcabriuſcula, ſacculo rubro, orificiis concoloribus. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 65. *f.* 3. *prodr.* 2726. *rar.* 2. *p.* 73.

Habitat in Norwegiae *ſinu* Chriſtianienſi, *fucis latere adhaerens, prima facie patulam referens, ab oculo glabra; digito tantum aſpera, aperturis potius coarctatis, collo utroque conico, ſacculo non maculato, cute exteriori pellucidiſſima, gelatinoſa, duriuſcula.*

orbicularis. 17. A. depreſſa albida, ſacculo punctis elevatis inaequalibus. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 79. *f.* 1. 2. *rar.* 2. *p.* 117.

Habitat ſolitaria Auguſto in ſinu Norwegiae Chriſtianienſi, *fuco ruſo affixa, gelatinoſa, orbicularis, pollicis diametro, pellucida, diſco opaco, aperturis collateralibus* 6-7 *dentatis: puncto in apice dentium coccineo, ſacculo albido.*

corrugata. 18. A. elongata glabra, ſacculo cinereo: faſciis albis. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 79. *f.* 3. 4. *prodr.* 2735. *rar.* 2. *p.* 118.

Habitat in Norwegiae ſinubus, *baſi fibrilloſa fucis adhaerens, teres, flaccida, plicata, rugoſa, cute exteriori hyalina, orificiis luteis.*

lepadiformis. 19. A. clavata hyalina, inteſtino flavo. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 79. *f.* 5. *prodr.* 2738. *rar.* 2. *p.* 119.

Habitat in Norwegiae ſinubus, *fucis et cancris brachyuris adhaerens, facile flacceſcens, clava compreſſa ſubquadrangula.*

complanata. 20. A. depreſſa inaequalis albida, interaneis nigris, orificiis fulvo punctatis. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 332. *n.* 320.

Habitat frequens in littore arenoſo Groenlandiae, *baſi ſua lapidibus arcte adhaerens, ſubcarnoſa, oblonga, pellucida,* 9 *lineas longa.*

Tuberculum. 21. A. oblonga compreſſo-gibba flavicans, punctis eminentibus concoloribus, orificiis verticalibus rubris. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 332. *n.* 321.

Habitat in fundo maris Groenlandiam *alluentis, ulvarum radicibus arcte adhaerens,* 3 *lineis vix longior.*

villoſa. 22. A. obovata radicata albida lanugine conferta veſtita, aperturis terminalibus concoloribus. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 333. *n.* 322.

Habitat

Habitat in fundo maris, Groenlandiam *alluentis*, *radice inter radices ulvarum fixa*, *4 lineas longa*, *erecta*, *teres*, *cute ſubſtupoſa*, *verrucis minutiſſimis confertis obſita.*

clavata. 23. A. ſtipite filiformi, aperturarum utraque laterali. *Müll. zool. dan. prodr.* 2740. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 333. *n.* 323.
Mant. plant. p. 552. Vorticella Bolteni.
Bolten. epiſt. de nov. zooph. Hamb. 1771. 4.
Habitat in mari ſeptentrionali, *ſcopulis rupibusque baſi ſua arctiſſima adhaerens*, *ſerpulis et zoophytis ſaepius tota obducta*, *9 pollices*, *et ultra longa*, *ſpadicea*, *rarius rubicunda*, *radicata*, *cute craſſa-calloſa*, *intus glabra*, *alba*, *ſtipite filiformi*, *rigido*, *erecto*, *ſubflexuoſo*, *ſurſum incraſſato dilatato*, *nunc longiori*, *nunc breviori*, *clava ovata*, *nunc laevi*, *nunc ſubſulcata*, *aperturis rugoſis*, *eminentibus.*

pedunculata. 24. A. ſtipite ſenſim attenuato, capitulo fuſiformi, apertura utraque terminali.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1319. *n.* 14. Vorticella (ovifera) ſimplex ſolitaria, flore ovali, ſtirpe ſimpliciſſima ſcabra.
Pall. ſpic. zool. 10. *p.* 25. *t.* 1. *f.* 16. Aſcidia clavata.
Edw. glean. t. 356.
Habitat in mari *inter* Aſiam *et* Americam borealem *intermedio*, *baſi variis marinis affixa*, *coriacea*, *rugoſiſſima*, *coccinea*, *orificiis papillaribus*, *rugis aliquot circularibus cinctis.*

mammillaris. 25. A. ſubparallelepipeda albicans, aperturis terminalibus concoloribus. *Pall. ſpic. zool.* 10. *p.* 24. *t.* 1. *f.* 15.
Habitat in ſalo Cornubienſi, *ſitu horizontali ſcopulis ſubmarinis tenaciſſime adnata*, *valde irritabilis*, *difformis*, *varie rugoſa et gibboſa*, *hinc inde ſetis mollibus adſperſa*, *coriacea ſordide albicans*, *aperturarum papilla hemiſphaerica intus elegantiſſime coccinea.*

globularis. 26. A. ovali-ſphaerica ſemipellucida, aperturis terminalibus vix prominentibus. *Pall. it.* 3. *p.* 709. *n.* 57.
Habitat copioſa in littoribus vadoſis arenariis Oceani glacialis, *ceraſi magnitudine*, *pedunculo breviſſimo affixa*, *cute duriuſcula extus laevi*, *arenulis adglutinatis obducta.*

Phuſca. 27. A. teres rubra, apertura utraque laterali.
Forsk. Fn. arab. aeg. p. 129. *n.* 82. Alcyonium Phuſca.

Habitat

Habitat in Smyrnam *et* Conſtantinopolin *alluente mari, ſaxis adhaerens, 2½ pollices longa, laevis, utrinque obtuſa, nunc recta, nunc incurva, cortice ſtupoſo rejecto* Graecis *cum ſucco limoniorum edulis.*

Gelatina. 28. A. compreſſa laevis alba, ſacculo pallido, orificiis punctis luteis cinctis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2723.
Habitat in mari Norwegico.

cryſtallina. 29. A. compreſſa laevis, ſacculo albo atomis coccineis ſparſo. *Müll. zool. dan. prodr.* 2725.
Habitat in mari Norwegico.

octodentata. 30. A. oblonga biroſtris laevis albicans, aperturis hinc octo illinc ſexdentatis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2731. *Act. Havn.* 10. *p.* 168. *f.* 7. *β* 8. 9.
Habitat in mari Norwegico.

patelliformis. 31. A. alba, diſco rubro. *Müll. zool. dan. prodr.* 2739.
Habitat in mari Norwegico.

Pyura. 32. A. conica laevis intus papilloſa rubra, tubulis duobus terminalibus punctisque inter hos duobus nigris. *Mol. hiſt. nat. Chil. p.* 172.
Habitat gregatim ſacco incluſa ad littus Chilenſe, *edulis, utrum hujus, an proprium genus?*

Aurantium. 33. A. ſubgloboſa: ſacculo coccineo punctis duriuſculis ſcabro, pupillis terminalibus cylindraceis rugoſis.
Pallas n. act. Petrop. 2. *p.* 246. *t.* 7. *f.* 38.
Habitat in mari Curilas inſulas *alluente baſi teſtis lapillisque adhaerens pomi aurantii magnitudine.*

globularis. 34. A. ovato globoſa ſemipellucida glabra pedunculata: ſacculo extus ſubtiliſſime punctata, aperturis diſtantibus vix prominulis.
Pallas n. act. Petrop. 2. *p.* 247. *t.* 7. *f.* 39. 40.
Habitat frequens in maris hyperborei *littoribus vadoſis arena ſubtili ſtriatis* e. g. *ad ſinum* Carae, *ceraſi majoris magnitudine, ſimpliciſſima, cineraſcens, arena tenera agglutinata ſcabra, pedunculo breviſſimo.*

SAL-

Blaſpron

SALPA. *Corpus* liberum gelatinoſum utroque apice apertum intus vacuum: inteſtino obliquo.

* *appendice inſtructae.*

maxima. 1. S. corpore utroque apice appendiculato. *Forsk. Fn. aegypt. arab. p.* 112. *n.* 30.
Habitat in Mari mediterraneo *et* Archipelago, *hyalina, ſpithamam longa ſubquadrangula, nucleo obſcure teſtaceo opaco ad anum, appendice poſteriore ſubulata, priore conica longiore.*

pinnata. 2. S. ore terminali, linea dorſali hinc flava inde alba, abdominis lineis duabus albo rubentibus. *Forsk. Fn. arab. aegypt. p.* 113. *n.* 31.
Habitat in mari mediterraneo, 2 *pollices longa, hyalina, ſubtriquetra, dorſi linea opaca, appendice pinnam aemulante, triquetro-priſmatica.*

democratica. 3. S. punctata faſciata, aculeis pone octo. *Forsk. Fn. arab. aegypt. p.* 113. *n.* 32.
Habitat numeroſiſſima ad Majorcam, *ovalis, antrorſum truncata, digitum latum longa, nucleo baſeos opaco caeruleo, rarius ejus loco circulo multiradiato caeruleſcente, cauda biſeta.*

mucranata. 4. S. ore laterali, mucrone hyalino interno ad frontem dextro, ad anum ſiniſtro, nucleo caeruleo oblongo. *Forsk. Fn. arab. aegypt. p.* 114. *n.* 33.
Habitat ad Yvicam, *hyalina, oblongo-ovata, poſterius acuta, digitum transverſum longa, nucleo opaco.*

** *appendice nulla.*

punctata. 5. S. ore ſubterminali, dorſo rubro-punctato pone mucronato, ano porrecto. *Forsk. Fn. arab. aegypt. p.* 114. *n.* 34.
Habitat rarior in mari mediterraneo, *ſeſquipollicaris, hyalina, abdominis faſciis obſoletis, nucleo ad anum globoſo opaco ex ferrugineo flaveſcente.*

6. S.

Salpae, *gregariae, ſaepius cohaerentes, ſyſtoles et diaſtoles phaenomena egregie monſtrantes, et aſcidiarum more aquam quaſi ex ſiphone expellentes, et* Dagyſa, *an proprium ambo conſtituant genus, huic ordini adſcribendum, judicent autoptae vivorum animalium: Hujus ſpecies adhuc incognitae a* Bankſio *et* Solandro *in mari hiſpanico captae, Illuſtris Viri examen cum orbe litterario communicandum adhuc expectant, gregariae, cohaerentes, eximiis coloribus conſpicuae.*

confoederata. 6. S. ore terminali, dorſo gibboſo. *Forsk. Fn. arab. aegypt. p.* 115. *n.* 35.
Habitat in Mari mediterraneo, *et* Archipelago, *pollice longior, ſubtetragona, hyalina, mollis, nucleo pone gibbum dorſi globoſo-ovato, opaco, obſcure brunneo: linea ex hoc exeunte pellucida.*

faſciata. 7. S. ovato-oblonga, ore terminali, abdomine faſciato, inteſtino filiformi incurvo ſupra nucleum. *Forsk. Fn. arab. aegypt. p.* 115. *n.* 36.
Habitat rarior ad ingreſſum Archipelagi, *ſesquipollicaris, hyalina, abdominis faſciis* 5, *nucleo marginali ferrugineo, opaco.*

Sipho. 8. S. ſubcylindrica obtuſa hyalina, nucleo brunneo, fronte tubulis duobus: apicibus perforatis rubris. *Forsk. Fn. arab. aegypt. p.* 115. *n.* 37.
Habitat in mari rubro ad Djiddam, *baſi ſaxis marinis aut ſpongiae affixa, vix digitum transverſum longa, nucleo prope baſin globoſo, opaco, inteſtino ex fuſco caeruleo.*

africana. 9. S. ſubtriquetra transverſe, decemſtriata, ore terminali, gibbo ad baſin aucto nucleis tribus. *Forsk. Fn. arab. aegypt. p.* 116. *n.* 38.
Habitat ad littora Tunetana, *ſesquipollicaris, hyalina, nucleo priori opaco brunneo globoſo, reliquis albidis ſubpellucidis.*

ſolitaria. 10. S. hyalina ovalis, ore terminali: tubulo caeruleo, ano laterali caeruleo. *Forsk. Fn. arab. aegypt. p* 116. *n.* 39.
Habitat in mari rubro ad Djiddam, *gramini adhaerens, digitum transverſum longa, depreſſiuſcula, nucleo prope baſin mediam globoſo pallide brunneo.*

polycratica. 11. S. ore infra apicem, fronte caudaque truncatis. *Forsk. Fn. arab. aegypt. p.* 116. *n.* 40.
Habitat in mari mediterraneo, *ſesquipollicaris, congeneribus rigidior, abdominis faſciis* 5 *transverſis, nucleo globoſo fuſco.*

DAGYSA. *Corpus* angulatum cavum, utroque fine apertum.

notata. 1. D. altero fine macula fuſca notato. *Banks et Solander apud Hawkesworth. it. 2. p. 2.*

Habitat in mari hiſpanico, 3 *pollices longa, at* 1 *craſſa, lateribus altera alteri adhaerente.*

CLAVA. *Corpus* carnoſum, gregarium clavatum, pedunculo tereti affixum: apertura unica verticali.

paraſitica. 1. Cl. pedunculo albido pellucido, clava rubra opaca, mucronibus pellucidis conicis erectis obſeſſa. *Müller Beſchr. berl. Naturf.* 1. *p.* 406. *t.* 5. *f.* 3. 4.

Habitat in maris balthici *fuco nodoſo, teſtaceis, palis, trabibus, parum vivida, os tamen dilatans et contrahens, hydris affinis.*

288. ACTINIA. *Corpus* rugoſum, cirris eccentricis, apertura unica terminali, baſi affixum.

rufa. 1. A. rufa, foramine roſaceo, cirris pallidis. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 75. *t.* 23. *f.* 1-5. *rar.* 1. *p.* 47. *prodr.* 2797.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1088. *n.* 1. *Müll. zool. dan. prodr.* 2793. Actinia (equina) ſemiovalis laeviuſcula.
Muſ. Ad. Fr. 1. *p.* 93. Tethys (mentula) ſemiovatus.
Brown jam. p. 787. Actinia ſubfuſca mellis, fundo muſculoſo.
Rondel. poiſſ. p. 380. Urtica marina libera Ariſtotelis.
Aldrov. zooph. p. 567. Urtica parva Rondeletii.
Geſn. Fiſchb. 2. *p.* 10. Urtica parva marina.
Jonſt. exang. t. 18. Urtica parva.
Hill anim. t. 5. Meduſa, ſpecies 1.
Dicquem. act. angl. vol. 63. *t.* 16. *f.* 1-3. Anemone de la prémiere eſpece.

Habitat in Oceano, *etiam* glaciali, *et* mari mediterraneo, *rupibus adhaerens, rarius verſicolor, formae variabilis, nunc cylindricae, nunc globoſae, nunc conicae, nunc*

 eve-

evolatae, cirris albidis, tenuibus, flexilibus, mobiliſſimis, diametro corporis brevioribus, apice truncatis.

craſſicornis. 2. A. rubra, cirris conico elongatis. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 77.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1088. *n.* 2. Actinia (ſenilis) ſubcylindrica transverſe rugoſa.
Müll. zool. dan. prodr. 2792. Actinia rubra, cirris fuſiformibus.
Baſt. opuſc. ſubſ. 3. *p.* 120. *t.* 13. *f.* 1. Actinia rugis longitudinalibus, proboſcidibus longis craſſis.
Fn. ſuec. 2103. Priapus ſenilis.
Forsk. fn. arab. aeg. p. 101. Priapus ruber.
Rondel. poiſſ. p. 381. *c.* 14. *Bellon. aq. p.* 342. *Geſn. Fiſchb.* 2. *p.* 11. *Jonſt. exſang. t.* 18. *f.* 2. Urtica rubra.
Aldrov. zooph. p. 568. Urtica rubra, Urtica explicata Bellonii, Urtica contracta Bellonii.
Dicquem. act. angl. vol. 63. *t.* 16. *f.* 10. *et t.* 17. *f.* 11. 12. Anemone de la ſeconde eſpece.
Stroem. ſondm. 1. *p.* 204.
Gunn. act. Stockh. 1767. *t.* 4. *f.* 4. 5.
Fabr. it. norw. p. 261.
Habitat in mari atlantico, mediterraneo, ſeptentrionali, glaciali.

plumoſa. 3. A. tentaculis parvis, margine penicillis cirrata. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 12. *t.* 88. *f.* 1-4. *rar.* 1. *p.* 77. *prodr.* 2791.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1088. *n.* 3. Actinia (ſolina) ſubcylindrica ſtriata laevis glande muricata.
Baſt. opuſc. ſubſ. 3. *p.* 122. *t.* 13. *f.* 2. Actinia rugis orbicularibus, proboſcidibus multis tenuibus.
Olaff. it. isl. 2. *p.* 1002. Actinia corpore ventricoſo molli, tentaculis numeroſis variis.
Gunn. act. Nidroſ. 5. *p.* 425. *t.* 7. Actinia (polymorpha) laevis rufa, baſi inaequabili et dilatabili, tentaculis duplicis generis.
Dicquem. act. angl. vol. 63. *p.* 397. Anemone de la quatrieme eſpece.
Planc. conch. min. nat. p. 43. *t.* 4. *f.* 6. Urtica ſoluta caryophyllum referens.

Habitat

Actiniae, *quibus pro ore et ano unica apertura data eſt, teſtaceis, piſciculis, aliis animalculis marinis victitant, ipſae eſculentae, nonnullae perquam ſapidae, forma ob tentacula nunc retracta, nunc magis minusve exſerta mire variabili, abſciſſas partes redintegrant, lucem vividiſſime ſentiunt, plurimae viviparae.*

Habitat in Oceano europaeo, *pulcerrima, nunc caſtanea, nunc ex luteo fuſca, nunc ex luteo virens, nunc alba; modo opaca, modo pellucidiſſima, faucis laciniis nunc albis, nunc rufis, nunc aurantiis.*

judaica. 4. A. cylindrica laevis truncata; praeputio interne undulato laevi.
Planc. conch. min. not. p. 43. *t.* 6. Colum marinum.
Habitat in mari mediterraneo.

effoeta. 5. A. ſubcylindrica anguloſo-ſtriata.
Baſt. opuſc. ſubſ. 1. *p.* 122. *t.* 14. *f.* 2.
Habitat in Oceano.

coccinea. 6. A. albo rubroque varia, cirris cylindricis annulatis. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 63. *f.* 1-3. *prodr.* 2794. *rar.* 2. *p.* 65.
Nov. act. nat. Cur. 6 *p.* 53. Actinia virginea.
Habitat rara in Norwegiae ſinubus, *fucis lapidibusque adhaerens, cylindrica, truncata, glabra: margine ſupero tentaculorum conicorum alborum rubro annulatorum, duplici ſerie muricato, glande glabra: centro fiſſuris perforato.*

undata. 7. A. conica pallida, ſtriis duplicatis rugoſis fulvis. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 63. *f.* 4. 5. *rar.* 2. *p.* 66.
Habitat in Norwegiae ſinu Chriſtianienſi, *fucis et milleporae polymorphae adhaerens, truncatae facie, porrecta cylindracea, retracta truncato-conica, tentaculis ex centro exeuntibus pallidis, pellucidis, longis.*

viduata. 8. A. griſea, ſtrigis longitudinalibus cirrisque albis. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 63. *f.* 6-8. *prodr.* 2799 *rar.* 2. *p.* 67.
Aldrov. zooph. p. 565. Urtica cinerea Rondeletii.
Habitat haud frequens in fuco ſaccharino maris Norwegici, *conico-truncata, ſtrigis* 24, *aperturae centro rugoſo rubro.*

truncata. 9. A. rufo-lutea conica glabra pellucida *Müll. zool. dan. prodr.* 2795.
Dicquem. act. angl. 63. *p.* 387. *t.* 17. *f.* 13? Anemone de la troiſieme eſpece.
β) Actinia inteſtinalis. O. *Fabr. fn. groenl. p.* 350. *n.* 342.
Habitat in Oceano europaeo.

nodoſa. 10. A. rugoſa ſulcata, utroque fine ampliori ſupero tuberculato cum cirris intermediis brevibus compreſſis coccineis. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 350. *n.* 341.

Habitat in maris Groenlandiam *alluentis profundis, fundo rupeſtri adhaerens,* 4 *pollices longa, ex albo rubens, apertura cirrorum duplici ordine cincta.*

ſpectabilis. 11. A. caerulea laevis, cirris craſſis albo maculatis, foramine radiato. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 351. *n.* 342. b.

Habitat ad Groenlandiae *littora, in cavernis rupium frequens, ad* 2 *pollices longa, ſtrigis longitudinalibus albo punctatis varia.*

digitata. 12. A. fulva punctis albis, cirris roſeis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2796.

β) Actinia craſſicornis. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 348. *n.* 340.

Habitat in Oceani ſeptentrionalis *rupibus littoreis in fiſſuris, β) tota mollis, lubrica, nunc lenticulae magnitudine, nunc pollicem longa, albida, ſubgriſea vel rubicunda; lineis longitudinalibus albo punctatis.*

gigantea. 13. A. cinereo vireſcens, limbo plicato corpore multoties latiore, tentaculis papillaeformibus vireſcentibus.

Forsk. fn. ar. aegypt. p. 100. *n.* 8. Priapus giganteus.

Habitat in mari rubro *ad littora vadoſa* Lohajae *et* Moccae, *in coeno ſabuloſo ſe recondens,* 4 *pollices longa, tentaculis apice violaceis.*

alba. 14. A. gelatinoſa albido-hyalina, tentaculis parvis papilliformibus oblongis.

Forsk. fn. aeg. arab. p. 101. *n.* 9. Priapus albus.

Habitat in mari rubro, *lapidibus littoreis adhaerens, vix pollicis diametro, vittis longitudinalibus obſcuris.*

viridis. 15. A. fuſco virens, tentaculis diametri longitudine.

Forsk. fn. aeg. arab. p. 102. *n.* 11. Priapus viridis.

Habitat Alexandriae *in* Aegypto, *lapidibus ſubmarinis inſidens, pollicis diametro, tentaculorum ſerie multiplici; ſub his glandulae marginales.*

Priapus. 16. A. corpore cylindrico baſi dilatato, tentaculis maculatis.

Forsk. fn. aeg. ar. p. 102. *n.* 12. Priapus Polypus.

Habitat in mari rubro *prope urbem* Ghomfoda, *teſtaceis adhaerens, albida fuſco nebuloſa, ad* 2 *pollices longa, circulo circa os rubro, tentaculis diametro triplo brevioribus, exterioribus rufeſcentibus, interioribus flavis.*

candida. 17. A. laevis foramine rugoſo, tentaculis ſetiformibus flexuoſis ad ſummum marginem diſpoſitis. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 58. *t.* 115. *prodr. n.* 2798.
Habitat in Oceano ſeptentrionali.

bicornis. 18. A. hemiſphaerico-ovalis glabra bicornis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2800.
Olaff. it. isl. p. 900.
Habitat in Oceano ſeptentrionali.

Volva. 19. A. corpore cylindrico ſuperne plano, appendicibus orificii ſex. *Müll. zool. dan. prodr.* 2801.
Olaff. it. isl. 900. Gigarpuſſa.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *an hujus generis?*

Caryophyllus. 20. A. rubro fuſca, tentaculis parvis penicilliformibus. *Martin in marine verm.* 1. *p.* 1. *t.* 1. *f.* 1.
Habitat in mari britannico.

Iris. 21. A. corpore tentaculisque obtuſis cylindricis: exterioribus rufis; interioribus caeruleis, centro albido. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 3. *t.* 82. *f.* 5. 6.
Habitat in Oceano norwegico.

Fiſcella. 22. A. rugis longitudinalibus transverſim ſtriatis, tentaculis cylindricis obtuſis annulatis. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 13. *t.* 88. *f.* 3.
Habitat in mari norwegico.

puſilla. 23. A. elliptica laevis, radiis duplicis ordinis; exterioribus apice nigris. *Ol. Swarts n. act. Stockh.* 1788. 3. *n.* 7. *t.* 6. *f.* 2.
Habitat in Oceano 57. *latitudinis, piſi majoris magnitudine, cataceorum pabulum.*

MAMMARIA. *Corpus* laeve cirris nullis: apertura unica.

Mammilla. 1. M. conico ventricoſa alba. *Müll. zool. dan. prodr.* 2718.
Habitat in mari norwegico.

varia. 2. M. ovata, albo et purpureo varia. *Müll. zool. dan. prodr.* 2719.
Olaff. it. isl. 900. Saettu Koppar i Sae.
Habitat in Oceano ſeptentrionali.

Globulus. 3. M. globoſa cinerea libera. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 329. *n.* 315.
Habitat frequens in Groenlandiae *littore inter radices fucorum, terebellae cirratae cibus praecipuus, ſimpliciſſima, mollis, laevis, ſesquilineae diametro, gelatinoſa, cute tenuiſſima.*

PEDICELLARIA. *Corpus* molle pedunculatum: pedunculo rigido fixo, apertura unica.

globifera. 1. P. capite ſphaerico, collo nullo. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 52. *t.* 16. *f.* 1-5. *prodr.* 2782. *rar.* 1. *p.* 32.
Habitat inter echini Droebacenſis aculeos, *mucorem referens, capite rubeſcente, ceraſi facie, pedunculo ſpadiceo ſextuplo longiore: cute gelatinoſa hyalina.*

triphylla. 2. P. capite trilobo: lobis ſubquadrangularibus muticis, collo tereti. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 54. *n.* 20. *t.* 16. *f.* 6-9. *prodr.* 2781. *rar.* 1. *p.* 33.
Habitat rarior in echini Droebacenſis *aculeis, collo flexuoſo cyaneo, capitis lobis rubentibus aut hyalinis, interdum ovatis, pedunculo ſpadiceo.*

tridens. 3. P. capite trilobo; lobis ovalibus ariſtatis, collo tereti. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 54. *n.* 21. *t.* 16. *f.* 10-15.
Habitat frequens inter echinorum Droebacenſium *aculeos, collo laevi, hyalino, interdum rubente, lobis capitis interdum* 4, *collo triplo longioribus, rariſſime muticis: Pedunculus rubeſcens, collo triplo longior.*

289. TETHYS. *Corpus* liberum, oblongiuſculum, carnoſum, pedunculis nullis. *Os* proboſcide terminali cylindrica, ſub labio explicato. *Foramina* duo ad latus colli ſiniſtrum.

leporina. 1. T. labro ciliato.
Column. aquat. 27. *t.* 26. Lepus marinus major.
Rondel. piſc. 526. Leporis marini tertia ſpecies.
Habitat in mari mediterraneo.

2. T.

Fimbrica. 2. T. labro crenulato.
Bohadſch mar. 54. *t.* 5. *f.* 1, 2. Fimbria.
Habitat in mari adriatico.

PTEROTRACHEA. *Corpus* liberum, gelatinoſum, pinna gelatinoſa mobili ad abdomen vel caudam. *Oculi* duo intra caput.

coronata. 1. Pt. ventre caudaque pinniferis, capitis proboſcide tereti perpendiculari, frontis coronula aculeis decem. *Forſk. Fn. aeg. ar. p.* 117. *n.* 41.
Habitat in mari mediterraneo *et* archipelago, *ſpithamae fere longitudine, pollicis craſſitie, proboſcide* 2 *fere pollices longa, oculis ovalibus fuſcis, cauda verticali triangulari: lineis utrinque* 4 *aculeatis ſcabra, pinnula utrinque horizontali ſemicordata terminata, ventris pinna pone medium, orbiculari, et altera ſubtus in margine campanulata, hyalina.*

hyalina. 2. Pt. capite elongato porrecto laevi, pinnula centrali. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 118. *n.* 42.
Habitat in mari - - - *celerrime mota, vix pollicem longa, oculis fuſcis internis ad baſin capitis non coronati, pinnula ſubrotunda.*

pulmonata. 3. Pt. capite obtuſo hyalino, inteſtino reſpiratorio plumis ciliato. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 118. *n.* 43.
Habitat - - - - *ſubcylindrica, hyalino-rufeſcens, capite a trunco non diſtincto, oculis pellucidis, transverſis, ovalibus, nigris, trunco ſubtus punctis albidis opacis vario: pinna ſubrotunda longitudinali, inteſtino reſpiratorio ante ſubalbido, pone rufeſcente, inſinuato membro violaceo baſi fuſco, cauda hyalina, compreſſa, attenuata, dimidium pollicem longa.*

aculeata. 4. Pt. ventre aptero, cauda trunco longiore: lineis aculeatis pinnaque terminali horizontali. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 118. *n.* 44.
Habitat ad Archipelagi *ingreſſum*, 2½ *pollices longa, hyalina, nucleo opaco flaveſcente gelatina alba pellucida circumdato, cauda trunco plus duplo longiori enſiformi: pinna duplici ſemicordata.*

290. HOLOTHURIA. *Corpus* liberum craſſum, cylindricum.

Os anticum inter tentacula ramoſa.

elegans. 10. H. tentaculis viginti racemoſis, corpore papilloſo ſupra rubeſcente, ſubtus albo. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 1. *t.* 1. *f.* 1-3. *prodr.* 2804. *rar.* 1. *p.* 3.
Stroem. ſondm. 1. *p.* 205.
Gunn. act. Stockh. 1767. *t.* 4. *f.* 3.
Habitat in mari norwegico, *aquam ſiphonis inſtar extrudens, ex foramine minori,* 8-11 *pollices longa, ex rubro alboque varia, papillis acuminato diſtantibus, dorſi in* 6 *ſeries digeſtis, tentaculis carnoſis albis, apice faſciculo fibrarum intus noduloſarum inſtructis.*

frondoſa. 1. H. tentaculis frondoſis, corpore laevi. O. *Fabr. Fn. groenl. p.* 353. *n.* 344.
Gunner act. Stockh. 1767.
Habitat in Oceano norwegico, *ovato oblonga, tentaculis* 10. *capite longioribus, foraminibus pone caput* 3 *approximatis et* 1 *laterali magis remoto.*

Phantapus. 2. H. tentaculis ramoſis, corpore poſterius attenuato ſubtus punctis ſcabro. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 54. *t.* 112. 113. *prodr.* 2804.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1089. *n.* 2. Holothuria tentaculis ramoſis, corpore ſubſquamoſo trifariam punctato.
Aldr. zooph. p. 590. Pudendum miſſum a Sittardo, Epipetrum quorundam.
Geſn. Fiſchb. 2. *p.* 24. Pudendi marini alia ſpecies.
Act. Stockh. 1765. *p.* 265. *t.* 10.
Habitat in mari Norwegico *et* mediterraneo, *ovata, ſubtus plana, poſterius conica, apice perforato, tentaculis* 10 *retractilibus.*

tubuloſa. 3. H. tentaculis viginti racemoſis, corpore ſupra papilloſo, ſubtus tubuloſo.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1090. *n.* 3. Holothuria (tremula) tentaculis faſciculatis, corpore papillis hinc ſubconicis illinc cylindricis.
Rond. zooph. c. 17. *Aldr. zooph. p.* 508. Holothurii prima ſpecies.

Jonſt.

Jonſt. exang. p. 56. *c.* 2. *t.* 19. *f.* 1. *et p.* 57. *c.* 4. Holothurius Rondeletii.

Aldr. zooph. p. 590. Epipetro zoographi ſimile, *et p.* 589. Genitale.

Bell. aq. p. 441. Genitale marinum.

Column. aq. 16. Pudendum regale piſcatorium.

Planc. conch. min. not. 108. *t.* 8. *f.* A. B. *et Vandell. diſſ. p.* 89. *t* 3. *f.* 1-3. Mentula marina.

Bohadſch anim. mar. p. 75. *t.* 6. *et t.* 7. *f.* 1-5. Hydra.

Forsk. Fn. aegypt. ar. t. 39. *f.* A. Fiſtularia.

Geſn. Fiſchb. anh. 4. *p.* 82.

Habitat in mari mediterraneo *et* adriatico, *an haec, quae teſte Ill.* Pallas *ſiccata Sinenſibus in cibum cedit?*

Phyſalis. 4. H. cirris difformibus filiformibus pendulis. *Amoen. acad.* 4. *p.* 254. *t.* 3. *f.* 6.

Rumpf muſ. 49? Holothuria.

Sloan. jam. 1. *p.* 7. *t.* 4. *f.* 5. Urtica marina ſoluta purpurea oblonga, cirris longiſſimis.

Brown. jam. 386. Arethuſa criſta ſubrubella venoſa.

Osb. it. 284. *t.* 12. *f.* 1. Phyſalis pelagica.

Habitat in pelago, mari atlantico, *ovata, ſubtrigona, hyalina, dorſo acuto obſcure viridi, anterius rufeſcens;* roſtrum *ſpirāle rufeſcens;* tentacula *plurima inaequalia, alia teretia, craſſiora breviora, alia media capillaria: apice luteo globoſo, alia longiora filiformia.*

Thalia. 5. H. criſta compreſſa: lineis lateralibus integris.

Brown. jam. 384. *t.* 43. *f.* 3. Thalia oblonga, criſta perpendiculari compreſſa quadrata: lineis lateralibus integris.

Habitat in pelago americano; *an hujus generis?*

caudata. 6. H. caudata, criſta compreſſa: lineis lateralibus interruptis.

Brown jam. 384. *t.* 43. *f.* 4. Thalia oblonga caudata, criſta depreſſa rotundata: lineis lateralibus interruptis.

Habitat in pelago; *an hujus generis?*

denudata. 7. H. deſtituta criſta caudaque.

Brown. jam. 384. Thalia oblonga lineis interruptis, cauda et criſta deſtituta.

Piſ. braſ. 296. Moucicou.

Habitat in pelago americano; *an hujus generis?*

pentacta. 8. H. tentaculis denis, corpore quinquefariam verrucoſo. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 110. *n.* 50. *t.* 31. *et* 3. *p.* 45. *t.* 108. *f.* 1-4.

 prodr.

prodr. 2806. *var.* 1. *p.* 71. O. *Fabr. Fn. groenl. p.* 352. *n.* 343.

Plin. hiſt. nat. l. 9. *c.* 2. *Rondel. piſc.* 2. *c.* 25. *Aldrov. zooph. p.* 593. *Geſn. Fiſchb. anh.* 4. *p.* 85. *Johnſt. exang. c.* 5. *t.* 20. Cucumis marinus.

Vandell. diſſ. p. 87. *t.* 2. *f.* 12. Cucumer marinus.

Planc. conch. min. not. p. 99. *t.* 6. *f.* D. E. F. *Comm. Bonon.* V. *p.* 242. *t.* 2. *f.* 1-3. Echinus coriaceus ad os fimbriatus.

Hill hiſt. an. t. 5. Aphrodita qua ta.

Olaff. it. isl. 2. *p.* 900. Brimbatus.

Penn. act. angl. 1761. *p.* 75. *t.* 1. *f.* 3. A. B. Hydra coralliflora, tentaculis retractilibus frondoſis.

Dicquemar. journ. de phyſ. Oct. 1778. *p.* 287. *t.* 11. *f.* 1-6. Fleurilarde.

Habitat in mari europaeo *omni, ad* 6 *usque pollices longa, in fundo maris decurrens, et longe a littoribus natans, vivipara, laevis, ex viridi brunnea, tentaculis apice rubicundis, cute craſſa.*

papilloſa. 24. H. tentaculis decem frondoſis, corpore ovato undique papilloſo. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 47. *t.* 108. *f.* 5.

Habitat in ſinubus inſularum Faeroe.

Spallanzani. 25. H. tentaculis 96 filamentoſis. *Spallanzan. act. ſoc. ital.* 2.

Habitat in mari mediterraneo.

Priapus. 9. H. ore papillis carnoſis, corpore ſtriis annularibus glandis longitudinalibus. O. *Fabr. Fn. groenl. p.* 355. *n.* 347.

Amoen. acad. 4. *p.* 255. Priapus (humanus) cylindricus ſtriis annularibus, glande ſtriis longitudinalibus elevatis.

Müll. zool. dan. 3. *p.* 27. *t.* 96. *f.* 1. *prodr. n.* 2807.

Abildg. Schr. berl. Naturf. 9. *p.* 133. *t.* 3. *f.* 1.

Habitat in Oceano indico *et* ſeptentrionali, mari *quoque* mediterraneo, *ad* 6 *pollices longa, cotti gobionis eſca:* Pars *dimidia cylindrica ſtriis numeroſiſſimis annularibus exarata oſculo terminatur, ſtriis* 3 *rugoſis cincto, et faſciculum tentaculorum oblongum protrudente, altera obovata glandiformis ſtriis* 24 *longitudinalibus, parallelis, elevatis, diſtantibus, ciliato-ſcabris exarata, oſculo concavo ſtria*

Holothuriae *omnes maris incolae per aperturam anteriorem nutrimentum hauriunt, et faeces expellunt, per poſteriorem aquam ingreſſam ejiciunt, verum figuram non raro diu occultantes et tentaculis nunc emiſſis, nunc retractis mutantes, corpus quoque ipſum nunc expandendo, nunc contrahendo.*

ſtria annulari excavata cincto, intus aculeis plurimis recurvis: exterioribus majoribus. An hujus generis?

ſquamata. 11. H. tentaculis octonis ſubramoſis, corpore ſupra ſcabro, ſubtus molli. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 35. *n.* 10. *t.* 10. *f.* 1-3. *prodr.* 2810. *rar.* 1. *p.* 20. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 356. *n.* 348.

Nov. act. nat. Cur. 6. *p.* 54. Actinia ſquamata.

Pall. nov. act. Petrop. 2. *p.* 244. *t.* 7. *f.* 34-37. Aſcidia ſquamata.

Habitat in Norwegiae *ſinubus*, mari, Groenlandiam *et inſulas* Kurilas *alluente*, *ſaxis tenaciſſime adhaerens*, *variae magnitudinis.*

Penicillus. 12. H. tentaculis racemoſis octo, corpore oſſeo pentágono. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 36. *n.* 11. *t.* 10. *f.* 4. *prodr.* 2808. *rar.* 1. *p.* 21.

Habitat in Norwegiae *ſinus* Droebacenſis *fundo limoſo profundo*, *immobilis*, *ventricoſa*, *laevis alba*, *torque fuſco*, *ad margines nigro*, *annuloque pone tentacula carinata ex nigro flava*, *parallelo*, *pallido*, *granulato.*

Fuſus. 13. H. tentaculis denis, corpore fuſiformi tomentoſo. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 37. *n.* 12. *t.* 10. *f.* 5. 6. *prodr.* 2809. *rar.* 1. *p.* 22.

Habitat in Norwegiae *ſinus* Droebacenſis *limo profundo*, *cinerea*, *ſquamis minutis rugoſa*, *fibriſque breviſſimis obſita*, *corpus cavum cyathiforme protrudens*, *infra collo anguſto inſtructum*, *ſupra in orbiculum foramine medio nigro pertuſum dilatatum*, *tentaculis latere denticulatis.*

inhaerens. 14. H. tentaculis duodenis, corpore papilloſo ſexfariam lineato. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 109. *n.* 49. *t.* 31. *f.* 1-7. *prodr.* 2811. *rar.* 1. *p.* 70.

Forsk. Fn. aeg. arab. p. 121. *t.* 38. *f.* A. Fiſtularia (reciprocans) tentaculis lineari lanceolatis utrinque ramoſis.

Habitat in Norwegiae ſinuum *profundo*, *etiam in* mari rubro, *aliquando a* piſcibus *deglutita*, *papillis viſcoſis innumeris obſeſſa*, *quarum ope manui contingenti firmiſſime adhaeret*, *porrecta*, *pellucida*, *ſpadicea: faſciis albis*, *tentaculis carnoſis*, *lanceolatis*, *rubris*, *utrinque denticulatis.*

laevis. 15. H. elongata, tentaculis duodenis, corpore quinquefariam lineato punctatoque. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 353. *n.* 345.

Habitat

Habitat ad ſcopulos maris Groenlandiam *alluentis in fundo argilloſo, quem tranat, et in quem ſe condit, tentacula ſena alternatim exſerens, mollis, laevis, candida, pellucida,* 1-6 *pollices longa, tentaculis mollibus, albidis, apice octofidis.*

minuta. 16. H. oblonga, tentaculis duodenis, corpore quinquefariam papillato. O. *Fabr. Fn. groenl. p.* 354. *n.* 346.

Habitat ad littora Groenlandiae *in fundo arenoſo papillas extendendo lente incedens, laevi proxime affinis,* 4 *lineas longa, glabra, ſubmembranacea, albida, rarius ſubrubicunda, papillis ſingularum ſerierum denis, tentaculis flavicantibus apice ſexfidis.*

forcipata. 17. H. ventricoſa, fine utroque anguſtato conico: anteriore forcipato. O. *Fabr. Fn. groenl. p.* 357. *n.* 349.

Habitat in fundo maris Groenlandiam *alluentis argilloſo, a cotto ſcorpio ſaepe comeſta,* 5 *pollices longa, mollis, lubrica, cute tenui punctis innumeris parum eminentibus ſubaſpera, forcipis rigidae orichalceae cruribus curvis.*

zonaria. 18. H. oblonga depreſſa, vagina incarnata, ſacco ex albido hyalino, zonis quinque luteis vario. *Pall. ſpicil. zool.* 10. *p.* 26. *t.* 1. *f.* 17. A. B. C.

Habitat in mari, *inſulam* Antiguam *alluente, oris transverſi labiis extrinſecus prominulis hiantibus.*

vittata. 19. H. corpore molli laxo vittis albis fuſca punctatis vario, tentaculis lineari: lanceolatis ad latera dentatis.

Forsk. Fn. aegypt. arab. p. 121. *n.* 48.

Habitat in mari rubro *ad* Lohajam, *frequens inter zoſteras, papillis ſuis viſcoſis digito contrectanti firmiter adhaerens ſesquiſpithamalis, vittis* 5 *albis nigro punctatis, rarius interruptis, et fuſcis albo-guttatis alternatim anguſtis, tentaculis* 12, *medio fuſcis, ad latera pallidis.*

maxima. 20. H. corpore rigido ſubtetragono ſupra convexo ſubtus plano marginato albo; tentaculis filiformibus apice peltato-laciniatis.

Forsk. Fn. aegypt. arab. p. 121. *n.* 50. Fiſtularia maxima.

Habitat in maris rubri *littore, pedalis, dura, papillis ſcabra, tentaculis cinereo-hyalinis.*

impatiens. 21. H. corpore rigido cinereo, tentaculis viginti filiformibus: apice pebla ſubſeptemfida denticulata.

Forsk.

Forſk. Fn. aegypt. arab. p. 121. *n.* 51. Fiſtularia impatiens.
Habitat ad maris rubri *littora ſub lapidibus vel in poris ſpongiae officinalis, duriuſcula, cinerea, faſciis maculisque varia, verrucis hemiſphaericis approximatis medio albidis aſpera, tentaculis hyalinis, nigro-punctatis, obtuſe denticulatis.*

nuda. 22. H. orbicularis caerulea, criſta nulla, tentaculis diſci nudis, radii trifariam glandiferis.
Forsk. Fn. aegypt. arab. p. 103. *n.* 14. Holothuria denudata.
Habitat in mari mediterraneo *a* Maſſilia *ad* Moliten, *diametro digiti transverſi, paginae ſuperioris diſco albido ſtriis concentricis radiato, margine diſci limboque caeruleo, tentaculis filiformibus hyalino-caeruleſcentibus;* utrum propria *ſpecies* hujus *generis, an meduſa umbella?*

ſpirans. 23. H. ovalis caerulea oblique criſtata, ſubtus tentaculis diſci albis, radii longioribus nudis caeruleis. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 104. *n.* 15.
Habitat in mari mediterraneo, 2 *pollices longa, eſculenta, diu in aqua aſſervata aquam caeruleo colore inficiens, exuviis ſuis oniſcis et monoculis in habitaculum cedens, ſupra in umbonem albidum protuberans, criſta bipartita ſemiorbiculari, tentaculis filiformibus, mobiliſſimis;* utrum diſtincta hujus *generis ſpecies, an meduſa vetella?*

LOBARIA. *Corpus* ſupra convexum ſubtus planum, lobatum.

quadriloba. 1. L. cauda lobalata. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 30. *t.* 100. *f.* 1-5. *prodr.* 2741.
Aſcanius act. Stockh. 1772. 4. 5. *t.* 10. *f.* A. B. Philina quadripartita.
Habitat in mari ſeptentrionali.

292. TRITON. *Corpus* oblongum.
Os proboſcide involuta ſpirali.
Tentacula XII. bipartita, utrinque ſex: poſterioribus cheliferis.

littoreus. 1. Triton.
Habitat in rupium ſubmarinatum *foraminibus, in lepadibus obvius, tentaculorum articulatorum involutorum intro-* *ſu-*

ſum ciliatorum paribus ſex, poſterioribus tribus cheliferis, ad baſin tentaculorum os; inter extrema proboſci . Figura ſimilis v. act. angl. 50. v. 2. p. 847. t. 34. f. A. Leeuwenh. arcan. 465. f. 7.

293. LERNAEA. *Corpus* oblongum teretiuſculum nudum, tentaculis 2-3 teretibus brachia aemulantibus ſe affigens.

Ovaria bina, tanquam totidem caudae.

branchialis. 1. L. corpore tereti flexuoſo, ore laterali inter cornua tria ſubramoſa.

Müll. zool. dan. 3. *p.* 65. *t.* 118. *f.* 4. *prodr.* 2743. O. *Fabr. Fn. groenl. p.* 336. *n.* 325. Lernaea gadina.

Stroem. ſondm. 1. *p.* 209. *t.* 1. *f.* 18. Tokn trold.

β) Lernaea minor. *Koelreuter comm. ac. Theod. Palat.* 3. *p.* 57.

Habitat in Oceani ſeptentrionalis gadorum *branchiis, Groenlandis eſculenta, digiti minimi longitudine, cava, membranacea, anterius et poſterius eminens, ſordide alba, vel obſcure rubra, cauda ſulco perpendiculari terminata, collo longo tubulari filiformi, ovariis ex cirris 2 longis contortuplicatis.*

cyprinacea. 2. L. corpore obclavato, thorace cylindrico bifurco, tentaculis apice lunatis. *Fn. ſuec.* 2100. *t.* 2. *f.* 2100.*

Fn. ſuec. 1. *n.* 1282. *f.* 1282. Lernaea tentaculis quatuor, duobus apice lunatis.

Habitat in piſcinis *frequens ſupra corpus* cyprini caraſſii, *quod maculis rubris vulnerat.*

ſalmonea. 3. L. corpore obovato, thorace obcordato, brachiis duobus linearibus approximatis. *Fn. ſuec.* 2102.*

Müll. zool. dan. prodr. 2744. O. *Fabr. Fn. groenl. p.* 337. *n.* 327. Lernaea corpore obovato, thorace obcordato, brachiis duobus in orbiculum cartilagineum connatis.

Brander piſc. eumoënſ. 25. *t.* 1. *f.* 1.

Gisler act. Stockh. 1751. *p.* 185. *t.* 6. *f.* 1-5. Pediculus ſalmonis.

Habitat

Habitat in ſalmonum, *rarius in* gadi barbati *branchiis, congeneribus vividior, 6 lineas longa, pallida, mollis, capite parvo, oblongo convexiuſculo, labiis 2 horizontalibus; ſuperiori uncinis 2 mobilibus rigidis armato, inferiori breviori bifido, abdomine obovato latiori, ovariis candidioribus, teretibus, intus granulatis, magnitudine totius animalis.*

aſellina. 4. L. corpore lunato, thorace cordato. *Fn. ſuec.* 2101. *It. wgoth.* 171. *t.* 3. *f.* 4. Lernaea, cauda duplici tereti.
Habitat in Oceani ſeptentrionalis gadi *branchiis.*

huchonis. 5. L. corpore nodoſo, tentaculis duobus, ovario duplici poſterius adnato. *Schranck it. bavar. p.* 99. *t.* 2. *f.* A-D.
Habitat in ſalmonis huchonis branchiis *frequens, ſalmoneae affinis, candidiſſima, ſubcartilaginea.*

clavata. 6. L. corpore cylindrico ſubſinuato triplicato infra apicem roſtri. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 119. *n.* 54. *t.* 33. *f.* 1. *prodr.* 2853. *rar.* 1. *p.* 75.
Habitat in percae norwegicae *pinnis, branchiis, ore, oculis, candida, pellucida, lineis rubris picta, collo anguſto, flaveſcente, apice acuminato, incurvo, nodoſo, ovariis tubuloſis: ovis extrinſecus adhaerentibus.*

uncinata. 7. L. corpore ſubcordato, roſtro ſimplici curvo, ore terminali. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 120. *n.* 55. *t.* 33. *f.* 2. *prodr.* 2745. *rar.* 1. *p.* 76. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 338. *n.* 328.
Habitat in maris Groenlandiam *alluentis* gad[illegible]um *variorum pinnis et branchiis, mollis, pallida, dorſi medii ſulco longitudinali, ovariis rotundis, apicem verſus incraſſatis.*

gobina. 8. L. corpore rhomboidali, brachiis duobus anterioribus totidemque poſterioribus nodoſis, cornubus duobus arietinis. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 121. *t.* 33. *f.* 3. *prodr.* 2747. *rar.* 1. *p.* 77. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 339. *n.* 329.
Habitat in cotti gobionis *branchiis, 7 lineas longa, ex albo caeruleſcens, inteſtino ſuperne translucente obſcuro, depreſſa, ſubtus ſubconcava, oris inter cornua 2 curvata intermedii labiis 3, ano bifido, ovariis ſpiralibus, tereti ſubulatis.*

9. L.

Lernaeae, *oculis carentes piſcibus infeſtae, quorum ſanguinem ſugunt, in pinnis potiſſimum et branchiis fixae, oreque ſuo, corpore perpendiculari erecto, ovariis rigidis protenſis immobiliter et tenaciſſime adhaerentes.*

radiata. 9. L. corpore quadrato depreſſo, brachiis utrinque tribus, cornubus quatuor rectis. *Müll. zool dan.* 1. *p.* 122. *n.* 57. *t.* 33. *f.* 4. *prodr.* 2748. *rar.* 1. *p.* 78. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 340. *n.* 330.

Habitat in coryphaenae rupeſtris *oris angulis, rarior, lernaeae ab* Ariſtotele *et* Rondeletio *in* thynno *obſervatae proxima,* 11 *lineas longa, ſordide alba vel cinerea, tuberibus ſolidioribus lacteis inaequalis, ad latera crenata, capite depreſſiuſculo rotundato, ſubtus convexiori, papillis crebris minutis inaequali.*

nodoſa. 10. L. corpore quadrato tuberculato, brachiis ſubtus breviſſimis utrinque duobus. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 123. *n.* 58. *t.* 33. *f.* 5. *prodr.* 2749. *rar.* 1. *p.* 79. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 341. *n.* 331.

Habitat in percae norwegicae rictu, *radiata minor, mollis, dilute cinerea, ſupra convexa, ſubtus concava, medio dorſo tuberculis* 4 *duris lacteis inaequali, dentibus utrinque* 5 *pariter lacteis, capite rotundato, per ſtriam mediam candidam bipartito.*

cornuta. 11. L. corpore oblongo, brachiis quatuor rectis emarginatis, capite ſubovato. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 124. *n.* 59. *t.* 33. *f.* 6. *prodr.* 2750. *rar.* 1. *p.* 80.

Habitat in pleuronectis Plateſſa *et* Linguatula, *cute pellucida circumdata, verticis mucronibus, frontis cornubus* 2, *his dente ſolitario armatis, oris palpis* 2, *ovariis fuſcis: ovis ſpadiceis.* Zoega.

pectoralis. 12. L. capite orbiculato hemiſphaerico, abdominis obcordati papilla terminali truncata. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 125. *n.* 60. *t.* 33. *f.* 7. *prodr.* 2751. *rar.* 1. *p.* 81.

Habitat in pleuronectarum *et* aeglefini *pinnis, potiſſimum pectoralibus, monoculo piſcino ſimilis, alba, diaphana, punctis pullis adſperſa, verticis mucronibus* 2 *falciformibus, roſtro conico truncato: cornibus* 4 *minutis, mucronibus* 2 *breviſſimis, et prope mucronem* 3 *conicum papis* 2, *brachiis* 2 *non curvatis, ovariis anguſtioribus, ſubannulatis diametri aequalis.*

lotae. 13. L. ovariis quaternis inaequalibus. *Hermann Naturf.* 19. *p.* 44. *t.* 2. *f.* 6.

Habitat in gadi lotae *branchiis, oris uncinulis* 2, *appendicibus cruciatis* 4. Zujeſ.

14. L.

cyclopterina. 14. L. corpore tereti flexuoſo, orificio duplici in medio roſtri cornibus tribus tripartitis terminati. *Müll. zool. dan. prodr.* 2745. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 337. *n.* 326.

β) Lernaea minor, ovariis vireſcentibus. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 337.

Habitat in cyclopteri ſpinoſi, β) *in* liparis branchiis, *branchiali affinis, cornu tamen tenui ſurſum verſo, apice integro, cauda anguſtiori: lobis utrinque* 2 *convexis, ovariis ſimplicibus ſpiralibus, in longitudinem* 5 *pollicum extenſilibus.*

pinnarum. 15. L. ruſa capite cylindrico anterius roſtrato, tentaculis duobus lunatis apice bifidis, brachio unico. *J. Chr. Fabr. it. norw. p.* 282. *n.* 3.

Habitat in gadi barbati *pinnis dorſalibus, depreſſa, carnoſa, dorſo canaliculato, brachio cylindrico dorſo antrorſum inſecto in canali recondendo, ovariis elongatis cylindricis.*

294. SCYLLAEA.

Corpus compreſſum: dorſo canaliculato.

Os foramine edentulo terminali.

Tentacula ſ. *Brachia* ſubtus trium parium.

pelagica. 1. Sc. fixa, tentaculis extremis ſimilibus, mediis papilloſis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1094. Scyllaea.
Muſ. Ad. Fr. 1. *p.* 56. Lepus pelagicus.
Osb. it. 306. Zoopterygius.
Seb. muſ. 1. *t.* 74. *f.* 1.

Habitat in pelagi fuco natante, *cui foſſula dorſi crenata affigitur, quieſcens, oblonga, dorſo retrorſum latiore obtuſo, tentaculis extremis minoribus rotundioribus, mediis foliaceis oblongis repandis, obtuſioribus.*

ghomfodenſis. 2. Sc. vaga, tentaculis primis nudis apice cavis, reliquis introrſum vittis ramoſis. *Forsk. Fn. aegypt. arab. p.* 103. *n.* 13.

Habitat parcius in mari rubro *inter* Ghomfodam *et* Djelan, *pollicaris, pellucida, flaveſcens: punctis ex fuſco ferrugineis, dorſo plano, ad margines fuſco punctato, ſerie media longitudinali punctorum caeruleorum, cauda compreſſa, dorſo in carinam rotundatam repandam margine fuſceſcentem anterius utrinque vittis ramoſis parvis conſpicu-*

ſpicuam elevato, abdomine caeruleo-punctato, utriusque lateris medio ſerie papillarum 5 albarum aſpero, tentaculis primis minoribus obovatis, reliquis contiguis margine denticulato repandis.

295. CLIO. *Corpus* vaginatum natans oblongum, brachiis duobus dilatatis membranaceis.

Tentacula tria praeter duo in ore.

caudata. 1. Cl. vagina compreſſa caudata.
Brown. jam. 386.
Habitat in Oceano.

pyramidata. 2. Cl. vagina triquetra pyramidata, ore oblique truncato.
Brown. jam. 386. *t.* 43. *f.* 1.
Habitat in Oceano.

retuſa. 3. Cl. bitentaculata, ore horizontali bidentato, cauda acuminata. O. *Fabr. Fn. groenl. p.* 334. *n.* 324. *nov. act. Havn.* 1.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1094. *n.* 3. *Müll. zool. dan. prodr.* 2742. Clio vagina triquetra, ore horizontali.
Brown. jam. 386.
Habitat in Oceano, *ſesquipollicem longa, gelatinoſa, pellucida, in aqua caeruleſcens, utroque fine coccineo, meduſarum ſocia, omni anni tempore obvia, brachiis ſ. alulis ſuis tanquam remis utens, anarhichae, cyclopteri, lari tridactyli frequens cibus, capite anguſtiore globoſo, ſulco longitudinali in 2 buccas diviſo; os terminale labio utrinque inſtructum dentibus 3 aperto ore ſtellatis armatum, interiori apertura alia dentibus 4 minoribus cruciatis munita, tentaculis ad os 2 mollioribus;* thorax *fere globoſus brachiis ſive alis ſubmembranaceis, gula fulva.*

borealis. 4. Cl. albida, capitis lobis papilla carnea acuminata terminatis, tentaculis tribus carnoſis conicis ori appoſitis. *Pall. ſpic. zool.* 10. *p.* 28. *t.* 1. *f.* 18. 19.
Habitat in mari hyperboreo, *mollis, balaenarum, ut fertur, eſca, cute ſcabriuſcula, capite ſubdidymo, ore bilabiato, tentaculis duobus minutis intra os, appendicibus foliaceis prope caput ſubtus quaternis, cauda vacua, depreſſa, acuta; an diſtincta a retuſa ſpecies?*

5. Cl.

helicina. 5. Cl. nuda, corpore ſpirali. *Phipps it. bor. p.* 195. *Martens Spitsb. p.* 141. *t.* Q. *f.* e. Snail ſlime-fiſh.
Habitat numeroſiſſima in Oceano boreali, *piſi magnitudine, alis ovatis, obtuſis, expanſis, corpore majoribus.*

limacina. 6. Cl. nuda, corpore obconico. *Phipps it. bor. p.* 195. *Mart. Spitsb. p.* 169 *t.* P. *f.* 5.
Habitat numeroſiſſima in mari boreali; *an diverſa a boreali? An hujus generis eſt vermis marinus, a de la* Martiniere *Journ. de phyſ.* 1787. *Nov. p.* 366. *deſcriptus et t.* 2. *f.* 15. 16. *delineatus?*

296. SEPIA. *Corpus* carnoſum: vagina excipiente pectus, ad cujus baſin tubus.

Brachia (praeter bina tentacula pedunculata in plerisque) octo interius adſperſa cirris verrucoſis.

Os inter brachia terminale, corneum.

octopus. 1. S. corpore ecaudato, tentaculis pedunculatis nullis. *Muſ. Ad. Fr.* 1. *p.* 94.* *Müll. zool. dan. prodr.* 2813. *Stroem. ſondm.* 1. *p.* 204. O. *Fabr. Fn. groenl. p.* 360. *n.* 351.
Haſſelq. act. Upſ. 1750. *p.* 33. Octopodia.
Jonſt. exang. 5. *t.* 1. *f.* 1. *Seb. muſ.* 3. *t.* 2. *f.* 1-6. *Koelreut. act. petrop.* 7. *p.* 321. *t.* 11. 12. Polypus.
Rond. piſc. 513. Polypus octopus.
Bell. aq. 330. *t.* 331.
Habitat in mari, *a* mediterraneo *et* rubro *ad* Groenlandiam *usque, cibo ex ſuo condimento, quod coctione addito nitro in rubrum vertitur appoſito* Liſter. *aliquando firmiſſime adhaerens corporibus, ut in humano inflammationem et dolores atroces excitet; brachiis baſi quaſi palmatis, verrucis ſeſſilibus alternis in* 2 *ſeries digeſtis, abdomine ovato, convexo molli, pinnis lateralibus nullis, aperto tantus effulſit ſplendor, ut remota veſpere candela totum palatium ardere videretur.* Bartholin. *act. Hafn.* 5. *obſ.* 109.

officinalis. 2. S. corpore ecaudato marginato, tentaculis duobus. *Muſ. Ad. Fr.* 1. *p.* 93. *Fn. ſuec.* 2106.
Amoen. acad. 1. *p.* 325.* Sepia.
Seb. muſ. 3. *t.* 3. *f.* 1-4. Sepia.

Geſn. aquat. 851.
Aldrov. exſang. 44.
Bellon. aquat. 336.
Rondel. aquat. 1. *p.* 498.
Olear. muſ. 97. *t.* 97.
Habitat in Oceano, *et* mari mediterraneo, *pleuronectae limandae, balaenarum frequens praeda, a congris quoque ejus brachia rodi, at, ſicut lacertis caudam, renaſci,* Plinius *refert hiſt. mund. l.* 9. *c.* 29. *Huic, quemadmodum ſequentibus, ſquama dorſalis oſſea, os ſepiae vulgo dicta, et atramentum, quo effuſo hoſti perſequenti ſe occultat, quo literae pingi, alia tingi poſſunt.*

unguiculata. 6. S. corpore ecaudato, brachiis unguiculatis. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 174.
Habitat in mari pacifico, Chili *alluente, rarior, ſapidiſſima, brachiis loco verrucarum unguiculis armatis in proprias vaginas retractilibus.*

hexapus. 7. S. corpore caudato quadri-vel quinquearticulato, brachiis ſex. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 175.
Habitat in mari pacifico, Chili *alluente, circiter ſemipedalis, digiti indicis craſſitie, capite difformi breviſſimo, brachiorum verrucis minimis, manum contrectantem per breve temporis ſpatium rigefaciens.*

media. 3. S. corpore depreſſo caudato ancipiti.
Rondel. piſc. 508. Loligo parva.
Habitat in Pelago, *officinali ſimilis, at latera membrana acuta non longitudinali, ſed ad dimidium modo affixa.*

Loligo. 4. S. corpore ſubcylindrico ſubulato, cauda ancipiti-rhombea, *Fn. ſuec.* 2107. *Osb. it.* 66.
Rondel. piſc. 506. *Stroem. ſondm.* 1. *p.* 173. Loligo.
Bellon. aquat. 339.
Seb. muſ. 3. *t.* 4. *f.* 1-4. *et t.* 3. *f.* 5. 6.
Olear. muſ. 44. *t.* 26. *f.* 2.
Needh. microſc. 1. *t.* 12.
Monro ſtruct. et phyſiol. piſc. n. 12.
Habitat in pelago, *media quaſi inter piſces et vermes, corde triplici, arteriis aorta et pulmonali valvula munitis, aqua infuſcata effuſo atramento, bilis ſpecie, ſe abſcondens, cauda tamen extra aquam exſiliente, oniſcis, cancris, meduſis victitans, phocarum et monodontis praeda, ad 9 pollices longa. Hujus ſquama dorſalis oſſea a* Seba *muſ.* 3. *p.* 40.

p. 40. *t.* 16. *f.* 9. *nomine* Pennae marinae maximae *delineata, et in Syſt. nat.* X. *p.* 108. *n.* 230. *inter pinnas relata eſt.* Pinna (pennacea) pellucida pennam referens.

Sepiola. 5. S. corpore poſterius alis duabus ſubrotundis. †
Jonſt. aquat. t. 1. *f.* 8. Sepiola.
Rondel. piſc. 519.
Habitat in mari mediterraneo, *parva.*

tunicata. 8. S. corpore toto tunicae nigrae pellucidae incluſo, poſterius alis duabus ſemicirularibus. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 174.
Habitat in mari pacifico, *regnum* Chilenſe *alluente, ſapidiſſima, magna, ut* 150 *libras aequare interdum pondere feratur.*

LUCERNARIA. *Corpus* gelatinoſum, rugoſum, ramoſum. *Os* inferum.

quadricornis. 1. L. corpore elongato tortili, brachiis quatuor dichotomis, apice tentaculatis. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 147. *n.* 72. *t.* 39. *f.* 1-6. *prodr.* 2754. *rar.* 1. *p.* 102. *Leske Naturg.* 1. *p.* 508. *t.* 10. *f.* 5.
Habitat in maris norwegici *fucis, hydris monoculisque minimis victitans, capite oculisque carens, aſteriis affinis, fuſca, pellucida, tetragona: angulis ſingulis in brachium exeuntibus, cujus ſinguli rami faſciculo* 30-40 *tentaculorum terminantur, cauda media flexuoſa in multas plicas compoſita, baſi incraſſata, ſenſim attenuata, apice obtuſa, tentaculorum inſtar extenſili, et in omnes partes mobili, ore albo cinereo-ſtriato quadridentato.*

phrygia. 2. L. corpore elongato papilloſo, brachiis numeroſis globiferis in hemiſphaeria deflexis, baſi byſſo fixa. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 343. *n.* 233.
Habitat in maris, Groenlandiam *alluentis profundo, locum vix, formam ſaepius mutans, hydris perquam affinis, ſemipollicaris, rubicunda, globulis papillisque albidioribus, collo erecto craſſo papillis innumeris exſertilibus obſito, ipſo exſertili, brachiis tenuibus, brevibus, implicatis.*

Auricula. 3. L. lagenam referens, collo tereti, extremitate ampliori: faſciculis octonis tentaculorum cincta. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 341. *n.* 332.

 Müll.

Müll. prodr. zool. dan. 2817. Holothuria lagenam referens, tentaculis octonis faſciculatis.
Habitat in maris Groenlandiam *alluentis profundo, ulvarum maximarum foliis pertinaciſſime adhaerens, raro locum mutans, oniſcis victitans, ad ſeſquipollicem usque longa, nigra aut rubicunda, rarius ex brunneo aurea nitens, lubrica, glaberrima, margine tuberculis* 8 *granulatis cincto, quae prolongata totidem faſciculos tentaculorum* 60 *et ultra nigrorum apice alborum referunt, ore albo.*

297. MEDUSA. *Corpus* gelatinoſum, orbiculatum, depreſſum. *Os* ſubtus centrale.

* *corpore coſtata: coſtis ciliatis,* Bercae Mülleri.

Infundibulum. 13. M. ovata, coſtis ciliatis novem. *Müll. prodr. zool. dan.* 2816. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 360. *n.* 352.
Forsk. Fn. aegypt. arab. p. 111. *n.* 29.
Syſt. nat. X. *p.* 660. Meduſa Beroë.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1324. *n.* 1. Volvox (Beroë) ovatus, angulis ciliatis novem.
Baſter opuſc. ſubſ. 3. *p.* 123. *t.* 14. *f.* 5. Meduſa ovata.
Brown. jam. 384. *t.* 43. *f.* 2. Beroë.
Mart. Spitsb. t. p. *f.* h.
Habitat in mari ſeptentrionali, rubro, mediterraneo.

Pileus. 14. M. globoſa, coſtis octo cirrisque duobus ciliatis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2817. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 360. *n.* 354.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1325. *n.* 2. Volvox (bicaudatus) octagonus, tentaculis duobus elongatis.
Gron. act. helv. 3. *p.* 36. Beroë corpore octagono tentaculis longiſſimis.
Baſt. opuſc. ſubſ. 3. *p.* 126. *t.* 14. *f.* 6. 7.
Mart. Spitzb. t. p. *f.* g.
Habitat in mari ſeptentrionali.

Cucumis. 15. M. oblonga, coſtis octo ciliatis, cirris nullis. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 361. *n.* 353.
Habitat in mari Groenlandiam *alluente, minus vivida, cilia coſtarum movendo tarde ingrediens, tacta in pomi figuram ſe contrahens, caeruleo intermiſto alba, punctis multis ſanguineis conſperſa, aperturis* 2 *terminalibus in cavitatem mediam oblongam coëuntibus.*

16. M.

Ovum. 16. M. ovata, coſtis ciliatis octo, cirrorumque duobus paribus: altero longiſſimo. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 362. *n.* 355.
Habitat in Groenlandiae *ſinubus, pileo affinis, ovi columbini, rarius anatini magnitudine oniſcis victitans, cyclopteri lumpi frequens praeda, ſatis vivida fragiliſſima: fragmentis adhuc vivis, caerulea.*

** *corpore laevi.*

Porpita. 1. M. ſupra plana ſubtus convexiuſcula ſulcata villoſa. *Amoen. acad.* 4. *p.* 255. *t.* 3. *f.* 7-9.
Muſ. Teſſin. 96. Meduſa parva figura porpitae.
Act. angl. 301. *p.* 2051. Animalcula ex Yvica maris mediterranei.
Habitat in India.

cruciata. 2. M. cruce alba. *Fn. ſuec.* 2110.*
Habitat in Oceano europaeo.

hyſocella. 3. M. convexa ſedecimradiata: ſubtus tentaculis quatuor unitis. *Baſt. op. ſubſ.* 2. *p.* 62. *t.* 7. *f.* 5?
Habitat in Luſitaniae Tago, *ſupra albeſcens, radiis ex punctis minimis e fuſco rufeſcentibus, ſubtus concava, tentaculis corpore longioribus lanceolatis rufeſcenti ſtriatis.* Vandelli.

aequorea. 4. M. planiuſcula, margine inflexo villoſo tentaculato. *Müll. prodr. zool. dan.* 2819. *Forsk. Fn. aegypt. arab. p.* 110. *n.* 28.
O. Fabr. Fn. groenl. p. 364. *n.* 357. Meduſa orbicularis planiuſcula, margine inflexo ciliato.
Baſt. opuſc. ſubſ. 2. *p.* 55. *t.* 5. *f.* 2. 3.
Habitat in pelago, *ſimpliciſſima, mollis, marginis ciliis albis.*

aurita. 5. M. cavitatibus ſubtus quatuor. *Fn. ſuec.* 2109.* *It. oel.* 160. *It. wgoth.* 172. *t.* 3. *f.* 2. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 76. 77. *rar.* 2. *p.* 109. *prodr.* 2820. *O. Fabr. Fn. gronl. p.* 363. *n.* 356.
Rondel. poiſſ. l. 17. *p.* 384. Sixieme eſpece d'ortie. *Aldrov.*

Meduſa *cyclopterorum aliorumque piſcium majorum aviumque pelagicarum cibus, noctu vagatur; vis pruritu (ſaepius) mordax; contrahit ſe rigens, ac praeternatante piſciculo frondem ſuam ſpargit, complectensque devorat; ora ei in radice eſſe, excrementa per ſumma reddi Plin.* IX. 45. *marginem alternatim contrahendo et expandendo progrediuntur; aquae fluviali immiſſae cito pereunt.*

Aldrov. zooph. l. 4. p. 574. f. inf. Urtica ſexta.
Kalm. it. 2. p. 109.
Loefl. it. 105.
Baſt. opuſc. ſubſ. 1. p. 123. t. 14. f. 3. 4. et 2. p. 58-60.
Merret pin. p. 195. t. 76. 77.
Stroem. ſondm. 1. p. 172. n. 2.
Habitat in mari balthico, Oceano, *hemiſphaerica, hyalina 2-4 pollicum diametro, piſciculis, et ſcorpiorum praeſertim pullis victitans, cavitatum corporisque marginibus ciliatis flavis.*

capillata. 6. M. convexa, margine ſedecies emarginato, ſubtus piloſa. *Fn. ſuec. 2108.* It. wgoth. 172. t. 3. f. 3. Müll. prodr. zool. dan. 2821. O. Fabr. Fn. groenl. p. 364. n. 358.*
Baſter op. ſubſ. 2. p. 60. t. 5. f. 1.
Stroem. ſondm. 1. p. 172. n. 1.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *congenerum maxima, diametri 8 pollicum, ut cyprini minuti ab aliis piſcibus agitati ſub hac aſylum reperiant, oniſcis victitans, marginis lobos flectendo progrediens, intus purpurea, ſupra laevis, cute tenuiſſima, annexis veſiculis materiem purpuream (an ova?) continentibus aucta.*

pilearis. 7. M. diſco capitato, limbo foraminibus octo, ſubtus fornicu- lato piloſa.
Habitat in Pelago.

marſupialis. 8. M. ſemiovata, margine tentaculis quatuor.
Planc. conch. rar. 41. t 4. f. 5. Urtica ſollata marſupium referens.
Habitat in mari mediterraneo.

hemiſphaerica. 9. M. hemiſphaerica, coſtis transverſalibus quatuor, tentaculis globulisque marginalibus, margine integro. *Müll. zool. dan. 1. p. 22. n. 5. t. 7. f. 1-5. prodr. 2822. rar. 1. p. 13.*
Gronov act. helv. 4. p. 38. t. 4. f. 7.
Habitat in Oceano belgico *et* norwegico, *hyalina, diametro 2 lineas aequans, marginem alternatim contrahendo et expandendo progrediens.*

pelagica. 10. M. hemiſphaerico-concava, margine crenato-incurvato, tentaculis octo. *Loefl. it. 105.* †
noctiluca. *β.* Meduſa depreſſa, verrucis punctisque brunneis, marginis tentaculis octo rubris. *Forsk. Fn. aeg. arab. p. 109. n. 24.*
Habitat in mari americano, atlantico, mediterraneo, *gregaria, magnisque ſaepe in glomeribus obvia, mare irradians, β) hya-*

β) hyalino rufeſcens, rarius ſubopaca punicea, diametro tripollicari, in aqua marina concuſſa mirifice ſcintillans.

brachiata. 11. M. margine brachiis novem: apicibus novem, extimo tentaculis novem. †
Habitat in pelago.

Velella. 12. M. ovalis concentrice ſtriata, margine ciliato, ſupra velo membranaceo.
Loefl. it. 104. Meduſa Velella ſ. Galera.
Brown. jam. 387. *t.* 48. *f.* 1. Pyllidoce labris caeruleis.
Imperat. nat. 912. *t.* 912. Velum marinum cotocis caerulei.
Col. ecphr. 20. *t.* 22. Urtica marina ſoluta.
Habitat in pelago, mari mediterraneo, atlantico, *centro prominulo, ſupra linea oblique tranſverſa, ſupra etiam membrana lineam dorſalem inferiorem ſecans, rigidula, latitudine corporis*

Pulmo. 17. M. hemiſphaerico-concava, margine fimbriato, ſubtus ſtriata, caudice quadri feneſtrato, brachiis octo. *Macri obſerv. del polm. mar. Nap.* 1778. *t.* 1.
Habitat in mari tyrrheno, *hyalina dura, tenax, nitida, caeruleſcens brachiis magnis, aequalibus, ſubcylindricis, poſterius criſpis, in corpore magna oblonga, craſſa, laevia, tandemque in plana tria membranacea acuta terminatis, appendicibus* 16 *ſubtrigonis, anterius bifidis, reſciſſa membra redintegrans.*

tyrrhena. 18. M. convexa, margine crenato: filis longiſſimis, ſubtus tentaculis quatuor. *Macri obſerv. del polm. mar. p.* 19.
Habitat in mari tyrrheno, *laevis, tenera, hyalina, rubro maculata,* 2 *uncias pondere aequans, cavitatibus ſubtus* 4, *ſingulis ſtria rubra notatis, an varietas auritae?*

tuberculata. 19. M. diſco prominulo, margine octies diviſo ſubtus-ſtriata, tuberculis octo. *Macri obſerv. del polm. mar. p.* 20.
Habitat in mari tyrrheno, *hyalina,* 2 *libras pondere aequans, ſubtus fulva fibris innumeris curvis, tuberibus ex albo caeruleis in duos truncos membrana pellucida, albicante apice flaccoſa caerulea aut lactea terminatos abeuntibus, pruritum contrectata nullum excitans.*

Utriculus. 20. M. utriculoſa, ſubtus centri tentaculo longiſſimo granuloſo, margine tentaculis numeroſis caeruleis apice flavicantibus.

bus. *de la Martiniere Journ. de phyſ. Nov.* 1787. *p.* 365. *t.* 2. *f.* 13. 14.

Habitat in pelago, *hyalina, marginis cirris circiter* 30.

Caravella. 21. M. ovata, ſubtus medio tentaculis longiſſimis, ſupra velo crenulato. *Müll. Beſch. der berl. Naturf.* 2. *p.* 190. *t.* 9. *f.* 2.

Sloan. jam. 1. *p.* 7. *t.* 4. 5. Urtica marina ſoluta purpurea oblonga, cirris longiſſimis.

Brown. jam. p. 287. Aretuſa criſta ſubrubella venoſa.

Habitat in mari atlantico, *pitnita ſua contrectantis manus inflammans, tenuis, laevis, nitens, caeruleſcens, hyalina utrinque attenuata, criſta per totam dorſi longitudinem excurrente, ſemilunata, compreſſa, ſulcis ramoſis exarata, venis roſeis picta, filis ſubtus cubitalibus articulatis, caeruleis, fragilibus: tubulis brevioribus intermiſtis.*

Umbella. 22. M. tentaculis diſci nudis, marginis glanduloſis. *Müll. Beſch. der berl. Naturf.* 2. *p.* 295. *t.* 9. *f.* 2. 3.

Habitat in mari mediterraneo *et* indico, *rigida, depreſſa, ſupra ſulcis radiatis, limbo membranaceo crenato, ſubtus in medio proboſcide quaſi clavata, tubulis brevibus clavatis cincta, tentaculis articulatis aequalis diametri, trifariam noduloſis.*

dimorpha. 23. M. dorſo eminente, ſubtus cruce minuta foraminibus quinque cincta, margine ciliato. *Müll. zool. dan. prodr.* 2823. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 365. *n.* 359.

Habitat in mari, *potiſſimum* ſeptentrionali, *aequorea paulo minor, expanſa orbicularis, margine inflexo quadrata, dorſo per radios ſulcatos in* 4 *areas diviſo, cruce centrali elata ciliisque albis, ſubtus concava.*

Campanula. 24. M. diſco gibbo, limbo ampliato ciliato, ſubtus cruce piloſa. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 366. *n.* 360.

Habitat in Groenlandiae *ſinubus, auctumno haud infrequens, oniſcos praedans, capillatae inſtar incedens, dimorphae magnitudine, conico-orbicularis, marginis crucisque ciliis flavis, his interdum albis, ſubtus cava, nivea.*

25. M.

An hujus etiam generis Meduſa palliata. *Bohadſch t.* 11. *f.* 1. *Stroem ſundm.* 1. *p.* 164. *balaenarum eſca; plures etiam in maribus auſtralibus viderunt ſpecies* Solander *et uterque* Forſterus, *ut videtur novas, nondum, quantum novi, amplius deſcriptas.*

Digitala. 25. M. hyalina ſubtus centro piſtillifero, margine ciliato. *Müll. prodr. zool. dan.* 2824. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 366. *n.* 361.
Habitat in mari, Groenlandiam *alluente, ſatis vivida, margine flexo in aquam ſaliens, minima, conica, ſtriata, ciliis introrſum hamatis flavis albisque, piſtillo in penicillum nunc flavum, nunc album terminato.*

frondoſa. 26. M. diſci margine maculis guttisque opacis albis vario, tentaculis octo dichotomis verrucis albis pedunculatis obſeſſis infloccos terminatis. *Pall. ſpicil. zool.* 10. *p.* 29. *t.* 2. *f.* 1-3.
Habitat in archipelago caribaeo, *volam implens, planiuſcula, ſupra convexior, limbo membranaceo faſciolis albis fimbriato, nucleo ſubtus villoſo, minoribus octogono, majoribus decagono.*

octopus. 27. M. marginis papillis ſemicircularibus, ſubtus cruce media, tentaculis octo, et foraminibus lunulatis intermediis. *Borl. corn. p.* 258. *t.* 25. *f.* 16. 17.
β) Urtica marina ex trunco octopedalis limbo imbricatim undante. *Borlaſ. cornw. p.* 257. *t.* 75. *f.* 15.
Habitat in Cornubiae *littore et* mari Belgium *inter et* Angliam *intermedio, magna, hyalina, interdum vireſcens, appendicibus ſubtus* 8, *quarum* 4 *ſcutiformes,* 4 *cordatae, ſulco intermedio, marginis papillis apice caeruleis.*

tetraſtyla. 28. M. hemiſphaerica, tentaculis nullis, tubulis marginalibus quatuor in priſma coadunatis. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 106. *n.* 17.
Habitat in mari rubro, *hyalina, rigidiuſcula, diametri ſeſquiſpithamalis, marginis tubulis linearibus, tripollicaribus rectis, planis.*

octoſtyla. 29. M. hemiſphaerica, marginis tentaculis nullis, ſubtus columna quadriplicata: apice lobis octo multifidis, laterumque appendicibus ſedecim. *Forsk. Fn. aegypt. arab. p. p.* 106. *n.* 18.
Habitat in mari rubro, *hyalino-caeruleſcens, diametri pedalis, columna ſubtus ſeſquipollicaris.*

Andromeda. 30. M. hemiſphaerica, marginis brachiis nullis, brachiis octo teretibus ramoſiſſimis inferius foliaceis. *Forsk. Fn. arab. p.* 107. *n.* 19.
Habitat copioſa in fundo littoris maris rubri *prope* Tor, *pulcerrima, ex hyalino fuſca, radiis albis margine integerrima,*

rima, centri cruce nigra, obſoleta, brachiis albis ad baſin penna anſerina craſſioribus.

Corona. 31. M. hemiſphaerica, marginis tentaculis nullis, ſubtus brachiis octo cultratis, infra utrinque dentatis. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 107. *n.* 20.
Habitat in mari rubro *ad* Saez *ex hyalino rufeſcens, diametri quadripollicaris, centri cruce caerulea, brachiis ſubtus latis apice bilobis.*

Perſea. 32. M. hemiſphaerica hyalina, intus annulo opaco albo quater interrupto, marginis tentaculis nullis. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 107. *n.* 21.
Habitat in mari mediterraneo, *diametri bipollicaris, margine longe prominente, brachiis* 4, *ſublanceolatis, fere pollicaribus, margine undulatis.*

Cephea. 33. M. hemiſphaerica tuberculata fuſco-rufeſcens, margine crenato, brachiis ſubtus octo lanatis. *Forsk. Fn. aegypt. arab. p.* 108. *n.* 22.
Habitat Djiddae *ad littus* maris rubri, *pellucida, radiis octo pallidioribus, brachiis hyalino fuſcis.*

proboſcidalis. 34. M. hemiſphaerica, ſubtus in medio proboſcide longa, marginis tentaculis ſex. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 108. *n.* 23.
Habitat in mari mediterraneo, *hyalina, diametri pollicum* 2½, *margine prominente aequali, proboſcide ſubflexili apice truncata, membrana plicata verſatili fimbriata.*

mollicina. 35. M. depreſſa, foraminibus lateralibus tentaculisque duodecim. *Forsk. fn. aeg. ar. p.* 109. *n.* 25.
Habitat in mari mediterraneo, *hyalina, diametri ſeſquipollicaris, marginis prominentis plicis* 12.

pileata. 36. M. ovato-campanulata ſuperne globo hyalino, intus nucleo rubro oblongo, marginis tentaculis numeroſis baſi flavis. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 110. *n.* 26.
Habitat in mari mediterraneo, *ſeſquipollicem alta, margine parum coarctato.*

crucigera. 37. M. hemiſphaerica, cruce rufeſcente corporis latitudine. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 110. *n.* 27.
Habitat - - - - ceraſi dimidii magnitudine, annulis ſupra 4 *minutiſſimis albis approximatis, margine tenui prominente, varie flexili ſaepe rufeſcente, tentaculis innumeris hyalinis, corporis ſemidiametro vix longioribus.*

38. M.

unguiculata. 38. M. orbicularis ſupra plana ſedecimradiata: margine crenato; unguibus ſedecim ſubincurvis. *Ol. Swarts. n. act. Stockh.* 1788. 3. *n.* 7. *t.* 6. *f.* 1.
Habitat ad Jamaicae *littora, diaphana, caeruleſcens, maculata, nucis moſchatae minoris magnitudine.*

PHYSSOPHORA. *Corpus* gelatinoſum e veſicula aërea pendens, membris gelatinoſis ad latera ſeſſilibus, tentaculis ſubtus plurimis.

hydroſtatica. 1. Ph. ovalis, veſiculis lateralibus trilobis plurimis extrorſum apertis, inteſtino medio tentaculisque quatuor majoribus rubris. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 119. *n.* 45.
Habitat in mari mediterraneo, *ſeſquipollicem longa, compreſſa veſiculae apice ſemper in aquae ſuperficie conſpicuo natans.*

roſacea. 2. Ph. orbicularis, foliolis oblongis horizontalibus veſicae affixis imbricata. *Forsk. Fn. aeg. ar. p.* 120. *n.* 46.
Habitat in mari mediterraneo, *hyalina, pollicis diametro, flori pleno deorſum inclinato ſimilis, veſica media obtuſa ovata rufeſcente: foliolis planis, obtuſis, curvis in denſas ſeries congeſtis tecta.*

filiformis. 3. Ph. membris lateralibus oblongis filiformibus dependentibus. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 120. *n.* 47.
Habitat in mari mediterraneo, *tenerrima, fili craſſitie, ad ſpithamam uſque longa, hyalina, capitulo ovato, obtuſo, ſeminis oryzae magnitudine.*

298.

Phyſſophorae *vix proprium conſtituere genus videntur, ad meduſas forte referendae.* Aſteriae *omnes ſupra macula alba, rugoſa, lapidea notatae, partes abſciſſas facile redintegrant, motu orbiculari jam dextrorſum jam ſiniſtrorſum incedunt, dorſo incumbentes radios flectunt, ut papillis fundo ſe affigant.*

298. ASTERIAS. *Corpus* depreſſum ſubtus ſulcatum: cruſta coriacea tentaculis muricata.
Os centrale quinquevalve

* *lunatae.*

nobilis. 17. A. granuloſa, margine pulvinato, diſco pulvilli glabro. *Müll. zool. dan. prodr.* 2826. Aſterias equeſtris.
Pontopp. norſk. Naturg. 2. *c.* 7. *p.* 291.
Habitat in mari Norwegico.

Pulvillus. 18. A. lubrica, margine integro mutico. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 64. *n.* 25. *t.* 19. *f.* 1. 2. *prodr.* 2827. *rar.* 1. *p.* 40.
Habitat rarior in Norwegiae ſinu Droebacenſi *ad inſulam* Kaholm, *ſupra convexa, cute laevi ſanguinea, hinc inde transverſim ſtriata marginem verſus mucronibus moll bus obtuſis, albis, ſeminis milii magnitudine, in* 10 *areas digeſtis obſeſſa, margine non articulato, at in angulis papillis acutis* 10 *et ultra aſpero, ſubtus concava, laevis, albida, roſeo tincta, ſulcis* 5 *utrinque baculis horizontalibus tectis exarata, aquam calidam ſpadiceo colore tingens.*

militaris. 19. A. undique granuloſa, margine pulvinato conſimili. *Müll. zool. dan. prodr.* 2828.
Habitat in mari Norwegico.

Luna. 1. A. integra orbicularis. *Amoen. acad.* 4. *p.* 256. *t.* 3. *f.* 14.
Habitat in India, *imperialis magnitudine, compreſſa; punctis eminentibus undique adſperſa.*

** *ſtellatae.*

papposa. 2. A. muricata, marginali ſerie penicillata. *Müll. zool. dan. prodr.* 2832.
O. Fabr. Fn. groenl. p. 369. *n.* 364.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1098. *n.* 2. Aſterias ſtellata, radiis XIII. undique muricata faſciculis.
Retzius nov. act. Stockh. 1783. *p.* 230. *n.* 4. Aſterias ſtellata, radiis tredecim, undique aculeata, aculeis ſubtus penicillatis ſupra pectinatis.
Jonſt. inſ. t. 26. *f.* 16. Stella marina.
Pontopp. norſk. Naturl. 2. *p.* 291. Soeſtierne.
Olaſſ. isl. 689.

Linck

Linck aſt. t. 32. *f.* 52. *et t.* 34. *f.* 54.
Cluſ. exot. 114.
Seb. muſ. 3. *t.* 8. *f.* 5.
Columm. ecphr. t. 38. *f.* A?
β) *Linck ſtell. mar. t.* 17. *f.* 28.
Habitat in Oceano europaeo *et* aſiatico, *ſupra ſubferruginea: diſco albo-maculato radiisque pallidioribus apice coccineis et interſtitiis albidis, ſubtus alba, papillis pallidioribus, diſco rubro tincto, interſtitiisque radiorum caeruleſcentibus, diametro ad 3 pollices et 9 lineas aequante, radiis utplurimum* 13, *interdum* 11, 12 *et* 15, *lanceolatis, ſupra parum convexis.*

ſpongioſa. 20. A. ſcabriuſcula, radiis ſemicylindricis obtuſis, margine mutico. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 368. *n.* 363.
Habitat rarior in profundo maris Groenlandiam *alluentis inter ulvas rubenti affinis, diametro 7 linearum, pallide rubicunda, verruca minutiſſima dorſi centrali ſanguinea, aculeis minutiſſimis confertis decumbentibus aſpera, radiis* 5: *margine inflexo.*

rubens. 3. A. laxa, radiis convexis: ſuperne ſpinulis ſolitariis ſeriatis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2830. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 367. *n.* 362.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1099. *n.* 3. *Muſ. Ad. Fr.* 1. *p.* 95. *Fn. ſuec.* 2111.* Aſterias ſtellata, radiis lanceolatis gibbis, undique aculeata.
It. wgoth. 172. Aſterias radiis quinis latiuſculis aſperis.
Pet. muſ. 6. *n.* 20. Aſteria.
Barr. rar. 130. *t.* 1288. Stella marina lacte rubens ſpinoſa.
Linck ſtell. mar. t. 7. *f.* 9. *t.* 9. 10. *f.* 19. *t.* 11. *f.* 15. *t.* 14. *f.* 23. *t.* 15. 16. *f.* 18. *t.* 30. *f.* 50. *t.* 34. *f.* 55. 58. *t.* 35. 36. *f.* 61. *t.* 37. *f.* 67. *t.* 40. *f.* 70. Stella marina.
Baſt. op. ſubſ. 3. *p.* 116. *t.* 2. *f.* 1-4.
Plot. oxfordſh. 85. *n.* 16. *t.* 2. *f.* 2. 3.
Olear. muſ. 55. *t.* 8. *f.* 4.
Seb. muſ. t. 5. *f.* 3. *et t.* 6. *f.* 3. 4.
Stroem. ſondm. 1. *p.* 178. *n.* 1.
Olaſſ. isl. 1005. a.
Jonſt. inſ. 26. *f.* 5?
β) *Baſt. op. ſubſ.* 3. *p.* 116. *t.* 12. *f.* 1-6.
Columm. aq. 5. *t.* 6.
γ) *Linck ſtell. mar. t.* 38. *f.* 69.

Habitat

Habitat frequens in Oceano, mari mediterraneo, *rarius pallida frequentius ſupra rufa, ſublutea, cinerea, nigra, rubra, violacea vel brunnea, ſubtus rubicunda vel flavicans, diametro ad 9 pollices aequante, radiis lanceolatis, ſubtus quadrifariam papilloſis, frequentiſſime 5, rarius 6 aut 4, tuberculis nunc nullis, nunc raris, nunc ſparſis, nunc in ſeries digeſtis, aculeis nunc nullis, nunc ſetis ſubtililioribus, nunc validis..*

Sepoſita. 21. A. radiis quinque teretibus ſubtus reticulatis, ſupra aculeatis: aculeis pectinatis. *Retz. nov. act. Stockh.* 1783. *p.* 229. *n.* 2.

Linck ſtell. mar. t. 4. *f.* 5. *t.* 9. *f.* 16. *t.* 30. *f.* 62.

Habitat ad Scaniae *littus, minuta.*

endeca. 22. A. radiis novem undique aculeatis: aculeis pectinatis. *Mant. p.* 543. *Retz. n. act. Stockh.* 1783. *p.* 229. *n.* 3.

Müll. prodr. zool. dan. 2855. Aſterias (aſpera) ſtellata aſpera, ſerie marginali pectinata.

Linck ſtell. mar. t. 14. *f.* 25. *t.* 15. 16. *f.* 26. *t.* 17. *f.* 27.

β) *Rumpf muſ. t.* 15. *f.* F.

Habitat in mari ſeptentrionali, *radiis* 5, 8, 10, *atplurimum* 9.

minuta. 4. A. margine pinnulis porrectis diſtantibus. *Müll. zool. dan. prodr.* 2835. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 370. *n.* 395.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1099. *n.* 4. *Fn. ſuec.* 2112.* Aſterias ſtellata obtuſa ciliata.

Seb. muſ. 3. *t.* 5. *f.* 14. 15.

Habitat frequens in mari norwegico *et* Groenlandiam *alluente, ochroleuca, utrinque plana, diametri vix* 2½ *linearum, radiis* 6.

glacialis. 5. A. radiis angulatis, angulis verrucoſo aculeatis. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 41. *rar.* 2. *p.* 3.

α) Aſterias radiata, radiis pentagonis: angulis verrucoſo-aculeatis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2838.

Aldr. inſ. p. 749. Stella pectinata tertia ſpinoſa tuberculis plurimis.

Linck ſtell. mar. p. 33. *t.* 38. *et* 39. *f.* 69. Sol echinatus cancellatus.

Linck ſtell. mar. p. 34. Pentadactylos aſter echinatus tuberculoſus.

β) Aſterias ſtellata, radiis heptagonis: angulis aculeatis. *Syſt. nat.* XII. *p.* 1099. *n.* 5. *Fn. ſuec.* 2113.

Habitat

Habitat in Oceano *ſeptentrionali, viva laete rufa albo undulata, rarius ex cinereo fuſca aut viridis, diſco ſupra tuberculis in circulum diſpoſitis aſpero, ſubtus cavo, radiis 5 craſſis lanceolatis, tentaculis innumeris pellucidis, utrinque ſerie pinnularum agilium ſtipatis.*

reticulata. 6. A. radiis reticulato-aculeatis.
Muſ. Teſſ. 114. *t.* 9. *f.* 1. Aſterias radiata, centro dorſali nodis 5 circumvallata.
Rondel. aq. 122. Stella reticulata.
Sloan. jam. 2. *p.* 272. Stella marina maxima reticulata.
Rumpf. muſ. t. 15. *f.* D.
Linck ſtell. mar. t. 23. *f.* 36. *et t.* 41. *f.* 72.
Seb. muſ. 3. *t.* 7. *f.* 1.
Habitat in mari indico.

phrygiana. 23. A. ubique papillis ſubtus roſaceis obſita. *Müll. zool. dan. prodr.* 2829.
Act. nidr. 4. *p.* 424. *t.* 14. *f.* 1. 2.
Stroem. ſondm. 1. *p.* 178. *n.* 2.
Habitat in mari norwegico, *an eadem cum reticulata?*

nodoſa. 7. A. radiis convexis longitudinaliter elevatis muricatis. *Muſ. Teſſin.* 114. *t.* 9. *f.* 2.
Grew. muſ. 123. *t.* 8. Stella marina coronalis.
Rumpf muſ. 39. *t.* 15. *f.* A. Stella marina quarta.
Linck ſtell. mar. t. 3. *f.* 3. *t.* 7. *f.* 8. *t.* 25. *f.* 40. *t.* 26. *f.* 41.
Seb. muſ. 3. *t.* 5. *f.* 7. 8. *t.* 6. *f.* 1. 2. 11. 12. *et t.* 7. *f.* 3.
Habitat in Oceano indico.

violacea. 24. A. laxa, ſuperficie griſeo-fuſca: tuberculis violaceis. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 46. *rar.* 2. *p.* 17.
Aldrov. inſ. 7. *p.* 753. Stella reticulata noſtra.
Laid. apud Linck ſtell. mar. p. 80. Echinaſtrum ſeu ſtella marina pentadactyla echinata.
Kade apud Linck ſtell. mar. p. 97. *f.* 1-9. Stella marina quinque radiorum holſatica coloris violacei.
Fn. ſuec. p. 512. Stella pentadactyla violacea.
Habitat in mari ſeptentrionali *et* mediterraneo, *jam tota ſuperficie, jam ſolis tuberculis violaceis, iique nunc in ſeries diſpoſitis, nunc ſine ordine ſparſis, diſco orbiculari, radiis 5 lanceolatis, apice rubicundis, trifariam tuberculatis, ſubtus in ſulco luteſcentibus.*

ſanguinolenta. 25. A. ſupra ſanguinea, radiis apice albis. *Müll. zool dan. prodr.* 2836.
Habitat in mari Norwegico.

perforata. 26. A. mutica, dorſo punctis pertuſa. *Müll. zool. dan, prodr.* 2834.
Habitat in mari Norwegico.

aranciaca. 8. A. diſco lato, radiis ſubdepreſſis, ſummo margine aculeato. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 3. *t.* 83. *f.* 1-3. *prodr.* 2031. *Act. nidr.* 4. *p.* 425. 426. *t.* 14. *f.* 3-6.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1100. *n.* 8. *Muſ. Lud. Ulr.* 719. *Muſ. Teſſ.* 114. *t.* 9. *f.* 3. Aſterias ſtellata, diſco tentaculis hiſpidis muricato, margine articulato varie aculeato.
Retz. nov. act. Stockh. 1783. *p.* 230. *n.* 5. Aſterias ſtellata, radiis quinque, ſubtus aculeis apice ſtellato-echinatis confertis, margine articulato aculeato.
Barr. ic. 1281.
Linck ſtell. mar. t. 4. *f.* 14. *t.* 5. 6. *f.* 6. *t.* 8. *f.* 12. *t.* 27. *f.* 44.
Seb. muſ. 3. *t.* 6. *f.* 5-8.
Habitat in mari mediterraneo *et* ſeptentrionali.

equeſtris. 9. A. diſco reticulato punctis pertuſo, tuberculis quinque, margine ſubarticulato, ſubtus ſimplici ſerie tentaculato.
Barr. ic. 1285.
Linck ſtell. mar. t. 6. *f.* 13. *t.* 12. *f.* 21. *t.* 13. *f.* 22. *t.* 23. *f.* 37. *t.* 24. *f.* 39. *t.* 27. *f.* 45. *t.* 33. *f.* 53.
Seb. muſ. 3. *t.* 8. *f.* 6. 8.
Habitat in mari mediterraneo, *ſubtus etiam diſco gaudens.*

laevigata. 10. A. radiis ſemicylindricis obtuſe octogenis muticis.
Rumpf. muſ. t. 15. *f.* E.
Grew. muſ. t. 8. *f.* 1. 2.
Linck ſtell. mar. t. 28. *f.* 47.
Habitat in mari mediterraneo *et* indico, *radiis tectis verrucis obſoletis, ad latera inter verrucas punctis excavatis, ſubtus verrucis in quincuncem diſpoſitis.*

membranacea. 27. A. pentagona utrinque tuberculis pectinato-aculeatis hiſpida, ſubtus coſtis quinque elevatis convexis. *Retz. nov. act. Stockh.* 1783. *p.* 230. *n.* 6.
Linck ſtell. mar. t. 1. *f.* 2.
Habitat in mari mediterraneo.

granularis. 28. A. pentagona inermis utrinque teſſellato-granulata, margine articulato. *Retz. nov. act. Stockh.* 1783. *p.* 231. *n.* 7.

Linck

Linck ſtell. mar. t. 13. *f.* 22. *t.* 23. *f.* 37? *t.* 24. *f.* 39? *t.* 27. *f.* 45.
Müll. zool. dan. 3. *p.* 19. *t.* 92. *f.* 1-4.
Habitat ad inſulam S. Crucis.

*** *radiatae.*

roſea. 29. A. aſpera, granulis reticulata, radiis teretibus. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 67. *rar.* 2. *p.* 76. *prodr.* 2838.
Seb. muſ. 3. *p.* 13. *t.* 7. *f.* 5. Stella marina vulgaris batava.
Habitat in mari belgico *et* norwegico, *elegans, ſupra laete roſea, rarius aurantia, areolarum punctis nigricantibus ſparſis, ſubtus albida: ſulcis dilatatis, tentaculorum ſerie quadruplici, pinnularum divergentium quintuplici, radiis ſummo apice albis.*

pertuſa. 30. A. ſcabra, radiis teretibus baſi anguſtatis gibbis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2839.
Habitat in mari Norwegico.

ophiura. 11. A. diſco ſquamoſo: ſquamula angulorum ſerrata. *Müll. zool. dan. podr.* 2840. *Act. Nidroſ.* 4. *p.* 54. *t.* 2. *f.* 15. 16. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 371. *n.* 366.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1100. *n.* 11. Aſterias radiata radiis quinque ſimplicibus, ſtella orbiculata quinqueloba.
Retz. nov. act. Stockh. 1783. *p.* 231. *n.* 8. Aſterias radiata, radiorum pectinibus appreſſis, diſco pentagono tunicato.
Sloan. jam. 2. *p.* 272. *t.* 244. *f.* 8. 9. Stella marina minor echinata purpurea.
Planc. conch. minot. 38. *t.* 4. *f.* 4.
Jonſt. inſ. t. 26. *f.* 7.
Stroem. ſondm. 1. *p.* 179. *n.* 4. 5.
Mart. Spitsb. t. P. *f.* D.
Linck ſtell. mar. t. 11. *f.* 17.
β) Aſterias radiis in morte diſſilientibus. *Olaff. isl. p.* 900.
Habitat in Oceano, *etiam maxime* ſeptentrionali, *inter minores hujus generis celerius incedit, rarior tota candida, ſed ſupra griſea, rubra vel violacea, aculeis* 4 *ſuperioribus cum apicibus ſtriisque transverſis albis, glabra, radiis* 5 *corpore orbiculari quadruplo longioribus, quadrangularibus, gracilibus, flexuoſis, ſquamarum ſerie ſimplici obtectis, divergentibus, ſolidis: In hac acri ſpecie certis anni temporibus a mytilo eduli frequentius comeſta probabilis cauſa funeſtorum effectuum, quos hujus uſus aliquando excitat, latet. v. de Beunie act. Bruxell.* 1. *n.* 8.

aculeata. 12. A. aculeis glabris, latitudine radii brevioribus. *Müll. zool. dan. prodr.* 2841.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1101. *n.* 12. Aſterias radiata, radiis quinque aculeatis.

Retz. nov. act. Stockh. 1783. *p.* 232. *n.* 10. Aſterias radiata, radiorum pectinibus divergentibus, diſco orbiculato ſquamato muricato.

Müll. zool. dan. 3. *p.* 29. *t.* 99. *f.* 1-3. *prodr.* 2841.

Linck ſtell. mar. t. 26. *f.* 42. *t.* 40. *f.* 71.

Habitat in Oceano, *colore ſummopere varians, orbicularis, ſubtus ſquamis minutis obtecta, quarum ſex corollam referunt.*

ciliaris. 13. A. ſpinis aſperis latitudine radii longioribus. *Müll. zool. dan. prodr.* 2842.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1101. *n.* 13. Aſterias radiata imbricata: radiis utrinque ciliatis.

Retz. nov. act. Stockh. 1783. *p.* 232. *n.* 9? Aſterias (ciliata) radiata, radiorum pectinibus patulis, diſco ſquamato laevi ſquamato.

Barr. rar. 131. *t.* 1295. *f.* 1. Stella marina minor ophiocnemos ſ. ophiurus.

Linck ſtell. mar. t. 34. *f.* 56. *t.* 37. *f.* 65. *t.* 40. *f.* 71.

Habitat in Oceano ſeptentrionali, auſtraliori *et* indico.

filiformis. 31. A. diſco ſquamoſo, aculeis latitudine radii aequalibus. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 59. *rar. p.* 55. *prodr.* 2843.

Habitat in Norwegiae *fundo argillaceo maritimo, gracillima, radiis flexuoſis fragilibus aliis corporibus adhaerens, orbicularis ſupra ex rufo fuſca margine nigricans, ſubtus nigra, quinqueloba, ſacculorum rubrorum ſerie ad baſin radiorum poſita; hi* 5, *ex luteo fuſci in fili tenuitatem abeuntes, diſco decuplo longiores, articulis ſingulis aculeis* 5 *puncto nigro et linea rubra notatis, et tentaculis* 2 *lateralibus inſtructis.*

tenella. 32. A. radiis duplicatis: ſuperioribus quinque bifidis pectinatis, inferioribus filiformibus: geniculis incraſſatis. *Retz. nov. act. Stockh.* 1783. *p.* 233. *n.* 11.

Habitat in mari *inſulam* S. Crucis *alluente, pectinata multo minor, alba, caudice radiorum longiore.*

pectinata. 14. A. radiis duplicatis: ſuperioribus quinque bifidis pectinatis: inferioribus filiformibus paucioribus: geniculis aequalibus, diſco ſupra laevi. *Retz. nov. act. Stockh.* 1783. *p.* 234. *n.* 12.

Syſt.

Syſt. nat. XI. 2. *p.* 1101. *n.* 14. *Amoen. acad.* 4. *p.* 256. Aſterias radiata, radiis duplicatis: ſuperioribus pinnatis, inferioribus filiformibus.
Barr. rar. t. 1282. *f.* 1. Stella marina decanemos fimbriata.
Columm. phytob. 109. *t.* 29. Stella marina altera.
Pet. gaz. t. 4. *f.* 6. Stella chinenſis perelegans dupliciter radiata.
Linck ſtell. mar. t. 37. *f.* 64. 66.
Seb. muſ. 3. *t.* 9. *f.* 3. 4.
Habitat in mari indico, *laevis, radiorum caudice vix conſpicuo.*

multiradiata. 15. A. radiis duplicatis: ſuperioribus decem palmato-ſubquadrifidis pectinatis; inferioribus filiformibus pluribus, diſco granulato. *Retz. nov. act. Stockh.* 1783. *p.* 234. *n.* 13.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1101. *n.* 15. Aſterias radiata, radiis palmato-multiplicatis pinnatis; inferioribus filiformibus.
Linck. ſtell. mar. t. 21. *f.* 33. *t.* 22. *f.* 34.
Habitat in mari indico.

Caput Meduſae. 16. A. radiis dichotomis, diſco radiisque granulatis, ore depreſſo. *Retz. nov. act. Stockh.* 1783. *p.* 234. *n.* 34.
Müll. zool. dan. prodr. 2844. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 372. *n.* 367. Aſterias radiata, radiis duplicatis dichotomis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1101. *n.* 16. *Fn. ſuec.* 2114. *Muſ. Ad. Fr.* 1. *p.* 95. Aſterias radiata radiis dichotomis.
Jonſt. inſ. t. 26. *f.* 11. Stella marina.
Pontopp. norſk. Naturh. 2. *p.* 292. *Stroem ſondm.* 1. *p.* 179. *n.* 6. Söe-Soel.
Martens Spitsb. t. P. *f.* E.
Linck. ſtell. mar. t. 18. *f.* 29. *t.* 19. *f.* 30. *t.* 20. *f.* 32.
Seb. muſ. 3. *t.* 9. *f.* 1. 2. *t.* 11. *f.* 1.
Knorr. delic. nat. ſel. t. G.
Thunb. nov. act. Stockh. 1783. *p.* 236.
Habitat in mari norwegico, mediterraneo, indico, aethiopico, ad caput bonae ſpei, *viridis aut rufa.*

Euryale. 33. A. radiis dichotomis, diſco papilloſo radiisque granulatis, ore ſubelevato. *Retz. nov. act. Stockh.* 1783. *p.* 235. *n.* 15.
Linck ſtell. mar. t. 29. *f.* 48. *t.* 30. *f.* 49.
Rumpf muſ 41. *I.* 16.
Habitat ad caput bonae ſpei, *fulva.*

oligaetes. 34. A. radiis longiſſimis ſimplicibus: articulis ſingulis baſi ſtilis binis mobilibus acutis. *Pallas nov. act. Petrop.* 2. *p.* 239. *t.* 6. *f.* 23. A. B.

 Habitat

Habitat ad Caraſſuo, *Gorgoniis adhaerens, pentagona, exigua, duriuſcula ochroleuca.*

nigra. 35. A. radiisque quinque articulatis ſuperne imbricatim ſquamatis: pectinibus lateralibus patulis diſco obtuſe pentagono granulato. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 20. *t.* 93. *f.* 1-4.

tricolor. 36. A. radiis quinque articulatis ad latera pectinatis: dentibus ſcabris, diſco hiſpido. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 28. *t.* 97. *f.* 1-5.
Habitat ad inſulam Foeroe.

fragilis. 37. A. diſco orbiculato muricato, dorſo ſpinoſo, radiis quinque articulatis ad latera pectinatis: dentibus, ſerrato-muricatis. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 28. *t.* 98. *f.* 1-3.
Habitat in mari norwegico *et* groenlandico.

299. ECHINUS. *Corpus* ſubrotundum, cruſta oſſea tectum, ſpinis mobilibus ſaepius aſpera. *Os* ſubtus, (ſaepius) quinquevolva.

* *ano verticali, tentaculis undique ſimplicibus,* Anocyſti Kleinii.

† *hemiſphaerici vel ſphaeroidales,* Cidares Kleinii.

eſculentus. 1. E. hemiſphaerico-globoſus ambulacris denis, areis obſolete verrucoſis. *Fn. ſuec.* 2116. *Muſ. Lud. Ulr.* 705.
Fn. ſuec. 1. 1289. Echinus ſubgloboſus vertice plano.
Rondel. piſc. l. 18. *c.* 32. *p.* 581. Echinometra.
Aldrov. aq. p. 405. 409. Echinometra.
Planc. conch. min. not p. 20. Melo marinus.
Gualt. ind. teſt. t. 107. *f.* B. E. Echinometra ſpinis denudata.
Phelſum Br. over de Zee-egelen. *p.* 28. *n.* 21. eetbare Zee-egel.
Klein echinoderm. ed. Lesk. p. 76. *t.* 38. *f.* 1. Cidaris miliaris.
Liſt. angl. 69. *t.* 3. *f.* 13. Echinus marinus aculeorum veſtigiis nonnihil eminentibus.
Rumpf muſ. 31. *t.* 13. *f.* B. C. Echinus eſculentus.
Seb. muſ. 3. *p.* 24. *t.* 11. *f.* 4. a. b. *et t.* 12. *f.* 1. 6. 8. 9.
Davila catal. p. 410. *n.* 926-928.

Argenv.

Argenv. conchyl. p. 307. *t.* 25. *f.* F.
Delic. nat. Select. t. D. *f.* 1. *t.* D. II. *f.* 1.

α) *Phelſ. ov. de Zee-egel. p.* 28. *n.* 11. Bontgeringde Zee-egel met korte gruppels.
Seb. muſ. 3. *t.* 10. *f.* 14.

β) *Phelſum. Zee-eg. p.* 28. *n.* 10. Bontgeringde Zee-egel met lange gruppels.
Seb. muſ. 3. *t.* 11. *f.* 6.

γ) *Phelſ. Zee-eg. p.* 28. *n.* 17. Kegelvormige Zee-egel.
Seb. muſ. 3. *t.* 11. *f.* 7.

δ) *Phelſ. Zee-egel. p.* 28. *n.* 14. Tienſtraalige Zee-egel.
Seb. muſ. 3. *t.* 11. *f.* 9.

ε) Echinus albus. *Molina hiſt. nat. Chil. p.* 175.

Habitat in Oceano europaeo *et* indico, mari mediterraneo, ε) *in* pacifico *ruber, coccineus, flaveſcens vel ſpadiceus* ε) *albus altitudinis interdum magis quam dodrantalis, verrucis ochroleucis, tuberculorum minorum circulo cinctis, ſpinis albidis, vel violaceis apice albis, ambulacris trifariam poroſis, ano membrana coriacea ſpinulis hiſpida clauſo.*

Sphaera. 18. E. ſubſphaericus ruber, ſpinis ſubcaeruleis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2845.
Pontopp. norſk. Naturh. 2. c. 7. *p.* 275.
Habitat in Oceano norwegico, *utrum ſatis diſtincta ab eſculento ſpecies, an ſardicus?*

Droebachienſis. 19. E. hemiſphaericus pallidus, ſpinis longis pallidis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2846.
Habitat in Norwegiae ſinu Droebachienſi.

miliaris. 20. E. hemiſphaerico-depreſſus, ambulacris denis, areis bifariam verrucoſis.
Klein echinod. ed. Lesk. p. 82. *t.* 2. A. C. D. *t.* 31. A. D. *t.* 38. *f.* 2. 3. Cidaris miliaris ſaxatilis.
Rondel. aquat. p. 578. *Geſn. aquat. p.* 416. *Aldrov. exanſ. l.* 3. *p.* 402. Echinus ovarius.

Sss sss sss 4 *Phelſ.*

Echini, *multi eſculenti, olim, petrefacti quoque, ad praecavendos et ſanandos morbos, nunc aliis, nunc aliis partibus potioribus habitis commendati, et adhibiti maris omnes incolae, quod ad teſtam attinet, inter petrificata frequentiſſimi inter molluſca et teſtacea ambigui, nervis gaudent, cerebro carent. Ideam ſculpturae diſtinctam formaturus computationem ejusdem inſtituat cum horto in areas ſive pulvillos diviſo, ambulacris diſtincto.*

Phelſ. ov. Zee-egel. p. 28. *n.* 23. 24. Frieſthe Zee-egel. et Klipegel platte.
Müll. zool. dan. prodr. 2847. O. *Fabr. Fn. groenl. p.* 372. *n.* 368. Echinus (ſaxatilis) hemiſphaerico-depreſſus vel orbicularis, ſpinis diverſicoloribus.
Sloan jam. 2. *p.* 268. *t.* 244. *f.* 1-3.
Rundm. rar. nat. et art. p. 97. *t.* V. *f.* 11.
Gualt. teſt. t. 107. *f.* G. H. I. L. N.
Davila catal. 1. *p.* 410. *n.* 928.
Seb. muſ. 3. *p.* 18. *t.* 10. *f.* 1-4. 12. *p.* 24. *t.* 11. *f.* 5-8. *p.* 25. *t.* 12. *f.* 1? 2. 7.
Delic. nat. ſel. 1. *p.* 94. *t.* D. II. *f.* 3. 4. 5. *et t.* D. III. *f.* 4.

Baſteri. β) E. teſta depreſſa: tuberculis rarioribus, linea media arearum argute ſerrata, poris ambulacrorum in ſeriebus alternis trium et duorum foraminum poſitis. *Leske op.*
Klein echinod. p. 87. *t.* 43. *f.* 3-5. *t.* 49. *f.* 1. 2.
Phelſum ov. de Zee-eg. p. 18. *n.* 16. Zee-Klit.
Baſt. op. ſubſ. 3. *p.* 112. *t.* 11. *f.* 2-8.
Reaum. act. par. 1712. *p.* 177. *t.* 8.
Gualt. teſt. t. 107. *f.* A.
Habitat frequens in Oceano europaeo, *teſta minore, vertice magis depreſſo, ambulacris anguſtioribus ab eſculento diſtinctus, nunc ex viridi cinereus, nunc ex olivaceo viridis, nunc ex violaceo ſubruber, areis majoribus tuberculorum minorum praeter interſperſa minima ſerie octuplici, minoribus majorum duplici minorumque ſimiliter duplici inaequalibus, ambulacris pororum duplicium ſerie triplici; ſpinis* 3-4 *lineas longis, ſtriatis, acutis vel obtuſis, albidis, violaceis, viridibus, vel ex olivaceo nigricantibus.*

hemiſphaericus. 21. E. hemiſphaerico depreſſus, ambulacris denis, arearum ſutura media ſerrata lineisque transverſis, ore pentagono; angulis obtuſis. *Klein echinod. ad. Lesk. p.* 90. *t.* II. E. *et t.* XL. *f.* 7.
Muſ. Linck. 1. *p.* 116. *n.* 43.
Gualt. teſt. t. 107. *f.* M.
Delic. nat. ſel. p. 88. *t.* D. *f.* 6.
Habitat - - - ex flaveſcenti ruber, ambulacris pallidioribus, baſi ochroleuca, eminentiis majoribus minoribusque et granulis arearum poris interſitis aſper; an varietas eſculenti?

anguloſus. 22. E. hemiſphaerica, areis granulatis bifariam verrucoſis, majoribus ſutura media ſerrata bipartitis, ambulacris trifariam

ſariam poroſis. *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 92. *t.* 2. F. *t.* 42. *f.* 1.

Phelſ. Zee-eg. p. 28. *n.* 15. Fyn wratje Zee-egel.

β) Echinus minor ex cinereo virideſcens. *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 94. *t.* 3. A. B.

Phelſ. Zee-eg. p. 29. *n.* 28. Kleine Vyfhoek.

Seb. muſ. 3. *t.* 10. *f.* 20.

Argenv. conch. 1. *p.* 310. *t.* 25. *f.* H.

Gualt. teſt. t. 108. *f.* A.

Delic. nat. ſel. 1. *p.* 88. *t.* D. *f.* 4. 5.

Habitat - - - ex cinereo colore in violaceum vergens, diametro transverſa $2\frac{1}{2}$ *digitorum β) duorum, areis granulorum ſeriebus, majoribus quidem decem, minoribus 6; verrucarum ordinibus ex 30 circiter conflatis, areis minoribus et ambulacris magis convexis et prominentibus, ambulacris potius ex luteſcente cinereis: poris diſtantibus duplicibus.*

excavatus. 23. E. hemiſphaericus, areis granulatis, omnibus bifariam verrucoſis, ambulacris excavatis bifariam poroſis. *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 95. *t.* 44. *f.* 3. 4.

Scill. de corp. mar. petrif. t. 22. *f.* 2. D.

Habitat in calcareum mutatus ex flavo cinereum Veronae, *an mera varietas miliaris?*

Globulus. 2. E. hemiſphaerico ſubgloboſus, ambulacris denis, areis latere muricatis, medio poroſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 706.

Habitat in Oceano indico; *an idem cum granulato?*

ſphaeroides. 3. E. hemiſphaerico-gibboſus, ambulacris denis undique muricatis medio poroſis.

Habitat in Oceano indico.

Gratilla. 4. E. hemiſphaerico-gibboſus, ambulacris denis triplicatis, areis decuſſatim muricatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 707.

Habitat in Oceano indico.

Lixula. 5. E. hemiſphaericus ambulacris denis: paribus approximatis, areis transverſe punctatis muricatis. *Muſ. Ludw. Ulr.* 707.

Habitat in Oceano indico.

ſaxatilis. 6. E. hemiſphaerico depreſſus, ambulacrorum poris arcuatis: arcubus in baſi obliquis, propius a vertice magis erectis.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1102. *n.* 6. *Muſ. Lud. Ulr.* 708. Echinus hemiſphaerico-depreſſus, ambulacris denis: paribus approximatis, areis longitudinaliter verrucoſis.
Rumpf amb. p. 31. *t.* 14. *f.* A. Echinus ſaxatilis.
Klein echinod. ed. Lesk. p. 111. *t.* 5. *et* 30. A. B. Cidaris rupeſtris.
Planc conch. min. not. p. 21. Secundum echinorum genus.
Delic. nat. ſel. 1. *t.* D. III. *f.* 6.
Seb. muſ. 3. *t.* 10. *f.* 11.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 13. *f.* 10. Echinometra muſcoſa amboinenſis.
Klein echinod. ed. Lesk. t. 39. *f.* 4.
γ) *Phelſ. Zee-eg. p.* 29. *n.* 1. Byna ronde Egelmoeder.
Klein echinod. ed. Lesk. t. 5. *f.* c.
δ) *Phelſ. Zee-eg. p.* 29. Breed band.
Klein echinod. ed. Lesk. t. 5. *f.* b.
Habitat in mari mediterraneo, β) *in* indico, *mediae magnitudinis, ſubelliptica, altitudine dimidii digiti, ex violaceo cinerea, vel alba, verrucis mediae magnitudinis violaceis, ſubrubris, aut flaveſcentibus, areis verrucarum maximarum ſerie duplici, minoribus interjectis, ambulacrorum poris duplicibus: paribus 5 in ſeriem diſpoſitis, ore amplo, ano ſcutis ovato-acutis cincto, ſpinis rigidis brunneis apice violaceis.*

feneſtratus. 24. E. orbicularis, baſi plana feneſtrata, areis decem verrucis raris magnisque inaequalibus, ore decagono. *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 107. *t.* 4. A. B. *t.* 39. *f.* 3.
Rumpf amb. p. 36? Echini ſecunda ſpecies.
Walch diluv. 2. *p.* 177. *t.* E. I. a. 1.
Habitat - - - albus, granulis per omnes areas et ambulacra inaequalis, in majoribus areis verrucarum papillas aequantium ſeriebus 6, ambulacris latis: pororum paribus 3, verſus verticem 2, ſpinis ex violaceo nigris, ano pentagono.

ſubangularis. 25. E. hemiſphaerico orbicularis, areis decem: minoribus elevatis, verrucarum in ſingulis ſeriebus decem. *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 106. *t.* 3. C. D.
Seb. muſ. 3. *t.* 11. *f.* 5?
Habitat - - - ex cinereo virideſcens, pauliſper in brunneum vergens, baſi pulvinata, arearum tuberculis 4 vicinis rhombum mentientibus, ambulacrorum poris per 4-5 paria arcuatis.

ovarius. 26. E. ovatus, areis majoribus bifariam verrucoſis.
Lang. hiſt. lap. fig. Helv. p. 124. Echinus ovarius minor.
Plot Oxfordſh. p. 108. §. 85. *t.* 5. *f.* 6.
Luid. lithoph. p. 46. *n.* 934-949. *t.* 9. *f.* 940.
Bourg. petrif. p. 76. *n.* 340. *t.* 52. *f.* 340. 345. 346.
Davil. catal. 3. *p.* 177. *n.* 213.
Habitat in Anglia, Normandia, Helvetia *in lapidem converſus.*

Diadema. 7. E. hemiſphaerico-depreſſus, ambulacris quinis longitudinaliter verrucoſis, areis lanceolatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 709.
Klein echinod. ed. Lesk. p. 14. 100. *t.* 37. *f.* 1. 2. *t.* 51. *g.* 1. *g.* 2.
Rumpf muſ. p. 35. *t.* 13. *n.* 5. *t.* 14. *f.* B.
Petiv. amboin. t. 8. *f.* 5.
β) *Phelſ. Zee-egel. p.* 29. *n.* 27. Cidaris faſciis tuberculatis.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 11. *f.* 10. Echinus ex viridi flavus.
δ) *Phelſ. Zee-eg. p.* 29. *n.* 39. Steekelpen.
Seb. muſ. 3. *t.* 13. *f.* 9. Echinometra ſetoſa ſinenſis.
ε) *Davil. catal. p.* 412. *n.* 933. 935. 938. Cidaris nigreſcens, ſpinis longis, Cidaris variolata rufo-cinerea, et Cidaris variolata americana.
Seb. muſ. 3. *t.* 13. *f.* 5. Echinometra nigra americana.
ζ) Cidaris variolata. *Klein echinod. ed. Lesk. t.* 46. *f.* 1.
η) Echinus ſpinis nigris albo annulatis. *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 101.
Habitat gregarius in maris indici *arenoſis, orbicularis, vertice depreſſo, teſta vivi caerulea, alias ex caeruleo cinerea, ore amplo, ano circulari corio pentagono cincto. areis* 5 *majoribus bifariam verrucoſis; verrucis apice perforatis, pororum in ambulacrorum baſi paribus* 3, *verſus apicem* 1, *ſpinis minoribus violaceis et ex caeruleo cinereis.*

calamarius. 27. E. ſphaeroideo depreſſus, ambulacris quinis margine poroſis nigris, medio granulatis: punctorum prominulorum majorum ſerie duplici. *Pall. ſpicil. zool.* 10. *p.* 31. *t.* 2. *f.* 4-7. *Leske apud Klein echinod. p.* 115. *t.* 45. *f.* 1-4.
Habitat in mari indico, *ex albo vireſcens, ſetis verrucis minoribus inſidentibus viridibus, fragiliſſimis, ſpinis equiſeti culmum ſimulantibus albidis viridi-annulatis, apice griſeis.*

araneiformis. 28. E. orbicularis griſeus, aculeis dilate griſeis purpureo nitentibus medio craſſioribus.

Seb.

Seb. muſ. 3. *t.* 13. *f.* 6. Echinometra multipes ſ. ſpinoſiſſima americana.
Phelſ. Zee-egel. p. 29. *n.* 38. Spinnekopf.
Habitat in mari americano.

ſtellatus. 29. E. ſpinis infimis capillaribus.
Phelſ. Zee-egel. p. 29. *n.* 37. Kleine Komeet.
Seb. muſ. 3. *t.* 13. *f.* 7. Echinometra purpurea americana.
Pontopp. norſk. Naturh. p. 320. Erinaceus marinus.
Habitat in mari americano.

radiatus. 30. E. ambulacris quinque radiatis apice bifurcis. *Leske apud Klein echinod. p.* 116. *t.* 44. *f.* 1.
Phelſ. Zee-egel. p. 29. *n.* 36. Groote Komeet.
Seb. muſ. 3. *t.* 14. *f.* 1. 2. Echinanthus major ſpinis orbus.
Habitat - - - ambulacris ſingulis radiis binis albicantibus terminatis, foraminibusque dilute rubellis pertuſis.

circinatus. 31. E. areis decem granulatis bifariam verrucoſis, majoribus excavatis, minoribus elevatis, baſi ſubpulvinata. *Leske apud Klein echinod. p.* 119. *t.* 45. *f.* 10.
Rumpf amb. 59. *f.* C. *p.* 336. Echinites, cui teſta remanſit &c.
Breyn. echin. p. 55. Echinometra circinata.
Phelſ. Zee-egel. p. 29. *n.* 30. Kransje.
Davil. catal. 3. *p.* 177. *n.* 214? Echinites eminentiis variolatis.
Scill. corp. mar. t. 25. *f.* 1?
Habitat - - - hactenus non niſi inter lapides inventus.

Cidaris. 8. E. hemiſphaerico-depreſſus, ambulacris quinis repandis linearibus, areis alternatim bifariis. *Fn. ſuec.* 2118. *Muſ. Lud. Ulr. p.* 710.
Klein echinod. ed. Lesk. p. 125. *t.* 7. Cidaris papillata.
α) *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 126. *t.* 7. A. *t.* 39. *f.* 1. 2. *t.* 51. *f.* h. 1. 2. Cidaris papillata major.
Imper. hiſt. nat. p. 784. Eltrice marino.
Shaw it. 2. *p.* 74. Grand heriſſon de mer &c.
Seb. muſ. 3. *p.* 30. *t.* 13. *f.* 11. 12. Echinometra ſpinis orba &c.
Delic. nat. ſel. t. D. *f.* 2. *p.* 87. Groſer türkiſcher Bund.
Phelſ. Zee-egel. p. 29. *n.* 32. 34. *t.* 3. *f.* 10. Groote Tulband et Vootangel.
β) *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 127. *t.* 7. B. *et* 36. *f.* 3. Cidaris papillata minor.

Aldrov.

Aldrov. exang. p. 403? Echinus cum ſpina adjuncta et ſpinis ſpoliatus.

Rumpf amb. p. 33. *t.* 12. *f.* 3. 4. *et muſ. Richter p.* 119. Echinometra digitata ſecunda vel rotunda.

Phelſ. Zee-egel. p. 29. *n.* 31. 33. Schubmond et kleine Tulband.

Argenv. conch. p. 310. *t.* 25. E.

Seb. muſ. 3. *t.* 13. *p.* 30.

Delic. nat. ſel. t. D. III. *f.* 5. *p.* 97.

γ) *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 129. *t.* 41. *f.* 4. *et t.* 7. D. E. Cidaris papillata ſpinis fuſiformibus.

Seb. muſ. 3. *t.* 13. *f.* 8. Echinometra ex Indiis.

Scill. corp. mar. t. 22. *f.* 1-3. Echinus maris e ſiculo mari.

Davil. catal. 1. *p.* 415. *n.* 943-945. Turban maure.

Valent. muſ. 2. *p.* 177? Echinus marinus.

Bonann. muſ. p. 92. *f.* 17. 18.

Breyn. echin. p. 55. *t.* 1. *f.* 1.

Gualt. teſt. t. 108. *f.* D. E.

Petiv. amb. t. 7. *f.* 2.

δ) *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 134. *t.* 46. *f.* 2. 3. Cidaris papillata ſpinis claviculatis.

Imper. hiſt. nat. p. 671.

Lang. lap. fig. t. 36. *fig. med.*

Deluc Naturſ. 8. *p.* 278. *t.* 8.

Andreae Brief. aus der Schweiz. p. 40. 267. *t.* 5. *f.* e. f. *t.* 14. *f.* d. *et* 4.

ε) *Müll. zool. dan. prodr.* 2848. Echinus ſpinis obtuſis.

Pontopp. norſk. Naturh. 2. *c.* 7. *p.* 278. f.

Stroem. ſondm. p. 175.

ζ) *Rumpf. amb. p.* 34. Echini ſiamenſes.

Habitat in Oceano, *utplurimum ex livido cinerea, baſi plana, areis majoribus* 5 *granulatis, verrucarum papillis apice perforatis alternarum et granulorum circulo, ſaepius duplici cinctarum, et ſulco circumeunte diſtinctarum ſeriebus duabus, minorum loco faſcia eminente inter ambulacra, ore ſatis amplo.*

mammillatus. 9. E. hemiſphaerico-ovalis, ambulacris denis flexuoſis, areis muricatis verrucoſis: anguſtioribus abbreviatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 711.

Klein echinod. ed. Lesk. p. 121. *t.* 6. *t.* 34. *et t.* 39. *f.* 1. Cidaris mammillata.

Rumpf amb. p. 32. *t.* 13. *f.* 1. 2. Echinometra digitata prima oblonga.

Phelſ.

Phelſ. Zee-egel. p. 30. *n.* 8. Groote Wydbeck.
Breyn. echin. p. 56. *t.* 1. *f.* 5.
Gualt. teſt. t. 108. B. C.
Argenv. conch. p. 310. *t.* 25. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 10. *f.* 17.
β) *Phelſ. Zee-eg. p.* 30. *n.* 7. Kleine Wydbeek.
γ) *Phelſ. Zee-eg. p.* 30. Karmoiſine Egel-moeder.
Seb. muſ. 3. *t.* 13. *f.* 1. 2.
δ) *Phelſ. Zee-eg. p.* 30. *n.* 6. Holleband.
Seb. muſ. 3. *t.* 13. *f.* 3.
ε) *Phelſ. Zee-eg. p.* 30. *n.* 12. Rosgeele Egel.
Seb. muſ. 3. *t.* 13. *f.* 4.
Delic. nat. ſel. 1. *t.* D. *f.* 3. *p.* 87. *et t.* D. III. *f.* 7. 8.
Davil. catal. p. 414. *n.* 939-941.
Habitat in maribus *magis* meridionalibus, *depreſſus ex flavo cinereus in fuſceſcentem colorem vergens, ſubtus magis albidus; arearum decem papillis omnibus non perforatis, circulis elevatis cinctis, in majoribus* 16-18, *quarum mediae maximae, in minoribus* 14 *magnis, ambulacris pororum ad baſin paribus* 4-5, *ore amplo, ano rotundo,* 10 *ſquamis cincto, quarum* 5 *perforatae, ſpinarum colore vario.*

Lucunter. 10. E. hemiſphaerico-ovatus, ambulacris denis flexuoſis, areis muricatis: anguſtioribus longitudinalibus.
Klein echinod. ed. Lesk. p. 109. *t.* 4. C. D. Cidaris Lucunter.
Seb. muſ. 3. *t.* 10. *f.* 6. 16. *et t.* 11. *f.* 11.
Breyn. echin. p. 56. *t.* 1. *f.* 6.
Gualt. teſt. t. 107. *f.* C.
Delic. nat. ſel. 1. *p.* 89. *t.* D. I. *f.* 8.
Davil. catal. p. 412. *n.* 934.
β) Cidaris Lucunter ambitu ſuborbiculari. *Klein echinod. ed. Lesk. t.* 4. *f.* E. F.
Phelſ. Zee-eg. p. 33. *n.* 3. Smalband.
Habitat in Oceano indico, *magnitudine et colore varians, ex flavo cinereus, caeruleſcens vel nigreſcens, baſi pulvinata, ore amplo, verrucarum maximarum in ſingulis areis ordine duplici, paulo minorum in majoribus areis ſextuplici, in minoribus quintuplici, pororum in ambulacris verſus utrumque finem paribus* 4-5, *in medio* 6.

11. E.

An hujus familiae Echinus totus niger, ovatus, ambulacris quinis, areis muricatis verrucoſis, teſte Molina hiſt. nat. Chil. p. 176. *ad littus* Chilenſe *obvius?*

atratus. 11. E. hemiſphaerico-ovalis depreſſiuſculus: ſpinis truncatis breviſſimis obtuſiſſimis: marginalibus clavatis depreſſis.
Klein echinod. ed. Lesk. p. 117. *t.* 47. *f.* 1. 2. *et* 1. f. *t.* 44. aa *t.* 54. *f.* 5. Cidaris violacea.
Phelſ. Zee-eg. p. 30. *n.* 9. Violette Egel-moeder.
Argenv. conchyl. 1. *p.* 310. *t.* 25. *f.* F. G.
Davil. catal. 1. *p.* 413. *n.* 936.
Habitat in India, *ambitu ſuborbicularis, cinereus, in violaceum vergens, areis decem ſubtiliſſime granulatis, majorum verrucis majoribus ſerie interdum octuplici, in quincunce poſitis, minorum ſerie duplici, ambulacris fuſcis, excavatis, granulatis, latis: pororum ſeriebus* 4, *ſpinis violaceis, aliis clavatis, aliis apice angulatis, aliis cylindricis.*

coronalis. 32. E. hemiſphaerico-orbicularis, areis decem: alternis anguſtioribus; papillis ſparſis, ambulacris planis, ante verticis aream per paria confluentibus. *Leske apud Klein echinod. p.* 136. *t.* 8. A. B.
Phelſ. Zee-egel. p. 28. *n.* 5. Gierſt-korlige Zee-egel, et kranswyze Geweloſlek.
Geſn. petrif. c. 12. *p.* 34. Echinites eminentiis per quinque ordines triangulares &c.
Luid. lithoph. brit. n. 979-981.
Morton Northampt. p. 234. *t.* 10. *f.* 10.
Lang. l. p. fig. p. 122. *t.* 35.
Bourg. petrif. t. 51. *f.* 334. 335.
β) Cidaris corollaris tenuis. *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 138. *t.* 8. C.
Geſn. petrif. c. 12. *p.* 34. Ombria.
Boët de Boodt gemm. p. 486. Brontia ſ. Ombria.
Dav. cat. 3. *p.* 178. Turban à courelle.
Meccat. muſ. metall. p. 247.
Hook Works p. 284. *t.* 2. *f.* 2. 3.
Plot ſtaffordſh. p. 178-198. *t.* 13. *f.* 21.
Liſt. lap. oochl. p. 120. *tit. et f.* 19.
Luid. lith. brit. p. 46. *n. et f.* 942. 943.
Valent. muſ. 2. *t.* 3. *f.* 8.
Lang. lap. fig. p. 124. *t.* 35.
Bourguet petrif. p. 76. *t.* 52. *f.* 345. 346.
Scheuchz. oryctogr. p. 317. *f.* 134.
phyſ. ſacr. t. 56. *f.* 65.
Baier oryctogr. noric. t. 3. *f.* 36.
γ) *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 140. *t.* 45. *f.* 2.

Rumpf

Rumpf amb. p. 337. *t.* 59. *f.* E.
Pheſum Zee eg. p. 27. *n.* 1.
δ) *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 141. *t.* 8. D. E. Cidaris corollaris craſſa.
Habitat - - - frequenter in cretam et ſilicem converſus; an vera diſtincta ſpecies protypus?

aſterizans. 33. E. orbicularis depreſſus, tuberculis ſulco ad apicem usque exaratis et granulorum circulo cinctis.
Klein echinod. ed. Lesk. p. 141. *t.* 8. F. *et t.* 46. *f.* 5.
Phelſ. Zee-eg. p. 29. *n.* 35. Sterre-wrat Zee-egel.
Habitat - - - inter lapides creta repletos, teſta in ſpatum converſa; vix diſtincta ſpecies protypus.

aſſulatus. 34. E. teſta ſcutellata: ſcutellis per ſuturas transverſas nexis. *Klein echinod. p.* 15. §. 26.
β) Cidaris teſſulata. *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 16. §. 27.
Habitat - - - vix vere diſtincta ſpecies.

ſardicus. 35. E. orbicularis depreſſus tuberculatus, ambulacris denis impreſſis, areis multifariam verrucoſis: ſutura media impreſſa. *Leske apud Klein echinod. p.* 147. *t.* 9. A. B. *t.* 54. *f.* 4. 6.
Phelſ. Zee-eg. p. 28. *n.* 18. Sardiſche Zee-egel.
Planc. comm. Bonon. V. 1. *p.* 236. *t.* 1. *f.* 4. 5. Echinometra magna, malo marinus.
Bonann. recr. 2. *p.* 92. *n.* 19. *f.* 19.
Scill. corp. mar. t. 13. *f.* 1. *et t.* 36. *f.* B.
Habitat in mari tyrrheno *et* adriatico, *magnus, ex cinereo flaveſcente ruber, baſi fere plana magis flaveſcente, arearum majorum verrucis in* 8-12 *ſeries digeſtis: interſtitiis minoribus et minimis tuberculis obſitis, minorum verrucis minoribus in* 4-6 *ſeries diſpoſitis, pororum in ambulacris paribus* 5, *arcuato ordine ſitis, ore parvo decies ſinuato.*

flammeus. 36. E. hemiſphaericus depreſſus, arearum medio ſuperiora verſus verrucis vacuo, minoribus elevatioribus ambulacris anguſtis, utrinque verrucarum ſerie cinctis. *Leske apud Klein echinod. p.* 148. *t.* 10. A.
Phelſ. Zee-eg. p. 28. *n.* 13. Gevlamde Zee-egel.
Habitat - - - ex olivaceo viridis, tuberculis et ambulacris baſique albidioribus; arearum majorum latiſſima parte verrucarum ſeriebus 12, *areis minoribus* 3 *aſperis: ſingulis*

ſingulis verrucis tuberculorum minorum circulo cinctis; ambulacris vix 2 lineas latis: pororum paribus ternis granulis interſtinctis, ore parvo, ano ſquamis pentagonis cincto.

variegatus. 37. E. orbicularis ſubanguloſus, areis mediis roſeis utrinque laete viridibus, ambulacris ex viridi albicantibus, baſi albida. *Leske apud Klein echinod. p.* 149. *t.* 10. B. C.

Phelſ. Zee-eg. p. 28. *n.* 12. Buntgeſlamte Zee-egel.

Seb. muſ. 3. *p.* 20. *t.* 10. *f.* 13.

Gualt. teſt. t. 107. *f.* F.

Habitat - - - rarior, arearum majorum parte latiſſima verrucarum: granulis circumdatarum veſtigiis 3-4 obſita, areis minoribus paulo elevatioribus: verrucarum ſeriebus 3, pororum in ambulacris paribus 3, ore ſubrotundo leviſſime ſinuoſo.

puſtuloſus. 38. E. arearum majorum medio ſutura interſtincto: verrucarum ſeriebus transverſis plurimis medium verſus numero increſcentibus, areis minoribus elevatioribus. *Leske apud Klein echinod. p.* 150. *t.* 11. A. B. C. D.

Phelſ. Zee-eg. p. 28. *n.* 7-9. Digtpniſtige, ylpuiſtige, et bynanaakte Zee-egel.

Seb. muſ. 3. *t.* 10. *f.* 8-10. 15.

Habitat - - - vix pollicem altus, diametri bipollicaris, ex bruneo cinereus, in rubrum vergens, areis minoribus dilutioribus, baſi magis albida, verrucis rubellis, areis decem majorum diſco aſpero, ſutura utrinque granulis minimis cincta, extimo utrinque verrucarum ordine ſolitaria verruca, altero duabus compoſito, ut in medio ſenarium numerum aſſequatur, areis minoribus verrucarum ordinibus 2, quibus linea ſerrata, et granula minima interjacent, pororum in ambulacris paribus 4-5, in lineis obliquis excurrentium, ore late ſinuoſo.

granulatus. 39. E. ſuborbicularis ſubanguloſus, arearum medio nudo ſutura utrinque ſerrata diſtincto, verrucarum in majoribus utrinque ordinibus ſeptem in minoribus quatuor. *Leske apud Klein p.* 150. *t.* 11. E. F.

Phelſ. Zee-eg. p. 27. *n.* 4. Zand-korlige Zee-egel.

Habitat - - - $\frac{3}{4}$ pollicis altus, diametri ſesquipollicaris, baſi pulvinata cum arearum majorum margine ex viridi cinereus, arearum majorum medio areisque minoribus obſcure viridibus, pororum in ambulacris paribus 3 in triangulo ſitis, ano circulari, ad marginem ſquamis 10, roſae inſtar expanſis cincto.

teſſellatus. 40. E. areis decem ſutura media diviſis aſſulatis, ambulacris decem biporoſis, ore circulari. *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 153. *t.* 11. G.
Phelſ. Zee-eg. p. 27. *n.* 2. Leyendak.
Beſchr. d. Merkw. Baſels. p. 259. *t.* 22. G?
Habitat - - - hactenus modo inter lapides repertus.

botryoides. 41. E. areis ſutura media longitudinali bipartitis, majoribus bifariam verrucoſis, pororum in ambulacris ſerie duplici arcuata. *Leske apud Klein echin. p.* 154. *t.* 11. H.
Phelſ. Zee-eg. p. 27. *n.* 3. Geribde Zee-egel.
Aldrov. muſ. metall. p. 457. Echinites laevis valde durus et lucidus, figuram meſpili aemulans.
Habitat - - - hactenus modo inter lapides inventus.

toreumaticus. 42. E. hemiſphaericus, areis decem bifariam verrucoſis: verrucis crenatis granulorum circulo cinctis, areis majoribus ſulcis longitudinalibus quatuor, minoribus duobus exaratis. *Leske apud Klein echin. p.* 155. *t.* 10. D. E. *t.* 44. *f.* 2.
Phelſ. Zee-eg. p. 28. *n.* 6. Gegraveerde Zee-egel.
Habitat - - - cinereus leviſſime vel caeruleſcens vel vireſcens, baſi et ambulacris flaveſcentibus, ambulacris biporoſis: poris in linea argute ſerrata poſitis, baſi pulvinata, ore parvo, ano ſquamis 10 *cincto.*

†† *figura ad clypei figuram accedente*, Clypei Kleinii.

ſinuatus. 43. E. convexus, ambulacris ſtriatis areisque decem, verrucis granulorum circulo cinctis. *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 157. *t.* 12.
Plot oxfordſh. p. 91. 92. *t.* 2. *f.* 9. 10. Polar ſtone.
Liſt. lap. cochl. p. 224. *tit. et fig.* 27.
Luid. lithoph. brit. p. 48. *n.* 971.
Mort. Northampt. p. 233. *n.* 1.
Habitat - - - hactenus modo inter lapides inventus, arearum una ſinu excavato diviſa, ambulacris latis margine utroque punctatis, baſi parum excavata, et ſulcis 5 *divergentibus exarata, ore parvo pentagono.*

ſemigloboſus. 44. E. hemiſphaericus ſulcatus, baſi plana, verrucis ſeriatis.
Klein echinod. ed. Lesk. p. 158. *t.* 43. *f.* 1. Clypeus hemiſphaericus.
Lang. lap. fig. p. 119. *t.* 34.
Volkm. Sil. ſubt. 1. *p.* 179. *t.* 30. *f.* 5.
Bourg. petrif. t. 52. *f.* 342.

Habitat

Habitat - - - hactenus tantum inter foſſilia deprehenſus; an propria ſpecies protypus?

quinque-labiatus. 44. E. annulis innumeris pictus: media foſſula, ſtellulam convexam cingente. *Leske apud Klein echinod. p.* 159. *t.* 41. *f.* 3.
Phelſ. Zee-eg. p. 30. *n.* 2. Vyſlip.
Walk monum. diluv. 2. *p.* 181. *t.* E. III. *f.* 4.
Verſ. der baſel. Merkw. 22. *t.* 22. *f.* 1.
Habitat - - - adhuc modo inter foſſilia obvius.

conoideus. 45. E. ſubconicus ambitu elliptico, areis et ambulacris decem, his transverſe ſulcatis, et margine poroſis, illis ſutura excavata recta diviſis. *Leske apud Klein echinod. p.* 159. *t.* 43. *f.* 2.
Hacquet Naturf. 11. *p.* 105.
Aldrov. muſ. metall. p. 456.
Davil. catal. 3. *p.* 182. *n.* 225.
Habitat - - - hactenus tantum inter foſſilia occurrens, baſi plana, arearum verrucis creberrimis, granulorum circulo cinctis, baſi plana ſulcata; ano circulari.

* *ano infero, tentaculis oris nullis*, Briſſi Mülleri.

† *baſi circulari, in cujus peripheria anus*, Fibulae Kleinii.

† *in conum elevati*, Conuli Kleinii.

albo-galerus. 46. E. areis tuberculis albis minimis denſe obſitis ambulacrisque denis, his biporoſis, areis majoribus ſutura ſerrata nexis et transverſim lineatis, minoribus foramine urticis terminatis. *Leske apud Klein echinod. p.* 162. *t.* 13. A. B.
Phelſ. Zee-egel. p. 31. *n.* 15. Egelſteen tienband rondtop.
Aldrov. muſ. metall. p. 455. *f.* 4.
Beſl. gazoph. contin. t. 19.
Plot oxfordſh. §. 35. *t.* 2. *f.* 13.
Morton Northampt. p. 235. *n.* 1.
Luid. lithoph brit. p. 47. *n.* 958. 959.
Lachm. oryctogr. Hildeſ. p. 23.
Lang. lap. fig. p. 125. *t.* 36. *f.* 1.
Mell. ech. magr. p. 7. *f.* 6.
Breyn. ech. p. 57. *t.* 2. *f.* 1. 2.
Bourg. petrif. p. 77. *t.* 53. *f.* 361.
Davil. catal. 3. *p.* 179. *n.* 220.

Habitat - - - hactenus ſolum inter foſſilia inventus, ſubovalis, ore orbiculari parvo, ano ovato.

depreſſus. 47. E. areis decem: majoribus ſutura media diviſis, ambulacris decem biporoſis, vertice depreſſo, ano orbiculari.
Leske apud Klein echinod. p. 164. *t.* 40. *f.* 5. 6.
Phelſ. Zee-eg p. 31. *n.* 16. Egelſteen tienband plattop.
Walch dilu. monum. 2. *p.* 180. *t.* E. II. *f.* 6. 7.
Mell. ech. Wagr. p. 7. *t.* I. *f.* 2.
Kundm. rar. nat. et art. 5. *f.* 12.
Natürl. baſel. Merkw. 22. *t.* 22. *f.* H.
Habitat - - - hactenus non niſi foſſilis, oris mediocris ſinubus 10 *acutis, ano magno ovato.*

vulgaris. 48. E. orbicularis, ambulacris decem: binis ſibi ſemper vicinis.
Leske ap. Klein echinod. p. 165. *t.* 13. *f.* e-k. *t.* 14. *f.* a-k. *t.* 40. *f.* 2. 3.
Waller. foſſ. miner. p. 507. Echiniti fibulares.
Phelſ. Zee-eg. p. 31. *n.* 1-11.
Walch dilu. monum. 2. *p.* 176. 177. *et ſuppl. p.* 217. *t.* E. I. *f.* 1. 2. *t.* E. I. a. *f.* 2. *t.* IX. d. *f.* 2. *t.* IX. g. *f.* 1.
Aldrov. muſ. met. p. 455. *f.* 3. 6.
Bocc. obſ. nat. p. 219. *fig. ad fin. tab.*
Olear. muſ. Gottorp. t. 21. *f.* 5. 6.
Beſl. gazoph. contin. t. 19. Scolopendrites, Ovum anguinum.
Muſ. Calceol. p. 353. Bufonites.
Worm. muſ. p. 107. Bufonius lapis.
Mort. Northampt. p. 235. *n.* 2. *t.* X. *f.* 11.
Liſt. lap. cochl. p. 219. *tit. et f.* 18.
Luid. lith. brit. p. 46. *n.* 944-950. 957?
Rumf amboin. t. 1. *f.* 6-9.
Mercat. metall. p. 246. *f.* 1-4.
Mell. ech. Wagr. p. 7. *t.* 1. *f.* 3. 4.
Myl. memor. Saxon. p. 45-47. *f.* 2. 4. 5. 9. 10.
Volkm. Sileſ. ſubterr. p. 179. *t.* 30. *f.* 6. E.
Helw. lithogr. angerb. p. 71. *t.* 8. *f.* 13.
Breyn. echin. p. 57. *t.* 2. *f.* 3. 4.
Bytem. biblioth. app. t. 23. *f.* 270.
Brom. mineral. p. 51.
Schreb. lithogr. Hal. p. 103. 1. *α.*
Lerch. oryctogr. Hal. 33.
Geſn. petr. p. 24.
Davil. catal. 3. *p.* 180. *n.* 220.

Habitat

Habitat - - - hactenus ſolummodo, ſed frequentiſſime, foſſilis, innumera priſtinae nunc melius conſervatae, nunc magis deletae formae varietate.

quadrifaſciatus. 49. E. ambulacris quaternis. *Leske apud Klein echinod. p.* 170. *t.* 47. *f.* 3-5.
Phelſ. Zee-eg. p. 30. 31. Vierbandige Egel-ſteen.
Gebler char. foſſil. extern. p. 13. *f.* 1.
Walch diluv. monum. ſuppl. p. 218. 223. *t.* IX. d. *f.* 3. *et t.* IX. g. *f.* 7-9.
Habitat - - - hactenus non niſi foſſilis, ambitu nunc orbiculari, nunc propius ad ovalem accedente.

ſexfaſciatus. 50. E. ambulacris ſenis. *Leske apud Klein echinod. p.* 170. *t.* 50. *f.* 1. 2.
Klein act. nat. Cur. Gedan. 2. *p.* 292. *t.* 5. *f.* 14. 15. Echinus Terdorpſii.
Phelſ. Zee-eg. p. 31. *n.* 14. Zesband.
Gebl. charact. foſſ. ext. p. 13. *f.* 2.
Walch diluv. monum. ſuppl. t. IX. g. *f.* 4-6.
Habitat - - - adhuc tantum foſſilis.

†† *baſi exacte circulari*, Diſcoidei Kleinii.

Subuculus. 51. E. ambulacris biporoſis areisque decem, ore anoque parvis orbicularibus. *Leske apud Klein echinod. p.* 171.
Geſn, petrif. p. 35. *n.* 6.
Davil. catal. 3. *p.* 180.
α) *Phelſ. Zee-egel. p.* 37. Rooſe-top-Egelmuts.
Klein echinod. ed. Lesk. t. 14. *f.* l. m.
β) *Phelſ. Zee-eg. p.* 37. Kreeft vagie Egelnaapje.
Klein echinod. ed. Lesk. t. 14. *f.* n. o.
Habitat - - - hactenus tantummodo foſſilis, areis circulis minimis obſeſſis, 5 majoribus, 5 minoribus, ambulacrorum poris ſubtiliſſimis denſe ſibi adjacentibus.

††† *baſi ovali*, Echinonei Phelſumii *et* Leskii.

cycloſtomus. 52. E. oblongus ſubdepreſſus, verticis porjs quinque, ore medio rotundo, ano oblongo vicino. *Leske apud Klein echinod. p.* 173. *t.* 37. *f.* 4. 5.
Müll. zool. dan. 3. *p.* 18. *t.* 91. *f.* 5. 6. *prodr.* 2851. Spatagus puſillus.
Phelſ. Zee-eg. p. 32. *n.* 11. Rond-mond.
Bocc. obſ. nat. p. 219.

Rumpf amb. p. 6. t. 14. f. D.
Breyn. echin. p. 57. t. 2. f. 5. 6.
Seb. muſ. 3. p. 36. t. 15. f. 30-33. 35-37.
Delic. nat. ſel. p. 90. t. D. I. f. 11.
Baier oryctogr. nor. t. 3. f. 35.
Habitat - - - cinereus, ſubflaveſcens, baſi pulvinata, areis 10, *linea media argute ſerrata diviſis tuberculis minimis circulo incluſis obſitis, ambulacris* 10 *biporoſis, ad os usque protenſis.*

ſemilunaris. 53. E. ano oblongo longitudinali, ore transverſo ſemilunari.
Muſ. Teſſin. p. 114. *t.* 6. *f.* 2. Echinus ovalis.
Leske ap. Klein echinod. p. 174. *t.* 49. *f.* 8. 9. Echinoneus minor, ore ſemilunari.
Phelſ. Zee-eg. p. 32. *n.* 2. Spleet-mond.
Seb. muſ. 3. *p.* 19. *t.* 10. *f.* 7.
Habitat in mari aſiatico, *dilute ex cinereo flaveſcens.*

ſcutiformis. 54. E. ore pentagono, ambulacris decem ſtriatis, areis majoribus aſſulatis: aſſulis pentagonis. *Leske ap. Klein echinod. p.* 174.
Scill. corp. mar. t. 11. *f.* 1. 2.
Habitat - - - - an hujus tribus?

†††† *baſi ex ovali acuta, ano ori oppoſito*, Caſſides Kleinii, Echinocoryes Leskii.
— *majores*, Galeae Kleinii.

ſcutatus. 55. E. convexus ſubtus planus, areis tuberculatis alternatim majoribus: majoribus ſutura media ſerrata diviſis, ore transverſo reniformi. *Leske ap. Klein echinod. p.* 175.
Klein echinod. ed. Lesk. p. 175. Galea vertice ſcutato.
Phelſ. Zee-egel p. 37. *n.* 1. Ocean-Egel, Vyfblad.
Luid. lith. brit. p. 46 *n.* 951-953.
Scheuchz. muſ. diluv. p. 88. *n.* 851-854.
Breyn. ech. p. 58. *t.* 3. *f.* 1. 2.
Abildg. Stevenſkl. p. 22. *t.* 2. *f.* 1-5.
Davil. catal. 3. *p.* 179. *n.* 219.
α) *Phelſ Zee-eg. p.* 36. *n.* 2. Geſtreepte Zont-egel.
Walch diluv. monum. 2. *p.* 179. *n.* 4. *t.* E. I. a. *f.* 4.
Leske apud Klein echinod. t. 42. *f.* 4.
β) *Phelſ. Zee-egel. p.* 37. Getaufelde Ocean-Egel.
Walch diluv. monum. 2. *p.* 176. *t.* E. I. *f.* 3. 4.
Leske apud Klein echinod. t. 42. *f.* 2. 3.

Habitat

Habitat - - - hactenus modo foſſilis, arearum tuberculis granulis minimis interſperſis, ore tuberculis paulo majoribus triangulum formantibus cincto, ano ſubovato, baſi marginem verſus convexiuſcula, plaga media eminentiore, utrinque faſciis duabus ſubtiliſſime granulatis cincta.

ovatus. 56. E. ovatus aſſulatus: aſſulis hexagonis, vertice nudo, ano ſubovali. *Leske apud Klein echinod. p.* 178. *t.* 53. *f.* 3.
Aldrov. muſ. met. p. 455. *f.* 10.
Grew muſ. p. 255?
Hook Works t. 2. *f.* 4?
β) *Leske apud Klein echinod. t.* 42. *f.* 5.
Walch diluv. monum. 2. *p.* 179. *t.* E. I. a. *f.* 5.
Aldrov. muſ. met. p. 455. *f.* 3.
Bgtem. biblioth. app. t. 23. *f.* 270.
γ) *Leske apud Klein echinod. p.* 143. *ic. tit. et t.* 8. *f.* G. Bronties favagineus.
Worm. muſ. p. 77.
Encel. re metall. c. 47. *p.* 232.
Olig. Jacob. muſ. p. 35.
Walch diluv. monum. 2. *p.* 177. *t.* E. a. *f.* 3.
Habitat - - - adhuc modo inter foſſilia repertus, 20 aſſularum (rariorum 7 aut 5 genarum) ſeriebus, 10 majoribus, 10 minoribus, omnibus ſutura ſerrata connexis, et ſimilarium duabus vicinis, areis 10 majoribus, 10 minoribus, in ſingulis his 2 punctis impreſſis, ore rotundo minori, ano ſubovali.

puſtuloſus. 57. E. areis obſoletis non tuberculatis, ambulacrorum punctis duobus per paria diſpoſitis eminentibus, vertice impreſſo. *Leske apud Klein echinod. p.* 180. *t.* 16. A. B.
Plot oxfordſh. §. 36. *t.* 2. *f.* 14.
Mort. northampt. p. 335. *t.* 10. *f.* 12.
Liſt. lap. cochl. p. 225. *t.* 7. *f. et tit.* 29-31.
Luid. lith. brit. p. 47. *n.* 954.
Grew muſ. p. 259.
Hook Works p. 284. *t.* 3. *f.* 7.
Hellw. lith. angerb. p. 70. *t.* 8. *f.* 12.
Mell. ech. wagr. t. 1. *f.* 7. 8.
Kundm. rar. nat. et art. p. 95. *t.* 5. *f.* 8. 9.
Schreb. lithogr. hal. p. 41. γ.
Friſch muſ. Hoffm. p. 33.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis, figura et ambitu, ore anoque ſcutato ſimilis.

quadriradiatus. 58. E. punctorum ordinibus quatuor geminatis. *Leske apud Klein echinod. p. 182. t. 54. f. 1.*
Mell de lap. fig. Lubec. p. 28. t. 2. f. 7. Echinites Niendorpienſis.
Habitat - - - adhuc tantummodo foſſilis.

†† *minores*, Galeolae Kleinii.

minor. 59. E. ovatus, baſi plana vel concava, ambulacris biporoſis areisque decem, ore transverſo ſubrotundo, ano ſubovali. *Leske apud Klein echinod. p. 183.*
papilloſus. α) E. *Klein echinod. ed. Lesk. t. 16.* C. D.
Phelſum Zee-eg. p. 36. n. 5. Knveſtagtige Zont-egel.
Aldrov. muſ. met. p. 455.
undoſus. β) E. *Klein echinod. ed. Lesk. t. 17.* a. b.
Phelſum Zee-eg. p. 36. n. 6. Gevlamde Zont-egel.
Breyn. echin. p. 58. t. 3. f. 3. 4.
laevis. γ) E. *Klein echinod. ed. Lesk. t. 17.* c. d.
Bromel. miner. p. 50.
Volkm. Sileſ. ſubt. t. 30. f. 7.
Habitat - - - hactenus ſolum inter foſſilia deprehenſus.
dubius. 60. E. ovatus, ambulacris denis ſimpliciter poroſis, ani dimidia parte marginali. *Leske apud Klein echinod. p. 184. t. 44. f. 5.*
Habitat - - - hactenus non niſi foſſilis inventus, areis 5 majoribus circulis impreſſis inſignitis.

††††† *baſi irregulari, flore quaſi pentapetalo in ſuperficie expanſo*, Scuta Kleinii, Echinanthi Leskii.
1 *angulares peripheria per ſinus anguloſa.*

roſaceus. 14. E. planiuſculus ovato ſubrotundus, ambulacris quinis ovalibus: ſuperficie punctata. *Muſ. Lud. Ulr. 713.*
Klein echinod. ed. Lesk. p. 185. t. 17. A. Echinanthus humilis.
Phelſ. Zee-egel. p. 38. n. 4. Groot Egel-roozen Stomp-blad.
Sloan. jam. t. 242. f. 6-11.
Rumpf amb. 36. t. 14. C.
Petiv. amb. t. 1. f. 10.
Seb. muſ. 3. t. 11. f. 2. 3.
Delic. nat. ſel. 1. p. 91. t. D. I. *f. 12.*
Davil. cat. 1. p. 421.
β) *Klein. echinod. ed. Lesk. t. 19.* A. B.
Phelſ. Zee-eg. p. 38. n. 5. Kleine Egel-roozen Stomp-blad.
Seb. muſ. 3. t. 15. f. 11. 12.

Gualt.

Gualt. teſt. I. *t.* CX. A.

γ) *Phelſ. Zee-eg. p.* 34. Eeglkoeken vyfhoek groote.
Klein echinod. ed. Leſk. t. 18. B.
Boccon. obſ. p. 324. *t. f.* 1.

δ) *Phelſ. Zee-eg. p.* 38. *n.* 6. Egel-roozen Dikrand.
Seb. muſ. 3. *t.* 15. *f.* 13. 14. 23. 24.

ε) *Phelſ. Zee-eg. p.* 38. Egel-roozen Scherpblad.
Klein echinod. ed. Leſk t. 40. *et* 41. *f.* 1.

Habitat in Oceano aſiatico, (ε) *non niſi foſſilis) ex bruneo flaveſcens, interdum ſordide cinereus, tuberculis arenam granula aequantibus, multis in quincunce poſitis.*

altus. 61. E. vertice elato orbiculari, ambulacris latis apice convergentibus granulatis. *Leske ap. Klein echinod. p.* 189. *t.* 53. *f.* 4.
Scill. corp. mar. t. 9. *f.* 1. 2.
Mercat. met. p. 233. Cucurbites.
Bonann. recr. t. 36. *f.* 1.
Dav. catal. 3. *p.* 153. *n.* 227.
Walch dil. monum. ſuppl. p. 215. *t.* IX. d. *n.* 1.
Habitat - - - hactenus non niſi foſſilis, roſaceo altior, ut 2 pollices altitudine, diametro baſeos longitudinali 6 aequet.

†† *ovati, margine integro.*

oviformis. 62. E. convexus ſubtus planus, ambulacris decem biporoſis ſtellae in modum expanſis, verticis poris quatuor. *Leske apud Klein echinod. p.* 191. *t.* 20. c. d.
Rumpf amb. t. 14. *n.* 3.

α) *Phelſum Zee-eg. p.* 38. *n.* 1. Eyronde Egelroos.
Klein echinod. ed. Leſk. t. 18. C. D. Scutum ovatum Chaumontianum.

β) *Phelſ. Zee-eg. p.* 38. *n.* 2. Hartagtige Egelroos.
Klein echinod. ed. Leſk. t. 20. a. b. Scutum ovatum Hſyavienſe.
Aldrov. muſ. met. p. 498. *f.* 1. 2. Pentaphyllites.
Mercat. metall. p. 23. Monoſtroites vel cryptopetrae ſpecies altera.
Rumpf amb. t. 59. *f.* D.
Breyn. echin. p. 59. *t.* 2. *f.* 45.
Walch dil. monum. 2. *p.* 181. *t.* E. III. *n.* 5.

γ) *Phelſum Zee-eg. p.* 37. *n.* 5. Rondhart.
Seb. muſ. 3. *t.* 10. *f.* 23.

Habitat - - - - ſupra ex cinereo fuſceſcens, ſubtus ex cinereo albidus, granulatus, granulis circulo circumdatis,

tis, ore transverſo ſubreniformi ſlabiato, ano margini vicino, baſeos linea media glabra, albidiore, ab altero teſtae fine ad alterum extenſa.

orbiculatus. 63. E. granulatus, ambulacris biporoſis: poris lineola transverſa impreſſa conjunctis, ſpatiisque intermediis ſutura media ſerrata bipartitis, reliqua ſuperficie quinquepartita. *Leske apud Klein echinod. p.* 194. *t.* 41. *f.* 2.
Mercat. met. p. 232. Monoſtroites minor.
Walch monum. dil. 2. *p.* 181. *t.* 41. *f.* 2.
Natürl. baſ. Merkw. 22. *t.* 22. *f.* 3?
Bourg. petrif. p. 77. *t.* 53. *f.* 352.
Habitat - - - hactenus non niſi foſſilis; an vere diſtinctus ab aliis, praeſertim a quinquelabiato ſpecies?

†††††† *utrinque plani, ambulacris petalorum figuram aemulantibus, ore centrali plano dentato, verticis poris quatuor,* Placentae Kleinii, Echinodiſci Leskii.

⁋ *margine ſinuoſo.*

⸸ *ſuperficie perforata,* Mellitae Kleinii.

biforis. 64. E. baſi ſulcis quinque lineisque flexuoſis radiatis decem exarata, foraminibus oblongis ad anum duobus. *Leske apud Klein echinod. p.* 169. *t.* 21. A. B.
Delic. nat. ſel. 1. *p.* 92. *t.* D. I. *f.* 1. Echinodiſcus.
Phelſ. Zee-eg. p. 35. *n.* 12. Onregelmatige Egelkoek *et p.* 34. *n.* 3. Stomphart met twot buiſen.
Davil. catal. 1. *p.* 423. *n.* 955.
St. Müller Linneiſch. Naturf. 6. B. *t.* 8. *f.* 8.
Habitat - - - ſupra convexiuſculus ex dilutiore flaveſcente cinereus, ſubtus ochroleucus, nunc ſubrotundus, nunc obtuſe trigonus, margine nunc ſinuato, nunc potius repando, ore obtuſe pentagono, ano nunc circulari, nunc transverſe ovali, foraminibus ei appoſitis nunc brevioribus ſubovatis, nunc longioribus, anguſtioribus, linearibus, ambulacris petala ovata mentientibus, ex ſimplici punctorum interiori ſerie, et ſtriarum obliquarum teſtam penetrantium ordine conſtatis.

65. E.

Cui tribui accenſendi, quos echinanthos appellat Cl. v. Phelſum, ſiquidem vere diſtinctae ſint ſpecies, Vyfhoekje *et* Sherprugge Egebloim, *et* Echinites *oblongus quinqueradiatus?*

pentaporus. 65. E. ambulacris apice emarginatis, ano ori proximo: foraminibus quinque. *Leſke apud Klein echinod. p. 197. t. 21. C. D.*

Phelſ. Zee-eg. p. 35. n. 11. Vyfbuizige Egelkoek.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1105. *n.* 17. V.
Hugh barb. 280. *t.* 24. *f.* 3. 4.
Broxm. obſerv. p. 296.
Seb. muſ. 3. *t.* 15. *f.* 9. 10.
Argenv. conch. 2. *p.* 63. *t.* 7. *f.* C.
Gualt. teſtac. t. 110. *f.* E.
Delic. nat. ſel. 1. *p.* 93. *t.* D. I. *f.* 16.
Dav. catal. 1. *p.* 423. *n.* 955.

Habitat - - - obtuſe pentagonus, ſupra ex albo cinereus leviſſime rubeſcens, ſubtus medium verſus excavatus, albus, parum flaveſcens, venis caeruleſcentibus, teſtae aſſulis prominentibus, ambulacris ovalibus, ore obtuſe pentagono: labiis parum prominentibus foramine pertuſis, ano fere tetragono: foraminibus appoſitis linearibus et ſubovalibus, vertice ſtella pentagona picto.

hexaporus. 66. E. orbicularis, ambulacris anguſtis, foraminibus ad anum ſex anguſtis. *Leſke apud Klein echinod. p.* 199. *t.* 50. *f.* 3. 4.

Phelſ. Zee-eg. p. 33. *n.* 2. Doorgeboorde Egelſchyf.
Seb. muſ. 3. *t.* 15. *f.* 7. 8.
Delic. nat. ſel. 1. *p.* 93. *t.* D. I. *f.* 17.
Davil. catal. 1. *p.* 423. *n.* 955.

Habitat in Oceano indico, americano, ſeptentrionali, *vix diverſus a pentaporo, cinereus vertice umbilicato, baſi parum excavata: lineolis picturam frondoſam referentibus obſcuriori.*

emarginatus. 67. E. ſubpentagonus, ambulacris ovatis, ano ovali ab ore magis remoto: foraminibus ſex marginem attingentibus. *Leſke apud Klein echinod. p.* 200. *t.* 50. *f.* 5. 6.

Phelſ. Zee-eg. p. 34. *n.* 6. Loefwerk.

Habitat ad inſulam Burboniae, *ex bruno cineraſcens, ſubcordato-ovalis, leviter pulvinata, ſinuoſa, diametro longitudinali 4 pollices et 8 lineas, transverſa 4 pollices et 6 lineas aequante, vertice patulo, baſi planiore, lineis flexuoſis ramoſis inſculptis picta.*

auritus. 68. E. margine undato: inferiori rotundato; ſuperiore ſubquadrato bis inciſo, inter ſingula bina ambulacra poro hians. *Leſke apud Klein echinod. p.* 202.

Phelſ.

Phelſ. Zee-eg. p. 34. *n.* 1. Geoorde Stomp-hart.
Seb. muſ. 3. *t.* 15. *f.* 1. 2.
Habitat in ſinu perſico, *ex cinereo flavus, margine ſuperiori ſpadiceo, baſi plana, punctata, radiatim ſtriata, ano oblongo ori proximo.*

inauritus. 69. E. ſubcordatus aſſulatus: aſſulis hexagonis, ambulacris quinque ovalibus apice emarginatis: quinto longiore, ſingulis binis poro interſito. *Leske apud Klein echinod. p.* 202.
Phelſ. Zee-eg. p. 34. *n.* 2. Ongeoorde Stomphart.
Rumpf amboin. p. 37. *t.* 14. F.
β) *Phelſ. Zee-eg. p.* .34 Schyfgeſcheurde Egelkoek zonder buizen.
Seb. muſ. 3. *t.* 15. *f.* 3. 4.
Habitat in Amboinae fluvio Wagnitoe, 5-6 *pollices longus latusque, latiore fine bis inciſus, tenuis, granulis ſpinis baſin praebentibus denſe obſitus, ſupra ex rufeſcente cinereus, ſubtus ex violaceo ruber.*

tetraporus. 70. E. orbicularis leviter ſinuoſus, quatuor foraminibus utrinque pertuſus, ano circulari. *Leske apud Klein echinod. p.* 204.
Phelſ. Zee-eg. p. 34. *n.* 5. Schyf geſcheurde Egelkoek met buiſen.
Seb. muſ. 3. *t.* 15. *f.* 5. 6.
Habitat - - - *ex flavo dilute cinereus, vertice quinque foraminibus pertuſo, ambulacris apice obtuſis, baſi ſulcis* 10 *flexuoſis apice bifidis exarata, ore rotundo quinquedentato.*

11 *ſuperficie integra*, Lagana Kleinii.

Laganum. 71. E. ambulacris ovalibus ſubtiliſſime ſtriatis apice fiſſis, vertice prominente, ano circulari margini vicino. *Leske apud Klein echinod. p.* 204. *t.* 22. *f.* a. b. c.
Rumpf amb. p. 36. *t.* 14. *f.* E. Zeereal.
Bocc. obſ. p. 296. *f.* 2.
Gualt. teſt. CX. *f.* C. C.
Seb. muſ. 3. *t.* 15. *f.* 25. 26.
Plot. oxfordſh. p. 92. §. 53. *f.* 12.
Habitat - - - *granulatus, ochroleucus, ovatus, ſubpentagonus, baſi radiis* 5 *excavatis in totidem areas aequales diviſa, ore obtuſe pentagono, ano vix lineae latitudine*

tudine a margine diſtante; vertice 5 foraminibus inter ambulacra pervio.

ſubrotundus. 72. E. orbicularis, ambulacris radiatis. *Leske apud Klein echinod. p.* 206. *t.* 47. *f.* 7.
Aldrov. muſ. met. p. 458.
Scill. corp. mar. t. 8. *f.* 1-3.
Andreae Br. a. d. Schw. t. 5. *f.* 8.
Davil. catal. 3. *p.* 184. *n.* 229.
Valent. muſ. t. 3. *f.* 7. b.
Habitat - - - hactenus non niſi foſſilis inventus.

reticulatus. 15. E. ovatus, ambulacris quinis ovalibus, ſuperficie reticulata.
Phelſ. Zee-eg. p. 34. Echinoglycus ovalis.
Leske apud Klein. echinod. p. 207. *t.* 45. *f.* 8. 9.
Rumpf amboin. t. 14. C.
Gualt. teſt. t. CX. *f.* D.
Seb. muſ. 3. *t.* 15. *f.* 23. 24. 35. 36. 38.
β) Phelſ. Zee-eg. p. 34. Echinoglycus pentagonus.
Seb. muſ. 3. *t.* 15. *f.**
Habitat in Oceano americano *et* indico.

orbicularis. 73. E. circularis, ambulacris ovalibus acutis, baſi radiis decem impreſſis poroſis ano inter os et marginem medio cum ore circulari. *Leske ap. Klein echinod. p.* 208. *t.* 45. *f.* 6. 7.
Rumpf amb. p. 37. Zeeſchelling.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1105. *n.* 17. *δ.*
Gualt. teſt. t. CX. *f.* B.
Breyn. ech. t. 7. *f.* 1. 2.
Bocc. obſ. p. 269. *f.* 2. 3.
Lang. lap. fig. p. 122. *t.* 35. *f. ult.*
Habitat in mari indico.

corollatus. 74. E. orbicularis ambulacris ovalibus obtuſis brevibus.
Lesk. ap. Klein echinod. p. 209. *t.* 40. *f.* 4. Echinodiſcus roſaceus.
Phelſ. Zee-eg. p. 34. *n.* 8. Rooſe topje.
Walch dil. monum. 2. *p.* 180. *t.* E. II. *f.* 8.
Habitat - - - hactenus tantummodo foſſilis repertus.

†† *margine dentato*, Rotulae Kleinii.

decadactylos. 75. E. teſta foraminibus quatuor oblongis pervia, marginis dentibus decem. *Leske apud Klein echinod. p.* 209. *t.* 22. A. B.

Syſt.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1105. *n.* 17. *β.*
Gualt. teſt. t. 110. *f.* H.
Seb. muſ. 3. *t.* 15. *f.* 17. 18.
Davil. cat. 1. *p.* 425. *n.* 960.
Habitat - - - granulis aſper, ſupra ex viridulo caeruleſcente et cinereo varius, ambulacris ſuturisque pallide carneis, baſi ex flaveſcente carnea: ſulcis 10 *impreſſis flexuoſis apice bifidis, ex virideſcente cinereis, ambulacris ex lanceolato ovalibus, integris, biporoſis, per ſtrias obliquas nexis, marginis dentibus alternatim brevioribus, ore rotundo, ano ovato.*

octodactylos. 76. E. anterius orbicularis, foraminibus duobus pervius, poſterius octodentatus, ambulacris lanceolatis. *Leske apud Klein echinod. p.* 211. *t.* 22. *f.* C. D.
Phelſ. Zee-eg. p. 33. *n.* 6. Agtvingerige Egelſchyv.
Breyn. echin. p. 64. *t.* 7. *f.* 5. 6.
Gualt. teſt. t. 110. *f.* F.
β) *Phelſ. Zee-eg. p.* 33. Echinotrochus decemdentatus.
Seb. muſ. 3. *t.* 15. *f.* 15. 16.
Habitat - - - rarior, ex cinereo albicans, aſſulatus, aſſulis convexis, concoides, vertice umbilicato, ambulacris emarginatis.

Orbiculus. 17. E. anterius orbicularis integer, poſterius inaequaliter dentatus, ambulacris lanceolatis apice fiſſis hinc flexis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1105. *n.* 17. Echinus planus ſuborbicularis; ambulacris quinis ovalibus, ano ſubremoto.
Leske ap. Klein echin. p. 212. *t.* 22. E. F. Echinodiſcus dentatus.
Rumpf amb. t. 14. *f.* I. Zonne-ſtrualde Pannekoek.
Breyn. echin. t. 7. *f.* 3. 4.
Bocc. obſ. p. 273. *f.* 15.
Valent. muſ. 3. *p.* 177. *f.* 2.
Argenv. conch. 2. *t.* 7. *f.* D.
Davil. catal. 1. *p.* 425. *n.* 959.
β) *Leske apud Klein echinod. t.* 49. *f.* 6. 7.
Seb. muſ. 3. *t.* 15. *f.* 19. 20.
Habitat in mari indico, *non perforatus, ex aſſulis planis hexagonis compactus, baſi plana ſulcis impreſſis diſtincta, ore rotundo, ano ovali.*

††††††† *ambulacris* 10 *e vertice radiis rectis biporoſis ſtellatis, ore anoque in media baſeos parte vicinis,* Echinocyami Phelſumii *et* Leskii.

Nucleus. 77. E. ſuperficie globoſa, ambitu orbiculari, baſi anguſtata medio plana, lateribus ſulcatis, ambulacris pulvinatis, vertice excentrico. *Phelſ. Zee-eg. p.* 131. *n.* 1. *t.* 1. *f.* 1-5. *Leske apud Klein echinod. p.* 213. *t.* 48. 2a-2e.

Habitat - - - ex flaveſcente cinereus, vertice 4 *poris pervio, ore circulari, anum oblongiuſculum ſuperante.*

centralis. 78. E. ſuperficie globoſa, ambitu ſuborbiculari, baſi pulvinata, lateribus tenuiſſime ſulcatis, ambulacris vix pulvinatis, vertice centrali. *Phelſ. Zee-eg. p.* 131. *n.* 2. *t.* 1. *f.* 6-10. *Leske ap. Klein echinod. p.* 213.

Habitat - - - ano minimo orbiculari, an vere diſtinctus a nucleo?

Ervum. 79. E. ſuperficie globoſa, ambitu ſubovali, baſi ſubanguſtata, lateribus ſulcatis, ambulacris ſubpulvinatis vertice centrali. *Phelſ. Zee-eg. p.* 131. *n.* 3. *t.* 1. *f.* 11-15. *Leske apud Klein echinod. p.* 213.

Habitat - - - nucleo paulo major, ore anoque aequalibus.

craniolaris. 80. E. ſuperficie anterius globoſa, poſterius ſubquinquangulari pulvinata declivi, ambitu elliptico, baſi ſubanguſtata, lateribus ſulcatis, ambulacris pulvinatis, vertice excentrico. *Phelſ. Zee-eg. p.* 132. *n.* 4. *t.* 1. *f.* 16-20. *Leske apud Klein echinod. p.* 214. *t.* 48. 3a-3e.

Pall. ſpicil. zool. 9. *t.* 1. *f.* 24. Echinus minutus ſubglobofus ex orientali India.

Habitat in India, *albus, granulis circulo inſculpto cinctis, obſeſſus, verticis poris* 4.

turcicus. 81. E. ſuperficie baſique pulvinatis, ambitu elliptico, lateribus vix ſulcatis, ambulacris ſubpulvinatis, vertice depreſſiore centrali. *Phelſ. Zee-eg. p.* 35. 132. *t.* 1. *f.* 21-25. *Leske ap. Klein. echinod. p.* 214.

Habitat - - - an vere diſtinctus a craniolari?

Vicia. 82. E. ſuperficie globoſa, ambitu obtuſe ovali, baſi ſubanguſtata, lateribus ſulcatis, ambulacris planiuſculis, vertice cen-

centrali. *Phelſ. Zee-eg. p.* 133. *t.* 1. *f.* 26-30. *Leske ap. Klein echinod. p.* 215.

Habitat in mari adriatico, *an vere diverſus a craniolari?*

Ovulum. 83. E. ſuperficie pulvinata, ambitu obtuſe ovali, baſi globoſa, lateribus vix ſulcatis, vertice centrali. *Phelſ. Zee-eg. t.* 1. *f.* 31-35.

Habitat - - - an revera diſtincta a craniolari ſpecies?

Lathyrus. 84. E. ſuperficie baſique pulvinatis ambitu ovali, lateribus vix ſulcatis, ambulacris pulvinatis, vertice fere centrali. *Phelſ. Zee-eg. p.* 133. *t.* 2. *f.* 1-5. *Leske apud Klein echinod. p.* 215. *t.* 48. 1*a*-1*c*.

Habitat - - - obſcurus ex flaveſcente cinereus, medius inter nucleum et craniolarem magnitudinis.

equinus. 85. E. ſuperficie baſique pulvinatis ambitu elliptico, lateribus laevibus, ambulacris ſubpulvinatis, vertice centrali. *Phelſ. Zee-eg. p.* 134. *t.* 2. *f.* 6-10. *Leske apud Klein echinod. p.* 215.

Habitat - - -

minutus. 86. E. ſuperficie pulvinata fere plana, ambitu ovato ſubquinquangulari, baſi anguſtata, lateribus ſulcatis, ambulacris pulvinatis, vertice centrali. *Phelſ. Zee-eg. p.* 134. *t.* 2. *f.* 11-15. *Leske apud Klein echinod. p.* 215.

Pall. ſpic. zool. 9. *p.* 34. *t.* 1. *f.* 25.

Aldrov. teſt. p. 412.

Habitat frequens, vere praeſertim, in littoris Belgici *arena, ore orbiculari.*

Faba. 87. E. ſuperficie baſique pulvinatis, ambitu obtuſe ovali, lateribus vix ſulcatis, ambulacris planis, vertice prominulo centrali. *Phelſ. Zee-eg. t.* 2. *f.* 16-20. *Leske ap. Klein echinod. p.* 216. *t.* 37. *f.* 6.

Delic. nat. ſel. 1. *p.* 90. *t.* D. I. *f.* 10.

Habitat - - - piſi magnitudine, ochroleucus, granulatus.

inaequalis. 88. E. ſuperficie anterius gibba, poſterius plana declivi, ambitu oblongo-ovali ſubquinquangulari, baſi globoſa ſubanguſtata, lateribus ſulcatis, ambulacris ſubpulvinatis, vertice centrali. *Phelſ. Zee-eg. t.* 2. *f.* 21-25. *Leske apud Klein echinod. p.* 216.

Habitat - - - dorſo inaequali.

89. E.

raninus. 89. E. ſuperficie globoſa poſterius magis declivi, ambitu acute ovali, baſi globoſa, lateribus ſulcatis, ambulacris ſubpulvinatis, vertice centrali. *Phelſ. Zee-eg. t.* 2. *f.* 26-30. *Leske apud Klein echinod. p.* 216.

Habitat - - - - nonne varietas minuti?

bufonius. 90. E. ſuperficie globoſa, ambitu ovato-cordato ſubtrigono, baſi pulvinata, lateribus ſubſulcatis, ambulacris pulvinatis, vertice fere centrali. *Phelſ. Zee-eg. p.* 136. *t.* 2. *f.* 31-36. *Leske apud Klein echinod. p.* 217.

Habitat - - - - nonne varietas minuti?

*** *ano laterali, oris tentaculis penicillatis,* Spatangi Mülleri.

† *ambitu per anfractus circulari, ore centrali, ano quadrato in ſuperficie,* Arachnoides Kleinii.

Placenta. 76. E. ſubconicus, areis decem: alternis anguſtioribus, ambulacris quinque laxis planis apice dehiſcentibus.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1105. *n.* 16. *Muſ. Lud. Ulr.* 714. Echinus planus orbicularis, ambulacris quinis bipartitis, ano marginali.

Leske ap. Klein echinod. p. 217. *t.* 20. A. B. Echinarachnius.

Petiv. amboin. t. 11. *f.* 5.

Rumpf amb. t. 14. *f.* G.

Breyn. echin. p. 64. *t.* 7. *f.* 7. 8.

Gualt. teſtac. t. 210. *f.* G.

Seb. muſ. 3. *t.* 15. *f.* 21. 22.

Davil. catal. 1. *p.* 424. *n.* 958.

Habitat in Oceano *meridionali, parum convexus, conoideus, ambitu ſubanguloſo, baſi plana, areis linea verticali obtuſe dentata bipartitis.*

†† *cordati,* Spatangi Leskii.

† *vertice ſulcato,* Spatangi Kleinii.

Cor anguinum. 91. E. ſupra convexus, ambulacris impreſſis quadrifariam poroſis areisque quinque.

α) Cor anguinum anglicum. *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 221. *t.* 23. C.

Phelſ. Zee-eg. p. 40. *n.* 3. Pokhart.

Mort. northampt. p. 235.

Lud. lith. brit. p. 47. *n. et f.* 964-967.

Hook works p. 285. *t.* 3. *f.* 8.

Breyn. echin. p. 62. *t.* 5. *f.* 5. 6.
Ritt. oryctol. goſl. p. 226. *t.* I. *f.* 7.
Davil. catal. 3. *p.* 181. *n.* 222.
β) *Phelſ. Zee-eg. p.* 40. *n.* 12. Geknotte Egelhart.
Walch monum. dil. 2. *p.* 176. *t.* E. I. *f.* 5. 6.
γ) *Phelſ. Zee-eg. p.* 40. *n.* 14. Rondagtige Egelhart.
Walch monum. dil. 2. *p.* 181. *t.* E. III. *f.* 1.
δ) *Phelſ. Zee-eg. p.* 40. Pluimhart.
ε) Cor anguinum, ſulcis criſpis. *Leske apud Klein echinod. p.* 224. *t.* 45. *f.* 12.
Phelſ. Zee-eg. p. 40. *n.* 15. Kruisbald.
Davil. catal. 3. *p.* 181. *n.* 222. §. 2.
ζ) Cor anguinum norwegicum. *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 225. *t.* 23. A. B. E. F.
Phelſ. Zee-eg. p. 40. *n.* 7. Bandhart.
Boccon. obſ. p. 219. *et* 304. *figg. med.*
Plot oxfordſh. p. 92. §. 13. *et* 102. *t.* 2. *f.* 11. *et t.* 7. *f.* 9.
Liſt. lap. cochl. p. 224. *tit. et f.* 28. 29.
Luid. litth. brit. p. 47. *n.* 968. 969.
Melle lap. fig. Lubec. t. 2. *f.* 4.
Bytem. bibliath. app. p. 37. *t.* 9. *f.* 33. *et p.* 51. *t.* 23. *f.* 271.
Baier oryctogr. Noric. p. 35. *t.* 3. *f.* 41. 42.
Walch diluv. monum. ſuppl. p. 224. *t.* 9. h. *f.* 13.
Davil. catal. 3. *p.* 181. *n.* 222. §. 3.
Mercat. metall. p. 282? Pentexoche minor ſ. meſpileus lapis.
Habitat - - - hactenus non niſi foſſilis inventus, an forte protypus hujus purpureus? an earum, quas Kleinius t. 23. *f.* E. F. *expreſſit Spatagus?*

lacunoſus. 13. E. ovatus gibbus, ambulacris quinis depreſſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 713.
Klein echinod. ed. Lesk. p. 221. *t.* 23.* A. B. *t.* 24. a. b. *t.* 27. A. Spatangus lacunoſus.
Phelſ. Zee-eg. p. 40. *n.* 8. Groote Holblad.
Rumpf amb. p. 36. *t.* 14. *f.* 2.
Gualt. teſtac. t. 109. *f.* C.
Delic. nat. ſel. 1. *p.* 96. *t.* D. III. *f.* 3.
Davil. catal. 1. *p.* 418. *n.* 947. *et* 3. *p.* 181. *n.* 222.
Aldrov. teſtac. p. 404. *f.* 1. 2.
muſ. met. p. 490. *f.* 2. 3.
Imper. hiſt. nat. p. 781.
Bocc. obſ. p. 296. *f.* 1.
Bonann. recr. 2. *p.* 92. *n.* 16. *f.* 16.
Scill. corp. mar. t. 7. *f.* 1. *t.* 10. *f.* 4. *t.* 25. *f.* 2.

Hook

Hook works p. 285. *t.* 3. *f.* 9.
Allion. oryct. p. 17. *n.* 1.
Kundm. rar. nat. et art. p. 95. *t.* 5. *f.* 7.
β) *Phelſ. Zee-eg. p.* 40. *n* 9. Kleine Holblad.
γ) *Phelſ. Zee-eg. p.* 40. *n.* 13. Egwyzige Steekeltonne.
δ) *Leske apud Klein. echinod. p.* 230. *t.* 24. *f.* c. d. e. *t.* 38. *f.* 5. Spatagus lacunoſus.
Phelſ. Zee-eg. p. 40. *n.* 10. Groote Hertogs muts.
Hook works p. 285. *t.* 3. *f.* 10.
Liſt. anim. angl. app. p. 28. *f.* 3.
Breyn. echin. p. 61. *t.* 5. *f.* 1. 2.
Seb. muſ. 3. *t.* 10. *f.* 21. a. b.
Argenv. conch. p. 311. *t.* 25. *f.* 1. *t.* 29. *f.* 22?
Delic. nat. ſel. 1. *p.* 92. *t.* D. I. *f.* 14. *et p.* 95. *t.* D. II. *f.* 6. 7.
Davil. catal. 1. *p.* 418. *n.* 947. 2.
ε) *Phelſ. Zee-eg. p.* 40. *n.* 11. Kleine Hertogs muts.
Habitat in mari indico, americano, atlantico, adriatico, belgico.

† † *vertice non ſulcato*, Spatangoidae Kleinii.

radiatus. 92. E. ambulacris quatuor, ſtriis impreſſis utroque latere poroſis, verticis poris quatuor, areis decem ſutura media ſerrata ſuturisque transverſis arcuatis diviſis. *Leske apud Klein echinod. p.* 234. *t.* 25.
Phelſ. Zee-eg. p. 40. *n.* 1. Straalblad.
Walch diluv. mon. p. 182. *t.* E. IV. *n.* 1. 2.
Habitat - - - hactenus non niſi foſſilis obvius, baſi plana, ore ſubreniformi, ſtella pororum ſubpentagona circumdato, ano ſubrotundo: margine 3 angulis prominente, ambulacris ex ſerie pororum per paria confertim poſitorum, in vertice ſingulis convergentibus conflatis.

purpureus. 93. E. ambulacris quaternis pentaloideis lanceolatis, tuberculis majoribus in ziczac poſitis, ſpinis acicularibus incurvis albis. *Leske ap. Klein echinod. p.* 235. *t.* 43. *f.* 3-5. *t.* 45. *f.* 5. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 17. *n.* 4. *t.* 6. *prodr.* 2850. *rar. p.* 11.
Phelſ. Zee-eg. p. 40. *n.* 2. Dikblad.
Rondel. piſc. 1. *p.* 580. *Geſn. aquat. p.* 426. *Aldrov. teſt. p.* 403. Echinus Spatagus et Briſſus.
Argenv. conch. p. 311. *t.* 25. *f.* 3. Pas de poulain.
Davil. catal. 1. *p.* 418. *n.* 947. 1. Coeur marin.
Hill anim. t. 11. High backed Sea-egg.
Aldr. muſ. met. p. 475. Scolopendrites.

Scilla corp. mar. t. 11. *f.* 1.
Allion. oryctogr. p. 18. *n.* 2.
Habitat rarior in mari norwegico, *ſupra convexus, ad latera declivis, anterius bicollis, poſterius truncatus, ſubtus planus, ab ore ad anum convexiuſculus purpureus, ſubtiliſſime granulatus, ſetis ſubtiliſſimis ſubclavatis, ſpinisque ſpatulatis, tuberculis albis inſidentibus aſper, taenia prope anum reniformi, e granis minimis albis multifariam conſlata, tuberculis albis copioſiſſimis cincta.*

puſillus. 94. E. ovalis, ambulacris quinis, ano remoto.
Müll. prodr. zool. dan. 3. *p.* 17. *t.* 91. *f.* 1-4. 2839. Spatagus flaveſcens.
Habitat in mari Norwegico, *minutus, a lacunoſo diſtinctiſſimus, an hujus familiae?*

complanatus. 95. E. utrinque ſubplanus, areis ambulacrisque decem, duobus in lacuna dorſi poſitis. *Leske apud Klein echinod. p.* 238. *t.* 51. *f.* 1. 2.
Lang. lap. fig. p. 119. *et* 121. *t.* 35. *f.* 1. 2.
Scheuchz. lith. helv. p. 61. *f.* 84.
muſ. diluv. n. 811. 813. 815.
oryctol. p. 318. *f.* 135.
Breyn. echin. p. 63. *t.* 6. *f.* 1. 2.
Bourg. petr. p. 76. *t.* 51. *f.* 330. 333. 343.
Davil. catal. 3. *p.* 181. *n.* 222.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis repertus, ſubrotundus.

ſubgloboſus. 96. E. utrinque convexus ſugloboſus aſſulatus, ambulacris denis ſtriato-biporoſis, ano ovato. *Leske apud Klein echinod. p.* 240. *t.* 54. *f.* 2. 3.
Mort. northampt. p. 233. *n.* 2. 3. *t.* 10. *f.* 8. 9.
Liſt. lap. cochl. p. 323. *tit. et f.* 26.
Luid lith. brit. p. 49. *n.* 983-994.
Lang. lap. fiſſ. p. 121. *t.* 35. *f.* 1. 2?
Scheuchz. muſ. diluv. p. 85. *n.* 800. 814.
oryctol. p. 317. 318.
Breyn. echin. p. 61. *t.* 5. *f.* 3. 4.
Buſal. nat. Merkw. p. 2598. *t.* 22. *f.* k.
Walch diluv. monum. 2. *p.* 182. *t.* E. IV. *f.* 3. 4.
Habitat - - - hactenus tantum inter foſſilia obvius, granulatus, verticis poris quatuor, areis ſutura ſerrata longitudinali diviſis, lineisque transverſis arcuatis exaratis; aſſulis

aſſulis heptagonis, ore ſubreniformi, tuberculis ſtellatim diſpoſitis cincto.

Ananchytis. 97. E. oblongo-cordatus ſubconicus, baſi planiore, ambulacris areisque decem, ore ſubrotundo margine elevato cincto, ano ovali inferius emarginato. *Leske apud Klein echinod. p. 243. t. 53. f. 1. 2.*
Mercat. met. p. 316. et app. p. 89. Ananchitis ſ. Synochitis.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis, rarior, arearum majorum aſſulis heptagonis, minorum hexagonis et pentagonis, ano faſcia elevata circumdato.

bicordatus. 98. E. vertice duplici. *Leske apud Klein echinod. p. 244. t. 47. f. 6.*
Andreae Br. a. d. Schw. p. 16. t. 2. f. C.
Habitat, rarior - - - hactenus modo inter foſſilia repertus.

carinatus. 99. E. dorſi medio carinato. *Leske apud Klein echinod. p. 245. t. 51. f. 2. 3.*
Baier oryct. nor. t. 3. f. 43.
Valent. muſ. 2. t. 3. f. 7. n. 1.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis, bicordato affinis, at poſterius anguſtior, ore reniformi, ano obſoleto.

††† *ovati.*

† *ambulacris ſulcatis*, Briſſi Kleinii.

Spatagus. 12. E. ovatus gibbus, ambulacris quaternis depreſſis. *Fn. ſuec. 2117. Muſ. Lud. Ulr. 712.*
Leske apud Klein echinod. p. 246. Spatangus Briſſus.
Müll. zool. dan. prodr. 2849. Spatagus flaveſcens.
Bocc. obſ. p. 296.
Ginann. adv. 2. p. 41. t. 29. f. 174.

maculoſus. α) E. *Lesk. ap. Klein echinod. p. 247. t. 24.* A. B. *t. 26.* A.
Phelſ. Zee-eg. p. 39. n. 4. Egelnoot ſmalle buyk.
Imperat. hiſt. nat. p. 780.
Scill. corp. mar. t. 4. f. 2. 3.
Rumpf. amb. p. 36. t. 14. n. 1.
Gualt. teſt. t. 109. f. A.
Davil. catal. 1. p. 419. n. 949.

major. β) *Phelſum Zee-eg. p. 39. n. 5.* Egelnoot breede buyk.

nodoſus. γ) *Phelſ. Zee-eg. p. 39. n. 3.* Geknotte Egelnoot.
Seb. muſ. 3. t. 10. f. 19.

orthopetalus. δ) *Phelſ. Zee-eg. p.* 39. *n.* 6. Egelnoot regtblad.
Seb. muſ. 3. *t.* 10. *f.* 22.

unicolor. ε) *Leske apud. Klein echinod. p.* 240. *t.* 26. B. C. Spatangus Briſſus unicolor.
Phelſ. Zee-eg. p. 39. *n.* 7. Effene Egelnoot.
Sloan. jam. 2. *p.* 268. *t.* 242. *f.* 3-5.

ovatus. ζ) *Leske apud Klein echinod. t.* 38. *f.* 4.
Delic. nat. ſel. 1. *p.* 91. *t.* D. I. *f.* 13.

carinatus. η) *Leske apud Klein echinod. p.* 249. *t.* 43. *f.* 4. 5. Briſſus late carinatus.
Phelſ. Zee-eg. p. 39. Breed gekielde Egelnoot.
Davil. catal. 1. *p.* 420. *n.* 420. *n.* 931.
Seb. muſ. 3. *t.* 14. *f.* 3. 4.
Gualt teſtac. t. 108. *f.* G. G.

grandis. ϑ) *Phelſ. Zee-eg. p.* 39. *n.* 8. Groote Egelnoot.
Seb. muſ. 3. *t.* 14. *f.* 5. 6.
Gualt. ind. teſt. t. 109. *f.* B. B.
Habitat in Oceano *omni, recens ſulphureus, colore ſenſim evaneſcente.*

†† *ambulacris non ſulcatis*, Briſſoidae Kleinii.

briſſoides. 100. E. oblongus, ambulacris quatuor biporoſis ex ovato lanceolatis per ſulcos transverſos connexis: tuberculis majoribus arcuatim interſitis. *Leske ap. Klein echinod. p.* 257. *t.* 27. B.
Phelſ. Zee-eg. p. 38. *n.* 1. Slingerblad Egeley.
Aldrov. muſ. met. p. 455. *f.* 11.
Scilla corp. mar. t. 10. *f.* 1.
Geſn. petrif. p. 35. *n.* 11.
Breyn. ech. t. 4. *f.* 3?
Mercat. metall. p. 374?
Walch diluv. monum. II. *p.* 181. *t.* E. III. *f.* 5? *et* 2.
Dav. catal. 3. *p.* 181. *n.* 224.
β) *Phelſ. Zee-eg. p.* 38. *n.* 2. Gebogen blad Egeley.
Habitat - - - - ſaepius foſſilis, aſſulatus, granulis aſper, ore reniformi, pororum ſtella pentagona cincto.

teres. 101. E convexus, ambulacris quatuor biporoſis petaloideis non connexis. *Leske apud Klein echinod. p.* 252. *t.* 49. *f.* 12. 13.
Phelſ. Zee-eg. p. 39. *n.* 3. Peeiswyze Egeley.
Seb. muſ. 3. *t.* 15. *f.* 27. 28.
Habitat - - - briſſoidae affinis, at ore latiore, linea carinata utrinque poris pertuſa a vertice deſcendente diſtinctus.

Oliva. 102. E. ſupra convexus punctatus olivaceus, faſcia duplici nuda ab ore ad anum extenſa. *Leske apud Klein echinod. p.* 252. *t.* 14. *f.* f. g.
Phelſ. Zee-eg. p. 39. *n.* 1. Kleine Egelnoot.
Seb. muſ. 3. *t.* 15. *f.* 31. 32?
Habitat - - - - radiis ſupra 4 ſtellatis.

Amygdala. 103. E. figura amygdalae. *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 253. *t.* 24. *f.* h. i.
Habitat - - -

ovalis. 104. E. aſſulatus, ovalis, ambulacris areisque decem, his ſutura media ſerrata diviſis. *Leske apud Klein echinod. p.* 253. *t.* 41. *f.* 5.
Phelſ. Zee-eg. p. 32. *n.* 3. Egelſchuitje twee top.
d'Annon. act. Helv. 4. *p.* 275. *t.* 14. *f.* 1-3.
Walch diluv. monum. 2. *p.* 182. *t.* E. III. *f.* 6.
Beckm. nov. act. Goett. 3. *p.* 115.
Habitat - - - hactenus modo inter foſſilia repertus; an hujus familiae?

pyriformis. 105. E. ovatus, altero fine gibbus, baſi planus, ambulacris quinis ſubpetaloideis, obſolete poroſis. *Leske apud Klein echinod. p.* 255. *t.* 44. *f.* 7. *t.* 51. *f.* 5. 6.
Walch Naturf. 9. *p.* 268.
Habitat - - - hactenus non niſi foſſilis, ore anoque rotundis, illo ſubpentagono quinquelabiato; ad quam familiam referendus?

Lapiscancri. 106. E. obtuſe ovatus, convexus, vertice excentrico poris quatuor pertuſo, ambulacris quinis biporoſis ovato-lanceolatis apice fiſſis. *Leske apud Klein echinod. p.* 256. *t.* 49. *f.* 10. 11.
Habitat - - - foſſilis hactenus modo repertus, oris ſitu et ſtructura pyriformi ſimilis, ano ſupra marginem teſtae latiorem poſito, rotundo, ore fini anguſtiori propiore baſi plana, leviſſime excavata, medio nuda, ceterum tuberculis circulo cinctis in ſeries digeſtis aſpera; cui familiae adſcribendus?

patillaris. 107. E. maxime depreſſus, ambulacris ſtellam imitantibus. *Leske apud Klein echinod. p.* 256. *t.* 53. *f.* 5-7.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis obvius, ambitu ovato, dorſo leviſſime convexo, baſi leniter excavata, lateribus granulatis, ore orbiculari.

 III. TE-

III. TESTACEA.

Animalia *Molluſca ſimplicia*, *domo ſaepius calcarea propria*, *obtecta.*

300. CHITON. *Animal* Doris.

Teſtae plures, ſecundum longitudinem ſibi appoſitae dorſo incumbentes.

hiſpidus. 1. Ch. teſta ſexvalvi ſtriata. *Schroet. Conchyl.* 3. *p.* 493. *t.* 9. *f.* 18.
Habitat in America, *mediae magnitudinis, ex atro cinereus: maculis punctisque albis, ſubtiliſſime ſtriatus: ſtriis ſubtiliſſime granulatis.*

tuberculatus. 2. Ch. teſta ſeptemvalvi, corpore tuberculato.
Muſ. Ad. Fr. 1. *p.* 96. Chiton oſcabrion.
Schroet. Conchyl. 3. *p.* 494. *t.* 9. *f.* 19. Chiton cylindricus.
Sloan jam. 2. *p.* 233? Patella oblonga articulata.
Habitat in America, *oblongo-ovalis, anguſtus, ſupra tuberculis in quincuncem poſitis inaequalis, ad latera cinereus albo miſtus: faſciis undulatis fuſcis dorſo viréſcente: faſcia lata nigerrima.*

aculeatus. 3. Ch. teſta octovalvi ſtriata, corpore ſubaculeato. *Amoen. acad.* 8. *t.* 3. *f.* 1. *Murr. teſtac. p.* 40. *t.* 2. *f.* 1. *Schroet. Conchyl. p.* 495.
Rumpf muſ. t. 10. *f.* 4. Limax marina.
Edw. glean. t. 286. *f.* B.
Seb. muſ. 2. *t.* 61. *f.* 4.
Chemn. Conch. 10. *t.* 173. *f.* 1692.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 173. *f.* 1691?
Habitat in Aſia, *facie tuberculati, ovalis, ſupra aculeis anguſtis ſubulatis rubris ſubarcuatis inaequalibus hiſpidus, teſtis conchiformibus, ultima reliquis minore.*

faſcicularis. 4. Ch. teſta octovalvi, corpore ad valvulas utrinque faſciculato. *Schroeter Conch.* 3. *p.* 496. *Müll. zool. dan. prodr.* 3017. *Chemn.*

Animal nonnullas chitonis *ſpecies inhabitans, edule.*

Chemn. Conchyl. 8. *t.* 95. *f.* 801? 10. *t.* 173. *f.* 1688. *Chiton. t.* 1. *f.* 2. a? b?

Habitat in Barbaria, *cinereus*, *laevis*, *teſtis leviter carinatis*, *juxta quarum latera animali*, *incluſo faſciculi pilorum totidem albidi.*

ſquamoſus. 5. Ch. teſta octovalvi ſemiſtriata, corpore ſquamuloſo. *Muſ. Lud. Ulr.* 465.* *Schroet. Conchyl.* 3. *p.* 497. *Chemn. Conchyl.* 8. *t.* 94. *f.* 788-791. *Chit. t.* 1. *f.* 1.
Petiv. gazoph. t. 1. *f.* 4. Oſcabrion.
Seb. muſ. 2. *t.* 61. *f.* 3.
Spengler Beſch. berl. Naturf. 1. *p.* 292. *t.* 7. *f.* L. M.
v. Born muſ. caeſ. Vind. teſtac. t. 1. *f.* 1. 2.
β) Chiton ſcaber variegatus. *Chemn. Conchyl.* 8. *t.* 94. *f.* 792. 793. *Chit. t.* 1. *f.* 3. a. b.
γ) Chiton laevis variegatus. *Chemn. Chiton. t.* 1. *f.* 4.
δ) Oſcabrion gallicum. *Argenv. conch. t.* 25. *f.* M.
ε) Chiton ſquamoſus, teſta ſeptemvalvi. *Schroeter in Litter.* 4. *p.* 14. *t.* 1. *f.* 2.
ζ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 173. *f.* 1689.
η) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 173. *f.* 1690.
Habitat in America, *aliquando ſat magnus*, *valvis rariſſime* 7, *in* 2 *partes diviſis*, *quarum altera granulata*, *altera ſubtiliſſime ſtriata*, *carinatus*, *utraque teſta extrema lunulata*, *vireſcens*, β) *thalaſſinus*, *faſciis alternis nigris et flavis vel albicantibus pictus.*

punctatus. 6. Ch. teſta octovalvi laevi, corpore punctis excavatis.
Amoen. acad. 3. *p.* 256. Chiton corpore punctato teſtis octo.
Müll. zool. dan. prodr. 3021. Chiton teſta octovalvi laevi carinata.
Eph. nat. cur. 1727. *p.* 63. *t.* 1. *f.* 1. 2. Calva ſerpentis diadema.
Osb. it. 62.
Seb. muſ. 3. *t.* 1. *f.* 13.
Habitat in Aſia, Europa, America.

ruber. 7. Ch. teſta octovalvi arcuato ſubſtriata, corpore rubro. *Fn. ſuec.* 2119. *Müll. zool. dan. prodr.* 3018. *Act. Nidroſ.* 3. *p.* 364. *t.* 6. *f.* 14. *Chemn. Conchyl.* 8. *t.* 96. *f.* 813. *Chit. t.* 2. *f.* 8.
β) Chiton marmoreus. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 420. *n.* 420. *Chemn. Conch.* 8. *t.* 96. *f.* 812.

 Habitat

Habitat in Oceano ſeptentrionali, *patellae more affixa, ovalis, oblongiuſculus dorſo carinatus, ad pollicem usque longus, ſpadiceus: ſtria dorſi obſcuriore albo limbata, animalis margine fuſco, aut flavus maculis punctisque rubris, β) ex albo rubroque varius.*

albus. 8. Ch. teſta octovalvi laevi dorſata, corpore albo. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 422. *n.* 421.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1107. *n.* 8. *Müll. zool. dan. prodr.* 3019. *act. Nidroſ.* 2. *p.* 54. Chiton teſta octovalvi laevi, valvula prima poſtice emarginata.
Chemn. Conch. 8. *t.* 96. *f.* 817. *Chiton. t.* 2. *f.* 9.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *ovalis, laevis.*

cinereus. 9. Ch. teſta octovalvi laevi carinata, corpore rubicundo: limbo ſubciliato. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 423. *n.* 422.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1107. *n.* 9. *Müll. zool. dan. prodr.* 3020. Chiton teſta octovalvi ovata.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſtac. t. 1. *f.* 3.
Chemn. Conchyl. 8. *t.* 96. *f.* 818.
Habitat in Oceano norwegico, *inter radices ulvarum,* 2 *lineas longus, depreſſus, anterius anguſtior, ſulcis* 2 *dorſi longitudinalibus, carinam mediam cingentibus, vivus, tum quoad teſtam tum quoad incolam rubicundus, mortuus et arefactus cinereus.*

bicolor. 10. Ch. teſta octovalvi craſſa dorſata extus thalaſſina intus nivea margine nigra.
Chemn. Conchyl. 8. *t.* 94. *f.* 794.
Habitat - - - *ſat magnus, valvis medio repandis, anteriori radiatim ſtriata.*

ceraſinus. 11. Ch. teſta octovalvi ceraſina laevi: marginis dentibus niveis.
Chemn. Conchyl. 8. *t.* 94. *f.* 796.
Habitat - - - *incola ſiccatus niger.*

magellanicus. 12. Ch. teſta octovalvi craſſa ex fuſco atra ſupra convexa: faſcia dorſi nigricante media, ſtriis lateralibus flavicantibus.
Seb. muſ. 3. *t.* 1. *f.* 14. 15.
Chemn. Conch. 8. *t.* 95. *f.* 797.
Habitat in freto magellanico, *magnus, teſta intus medio atra, ceterum laete viridi, margine omni fuſco.*

fuſcus. 13. Ch. teſta octovalvi fuſca glaberrima, intus marginisque dentibus nivea, dorſi maculis trigonis nigris: utrinque faſciis obſcure flavicantibus.

Chemn. Conchyl. 8. *t.* 95. *f.* 799. 800.
Habitat in India, *magellanico anguſtior, dentibus marginis pluribus, et utriusque valvae extremae majoribus, dorſo magis elevato et carinato.*

maculatus. 14. Ch. teſta octovalvi glaberrima intus thalaſſina margine, ſquamis ex cinereo albis veſtita, valvis mediis anterius, nonnullis utrinque fuſco maculatis.
Chemn. Conchyl. 8. *t.* 95. *f.* 802.
Habitat - - - rarior.

marmoratus. 15. Ch. teſta octovalvi glaberrima albo et nigricante varia, valvis mediis intus virentibus.
Chemn. Conchyl. 8. *t.* 95. *f.* 803-805.
Chiton. t. 1. *f.* 5.
Knorr Vergn. 4. *t.* 17. *f.* 3. 4.
β) Chiton marmoratus, teſta ſeptemvalvi. *Schroeter n. Litterat.* 4. *p.* 40. *t.* 1. *f.* 3.
Habitat in Oceano americano, *nunc magis, nunc minus anguſtus et convexus, faſciis, ſtriis, venis, maculis nigricantibus et albis alternis, limbo tumido ſquamoſo: areis albidis, chalybeis et nigricantibus alternis.*

granulatus. 16. Ch. piceus ſupra planus, punctis elevatis numeroſis in ſeries digeſtis, limbo lato coriaceo ſpinoſo: areis nigris albisque alternis.
Chemn. Conchyl. 8. *t.* 96. *f.* 806.
Habitat in Oceano americano *valvis* 8, *rarius* 7.

piceus. 17. Ch. teſta octovalvi ſupra glabra picea nigro albidoque varia.
Chemn. Conchyl. 8. *t.* 96. *f.* 807-810.
Chemn. Chit. t. 2. *f.* 6. *et* 6. a. b. c.
Habitat in mari americano *et* rubro, *granulato affinis, intus medio niger, ad latera vireſcens, maculis dorſi nigris et maculis faſciis venisque albidis aut vireſcentibus alternis, valvis rarius* 7 *aut* 6.

indus. 18. Ch. teſta octovalvi ex cinereo albida, limbo ſquamoſo, valvis mediis ſubtiliſſime punctatis.
Chemn. Conchyl. 8. *t.* 96. *f.* 811.
Habitat in mari americano.

minimus. 19. Ch. teſta octovalvi, glabra nigra hinc inde farinoſa.
Chemn. Conch. 8. *t.* 96. *f.* 814.
Habitat in mari norwegico, *prope* Bergam *repertus, minutus.*

20. Ch.

Cimex. 20. Ch. teſta octovalvi, carinata diaphana faſciata, valva utraque extrema tenuiſſime punctata.
Chemn. Conchyl. 8. *t.* 96. *f.* 815.
Habitat in mari norwegico, *parvus, intus ex cinereo albidus, faſciis nigricantibus et dilutioribus alternis.*

Aſellus. 21. Ch. teſta octovalvi nigerrima ſupra convexa, dorſi macula in ſingulis valvis flavicante.
Chemn. Conch. 8. *t.* 96. *f.* 816.
Habitat in mari norwegico, *Mytilo Modiolo affixus.*

Gigas. 22. Ch. teſta octovalvi craſſa convexa alba, valva prima crenata, poſtrema dentata, mediis emarginatis.
Chemn. Conch. 8. *t.* 96. *f.* 819.
Chiton. t. 2. *f.* 10.
Habitat ad caput bonae ſpei, 4 *pollices et ultra longus, limbo tumido, coriaceo, ex atro fuſco.*

thalaſſinus. 23. Ch. teſta ſexvalvi glabra ovali thalaſſina, ſupra linea media dilutiori, limbo tenui hyalino.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 509. *n.* 18.
n. Litterat. 4. *p.* 4. *t.* 1. *f.* 1.
Habitat - - - *parum convexus.*

islandicus. 24. Ch. teſta octovalvi ſubcylindrica tenuiſſime punctata nigra: limbo cinereo.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 509. *n.* 19.
Habitat - - - *veneri islandicae adhaerens, minimus, utrinque anguſtus.*

crinitus. 25. Ch. teſta ſeptemvalvi pilis brevibus denſe obſita.
Brit. zool. 4. *p.* 60. *t.* 36. *f.* 1.
Habitat in mari ſcotico *prope* Aberdeen, $\frac{5}{8}$ *pollicis longus.*

marginatus. 26. Ch. teſta octovalvi: margine ſerrato reflexo laevi.
Brit. zool. 4. *p.* 61. *t.* 36. *f.* 2.
Habitat in mari britannico *prope* Scarborough.

laevis. 27. Ch. teſta octovalvi glaberrima: faſcia dorſi longitudinali elevata.
Brit. zool. 4. *p.* 61. *t.* 36. *f.* 3.
Habitat in mari ſcotico *prope* Loch Broom.

amiculatus. 28. Ch. teſta octovalvi reniformi fragiliſſima, corio extus ſcabro obducta. *Pall. nov. act. Petr.* 2. *p.* 241. *t.* 7. *f.* 26-30.
Habitat

Habitat ad Kuriles *inſulas, ad 6 pollices usque longus, valvis imbricatis.*

301. LEPAS. *Animal* Triton.

Teſta baſi affixa multivalvis: valvis inaequalibus erectis.

Balanus. 1. L. teſta conica ſulcata, operculis acuminatis. *Fn. ſuec.* 2122.* *Muſ. Lud. Ulr.* 466. *n.* 2.* *It. wgoth.* 170. *Müll. zool. dan. prodr.* 3022. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 423. *n.* 423.
Leeuwenh. ap. 82. *p.* 472. *t.* 465.
Ellis art. angl. 1758. *v.* 2. *t.* 34. *f.* 17.
Liſt. conch. t. 443. *f.* 286.
v. Born muſ. caeſ. Vind. teſt. t. 1. *f.* 4.
Chemn. conch. 8. *t.* 97. *f.* 820.
β) *Chemn. Conch.* 8. *t.* 97. *f.* 826.
γ) *Bonann. muſ. Kirch.* 1. *f.* 35.
Habitat copioſiſſima ad littora Oceani europaei, *et* maris mediterranei, *cancris aliisque teſtaceis adhaerens, utplurimum alba, ſatis magna, areis extrinſecus 6, quarum 3 elevatae, ſtriatae, 3 excavatae magis glabrae, operculis rugis transverſis ſubtiliter crenatis, 2 minoribus, 2 majoribus acuminatis.*

balanoides. 2. L. teſta conica truncata laevi, operculis obtuſis. *Fn. ſuec.* 2123.* *Müll. zool. dan. prodr.* 3023. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 424. *n.* 424.
Petiv. muſ. 82. *n.* 802. Balanus parvus vulgaris.
Liſt. Conchyl. t. 444. *f.* 287.
hiſt. anim. t. 5. *f.* 41.
Leeuwenh arc. 474. *t.* 465. *f.* 1. E. *et f.* 7.
Klein oſtr. t. 12. *f.* 94. 95.
Arcbenv. Concb. t. 26. *f.* C.
Chemn. Conch. 8. *t.* 97. *f.* 821-825.
β) *Chemn. Conch.* 8. *t.* 98. *f.* 833.
Habitat in Oceani ſeptentrionalis, americani, indici *rupibus, non ſupra refluxum altius, ſub fluxu dehiſcens, ſub aeſtu clauſus, tentaculis ciliatis exſertis animalcula obvia captura, mytilos edules ſaepe arcte operiens, balano minor, albida, cinerea aut variegata, nunc depreſſo-convexa, nunc ſubcylindrica elongata, animali flavicante granulato.*

Tintinnabulum. 3. L. teſta conica obtuſa rugoſa fixa. *Muſ. Lud. Ulr.* 466. *n.* 3.
Lang. teſtac. 4. Balanus tintinnabuliformis laevis.
Liſt. conchyl. t. 443. *f.* 285.
Rumpf muſ. t. 41. *f.* A. B.
Gualt. teſt. t. 106. *f.* E. H. I.
Argenv. conchyl. t. 26. *f.* A. B.
Klein oſtr. t. 12. *f.* 97.
Ellis act. angl. 1758. *vol.* 2. *t.* 34. *f.* 8.
Knorr Vergn. 2. *t.* 2. *f.* 6. *et* 5. *t.* 30. *f.* 1.
Chemn. Conch. 8. *t.* 97. *f.* 828-831.
β) Tulipa alba. *Chemn. Conch.* 8. *t.* 98. *f.* 832.
Habitat in Oceano americano *et* indico β) *in* ſeptentrionali, *balano affinis, rubro alboque varia, aut caeruleſcens, intus alba, nunc cylindrica, nunc paulo craſſior, et paulisper incurva, areis elevatis perpendiculariter, depreſſis transverſe ſtriatis, operculis fere aequalibus.*

Diadema. 4. L. teſta ſubrotunda, ſexlobata ſulcata.
Walch Naturf. 8. *t.* 4. *f.* A. B. C. Balanus polythalamius.
Liſter Conch. t. 445. *f.* 288.
Gualt. teſtac. t. 106. *f.* Q.
Boccon. recher. 294.
Klein oſtr. t- 12. *f.* 98.
Schroeter Journ. 4. *t.* 2. *f.* 4. 5.
Born muſ. caeſ. Vind. teſt. t. 1. *f.* 5. 6. *et p.* 7. *f.* a.
Chemn. Conch. 8. *t.* 99. *f.* 843. 844.
Habitat in mari mediterraneo *et* indico, *ſordide alba,* $1\frac{1}{4}$ *pollicis circiter alta, ſurſum anguſtior, apertura ſuperiori infundibuliformi, dimidiam reliquae teſtae diametrum aequante, areis exterius* 12 *triangulis, quarum* 6 *excavatae ſtriis ſubtilibus transverſis exaratae, ſex alterae elevatae* 4-5-6 *prominentiis arcte ſibi accumbentibus, et ſtriis transverſis crenatis exaratis conſtant.*

balaenaris. 5. L. teſta ſubconica, lobis ſex elevatis rugoſis quadripartitis, operculo membranaceo bidentato. *Müll. zool. dan. prodr.* 3024. O. *Fabr. Fn. groenl. p.* 425. *n.* 425.
Rumpf muſ. t. 14. *f.* H.
Petiv. amb. t. 1. *f.* 11.
Walch Naturg. 10. *t.* 1. *f.* 11. 12.
Chemn. Conch. 8. *t.* 99. *f.* 845. 846.
Habitat in Balaena boope, *pectoris ſulcis pinnisque adhaerens, candore ſuo balaenam prodens et ad fugam exhortans,* 15 *circiter lineas alta, diametro baſeos* 19 *lineis aequali,*

aequali, craſſa lamelloſa, ſurſum lentiſſime anguſtata, ſupra truncata, obtuſiſſima: apertura membrana luteſcente laxa clauſa, areis 12 triangularibus, quarum 6 elevatae fere aequales, transverſim rugoſo-granulatae, et ſulcis 3 longitudinalibus quadripartitis exaratae, ſex humiliores, ſtriis transverſis ſubtiliſſimis pictae; an forſan eadem cum diademate?

teſtudinaria. 6. L. teſta plano-convexa, radiis ſex excavatis ſtriatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 467. *n.* 4.*
Rumpf muſ. t. 40. *f.* K. Verruca teſtudinaria.
Bonann. muſ. Kirch. 1. *f.* 34. 36. 37.
Gualt. teſt. t. 106. *f.* M. N. O. P.
Petiv. gazoph. t. 9. *f.* 9.
Planc. Conch. t. 5. *f.* 2. 2.
Klein t. 12. *f.* 99.
Ellis act. angl. 1758. *vol.* 2. *t.* 34. *f.* 12. 13.
Ginan. adr. 41. *t.* 30. *f.* 175.
Knorr Vergn. 3. *t.* 30. *f.* 3. 4.
Bock Naturf. 12. *t.* 4. *f.* 9. A. B.
Chemn. Conch. 8. *t.* 99. *f.* 847. 848.
Schroeter Journ. 4. *p.* 355. 5. *p.* 518. 6. *p.* 305.
Habitat in pelago, *ſaepe teſtudinibus adhaerens, globo in medio diſciſſo ſatis ſimilis, alba, ſatis laevis, apertura inferiore hexagona, diametro ſuperiorem ſuperante, operculis 4 trigonis membranae inſertis.*

galeata. 7. L. teſta galeata, apertura laterali. *Mantiſſ. pl.* 2. *p.* 544.
Pall. elench. zooph. p. 198. Lepas Calceolus.
Schroet. Einl. in die Conch. 3. *p.* 318. *n.* 7. *t.* 9. *f.* 20. a. b.
Habitat in Gorgonia verrucoſa *et* Ventilabro, *cymbiformis, laevis, apertura rhombea.*

palmipes. 8. L. teſta erecta conica, valvulis baſis palmatis. *Mant. pl.* 2. *p.* 544.
Habitat in Oceano, *alba, depreſſiuſcula, piſi majoris magnitudine, laevis, valvulis 4-6, baſi ad medium usque diviſis: digitis 5-6, operculo quadrivalvi obliquo.*

Tulipa. 9. L. teſta ſubcubica laevi, operculis acutis transverſim ſtriatis. *Müll. zool. dan.* 3026. *Olaſſ.*

An ad hoc genus referendae teſtae, quas Bonanni muſ. Kirch. 1. f. 14. miſere depingendas curavit?

Olaff. isl. Reſ. 901. B. a. *t.* 11. *f.* 13.
Aſcan. ic. rar. natur. t. 10.
Habitat in Oceano ſeptentrionali.

Mitella. 10. L. teſta compreſſo erecta difformiter ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 467. *n.* 5.*
Lang. teſt. 4. Balanus tulipaeformis ſtriatus.
Geſn. aq. 121. Balanus Rondeletii.
Pet. gaz. t. 6. *f.* 10. Balanus chinenſis ſtriatus.
Rumpf muſ. t. 47. *f.* M.
Ellis act. angl. 1758. *vol.* 2. *t.* 23. *f.* 4.
Klein oſtr. t. 12. *f.* 100.
Seb. muſ. 2. *t* 61. *f.* 8. 3. *t.* 16. *f.* 3.
Chemn. Conch. 8. *t.* 100. *f.* 849. 850.
Habitat in Oceano indico; *coronae gemmatae ſimilis, alba, epidermide ſordide lutea tecta, multis valvis utplurimum triangularibus inaequalibus acutis conſtans, pedunculo communi nigro, coriaceo ſquamoſo intus cavo inſidentibus.*

Scalpellum. 11. L. teſta compreſſa tredecimvalvi laeviuſcula, pedunculo ſquamoſo inſidente. *Fn. ſuec.* 2121.*
Gualt. teſt. 106. *f.* C.
Ellis act. angl. 1758. *vol.* 2. *t.* 34. *f.* 4.
Liſt. Conch. t. 439. *f.* 281?
Argenv. Conch. t. 26. *f.* F? G?
Klein oſtr. t. 12. *f.* 91?
Müll. zool. dan. 3. *p.* 23. *t.* 94. *f.* 1. 2.
Chemn. Conch. 8. *p.* 294. *Vign.* 7. *f.* a. A.
Habitat in Oceano norwegico, *parva, anatifera minor, valvis ſquamae aemulis, utrinque ſenis, valva longa curvata reliquas complectente, pedunculo breviſſimo, rugoſo annulato.*

anſerifera. 12. L. teſta compreſſa quinquevalvi, ſtriata, pedunculo inſidente.
Liſt. Conch. t. 440. *f.* 283.
— *exerc. anat. t.* 19. *f.* 4. 5.
Gualt. teſt. 106. *f.* 2. 3.
Klein oſtr. t. 12. *f.* 93.
Chemn. Conch. 8. *t.* 100. *f.* 856.
Habitat in mari americano *et* atlantico, *anatiferae aequalis, etiam foſſilis, pedunculo ſubcroceo, valva prima curvata laevi dorſo carinata, reliquarum ſtriis magis evidentibus et diſtantibus, utraque majore pedunculum verſus magis turgida,*

turgida, ſine cuneato divergente, utraque minore anguſtiore magis acuminata ab anatifera diſcernenda.

anatifera. 13. L. teſta compreſſa quinquevalvi laevi pedunculo inſidente. *Fn. ſuec. 2. n.* 2120. *Muſ. Lud. Ulr.* 468. *n.* 6.*
Fn. ſuec. 1. *n.* 1350. Lepas teſta compreſſa baſi membranacea cylindrica.
Aldrov. orn. c. 20. *f.* 548. Concha anatifera.
Bonann. rear. et muſ. Kirch. 2. *f.* 2. Tellina pedata.
Imper. hiſt. nat. 904. Concha pedata.
Bauh. pin. 513. Arbor ex cujus ligni putredine vermes 1. 2. 3.
Stalp. obſ. 2. *p.* 458. *t.* 15. *Osb. it.* 82. Lepas anatifera cum Tritone.
Barth. cent. 6. *p.* 271.
Worm. muſ. 256.
Marcgr. braſ. 188.
Grew muſ. 148.
Hufn. inſ. 3. *t.* 6.
Sibb. muſ. 170. *n.* 2.
Liſt. Conch. t. 439. *f.* 282.
Gualt. teſtac. t. 106. *f.* A. D.
Argenv. Conch. t. 26. *f.* E.
zoomorph. t. 7. *f.* I. K.
Klein oſtr. t. 12. *f.* 89. 90. 92
Planc. Conch. t. 5. *f.* 4.
Columm. phytob. 110. *t.* 30.
Seb. muſ. 3. *t.* 16. *f.* 1. *a.* 2.
Needham micr. t. 7. *f.* 1. 2. *et t.* 6.
Ellis act. angl. 1758. *vol.* 2. *t.* 34. *f.* 6.
Knorr Vergn. 2. *t.* 30. *f.* 4. 5.
Murr. fund. teſtac. t. 2. *f.* 2.
Chemn. Conch. 8. *t.* 100. *f.* 853-855.
de la Faill. act. pariſ. peregr. vol. 9. *p.* 331. Macreuſe.
β) Concha anatifera ſubrotunda Bartholini. *Liſter Conch. t.* 439. *f.* 280.
γ) Tellina cancellifera ſtriis minimis argutiſſime ſignata cinerea. *Gualt. teſtac. t.* 106. *f.* B.
Habitat in Pelago *fere omni, utplurimum lactea, rarius margaritacea, interdum radio aut radiis binis nigro punctatis notata, pedunculo coriaceo nigro, rarius rubro, valvis tenuiſſime ſtriatis, majore utraque trigona, roſtro convergente, duabus aliis latioribus at duplo minoribus, quinta reliquas complectente anguſta, curvata, dorſo rotundata.*

aurita. 14. L. teſta membranacea, ventricoſa tubo inſidente, ore octovalvi dentato: tubulo gemino aurita.
Ellis act. angl. 1758. *t.* 34. *f.* 1. Lepas nuda comoſa aurita.
Seb. muſ. 3. *t.* 16. *f.* 5.
Edw. glean. t. 286. *f.* A.
Chemn. Conch. 8. *t.* 100. *f.* 857. 858.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *pedunculo longo.*

Pſittacus. 15. L. teſta poſterius adunca ſexvalvi rugoſo. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 179.
Habitat ad littus Chilenſe, *vix pollicem longitudine ſuperans, ſcopulis adhaerens, valvis* 2 *majoribus pſittaci roſtrum aemulantibus, carne alba, tenera, ſapidiſſima.*

minor. 16. L. teſta rubicunda ſexvalvi inaequivalvi, operculo acuminato.
Chemn. Conch. 8. *t.* 97. *f.* 827.
Habitat in India, *lineis transverſis albido-punctatis arcuatis picta.*

Verruca. 17. L. teſta hemiſphaerica ſerrata ſexvalvi, valvis quatuor exterioribus operculoque plicatis. *Spengler Schr. berl. Naturf.* 1. *p.* 101. *t.* 5. *f.* 1-3.
Müll. zool. dan. prodr. 3025. Lepas (Stroemia) teſta conico convexa ſerrata ſtriata, operculo elevatili.
Schroeter Journ. 5. *p.* 522. Lepas dentata ſ. ſerrata.
Stroem. act. Havn. 10. *p.* 6. *t.* 3. *f.* 1-9.
Habitat in mari, Islandiam alluente, *oſtreae islandicae aliisque affixa, parva.*

anguſtata. 18. L. teſta elongata laevi ſexvalvi, apertura anguſta, operculo minimo. *Bonann. recr. et muſ. Kirch.* 1. *f.* 15.
Chemn. Conch. 8. *t.* 98. *f.* 835.
Habitat rarior - - - valvis in puncto conjunctionis ſulco exaratis, interdum rubro alboque ſtriatis.

poroſa. 19. L. teſta granulato ſtriata conica tubuloſa, operculo obtuſo.
Schroet. Journ. 4. *t.* 2. *f.* 6. a. b.
Chemn. Conch. 8. *t.* 98. *f.* 836.
β) Balanus major latus. *Klein oſtr. t.* 12. *f.* 96.
Liſt. Conch. t. 242. *f.* 284.
Habitat rarior in India, *recens exterius viridis, poſtea ſupra nigra, infra alba.*

20. L.

elongata. 20. L. teſta cylindrica nivea pellucida ſexvalvi ſupra fiſſa, operculo obtuſo ſulcato transverſim ſtriato.
Chemn. Conch. 8. *t.* 98 *f.* 838.
Schr. der berl. Naturf. 5. *t.* 5. *f.* 2.
Schroeter Journ. 4. *t.* 2. *f.* 2.
Habitat rariſſima in Islandia, 5 *lineas vix lata, et* 3 *pollices et ultra longa, infra hinc inde transverſe annulata et nodoſa.*

patellaris. 21. L. teſta ſexvalvi, exterius violacea albo miſta ſubtiliter longitudinaliter ſtriata, intus ſalcata, valvis margine denticulatis.
Spengler Schr. berl. Naturf. 5. *t.* 5. *f.* 4.
Chemn. Conch. 8. *t.* 98. *f.* 839.
Habitat rariſſima in Coromandel, *valvarum dentibus ſe invicem excipientibus.*

ſpinoſa. 22. L. teſta conica, areis duodecim triangularibus: ſex depreſſioribus minoribus albidis transverſim ſtriatis, ſex purpureis longitudinaliter ſtriatis, ſpiniſque tubuloſis recurvis, armatis.
Chemn. Schr. berl. Naturf. 5. *t.* 5. *f.* 3. 4.
Conch. 8. *t.* 98. *f.* 840. *et t.* 99. *f.* 841.
Schroet. n. Litterat. 1. *t.* 2. *f.* 10.
Habitat in India, *operculis quadrivalvibus acuminatis, undulato-ſtriatis.*

violacea. 23. L. teſta craſſa glabra ſexvalvi alba, radiis violaceis.
Chemn. Conch. 8. *t.* 99. *f.* 842.
Habitat in India, *intus leviter ſulcata.*

Pollicipes. 24. L. teſta compreſſa erecta multivalvi laevi, pedunculo coriaceo brevi duro ſquamoſo inſidente.
Argenv. Conch. t. 26. *f.* D.
zoomorph. t. 7. *f.* G.
Knorr Vergn. 5. *t.* 13. *f.* 7.
Chemn. Conch. 8. *t.* 100. *f.* 851. 852.
Habitat in mari mediterraneo, *valvis* 4 *majoribus, roſtri avium inſtar verſus invicem inclinatis, et pluribus quam* 20 *minoribus.*

cylindrica. 25. L. cylindrica ſubcurva, orificio ampliſſimo obliquo, operculis cornutis.
Gronov. zooph. t. 19. *f.* 3. 4. Balanus maxillaris.

 Ellis

Ellis act. angl. vol. 50. *f.* 15. Lepas ſeſſilis capenſis ore obliquo cum operculis cornatis.
Habitat ad Africae *littora ſub* zona torrida.

criſpata. 26. L. teſta ovali truncato conica, areis ſex caeruleſcentibus albo obumbratis, ſex aliis elevatis rubellis ſpinoſis perpendiculariter ſtriatis.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 534. *n.* 22. *t.* 9. *f.* 21.
Habitat - - - aſſeri affixa, a teredine perforato; pollicem fere alta, operculis obtuſis.

cariola. 27. L. teſta ſolida alba depreſſa ſulcato carioſa intus inaequali laevi.
Pallas nov. act. Petrop. 2. *p.* 240. *t.* 6. *f.* 24. A. B.
Habitat ad inſulas Kuriles.

Stroemia. 28. L. conico-convexa, valvis quatuor ſerrato-ſtriatis operculo bivalvi. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 21. *t.* 94. *f.* 1-4. *prodr. n.* 3025.
Habitat in mari ſeptentrionali.

302. PHOLAS.

Animal Aſcidia.
Teſta bivalvis divaricata cum minoribus acceſſoriis difformibus.
Cardo recurvatus cartilagine connexus.

Dactylus. 1. Ph. teſta oblonga hinc reticulato-ſtriata. *Fn. ſuec.* 2124.
Müll. zool. dan. prodr. 3031.
Rondel. teſtac. 23. *f.* 2.
Bell. aq. 414.
Liſt. hiſt. Conch. t. 433. *f.* 276.
exerc. anat. t. 19. *f.* 1. 2.
an. angl. app. t. 2. *f.* 3.
Bonann. recr. ment. 2. *f.* 25. 26.
muſ. Kirch. 2. *f.* 23. 24.
Gualt. teſtac. 105. *f.* A. B. C. D.
Argenv. Conch. t. 26. *f.* H. I.
zoomorph. t. 7. *f.* Q. R.
Ginann. adr. 44. *t.* 31. *f.* 184.
Seb. muſ. 3. *t.* 16. *f.* 6. a. b. c. d.
Reaum. act. Pariſ. 1712. *p.* 163.

Planc.

Planc. Conch. 33. *n.* 3.
Murray fund. teſt. t. 2. *f.* 3.
v. Born muſ. caeſ. Vind. teſt. t. 1. *f.* 7.
Chemn. Conch. 8. *t.* 101. *f.* 859.
Habitat intra Europae ſcopulos, *ſaxa, ut perhibent, perterebrans, noctu lucens, ad 5 pollices longa, tota alba, interdum ochroleuca, tenuis, fragilis, antrorſum elongata cuneata, poſterius magis convexa, margine inflexa et repanda, ſtriis ſubſpinoſis antrorſum ſenſim minoribus, tandem evaneſcentibus, cardine cochlear forma ſua mentiente, teſtis acceſſoriis* 4.

coſtata. 2. Ph. teſta ovata, coſtis elevatis ſtriata.
Liſt. Conch. t. 434. *f.* 277.
Bonann. recr. 3. *f.* 351.
muſ. Kirch. 2. *f.* 105.
Gualt. teſt. t. 105. *f.* G.
Knorr Vergn. 2. *t.* 25. *f.* 4.
Chemn. Conch. 8. *t.* 101. *f.* 863.
Habitat in mari americano, *alba, 6 fere pollices longa, coſtis obliquis ſquamis elevatis aut ſpinis obtuſis armatis.*

ſtriata. 3. Ph. teſta ovata multifariam ſtriata.
Gualt. teſt. 105. *f.* F.
Chemn. Conch. 8. *t.* 102. *f.* 864-866.
Habitat in Europa *auſtrali et* India, *ad* Barbariae *quoque littora, ſtriis hinc inde decuſſatis, area margini propinqua glaberrima.*

candida. 4. Ph. teſta oblonga undique ſtriis decuſſatis muricata. *Muſ. Lud. Ulr.* 469. *n.* 7.* *Müll. zool. dan. prodr.* 3033.
Bonann. muſ. Kircher. 2. *t.* 24.
Liſt. an. angl. 193. *t.* 5. *f.* 39.
app. t. 2. *f.* 4. 6.
Conch. t. 435. *f.* 278.
Gualt. teſtac. t. 105. *f.* E.
Habitat in mari europaeo *et* americano, *tenuiſſima, intus argentea magis glabra, utroque fine rotundato, cardinis dente fiſſo.*

Pholades *intrant et inhabitant rupes marinas calcareas, imo arenarias, intra quas latent phoſphoreae.* Reaum. *act. pariſ.* 1712 *p.* 126. *"His natura in tenebris, remoto lumine, alio fulgore clarere, et quanto magis humorem habeant, ludere in ore mandentium, lucere in manibus, atque etiam in ſolo et veſte decidentibus guttis.* Plin. IX. 61. *An, quam Liſter hiſt conch. t.* 437. *f. a. depingendam curavit, diſtincta ſpecies?*

pusilla. 5. Ph. teſta oblonga rotundata arcuato-ſtriata.
Rumpf muſ. t. 46. f. H.
Petiv. amboin. t. 19. f. 8.
Adanſ. hiſt. Seneg. t. 19. f. 1. 2?
Brown jam. 417. t. 40 f. 11.
Martin. Beſch. berl. Naturf. 2. t. 12. f. 6-9.
Spengl. Beſch. berl. Naturf. 4. t. 5. f. 1-5.
Chemn. Conch. 8. t. 102. f. 867-871. a. b.
Habitat in America *et* India (*in hac utplurimum major*) *mediae magnitudinis, alba, fuſceſcens, navium lignum perterebrans, antrorſum roſtri inſtar hians, ſub vertice globoſa, nodoſo reticulata.*

criſpata. 6. Ph. teſta ovali hinc obtuſiore criſpato ſtriata, cardinis dente curvo. *Muſ. Lud. Ulr. 469. n. 8.* Müll. zool. dan. prodr. 2032.*
*Fn. ſuec. 2125.** Mya criſpata.
Liſt. hiſt. anim. angl. t. 5. f. 38.
app. t. 2. f. 7.
hiſt. Conch. t. 436. f. 279.
exerc. anat. t. 19. f. 3.
Chemn. Conch. 8. t. 102. f. 872-874.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *ultra pollicem longa, teſtis primariis ſulco medio transverſo rugoſo bipartitis, teſta tertia parva.*

orientalis. 7. Ph. teſta oblonga margine recto: altera parte glaberrima, altera reticulato-ſtriata.
Liſt. hiſt. Conch. t. 431. f. 274.
Chemn. Conch. 8. t. 101. f. 860.
Walch Naturf. 13. p. 86. t. 3. f. 15.
Habitat in ſinu Siamenſi *et* Tranquebariae, *ſatis magna, teſtis tenuioribus, margine tantum antico hiantibus, ſtriis reticulatis intus quoque conſpicuis, teſta ſatis magna et altera dente armata minore cardinem tegente.*

campechienſis. 8. Ph. teſta anguſta alba, tenuiter ſtriata.
Liſt. Conch. t. 432. f. 275.
Habitat in ſinu Campechienſi, *an diſtincta ſpecies?*

cordata. 9. Ph. teſta brevi turgida poſterius ſtriis elevatis transverſis ſubtilibus exarata: hiatu cordato. *Schroet. Einl. in Conch. 3. p. 544. n. 4. t. 9 f. 22-24.*
Habitat - - - corallio affixa, tenuiſſima, fragilis, ſordide alba, teſta anterius praeter rugas aliquot arcuatas laevi,

laevi, roſtri teſtarum anterioris hiata teſta minori ovali, convexa, dente munita occluſo.

chiloenſis. 10. Ph. teſta oblonga depreſſiuſcula: ſtriis longitudinalibus diſtantibus. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 179.
Habitat in ſcopulis archipelagi Chiloenſis, *ad* 5 *pollices longa, appendicibus minutis aucta.*

Teredula. 11. Ph. teſta oblonga alba: ſutura granulata fuſca longitudinali. *Pall. nov. act. Petrop.* 2. *p.* 240. *t.* 6. *f.* 26. A. D.
Habitat ad Belgii *littora, ligni incorrupti ſertulariis obducto, fruſta tenuia perterebrans.*

hians. 12. Ph. teſta bivalvi alba transverſe arcuatim ſtriata ſupra conivente, medio convexa, ſubtus cuneiformi: apertura ovali potentiſſima. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 364. *t.* 172. *f.* 1678-1681.
Spengl. nov. act. ſoc. dan. 2. *f.* 8-11.
Habitat ad inſulas Americae *mediae oppoſitas, lapides calcareos et corallia perterebrans.*

303. MYA.

Animal Aſcidia.

Teſta bivalvis hians utplurimum altera extremitate.

Cardo dente (plerisque uno) ſolido craſſo patulo vacuo (*nec inſerto teſtae oppoſitae.*)

truncata. 1. M. teſta ovata poſterius truncata, cardinis dente antrorſum porrecto obtuſiſſimo. *Fn. ſuec.* 2126. *Müll. zool. dan. prodr.* 2959.
O. *Fabr. Fn. groenl. p.* 404. *n.* 406. Mya teſta ſubovata convexa antice truncata, cardinis dente ſolitario antrorſum porrecto obtuſiſſimo.
It. wgoth. 199. *n.* 3. *t.* 5. *f.* 3. Concha laevis altera tantum parte clauſilis.
Liſt. Conch. t. 428. *f.* 269.
an. angl. t. 5. *f.* 36.
Gualt. teſt. t. 91. *f.* D.
Olaff. isl. Reſ. p. 69. 716. 1009. *t.* 11. *f.* 7.
Chemn. Conch. 6. *t.* 1. *f.* 1. 2.
β) *Liſt. Conch. t.* 429. *f.* 270.

Habitat in Oceano europaeo, *ad 2½ pollices longa, ſordide alba, epidermide ex luteo fuſca veſtita, craſſa, convexa edulis, roſmari, lagopodis, coracis, anatis ſpectabilis cibus, ſtriis transverſis irregularibus in rugas abeuntibus exarata, intus glaberrima.*

arenaria. 2. M. teſta ovata poſterius rotundata, cardinis dente antrorſum porrecto rotundato denticuloque laterali. *Fn. ſuec.* 2127. *Müll. zool. dan. prodr.* 2960.

O. *Fabr. Fn. groenl. p.* 405. *n.* 407. Mya ovata compreſſa antice rotundata, cardinis dente antrorſum porrecto rotundato denticuloque laterali poſtico.

It. wgoth. 187. Concha ſubarenacea marina.

Baſt. opuſc. ſubſ. 2. *p.* 69. *t.* 7. *f* 1-3. Mya arenaria.

Liſt. hiſt. Conch. p. 418. *f.* 262.

Argenv. zoom. t. 5. *f.* 10.

Leſſer teſtaceoth. f. 106.

Born. muſ. caeſ. Vindob. teſt. p. 19. *t.* 7. *f.* A.

Chemn. Conch. 6. *p.* 3. *Vign. et t.* 1. *f.* 3. 4.

β) *Liſt. Conch. t.* 419. *f.* 263.

Habitat in Oceano Europae *ſeptentrionalis ſub arena, quam excavat, foraminibus 2 dignoſcenda, flaveſcens, ex fuſco rubella, aut ſordide alba, 2½ pollices longa, cardinis dente longiore et magis obtuſo, quam in mya truncata, ſtriis transverſis in rugas abeuntibus.*

pictorum. 3. M. teſta ovata, cardinis dente primario crenulato: laterali longitudinali, alterius duplicato. *Fn. ſuec.* 2129.

Liſt. Conch. t. 146. *f.* 1. *t.* 147. *f.* 2. 3.

anim. angl. t. 2. *f.* 30.

app. t. 1. *f.* 4.

Bonann. recr. 2. *f.* 40. 41.

muſ. Kirch. 2. *f.* 39. 40.

Valent. muſ. t. 14. *f.* 15.

Gualt. teſt. t. 7. *f.* E.

Argenv. Conch. t. 27. *f.* 10.

zoomorph. t. 8. *f.* 11.

Murr. fund. teſtac. t. 2. *f.* 6.

Schroet. Fluſconch. t. 2. *f.* 2. *t.* 3. *f.* 2-5. *t.* 4. *f.* 6.

Chemn. Conch. 6. *t.* 1. *f.* 6.

Beſch. berl. Nat. 1. *p.* 344.

β) Mya maroccana. *Chemn. Conch.* 6. *t.* 3. *f.* 23. 24.

γ) *Liſt.*

Myae *ſaepius terebrant fundum, et in eundem ſe defodiunt vel totae vel pro parte.*

γ) *Liſt. Conch. t.* 148.
δ) *Argenv. Conch. t.* 29. *f.* 18.
ε) *Schroet. Fluſconch. t.* 3. *f.* 3.
ζ) *Schroet. Flusconch. t.* 9. *f.* 1.
Habitat β) *in* Barbariae, ζ) *in* Tranquebariae, *in* Europae aquis dulcibus, 1¾ *pollicis longa*, 3½ *lata*, *epidermide fuſceſcente aut nigricante veſtita*, *ſub hac flavicans aut vireſcens: radiis viridibus*, *intus laevis margaritacea*, *non hians*, *tenuis*.

margaritifera. 4. M. teſta ovata anterius coarctata, cardinis dente primario conico, natibus decorticatis. *Fn. ſuec.* 2130.*
Müll. zool. dan prodr. 2961. Mya teſta ovali-oblonga, apertura ſinuata, natibus decorticalis.
Liſt. Conch. t. 149. *f.* 4.
anim. angl. app. 15. *t.* 1. *f.* 1.
Gualt. teſtac. t. 102. *f.* C.
Klein oſtr. t. 10. *f.* 47.
Mylius ſaxon. ſubt. 2. *p.* 20.
Knorr Vergn. 4. *t.* 25. *f.* 2.
Schroet. Fluſconch. t. 4. *f.* 1.
Mayer Abh. der boehm. Geſ. 4.
Chemn. Conch. 6. *t.* 1. *f.* 5.
Habitat in totius orbis arctici *ad* Bohemiam *et* Franconiam *usque cataractis*, *in* Barbariae *quoque lacubus*, *matricem perlarum exhibens et margaritas*, *in animalis corpore ipſo natas*, *ſpurias ex perforatione teſtae genitas*, *ad* 5¼ *pollices lata*, *et* 2½ *pollices longa*, *valida*, *transverſe rugoſa*, *extus atra*, *vermibus ſaepe corroſa*, *cardinis dente laterali nullo*, *primario in alterius teſtae dentem latum fiſſumque recepto*.

Perna. 5. M. teſta oblonga dilatata, baſi anguſtiore compreſſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 470. *n.* 10?
Argenv. Conch. t. 22. *f.* N?
Knorr. Vergn. 4. *t.* 15. *f.* 2. 4. 5.
Chemn. Conch. 8. *t.* 83. *f.* 738. 739. *et t.* 84. *f.* 748.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 608. *n.* 5. *t.* 7. *f.* 4.
Habitat in freto magellanico *et* Barbariae *littore*, *pernae figura*, *laevis caerulea et alba*, *altero latere hians*, *cardinis loco fovea profunda transverſa*, *in cujus medio dens acutus in utraque valva*, *an hujus generis?*

Vulſella. 6. M. teſta linguiformi, cardine terminali depreſſo ſemiorbiculato. *Muſ. Lud. Ulr.* 471. *n.* 11.* *Muſ. Theſſin. t.* 6 *f.* 3.

 Liſt.

Liſt. Conch. t. 1055. *f.* 10.
Rumpf muſ. t. 46. *f.* A.
Valent. muſ. t. 16. *f.* 28.
Gualt. teſt. t. 90. *f.* H.
Knorr Vergn. 5. *t.* 2. *f.* 1-3.
Chemn. Conch. 6. *t.* 2. *f.* 8-11.
Hermann Naturf. 17. *p.* 126. *t.* 3. *f.* 1-4.

Habitat in mari americano, indico, *rubro, rarior,* ¼ *pollicis* 2-5 *pollices longa, formae pro aetate variabilis, valvis ſatis planis, ſubtiliter transverſim ſtriatis, extrinſecus flaveſcentibus nigricante et flavicante radiatis, hiantibus, dente longo lato, in medio et profundius adhuc ad latera canaliculato; an hujus generis?*

arctica. 7. M. teſta ſtriata: valvis carinis duabus ſpinuloſis, cardine edentulo. *Müll. zool. dan. prodr.* 2962.

O. Fabr. Fn. groenl. p. 407. *n.* 408. Mya teſta ſtriata, valvulis carinis duabus ſpinuloſis ſaepe obſoletis, cardine obſolete dentato.

Habitat libera in Oceano ſeptentrionali *inter algas, mytilos et alia marina, fabae magnitudine,* 1½-7 *lineas longa, pallide flava, intus lactea, forma arcae, anterius impreſſa planiuſcula, parte anteriore obtuſiſſima, poſteriore breviore acutiuſcula; pars anterior a natibus excurrit angulis* 2 *remotis antrorſum ſubaculeatis.*

edentula. 8. M. teſta ſtriata ovali aequivalvi ample hiante, cardine edentulo. *Pall. it.* 2. *p.* 700.

Habitat rarior in arena littorea maris caſpii, *pollicaris, tenuis, ſubantiquata, alba, ſtriis in utraque valva circiter* 33, *in breviore fine diſtantibus, in productiore confertis, cardinis labio craſſiuſculo inflexo.*

radiata. 9. M. teſta aequivalvi pellucida tenuiſſime transverſim ſtriata viridi flavicante livido-radiata: valvis altero latere latiſſimis, altero anguſtiſſimis.

Chemn. Conch. 6. *t.* 2. *f.* 7.
β) Liſt. Conch. t. 152. *f.* 7. Muſculus latior ſubfuſcus, caeruleis lineis radiatus.

Habitat in Malabariae *fluviis, m. pictorum tenuior, fragilior, latior et magis complanata, intus margaritacea, cardinis dente primario crenato.*

10. M.

oblonga. 10. M. ovato oblonga, valva altera dente valido lato, valvae alterius foveae inſerto, denteque minore inter duos minores alterius valvae poſito.

Chemn. Conch. 6. *t.* 2. *f.* 12.

Habitat - - - $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa*, 3 *pollices lata*, *mactra lutraria magis ventricoſa*, *arenariae valde affinis*, *an mera varietas?*

anatina. 11. M. teſta globoſa nivea pellucida, cardinis dente primario prominente rotundato.

Adanſ. Seneg. t. 19. *f.* 2. Tugon.

Chemn. Conch. 6. *t.* 2. *f.* 13.

Habitat rarius in Guinea, *frequentius in littore* africano, *praeſertim ad oſtium* Nigri, *ſoleni anatino valde affinis*, *teſtarum ſtriis decuſſatis*, *valva utraque altero latere repanda.*

nicobarica. 12. M. teſta aequivalvi nivea ovato-oblonga decuſſatim ſtriata, cardinis dente ſolitario lato perpendiculari cochleariformi.

Chemn. Conch. 6. *t.* 3. *f.* 17. 18.

Habitat ad inſulas Nicobaricas, *valvis altero latere convexis*, *latis margine rotundatis*, *altero magis anguloſis*, *anguſtis*, *planis*, *biantibus.*

auſtralis. 13. M. teſta ovata compreſſa clauſa, cardinis dentibus duobus lateralibus.

Chemn. Conch. 6. *t.* 3. *f.* 19. 20.

Habitat in nova Seelandia, *ſordide ochroleuca*, *an hujus generis?*

gaditana. 14. M. teſta rotundata, planiuſcula, transverſim ſtriata ochroleuca, intus alba.

Chemn. Conch. 6. *t.* 3. *f.* 22.

Habitat ad littus Gaditanum.

corrugata. 15. M. teſta rhombea viridi, natibus rugoſis. *Müll. hiſt. verm. terr. et fluv.* 2. *p.* 214. *n.* 384. *Beſch. der berl.* Naturf. 4 *p.* 58. *t.* 3. *f.* 7. 8.

Schroet Fluſconch. t. 9. *f.* 3.

Chemn. Conch. 6. *t.* 3. *f.* 22. a. b.

Habitat in fluviis littoris Coromandel, *epidermide remota margaritaceus*, *tenera*, *pellucida*, *ab utraque cardinis parte ſtriis rugoſis notata*, *intus ſtriis radiatis ſubtiliſſimis picta*, 11-16 *lineas longa.*

32. M.

rugoſa. 32. M. teſta ovali rugoſa extrinſecus vireſcente intus margaritacea: cardinis dente primario crenulato; laterali longitudinali, alterius duplicato. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 346. *t.* 170. *f.* 1649.
Habitat in Coromandel *fluviis.*

nodoſa. 23. M. teſta ovali tenera vireſcente: natibus noduloſis. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 347. *t.* 170. *f.* 1650.
Habitat - - - -

norwegica. 24. M. teſta ovali longitudinaliter denſe ſtriata, altero fine rotundata, altero truncata, natibus decorticatis. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 345. *t.* 170. *f.* 1647. 1648.

ſpuria. 16. M. teſta rhombea viridi, natibus glabris.
Schroet. Einl. in Conch. 2. 617. *n.* 9. *t.* 7. *f.* 5.
Habitat in Tranquebariae *fluviis, corrugatae ſimilis, at duplo fere major, et praeter vulvae regionem tota glabra.*

glycymeris. 17. M. teſta utrinque hiante craſſiſſima lamellata oblongo ovata transverſe ſtriato rugoſa, cardinis dente primario craſſiſſimo.
Liſt. Conch. t. 414. *f.* 258.
Bonann. recr. 2. *f.* 59?
muſ. Kirch. 2. *f.* 59?
Klein oſtrac. t. 11. *f.* 72.
Gualt. teſt. t. 90. *f.* A.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 1. *f.* 8.
Chemn. Conch. 6. *t.* 3. *f.* 25.
Habitat in Oceano europaeo, mari *praeſertim* hiſpanico *et* mediterraneo, *ad* 5 *pollices longa et* 10 *pollices lata, cinerea vel ochroleuca, intus cretacea, cardinis dente adhuc minore ſerieque plicarum, inter myas et ſolenes ambigua.*

ſyrmatophora. 18. M. teſta ovata depreſſa, cardinis margine ad dentem primarium mucrone ſubulato, altero dilatato. *Gronov. zooph. t.* 18. *f.* 1. 2.
Habitat in Guineae *fluviis, dentibus marginalibus utrinque parallele duplicatis.*

nitida. 19. M. teſta ovali alba laevi, cardinis utriusque dente obtuſo. *Müll. zool. dan. prodr.* 2963.
Habitat in Norwegia.

membranacea. 20. M. teſta ovata membranacea candida, margine ad proboſcidem protracto reflexo. *Müll. zool. dan. prodr.* 2964. *Olaſſ.*

Olaſſ. isl. reſ. 901. *t.* 11. *f.* 10.
Habitat - - - -

byſſifera. 21. M. teſta rudi oblonga ſtriata convexa, cardine edentulo. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 408. *n.* 409.
It. Wgoth. 198. *t.* 5. *f.* 2.
Habitat in rupium marinarum Groenlandiae *fiſſuris, libera byſſo ſe affigens,* 3-17½ *lineas longa.*

304. SOLEN. *Animal* Aſcidia.

Teſta bivalvis oblonga, utroque latere hians.

Cardo Dens ſubulatus reflexus ſaepe duplex; non inſertus teſtae oppoſitae, margo lateralis magis obſoletus.

Vagina. 1. S. teſta lineari recta: fine altero marginato, cardinibus unidentatis, *Muſ. Lud. Ulr.* 472. *n.* 12.*
Liſt. Conch. t. 409. *f.* 255. *t.* 418. *f.* 256. *t.* 412. *f.* 1. *t.* 1056. *f.* 5.
Bonann. recr. 2. *f.* 57.
muſ. Kircher. 2. *f.* 56.
Rumpf muſ. t. 45. *f.* M.
Gualt. teſt. t. 95. *f.* C. D. E.
Argenv. Conch. t. 24. *f.* K. M. M.
zoom. t. 6. *f.* G. H.
Klein. oſtr. t. 11. *f.* 65.
Leſſer teſtaceoth. f. 120.
Bytem. app. t. 11. *f.* 52. b.
Knorr Vergn. 1. *t.* 28. *f.* 3.
Chemn. Conch. 6. *p.* 36. *vign.* 2. *f.* G. H. *t.* 4. *f.* 26-28 *et lit.* a-c.
β) *Liſt. conch. t.* 412. *f.* 6.
Habitat frequens in mari europaeo, americano, indico, 6-7 *pollices latus,* 1 *longus, vireſcens, ſub epidermide triangulo rubello altero transverſe ſtriato, altero faſciis arcuatis picto, valvis canalem referentibus.*

Siliqua. 2. S. teſta lineari recta, cardine altero bidentato. *Fn. ſuec.* 2131. *Muſ. Lud. Ulr.* 473. *n.* 13.*

Liſt.

Liſt. Conch. t. 413?
an. angl. t. 5. *f.* 37.
Rond. teſt. 93,
Bell. aq. t. 414. *f.* 2.
Planc. Conch. t. 3. *f.* 6.
Ginan. adr. 2. *p.* 37. *t.* 27. *f.* 170.
Knorr Vergn. 6. *t.* 7. *f.* 1.
Chemn. Conch. 6. *t.* 4. *f.* 29. *et* d.

β) Solen indicus lunulis roſeis pictus. *Schroeter Einl. in Conch.* 2. *t.* 7. *f.* 6.

Habitat frequens in Oceano europaeo, *ad* 8 *pollices latus*, 1¼ *pollicis longus*.

Enſis. 3. S. teſta lineari ſubarcuata, cardine altero bidentato. *Muſ. Lud. Ulr.* 473. *n.* 14.*
Liſt. Conch. t. 411. *f.* 257.
an. angl. app. t. 2. *f.* 9.
Argenv. conch. t. 24. *f.* L.
Chemn. conch. 6. *t.* 4. *f.* 30. *et* e.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 626. *n.* 3. *t.* 7. *f.* 7.

Habitat in Mari mediterraneo, anglico, belgico, *rarior, utroque fine rotundatus, praecedentibus ſpeciebus utplurimum minor, dentibus duobus alterius valvae foveae triangulari alterius inſertis.*

Legumen. 4. S. teſta lineari-ovali recta, cardinibus mediis bidentatis: alterius bifido.
Adanſ. ſeneg. t. 19. *f.* 3. Molen.
Liſt. Conch. t. 420. *f.* 264.
Planc. Conch. t. 3. *f.* 5.
Gualt. teſt. t. 91. *f.* A.
Klein oſtr. t. 11. *f.* 66.
v. Born. muſ. caeſ. Vind. teſt. t. 2. *f.* 1. 2.
Chemn. Conch. 6. *t.* 5. *f.* 32-34.

Habitat rariſſimus in mari mediterraneo, *et* atlantico, *praecedentibus brevior, utrinque rotundatus, epidermide flavicante, triangulo ſub hac arcuato ſtriato caeruleſcente, cardine in teſtae medio poſito.*

Cultellus. 5. S. teſta ovali-oblonga ſubarcuata. *Muſ. Lud. Ulr.* 474. *n.* 15.*
Leſſer teſtaceoth. f. 126.
Rumpf muſ. t. 45. *f.* F.
Gualt. teſt. t. 90. *f.* E.

Chemn.

Chemn. Conch. 6. t. 5. f. 36. 37.
Habitat in Amboinae *et* Tranquebariae *arena littorea, tenuis, fragilis, 8 circiter lineas longas, et 3 ultra 2 pollices lata, ſub epidermide flavicante ſordide alba: maculis ſpadiceis et violaceis varia, utroque fine rotundata, altera valva unidentata, altera bidentata.*

radiatus. 6. S. teſta ovali recta laevi: coſta transverſali adnata depreſſa.
Muſ. Lud. Ulr. 474. *n.* 16.*
Liſt. Conch. t. 422. *f.* 266.
Rumpf muſ. t. 45. *f.* E.
Gualt. teſt. t. 91. *f.* B.
Argenv. Conch. t- 22. *f.* P.
Knorr delic. t. B. III. *f.* 9.
Vergn. 1. *t.* 6. *f.* 5.
Chemn. Conch. 6. *t.* 5. *f.* 38-40.
Habitat in Oceano indico, *violaceus, radiis* 4, *rarius* 2 *albis, tenuis, fragilis, coſta nivea, ſatis valida, totam fere teſtam percurrente, cardine utrinque calloſo et in utraque teſta bidentato.*

ſtrigilatus. 7. S. teſta ovali oblique ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 475. *n.* 17.*
Rondel. teſt. 14. Concha nigra.
Liſt. Conch. t. 416. *f.* 260.
Bonann. recr. 2. *f.* 77.
muſ. Kircher 2. *f.* 76.
Rumpf muſ. t. 45. *f.* N.
Gualt. teſt- t. 91. *f.* C.
Knorr Verg. 6. *t.* 5. *f.* 4.
Adanſ. ſeneg. 1. *t.* 19. *f.* 2.
Murr. fund. teſt. t. 2. *f.* 7.
Chemn. Conch. 6. *t.* 6. *f.* 41. 42.
β) *Liſt. Conch. t.* 421. *f.* 265.
Bonann. recr. 3. *f.* 353.
muſ. Kirch. 2. *f.* 107.
Klein oſtr. t. 11. *f.* 68.
Adanſ. ſeneg. 1. *t.* 19. *f.* 1.
Chemn. Conch. 6. *t.* 6. *f.* 43. 44.
Habitat in mari mediterraneo, atlantico, indico, *roſeus radiis* 2 *albis, aut* β) *albus, ſatis robuſtus ventricoſus, cardinis margine prominente, dente tenero retroflexo.*

anatinus. 8. S. teſta ovata membranacea piloſa, cardinis coſta falcata.
Muſ. Lud. Ulr. 475. *n.* 18.*

Rumpf

Rumpf muſ. t. 75. *f.* O. Roſtrum anatis.
Argenv. Conch. t. 22. *f.* R.
v. Born muſ. caeſ. Vind. teſt. p. 23. *vign. f. ſupr. et inf.*
Chemn. Conch. 6. *t.* 6. *f.* 46-48.
Habitat rarior in Oceani indici *fundo arenoſo, pellucidus, albus, chartae inſtar tenuis, altero fine rotundato clauſo, altero roſtri aemulo hiante, utriusque valvae dente cardinali figura auriſcalpii.*

Macha. 9. S. teſta ovali oblonga anterius truncata, cardine altero bidentato.
Molin. hiſt. nat. Chil. p. 178.
Habitat in mari pacifico, Chili *alluente, in fundo arenoſo ſe abſcondens margaritifer, 6-7 pollices longus, fuſcus, caeruleo varius.*

bullatus. 10. S. teſta ſubrotunda inflata ſubſtriata, anterius crenato-hiante.
Liſt. Conch. t. 342. *f.* 179.
Rumpf muſ. t. 44. *f.* N?
Gualt. teſt. t. 85. *f.* H.
Knorr Vergn. 4. *t.* 3. *f.* 3?
Chemn. Conch. 6. *t.* 6. *f.* 49. 50.
Habitat in mari indico (?) *et* americano, *ſatis tenuis, ſubpellucidus, longitudinaliter ſtriatus, albus, purpureo-maculatus aut nebuloſus, cardinis dente unico, marginalibus remotis compreſſis foveae oppoſitae inſertis.*

minutus. 11. S. teſta ovali, valvularum angulis utrisque ſerratis.
Liſt. Conch. t. 426. *f.* 267?
Spengl. catal. raiſ. t. 6. *f.* 6-8.
Chemn. Conch. 6. *t.* 6. *f.* 51. 52.
Habitat in Oceano Europae ſeptentrionali *inter zoophyta, ſeminis cucumeris magnitudine, longitudinaliter ſtriatus apice truncatus, carinis a cardine apicem verſus divergentibus, acutis, ſerratis.*

virens. 12. S. teſta ovato-oblonga, umbonibus tumidis.
Habitat in Java, *teſta fragiliſſima, diaphana, alba, extus virente, inaequivalvi, forma myae pictorum, apice et baſi vix clauſa: utraque valva calloſa, cardine alterius dentibus* 2 *approximatis ſine oppoſitis.*

diphos. 13. S. teſta ovali recta laevi, nymphis prominentibus. *Mant.* 2. *p.* 544.
Valent. muſ. t. 13. *f.* 5.

Chemn.

Chemn. Conch. 6. t. 7. f. 53. 54.
Habitat in Oceano indico, *radiato affinis, epidermide virente, violaceus, radiis pluribus, 2 magis evidentibus, $2\frac{1}{2}$ pollices longus, 5 pollices latus, alterius valvae cardine unidentato, alterius bidentato.*

minimus. 14. S. teſta lineari-ovali recta, cardinibus lateralibus bidentatis: alterius bifido.
Chemn. Conch. 6. t. 5. f. 31. a. b.
Habitat in ſinu tranquebarico, *legumini proximus, at longe minor, ſub epidermide flavicante totus niveus, coſta interiori totam teſtam percurrente.*

maximus. 15. S. teſta lineari-ovali recta arcuato-ſtriata, cardinibus lateralibus bidentatis.
Chemn. Conch. 6. t. 5. f. 35.
Habitat rariſſimus ad littora Nicobariae, *teſta tenui, pellucida, ſub epidermide flavicante alba, 4 pollices lata, 1 pollicem et 5 lineas longa, utrinque hiante; cardinis dentibus ſeſe non excipientibus.*

coarctatus. 16. S. teſta transverſe rugoſa, medio coarctata, utrinque rotundata, cardine medio in alterutra valva nunc unidentato nunc bidentato.
Chemn. Conch. 6. t. 6. f. 45.
Schroeter Fluſconch. t. 9. f. 17.
Habitat ad inſulas Nicobaricas, *teſta ſordide alba, utrinque hiante, $\frac{3}{4}$ pollicis longa, $2\frac{1}{4}$ lata.*

roſeus. 17. S. teſta roſea aequivalvi, cardinis dente ſubbifido foveae alterius valvae inſerto.
Chemn. Conch. 6. t. 7. f. 55.
Habitat in mari rubro, *tellinae radiatae affinis, at teſta utrinque hiante.*

ſanguinolentus. 18. S. teſta ovali glaberrima; cardine calloſo bidentato.
Liſt. Conch. t. 397. *f.* 236.
Knorr Vergn. 4. t. 3. f. 4.
Chemn. Conch. t. 7. f. 56.
Habitat ad Jamaicam, *natibus extrinſecus et intus roſeis.*

ſtriatus. 19. S. teſta aequivalvi transverſim ſtriata, cardinis dente unico.
Chemn. Conch. 6. t. 7. f. 57. 58.
Habitat ad inſulas Nicobaricas, *mediae magnitudinis, tenuis, roſeus: radiis albis.*

veſpertinus. 20. S. teſta ovali oblonga ſpadiceo-radiata, cardinis ſiniſtrae valvae dente ſolitario duplici alterius inſerto.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 17. *f.* 20. Gatan.
Liſt. Conch. t. 417. *f.* 261.
Argenv. Conch. t. 22. *f.* I.
v. Born muſ. caeſ. Vind. teſt. t. 2. *f.* 6. 7.
Chemn. Conch. 6. *t.* 7. *f.* 59. 60. a. b.
Habitat in mari mediterraneo *et* atlantico, *tellinae gari ſimilis, at teſta utrinque hiante, neque ad alterum latus flexa, intus caeruleo alboque varia, nunc laevi, nunc ſtriis transverſis aſpera.*

occidens. 21. S. teſta transverſe ſtriata ad nates glabra albo rubelloque radiata, cardine utroque bidentato: foveola intermedia.
Chemn. Conch. 6, *t.* 7. *f.* 61.
Habitat rariſſima - - - teſta hinc inde albis rubellisque maculis varia, intus alba, 3 *lineas ultra* 2 *pollices longa, et ultra* 4 *pollices lata, utrinque hiante, cardine laterali.*

criſpus. 22. S. teſta partim laevi, partim ſtriis undatim criſpis aſpera, cardinis dente longiſſimo anguſto.
Liſt. an. angl. t. 5. *f.* 38.
Habitat frequens in fluvio Teers Angliae, *anatino affinis, an diſtincta ſatis hujus generis ſpecies?*

Spengleri. 23. S. teſtae natibus bipartitis, cardinis dente primario rotundo, acceſſoriis longis anguſtis: altero curvato.
Spengl. catal. raiſ. t. 1. *f.* 8. 9.
Habitat - - - teſta vix pollicem longa, $2\frac{1}{2}$ *pollices lata, utrinque rotundata.*

305. TELLINA. *Animal* Tethys.

Teſta bivalvis, anterius hinc ad alterum latus flexa.

Cardinis dentes (*utplurimum*) tres: laterales plani alterius teſtae.

* *ovatae craſſiuſculae.*

gargadia. 1. T. teſta ſubrotunda compreſſa anterius rugoſa, rima dentata.
Muſ. Lud. Ulr. 476. *n.* 19.*

Rumpf

Rumpf muſ. t. 43. *f.* N. Remies gargadica.
Klein oſtr. t. 10. *f.* 55.
Leſſer teſtaceoth. f. 119.
Chemn. Conch. 6. *t.* 8. *f.* 63. 64. a. b.
Habitat rariſſima in Oceano indico, *teſta alba, apice et intus flavicante, cardinis dente medio fiſſo.*

Lingua felis. 2. T. teſta ſubovata ſcabra: ſquamulis lunatis quincuncialibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 476. *n.* 20.*
Rumpf muſ. t. 45. *f.* G.
Gualt. teſt. t. 76. *f.* B.
Klein oſtrac. t. 11. *f.* 62.
Knorr Vergn. 2. *t.* 2. *f.* 1.
Chemn. Conch. 6. *t.* 8. *f.* 65.
Habitat rarior in Oceano indico, *teſta duplo fere latiori, quam longa, vertice radiisque dilute roſeis picta.*

virgata. 3. T. teſta ovali ſtriis transverſis recurvatis anterius angulata, dentibus lateralibus prominulis. *Muſ. Lud. Ulr.* 477. *n.* 21.*
Rumpf muſ. t. 45. *f.* H. Tellina virgata.
Argenv. Conch. t. 25. *f.* G.
Knorr Vergn. 2. *t.* 21. *f.* 4. *et* 4. *t.* 25. *f.* 1.
Chemn. Conch. 6. *t.* 8. *f.* 66-72.
β) *Gualt. teſt. t.* 89. *f.* E.
γ) *Gualt. teſt. t.* 86. *f.* G.
Habitat in Oceano indico *et* atlantico, *teſta ad* 1¾ *pollices longa,* 2½ *lata, alba vel flavicante, radiis utplurimum roſeis picta, cardinis dente medio fiſſo, lateralibus triangularibus, altero ante vulvam, altero pone anum poſito.*

angulata. 4. T. teſta ſubovata ſtriis transverſis recurvatis anterius angulata, dentibus lateralibus nullis.
Liſter Conch. t. 388. *f.* 235. *t.* 406. *f.* 252.
Chemn. Conch. 6. *t.* 9. *f.* 74. 75.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 643. *n.* 4. *t.* 7. *f.* 8.
Habitat in Oceano indico, *ultra ſesquipollicem longa, 2 pollices lata, virgatae affinis, at minus oblonga, tota alba, angulo anteriori magis extrorſum ſito, ano ovali, nec ſolis marginibus inflexis diſtincta.*

Gari. 5. T. teſta ovalis ſtriis transverſis recurvatis, dentibus lateralibus obſoletis. *Muſ. Lud. Ulr.* 478. *n.* 22.*
Rumpf muſ. t. 45. *f.* D. Tellina gari.
Knorr Vergn. 6. *t.* 12. *f.* 2.

Chemn. Conch. 6. *t.* 10. *f.* 92. 93.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 644. *n.* 5. *t.* 7. *f.* 9.
β) *Chemn. Conch.* 6. *t.* 10. *f.* 94.
Habitat in Oceano indico, *virgatae facie, et teſta minore magis anguſta, anterius inflexa rugoſiſſima, rugis transverſis in medio teſtae per ſtrias perpendiculares decuſſatis, nymphis exterius prominentibus, nunc cinerea radiis fuſcis, nunc alba radiis caeruleis, nunc caeruleſcens albo-maculata radiis rubris, nunc albo-rubella radiis rubris, β) ex cinereo alba, radiis rubro variis, et ex cinereo albidis.*

fragilis. 6. T. teſta ovata alba gibba: ſtriis transverſis recurvatis, natibus flaveſcentibus.
Chemn. Conch. 6. *t.* 9. *f.* 84.
Habitat in Oceano europaeo, mari caſpio, *teſta magnitudine extimi pollicis, ſatu tenui, ſtriis transverſis per alias decuſſatis, cardinis in altera valva dente unico fiſſo, in altera duobus, in utraque lateralibus nullis.*

rugoſa. 7. T. teſta ovata: rugis transverſis undulatis, cardinis dentibus lateralibus duobus, primario in ſiniſtra valva unico fiſſo, in altero duobus.
v. Born muſ. caeſ. Vind. teſt. t. 2, *f.* 3. 4.
Chemn. Conch. 6. *t.* 8. *f.* 62.
Habitat minus frequens in mari indico *et* americano, *teſta pauliſper latiori quam longa intus glabra, alba, aut flavicante, angulatae affinis.*

inflata. 8. T. teſta rotundata craſſa tota nivea gibba: ſtriis longitudinalibus ſubtiliſſimis.
Chemn. Conch. 6. *t.* 9. *f.* 76.
Habitat rarior - - -

multangula. 9. T. teſta ovata ſubventricoſa inaequivalvi decuſſatim ſtriata anterius ſinuata, cardinis dente primario in ſiniſtra valva ſolitario fiſſo, in altera duobus.
Chemn. Conch. 6. *t.* 9. *f.* 77.
Habitat ad Tranquebariae *littus, teſta ſatis magna ex cineraſcente alba: rima ampla.*

10. T.

Tellinarum *teſtae anterius inflexae, ut altera teſta plicam convexam, altera vero cavam oſtendat, in ſuborbiculatis autem plica vix manifeſta, ſed ſtriae in eodem loco divergentes genus produnt.*

papyracea. 10. T. teſta tenui ovata ventricoſa transverſim ſtriata, anterius plicato-rugoſa; cardinis dentibus lateralibus nullis, primariis duobus.

Chemn. Conch. 6. *t.* 9. *f.* 78.

Habitat rarior ad Guineam, *teſta* 3 *lineas longa, et* 6 *ultra pollicem lata, fragili, medio excavata, intus laevi, alba.*

gibboſa. 11. T. teſta ſubtrigona ventricoſa ſubtiliter transverſim ſtriata, cardinis dente laterali valido.

Gualt. teſt. t. 77. *f.* Q.

Habitat - - - teſta ex viridi albicante utrinque inflexa: altero latere breviori, cardinis dente primario unico.

inaequilatera. 12. T. teſta aequivalvi ſubrotunda alba: ſtriis verſus marginem nonnullis transverſis.

Gualt. teſt. t. 88. *f.* C.

Habitat [illegible]

Knorrii. 13. T. teſta ſplendide rubra margine violacea.

Knorr Vergn. 5. *t.* 21. *f.* 5.

Habitat - - - teſta 1¼ *pollicis longa, ultra* 2 *pollices lata.*

candidiſſima. 14. T. teſta alba.

Knorr Vergn. 6. *t.* 38. *f.* 4.

Habitat - - - teſta 1¼ *pollicis longa,* 2¼ *pollicis lata, an diſtincta ſpecies?*

Bornii. 15. T. teſta transverſim ſtriata, altero latere flexa rubeſcente: radiis rubris.

v. Born muſ. caeſ. Vind. teſt. t. 2. *f.* 5.

Habitat - - - teſta ¾ *pollicis longa, et* 2 *lata.*

puſilla. 16. T. teſta ovata ventricoſa, tenui transverſe ſtriata, cardine in altera valva edentulo, in altera dente primario duplici.

Schroet. Flusconch. p. 194. *t.* 4. *f.* 7. a. b.

Habitat in Europae *fluviis, teſta minima ſordide alba, intus nivea, tenera.*

** *ovatae compreſſae.*

albida. 17. T. teſta ovali laevi, nymphis prominentibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 479. *n.* 23.*

Habitat in Oceano europaeo, *teſta ovi magnitudine, ex rubeſcente alba, obſolete transverſim ſtriata, intus candida,*

 nym-

nymphis albis, cardine utrinque ſutura diſtincto, ſtriis minimis transverſis rubris notata: dentibus in utraque valva 3.

foliacea. 18. T. teſta ovali, pube ſcabra, rima ſerrata. *Muſ. Lud. Ulr.* 479. *n.* 24.*
Rumpf muſ. t. 45. *f.* K.
Argenv. Conch. t. 22. *f.* E.
Klein oſtr. t. 11. *f.* 64.
Knorr Vergn. 5. *t.* 29. *f.* 2.
Chemn. Conch. 6. *t.* 10. *f.* 95.
Habitat rariſſima in Oceano indico, *teſta tenera, pellucida, aurea,* 1½ *pollicem longa,* 3 *pollices lata, cardinis dente primario fiſſo, laterali elongato.*

planata. 19. T. teſta ovata compreſſa transverſim ſubſtriata laevi: marginibus acutis, pube ſubtomentoſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 480. *n.* 25.*
Gualt. teſt. t. 89. *f.* G?
Regenſ. Conch. 1. *t.* 3. *f.* 28?
Chemn. Conch. 6. *t.* 11. *f.* 100?
Habitat in Oceano europaeo, mari mediterraneo, *teſta maxime plana, pellucida, incarnata, minus flexa, quam in congeneribus: margine acutiſſimo.*

laevigata. 20. T. teſta ovata laevigata: dentibus lateralibus marginatis, pube ſtriato-ſcabra, nymphis inflexis. *Muſ. Lud. Ulr.* 480. *n.* 26.*
Rumpf muſ. t. 45. *f.* I? Tellina laevis.
Chemn. Conch. 6. *t.* 12. *f.* 111.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 649. *t.* 7. *f.* 10.
β) *Liſt. Conch. t.* 387. *f.* 234?
Habitat in Oceano europaeo *et* indico, *teſta alba: radiis rubellis, intus rubella, flavicante aut alba.*

radiata. 21. T. teſta oblonga longitudinaliter ſubtiliſſime ſubſtriata nitida, ſutura anali canaliculata. *Muſ. Lud. Ulr.* 481. *n.* 27.* *Fn. ſuec.* 2132.* *Müll. zool. dan. prodr.* 2968.
Liſt. Conch. t. 393. *f.* 240.
Gualt. teſt. t. 89. *f.* I.
Argenv. Conch. t. 22. *f.* A.
Klein oſtr. t. 11. *f.* 60.
Knorr delic. t. B III. *f.* 8.
Vergn. 1. *t.* 19. *f.* 1. 4. *t.* 2. *f.* 4. *et* 4. *t.* 2. *f.* 2.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 22.

Chemn.

Chemn. Conch. 6. *t.* 11. *f.* 102.

β) Tellina inaequilatera maxima rugoſa candida intus argentea. *Gualt. teſt. t.* 88. *f.* P?

γ) Tellina inaequilatera aliquantulum rugoſa prope marginem fuſca, in medio faſcia ſubalbida cincta, ad cardinem purpuraſcens. *Gualt. teſt. t.* 89. *f.* A?

δ) Tellina flava. *Knorr Vergn.* 4. *t.* 2. *f.* 2.

ε) *v. Born muſ. caeſ. Vind. teſt. t.* 2. *f.* 10?

Habitat in Oceano europaeo *et* americano *frequens, teſta utplurimum alba, radiis rubris picta.*

roſtrata. 22. T. teſta oblonga anterius angulato roſtrata: angulis ſubdentatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 481. *n.* 28.*

Liſt. Conch. t. 382. *f.* 225. *t.* 395. *f.* 242?

Rumpf muſ. t. 45. *f.* L.

Gualt. teſt. t. 86. *f.* D? *t.* 88. *f.* T.

Argenv. Conch. t. 22. *f.* O.

Klein oſtr. t. 11. *f.* 63.

Knorr Vergn. 4. *t.* 2. *f.* 3. 5.

v. Born muſ. caeſ. Vind. t. 2. *f.* 12.

Chemn. Conch. 6. *t.* 10. *f.* 96. *et t.* 11. *f.* 104.

Habitat rarior in Oceano indico, *teſta nunc alba, radiis interdum roſeis picta, nunc rubra, radiis interdum albis, nunc flava.*

inaequivalvis. 23. T. teſta oblongo-roſtrata, valva altera plana.

Gronov. zooph. t. 18. *f.* 3.

Brunniche Beſch. berl. Naturf. 3. *p.* 313. *t.* 7. *f.* 25-28.

Chemn. Conch. 6. *t.* 11. *f.* 106. a. b. c. d.

Habitat in mari mediterraneo *et* norwegico, *teſta lactea, laevi, pellucida, pollicis transverſi longitudine, ſutura dorſali recta in roſtrum obtuſum patulum excurrente, valvula altera leviter convexa, cardinis dentibus 2 primariis, lateralibus nullis.*

trifaſciata. 24. T. teſta ovata laeviuſcula ſanguineo-triradiata, pube rugoſa. *Fn. ſuec.* 2133. *Müll. zool. dan. prodr.* 2969.

Liſt. an. angl. app. 32. *f.* 8.

Chemn. Conch. 6. *t.* 12. *f.* 114. a. b.

β) *Chemn. Conch.* 6. *t.* 12. *f.* 115. 116.

Habitat minus frequens in Oceano europaeo, *teſta unguis magnitudine, alba aut pallida: radiis 3 ſanguineis (β. violaceis, interdum 6) a cardine ortis, anterius magis obtuſa, vulva ovata.*

incarnata. 25. T. teſta ovata anterius productiore compreſſo planiuſcula, natibus ſubmucronatis. *Fn. ſuec.* 2134.*
Liſt. an. angl. 32. *t.* 1. *f.* 8.
Gualt. teſt. t. 88. *f.* M.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 2. *f.* 13.
Chemn. Conch. 6. *t.* 12. *f.* 110.
β) *Chemn. Conch.* 6. *t.* 12. *f.* 117.
γ) *Liſt. Conch. t.* 405. *f.* 251.
δ) *Liſt. Conch. t.* 405. *f.* 250.
Habitat in Oceano europaeo, mari mediterraneo, *teſta extimi pollicis magnitudine, planatae ſimillima, ſed roſea, radio uno alterove pallido, β) margine albo, vertice roſeo; γ) tota rubra, natibus acutiuſculis; δ) intus rubra.*

donacina. 26. T. teſta ovata compreſſo-planiuſcula laeviuſcula, anterius obtuſiſſima.
Gualt. teſt. t. 88. *f.* N?
Chemn. Conch. 6. *t.* 12. *f.* 119?
Habitat in mari mediterraneo, *incarnatae ſimillima, ſed teſta minore purpuraſcente: radiis plurimis rubris, regione vulvae obtuſiſſima, et, ut in donace, truncata.*

truncata. 27. T. teſta ovali compreſſa ſubſtriata: parte antica truncata ſuturaque diſtincta.
Habitat in Java, *incarnatae ſimilis, at teſta violacea, magis fragili, anterius fere truncata, cardinis dentibus omnibus emarginatis.*

trilatera. 28. T. teſta plana anterius truncata flava: vertice albo, cardinis dente primario et laterali ſolitariis.
Chemn. Conch. 6. *t.* 10. *f.* 85.
Habitat - - - teſta triangulo inaequilatero ſimili, 1 pollicem et 7 lineas longa, 2 pollices 2 lineas lata.

oblonga. 29. T. teſta oblonga fragili flavicante, cardinis dente primario in altera valva ſolitario, in altera duplici.
Chemn. Conch. 6. *t.* 10 *f.* 87.
Habitat in Oceano europaeo, *mediae magnitudinis, teſta altero latere rotundata.*

Spengleri. 30. T. teſta alba transverſim ſtriata utrinque bifariam uncinata: valva altera extrorſum, altera introrſum arcuatim flexa.
Spengl. Beſch. Berl. Naturf. 1. *p.* 387. *t.* 9. *f.* 1-3.
Catal. raiſ. t. 4. *f.* 3-5.
Chemn. Conch. 6. *t.* 10. *f.* 88-90.

β) *Liſt.*

β) *Liſt. Conch. t.* 398. *f.* 237.

Habitat ad inſulas Nicobaricas, *teſta craſſa* 11 *lineas longa, et* 2 *pollices cum* 8 *lineis lata alba, vertice roſeo; β) uncinis caret.*

fervenſis. 31. T. teſta oblongo-ovata compreſſa albo rubelloque radiata ſubtiliter transverſim ſtriata, cardinis dentibus lateralibus nullis.

Liſt. Conch. t. 394. *f.* 241.

Chemn. Conch. 6. *t.* 10. *f.* 91.

Habitat in Oceano ſeptentrionali, *teſta pollicem longa, et* 2 *lata.*

operculata. 32. T. teſta purpurea albido faſciata decuſſatim ſtriata altero fine productiore, valva altera convexa, altera plana.

Chemn. Conch. 6. *t.* 11. *f.* 97.

Knorr Vergn. 6. *t.* 12. *f.* 1?

β) Tellina operculata ochroleuca. *Chemn. Conch.* 6. *t.* 11. *f.* 98.

Habitat in India? *rarior, teſta* $1\frac{3}{4}$ *pollicis longa,* $2\frac{3}{4}$ *pollicis lata, dentibus cardinis lateralibus nullis, primario alterius valvae ſolitario, alterius duplici, ſtriis transverſis ſubtilioribus; β) ſtriis transverſis craſſioribus, cardinis dente laterali, primario fiſſo, ſiniſtrae valvae ſolitario, dextrae duplici; an ad inaequivalvem forſan referenda?*

hyalina. 33. T. teſta ovali inaequivalvi plana pellucida ſubtiliſſima decuſſatim ſtriata, cardinis dentibus lateralibus nullis.

Chemn. Conch. 6. *t.* 11. *f.* 99.

β) Tellina excavata Spengleri. *Schroet. Einl. in Conch.* 3. *p.* 6. *n.* 14.

Habitat ad Guineae *littora, β) in* India, *teſta nivea, tenui,* 6 *lineas ultra pollicem longa,* 9 *lineas ultra* 2 *pollices lata, margine acutiſſimo, cardinis dente primario in ſiniſtra valva ſolitario, in dextra duplici.*

vitrea. 34. T. teſta flavicante tenuiſſima perpendiculariter ſtriata anterius roſtrata, cardinis dentibus lateralibus nullis.

Chemn. Conch. 6. *t.* 11. *f.* 101.

Habitat in mari ſeptentrionali *et* balthico, *teſta fragilliina poſterius rotundata, cardinis dente in valva ſiniſtra primario ſolitario, in dextra* 2 *minimis.*

lanceolata. 35. T. teſta ovali tenuiſſima pellucida albida transverſim ſtriata anterius acuminata, cardinis dentibus lateralibus in altera valva nullis.
Chemn. Conch. 6. *t.* 11. *f.* 102.
Habitat rariſſima in India, *teſta* 10 *lineas longa, pollicem cum* 8 *lineis lata, rubelló obumbrata, cardinis dente primario ſimplicii ſubfiſſo.*

apelina. 36. T. teſta ovali pellucida lucis reflexione et refractione variante coſta in utraque valva alba a cardine ad marginem exteriorem procedente.
Chemn. Conch. 6. *t.* 12. *f.* 107.
β) Tellina papyracea alba Spengleri. *Schroet. Einl. in Conch.* 3. *p.* 8. *n.* 18.
Habitat in ſinu Nicobarico, *teſta tenui.*

coccinea. 37. T. teſta ovali pellucida coccinea ſubtiliter transverſim ſtriata.
Chemn. Conch. 6. *t.* 12. *f.* 109.
Habitat in mari mediterraneo, *callo prope cardinem teſtae, inſtar ſolenis inſtructa.*

calcarea. 38. T. teſta ovali tenui alba, cardinis dente primario in altera valva fiſſo, alterius foveae inſerto.
Chemn. Conch. 6. *t.* 13. *f.* 136.
Habitat frequentiſſima in mari Islandiam *circumfluente, teſta tenui.*

virginica. 39. T. teſta ſubtiliter transverſim ſtriata anterius roſtrata.
Liſt. Conch. t. 159. *f.* 15.
Habitat in Virginiae *fluviis, teſta minima rotundata.*

alata. 40. T. teſta viridi ſubtriquetra: margine dilatato.
Liſt. Conch. t. 160. *f.* 16.
Klein oſtr. t. 9. *f.* 36.
Habitat - - - - teſta 2 *fere pollices lata,* 1¼ *longa, an hujus tribus et generis?*

pectinata. 41. T. rotundata plana tenui ſubfuſca longitudinaliter ſtriata,
Liſt. Conch. t. 300. *f.* 137.
Habitat - - - -

anguſta. 42. T. teſta planiuſcula rubra albo-radiata altero fine acuminata, altero rotundata.
Liſt. Conch. t. 383. *f.* 26.

Habitat

Habitat - - - teſta mediae magnitudinis latitudine longitudinem duplo ſuperante.

variegata. 43. T. teſta ovali utroque fine rotundata variegata, radio ad verticem albido.
Liſt. Conch. t. 384. *f.* 27.
β) Tellina lata albida ex rubro radiata. *Liſt. Chonch. t.* 385. *f.* 232.
γ) Tellina parva albida, ex purpura maculata ſive radiata. *Liſt. Conch. t.* 389. *f.* 228.
Habitat - - - -

madagaſcarienſis. 44. T. teſta ovali altero fine ſubacuminata - - - -
Liſt. Conch. t. 386. *f.* 233.
Habitat in Madagaſcar, *teſta* $2\frac{1}{4}$ *pollices longa,* $3\frac{1}{2}$ *lata.*

purpuraſcens. 45. T. teſta utrinque purpuraſcente.
Liſt. Conch. t. 391. *f.* 230.
β) *Gualt. teſt. t.* 77. *f.* L?
γ) *Gualt. teſt. t.* 77. *f.* M?
Habitat - - - teſta ſeſquipollicem longa, at paulo latiori.

aſpera. 46. T. teſta altero fine acuminata intus luteſcente, exterius radiata et ſtriis transverſis aſpera.
Habitat - - - teſta $1\frac{3}{4}$ *pollicis longa,* 3 *pollices lata.*

triangularis. 47. T. teſta ſubcuneata albida transverſe ſtriata.
Liſt. Chonch. t. 401. *f.* 244.
β) Tellina triangularis admodum craſſa fere levior. *Liſt. Conch. t.* 401. *f.* 245.
Habitat - - - teſta ultra pollicem longa, $1\frac{1}{2}$ *lata.*

lata. 48. T. teſta alba inaequilatera, altero fine ſubacuminata.
Liſt. Conch. t. 407. *f.* 253.
Habitat in Oceano Norwegico, *teſta* $1\frac{1}{4}$ *pollicis longa,* $1\frac{3}{4}$ *lata.*

jamaicenſis. 49. T. teſta craſſa roſtro extus purpuraſcente.
Liſt. Conch. t. 408. *f.* 254.
Habitat in Jamaica, *teſta pollicem longa, ſeſquipollicem lata.*

rhomboides. 50. T. teſta exterius alba, ſtriis transverſis aſpera intus caeruleſcente.
Liſt. an. Angl. p. 171. *t.* 4. *f.* 20.
β) *Bonann. recr.* 2. *f.* 48.
muſ. Kirch. 2. *f.* 47.

Habitat

Habitat ad fluvium Angliae Tees, *teſta* 2 *pollices lata, et ultra pollicem longa.*

vinacea. 51. T. teſta ſpadiceo-vinacea: radio albo.
Bonann. recr. 2. *f.* 42.
muſ. Kirch. 2. *f.* 41.
Habitat in mari britannico *et* balthico, *teſta pollicem longa, et ultra* $1\frac{1}{2}$ *lata.*

zonata. 52. T. teſta roſea: faſcia candida.
Bonann. recr. 2. *f.* 44.
muſ. Kirch. 2. *f.* 43.
Habitat in littore latino, *teſta interdum lactea, umbonis macula balauſtina, vix propria ſpecies.*

albicans. 53. T. teſta albida: faſcia candida, intus flava.
Gualt. teſt. t. 77. *f.* H.
β) *Gualt. teſt. t.* 77. *f.* M?
Habitat - - - *β*) *cardine purpuraſcente.*

rufeſcens. 54. T. teſta rufeſcente luteo maculata, decuſſatim ſtriata.
Gualt. teſt. t. 85. *f.* C.
Habitat - - - *teſta* $\frac{3}{4}$ *pollicis longa,* $1\frac{1}{4}$ *lata.*

depreſſa. 55. T. teſta inaequilatera depreſſa minutiſſime ſtriata.
Gualt. teſt. t. 88. *f.* H. I. L.
Habitat - - - *teſta nunc candida, nunc purpuraſcente, nunc ſubroſea.*

faſciata. 56. T. teſta inaequilatera ſubtiliſſime transverſim ſtriata, candido et ſubalbido alternatim faſciata.
Gualt. teſt. t. 89. *f.* B.
Habitat - - - *teſta ultra pollicem longa, et* $1\frac{1}{2}$ *fere lata, altero fine ſubacuminata.*

ſtriata. 57. T. teſta inaequilatera utrinque rotundata ex roſeo alba pellucida.
Gualt. teſt. t. 89. *f.* C.
Habitat - - - *teſta* 2 *pollices lata,* $1\frac{1}{4}$ *longa.*

roſea. 58. T. teſta roſea: coſtis tenuibus a cardine ad marginem decurrentibus.
Knorr Vergn. 5. *t.* 9. *f.* 3.
Habitat - - - *teſta pollicem longa,* $1\frac{1}{2}$ *lata.*

59. T.

punicea. 59. T. teſta ovali plana aequilatera punicea denſiſſime transverſim ſtriata.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 2. f. 8.
Habitat - - - teſta pollicem longa, pollicem et 8 lineas lata.

complanata. 60. T. teſta obovata complanata obſolete ſtriata rubella: margine aucto, rima hiante ſubtomentoſa. *v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 2. f. 9.*
Habitat - - - teſta 1¾ *pollicis longa*, 2¾ *lata.*

Fabula. 61. T. teſta ovata compreſſa inflexa anterius ſubroſtrata: valva altera laevi, altera oblique ſubſtriata: ſtriis reflexis. *Gronov. zooph. t. 18. f. 9.*
Habitat in mari norwegico, mediterraneo, americano, *teſta alba, magnitudine ſeminis lupini albi.*

Adanſoni. 62. T. teſta albida: cardine violaceo.
Adanſ. Seneg. t. 17. f. 9. Poron.
Habitat frequens in antris ſcopulorum aqua marina repletis ad littus Africae *occidentalis, diametri* 2 *linearum.*

cancellata. 63. T. teſta tenui ſordide alba: ſulcis numeroſis tenuiſſimis longitudinalibus rugas transverſas decuſſantibus.
Adanſ. Seneg. t. 17. f. 10. Pirel.
Habitat in mari Atlantico, *teſta opaca, pollicem lata pauloque breviori.*

ſtrigoſa. 64. T. teſta albicante faſciata, glabra ad marginem rugoſa, cardinis dentibus in valva dextra duobus, in ſiniſtra tribus.
Adanſ. Seneg. t. 17. f. 19. Vagal.
Habitat ad littus Africae occidentale, *teſta duplo ſaepiſſime latiori, quam longa, faſciis juniorum flavicantibus, adultiorum ex griſeo violaceis.*

*** *ſuborbiculatae.*

balauſtina. 65. T. teſta dilatato-orbiculata: valvula altera dentibus lateralibus.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta albida: radiis obſoletis rufis, magnitudine ſeminis lupini albi.*

Remies. 66. T. teſta ſuborbiculata compreſſa rugoſa. *Muſ. Lud. Ulr. 482. n. 29.**
Rumpf muſ. t. 43. f. 1. Remies.
Liſt. Conch. t. 266. f. 102.

Murr.

Murr. fund. teſtac. t. 2. f. 8.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 2. *f.* 11.
Chemn. Conch. 6. *t.* 12. *f.* 112. 113.
Habitat in Oceano indico *et* americano, *teſta interdum* 3 *pollices longa et* $3\frac{1}{2}$ *lata alba, in americanis flavedine intermiſta, rugis minus evidentibus.*

reticulata. 67. T. teſta lentiformi compreſſa reticulata.
Habitat in India, *teſta alba, intus flavicante* 2 *pollices longa, et* $1\frac{3}{4}$ *pollicis lata, ſtriis transverſis criſpis, et ſubtiliſſimis elevatis longitudinalibus exarata; ano cordato impreſſo, breviſſimo; cardinis dentibus primariis* 2 *ſubtilibus, laterali utrinque unico.*

ſcobinata. 68. T. teſta lenticulari ſcabra: ſquamis lunatis quincuncialibus.
Muſ. Lud. Ulr. 482. *n.* 30.*
Rumpf. muſ. t. 43. *f.* E.
Gualt. teſt. t. 76. *f.* E.
Knorr Vergn. 6. *t.* 37. *f.* 3.
Chemn. Conch. 6. *t.* 13. *f.* 122-124.
Habitat rarior in Oceano indico, *teſta alba, maculis ferrugineis varia,* $2\frac{1}{2}$ *pollices longa,* $2\frac{3}{4}$ *lata: ani foſſula oblonga, labiis non canaliculatis.*

lactea. 69. T. teſta lentiformi gibba alba pellucida laevi.
Gualt. teſt. t. 71. *f.* D.
Chemn. Conch. 6. *t.* 13. *f.* 125.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta ſemine lupini albi paullo majore, obſolete transverſim ſtriata; cardine edentulo.*

carnaria. 70. T. teſta ſuborbiculata laevi utrinque incarnata oblique ſtriata: ſtriis hinc reflexis.
Liſt. Conch. t. 339. *f.* 176.
an. angl. t. 4. *f.* 25.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 2. *f.* 14.
Chemn. Conch. 6. *t.* 13. *f.* 126.
β) Gualt. teſt. t. 77. *f.* I.
Habitat copioſiſſima in Angliae ſinubus, *et* inſularum Oceani americani littore, *ſeminis lupini albi magnitudine.*

bimaculata. 71. T. teſta triangulo ſubrotunda latiore laevi albida: intus maculis duobus ſanguineis ſubrotundis. *Fn. ſuec.* 2135.
Chemn. Conch. 6. *t.* 13. *f.* 127.
β) Chemn. Conch. 6. *t.* 13. *f.* 132. a. b.

Habitat

Habitat rarior in Oceano europaeo *et* americano, *teſta vix extimi pollicis magnitudine, extus alba, rarius flavicante, praeter ſtrias aliquot obſoletas laevi, flexura parum manifeſta.*

balthica. 72. T. teſta ſubrotunda laevi extrinſecus incarnata. *Fn. ſuec.* 2136.* *it. oel.* 43. *Müll. zool. dan. prodr.* 2970.
Chemn. Conch. 6. *t.* 13. *f.* 128.
Habitat in mari balthico, *teſta fabam minorem vix unquam ſuperante, tenuiſſima, pellucida, fragili, intus alba, a triangulo rotundata.*

piſiformis. 73. T. teſta ſubgloboſa laevi intus incarnata oblique ſubſtriata: ſtriis anterius angulo acuto reflexis. *Fn. ſuec.* 2137.
Habitat ad Oceani europaei oſtia fluviorum, *teſta piſi magnitudine, alba, fundo purpureo, rarius tota alba; ſtriis oculo nudo vix conſpicuis, cardinis dente primario ſimplici, lateralibus prominulis.*

divaricata. 74. T. teſta ſubgloboſa alba bifariam oblique ſtriata.
Liſt. Conch. t. 301. *f.* 142.
Bonann. recr. 3. *f.* 349.
muſ. Kirch. 2. *f.* 104.
Klein oſtr. t. 9. *f.* 28.
Chemn. Conch. 6. *t.* 13. *f.* 129. 130.
Habitat in mari mediterraneo *et* americano, *teſta piſi magnitudine ad pollicis longitudinem ſubcompreſſa, rarius caeruleſcente aut cinerea, intus alba, ſtriis tenuiſſimis undulatis divergentibus exarata; margine crenato, flexura nulla, cardinis dente primario duplici, lateralibus nullis; an hujus generis?* Logie.

digitaria. 75. T. teſta ſubgloboſa pallida, cincta ſtriis obliquis uniformibus.
Chemn. Conch. 6. *t.* 12. *f.* 120. 121.
Habitat in mari mediterraneo, americano *et rariſſime* indico, *teſta piſi magnitudine, in indica majore, intus utplurimum glabra, nonnunquam ex rufo aurantia, maculis interdum undulatis rufis picta, ſtriis eleganter obliquis ad marginem exteriorem ſenſim, inſtar ſtriarum in apice digitorum, deſinentibus, unde apparet ſpiraliter ſtriata.*

cornea. 76. T. teſta globoſa glabra cornei coloris: ſulco transverſali. *Fn. ſuec.* 2138.

Müll.

Müll. verm. terr. et fluv. 2. *p.* 202. *n.* 387. *zool. dan. prodr.* 2965. Tellina (rivalis) teſta globoſa gibba glabra, umbone obtuſo.

Liſt. Conch. t. 159. *f.* 14.
anim. angl. t. 2. *f.* 31. *app.* 22. *t.* 1. *f.* 5.
Gualt. teſt. t. 7. *f.* B. C. C. C.
Argenv. Conch. t. 27. *f.* 9.
zoomorph. t. 8. *f.* 16.
Schroet. Flusconch. t. 4. *f.* 3-5.
Chemn. Conch. 6. *t.* 13. *f.* 133. a. b.
Habitat vulgaris in Europae amnibus *et* foſſis, *teſta pellucida nitida, oculis armatis, ſubtiliſſime transverſe ſtriata, intus alba ſubcaeruleſcente, extus alba, pallida, ex caeruleo cinerea, caerulea albo miſta, arcubus transverſis nigris, uno evidentiori, piſi ſaepius magnitudine, non raro quadruplo majore, cardinis dentibus lateralibus elongatis obſoletis utrinque cum foſſulis excipientibus, mediis vix ullis.*

lacuſtris. 77. T. teſta rhombea planiuſcula glabra, umbone acuto. *Müll. zool. dan. prodr.* 2966. *verm. terr. et fluv.* 2. *p.* 204. *n.* 388.
Chemn. Conch. 6. *t.* 13. *f.* 135.
Habitat in Europae lacubus *et* paludibus, *vivipara, teſta ad* 6 *lineas longa* 4 *lata, ſubfuſca, valvarum dorſo cinereo, margine albido, intus alba, juniore tota alba diaphana, tenuiore et fragiliore, quam corneae, cardinis dentibus mediis nullis, lateralibus obſoletis* 6.

amnica. 78. T. teſta ſubcordiformi transverſim ſulcata, umbone obtuſo. *Müll. zool. dan. prodr.* 2967. *verm. terr. et fluv.* 2. *p.* 205. *n.* 389.
Chemn. Conch. 6. *t.* 13. *f.* 134.
Habitat in Europae amnibus *et foſſis, teſta cornea minus globoſa,* 1-5 *lineas diametro aequante, intus glabra ſubcaerulea; exterius alba, fuſca, aut lutea, coſta interdum nigricante ſimplici aut duplici, junioribus tota candida pellucida, cardinis dentibus mediis in utraque valva* 2; *laterali utrinque* 1.

fluminalis. 79. T. teſta triangulari gibba transverſim ſtriata. *Müll. verm. terr. et fluv.* 2. *p.* 205. *n.* 390.
Habitat in Aſiae fluvio Euphrat, *teſta craſſa, dura, opaca, cardinem verſus antrorſum latiori, exterius viridi, ſtriis imbricatis aperturae parallelis, exarata, intus cyanea, cardi-*

cardinis dentibus mediis ſex, lateralibus utrinque elongatis et cum ſulcis excipientibus crenulatis.

fluminea. 80. T. teſta triangulari gibba transverſim coſtata. *Müll. verm. terr. et fluv. 2. p 206. n. 391.*
Habitat in Sinae arena fluviatili, *teſta* 6-8 *lineas longa et lata, opaca, antrorſum et retrorſum fere aequali, exterius viridi, intus ſemicirculo nigro notata, albida, cardine teſtam fluminalis referente.*

fluviatilis. 81. T. teſta triangulari transverſim rugoſa. *Müll. verm. terr. et fluv. 2. p. 206. n. 392.*
Habitat in fluvio, emporium Sinenſe Canton *praeterlabente, cum fluminali et fluminea ad Venerem accedens, cardine his etiam ſimilis, at teſta latiore et tenuiore,* 8 *lineas longa,* 9 *lata, ex fuſco virente varioloſa diſtincta.*

iberica. 82. T. teſta globoſa laevi nitida, margine dentata.
Bonann. recr. 2. *f.* 33.
muſ. Kirch. 2. *f.* 32.
Habitat copioſa in littore Iberico, *teſta parva, pulla, interdum ex luteo fuſca, atro intermiſta.*

adriatica. 83. T. teſta ſubgloboſa extrinſecus alba intus margaritacea margine denticulata.
Bonann. recr. 2. *f.* 34.
muſ. Kirch. 2. *f.* 33.
Habitat in Adriatici littoris *arena, teſta parva.*

ſinuoſa. 84. T. teſta ſubgloboſa aequivalvi aequilatera: ſtriis transverſis rarioribus.
Gualt. teſt. t. 77. *f.* D. E.
Habitat - - - - teſta mediae magnitudinis, albida, aut rubella.

purpurata. 86. T. teſta aequilatera laevi tota lucidiſſime purpurea.
Gualt. teſt. t. 77. *f.* L.
Habitat - - - - teſta pollicem longa, ſeſquipollicem lata.

87. T.

Tellinarum *ſpecies multae imperfectius juſto ab auctoribus deſcriptae, difficillime definiendae; multae certe videntur merae varietates; an hujus generis eſt concha ab* Argenvillio *zoomorph. t.* 8. *f.* 9. *delineata? an diſtincta ſpecies atra, quam Ill.* Pallas *in mari glaciali reperit?*

candida. 87. T. teſta ſuborbiculata ſubtiliter transverſim ſtriata candida.
Gualt. teſt. t. 77. f. O.
β) Gualt. teſt. t. 77. f. P.
Habitat - - - - teſta β) minore laevi.

gallica. 88. T. teſta trigona pectinata.
Argenv. Conch. t. 27. f. 11.
Habitat frequens in Galliae *fluvio* Marne, *mediae magnitudinis, cardinis dente ſolitario.*

ſenegalenſis. 89. T. teſta trigono-globoſa, craſſa, dura, laevi, ſulcis transverſis exarata.
Adanſ. Seneg. t. 17. *f.* 14. Toſar.
Habitat in Africa, *teſta alba, incarnata, aut lini florum colore tincta, interdum rubella albo radiata.*

anguloſa. 90. T. teſta ovali planiuſcula transverſim ſtriata antrorſum inflexo-angulata; cardinis dente primario bifido; lateralibus remotis.
Chemn. Conch. 10. *p.* 349. *t.* 170. *f.* 1654. 1655.
Habitat ad inſulas Americae *mediae obverſas.*

polygona. 91. T. teſta alba transverſim ſtriata orbiculari antrorſum angulato: cardinis dentibus lateralibus nullis; primario exporrecto duplicato, alterius duobus. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 348. *t.* 170. *f.* 1651-1653.
Habitat in Oceano indico.

306. CARDIUM. *Animal* Tethys.

Teſta bivalvis ſubaequilatera aequivalvis (*plerumque*) convexa, longitudinaliter coſtata ſtriata aut ſulcata, margine dentata.

Cardo dentibus mediis binis alternatis: altero utplurimum incurvo; lateralibus remotis inſertis.

coſtatum. 1. C. teſta gibba aequivalvi: coſtis elevatis carinatis concavis membranaceis. *Muſ. Lud. Ulr.* 483. *n.* 31.*
Argenv.

Argenv. Conch. t. 26. *f.* A. Concha exotica.
Adanſ. Seneg. t. 18. *f.* 2. Kaman.
Columm. purp. 26. *t.* 27.
Major teſtac. t. 10.
Rumpf muſ. t. 48. *f.* 6.
Liſt. Conch. 1. *t.* 327. *f.* 164.
Gualt. teſt. t. 72. *f.* D.
Knorr Vergn. 1. *t.* 28. *f.* 2.
Chemn. Conch. 6. *t.* 15. *f.* 151.
Habitat in Oceano africano, *teſta (integra rariſſima) ad* 3 *pollices longa,* $3\frac{3}{4}$ *lata, et ultra* 3 *pollices alta, alba: ſulcis latis fuſcis.*

Cardiſſa. 2. C. teſta cordata: valvis compreſſis dentato-carinatis, natibus approximatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 484. *n.* 32.*
Rumpf muſ. t. 42. *f.* E. Cardiſſa.
Argenv. Conch. t. 26. *f.* I. Cor veneris.
zoomorph. t. 12. *f.* K.
Columm. aq. 16.
Liſt. Conch. t. 318. *f.* 155. *t.* 319. *f.* 156.
Bonann. recr. 2. *f.* 49.
muſ. Kirch. 2. *f.* 48.
Gualt. teſt. t. 84. *f.* B. C. D.
Klein. oſtrac. t. 10. *f.* 39.
Knorr Vergn. 1. *t.* 18. *f.* 3. *et* 4. 6. *t.* 11. *f.* 1.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 2. *f.* 15-18.
Chemn. Conch. 6. *t.* 14. *f.* 143-146.
β) *Liſt. Conch. t.* 320. *f.* 157.
Habitat rarior in Oceano indico, *teſta ad* $2\frac{1}{2}$ *pollices longa, et ultra* 2 *pollices lata, cordi humano ſimillima, coſtis obliquis, vulvaque cordata conſpicua, ſanguineis guttis interdum varia, nunc utrinque plana, nunc altero latere concava.*

roſeum. 3. C. teſta cordata anterius lineis, poſterius ſtriis paulo latioribus conjunctione cordis figuram aemulantibus exarata, hinc convexa, illinc concava.
Argenv. Conch. t. 23. *f.* D.
Chemn. Conch. 6. *t.* 14. *f.* 147.
Habitat ad inſulas Nicobaricas, *cardiſſae affine, teſta ex albido et roſeo varia: vulva cordata.*

retuſum. 4. C. teſta cordata: valvis ſtriatis crenulatis ſubcarinatis; ano lunato cordiformi intruſo.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 3. *f.* 1. 2.

Chemn. Conch. 6. *t.* 14. *f.* 139-142.
Habitat in India, Arabia, Aegypto, *inter hemicardium et fragum medium, teſta interdum ultra* 2 *pollices longa, et* 2 *fere pollices lata, craſſa lactea, anterius convexa, poſterius anguſtata, plana, quaſi truncata: margine plicato-dentato.*

Hemicardium. 5. C. teſta cordata ſubquadrilatera: valvulis carinatis, natibus diſtantibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 484. *n.* 33.*
Rumpf muſ. t. 44. *f.* H.
Petiv. aq. amb. t. 17. *f.* 4.
Gualt. teſt. t. 83. *f.* C.
Knorr Vergn. 6. *t.* 3. *f.* 2.
Chemn. Conch. 6. *t.* 16. *f.* 159-161.
Habitat rariſſimum in Oceano indico, *cardiſſae affine, teſta extrinſecus ochroleuca, intus nivea, coſtarum paucioribus glabris, reliquis nudulosis: ſulcis intermediis rugoſis excavato-punctatis.*

Lithocardium. 50. C. teſta cordata ſubtrilatera, valvis transverſe ſulcatis: anterius longitudinaliter ſtriata. *Mant.* 2. *p.* 544.
Habitat - - - bactenus modo foſſile inventum, hemicardio affine, valvis anterius carinatis: carinis crenulatis, natibus approximatis, vulva ovata, monte veneris planiuſculo longitudinaliter crenulato ſtriato cum carinula altiore.

lineatum. 51. C. teſta cordata carinata, anterius oblique truncata, tenui, glaberrima nivea, aureo ſtriata, margine denticulata. *Kaemm. lab. Rudolſt. p.* 210. *n.* 2. *t.* 12. *f.* 4.
Habitat - - - teſta ultra pollicem longa.

medium. 6. C. teſta ſubcordata ſubangulata: valvis angulatis ſulcatis laevibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 485. *n.* 34.

Liſt.

Cardiorum *cardines dentibus lateralibus remotis inſtruuntur, ſcrobiculo oppoſitae valvae inſertis, dum teſta clauditur, multae ſpecies adhuc ignotae, aut obſcurae; an huc ſpectant conchae a* Valentyn *Abh. t.* 16. *f.* 27. *ab* Argenville *conch. t.* 24. *f.* B. *t.* 29. *f.* 20. b. *et zoom. t.* 6. *f.* U. *depictae? incola ocreae figura apertura duplici laterali tentaculis cincta conſpicuum pedem falciformem, quo ſe domumque movet, teſtae valvas tertia ſui parte aperiendo protrudit, interſtitio membrana flavo fuſcoque undulata clauſo.*

Antiquata *teſta nobis, quae longitudinaliter ſulcata, ſed transverſis appoſitionibus annotinis intercepta, pectinata, quae longitudinalis ſulcata vel ſtriata, at anterius ſtriis vel ſulcis ad angulum acutum divergentibus, longitudinalis teſta a natibus ad marginem, transverſulis a natibus ad nates, orae margini parallele.*

Liſt. Conch. t. 316. *f.* 153.
Bonann. recr. 2. *f.* 94.
muſ. Kirch. 2. *f.* 91.
Gualt. teſtac. t. 83. *f.* B.
Knorr Vergn. 1. *t.* 29. *f.* 5. 6. *t.* 20. *f.* 5.
Spengler ſelt. Conch. t. 1. *f.* k.
Chemn. Conch. 6. *t.* 16. *f.* 162-164.
β) Cardium donaciforme. *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *t.* 7. *f.* 11.
Chemn. Conch. 6. *t.* 16. *f.* 165?
Habitat in Oceano americano, *teſta teſtae hemicardii ſatis ſimili, at maculis ſpadiceis aut fuſcis varia, coſtis pluribus cum intermediis ſulcis laevibus; valvis altero latere quaſi truncatis medio tamen prominentibus, cardinis dente primario unico.*

aculeatum. 7. C. teſta ſubcordata: ſulcis convexis linea exaratis: exterius aculeato ciliatis.
Muſ. Lud. Ulr. 485. *n.* 35.* Cardium muricatum.
Argenv. Conch. t. 23. *f.* B. Cor bovis.
Liſt. Conch. t. 321. *f.* 158.
Bonann. recr. 2. *f.* 96. 97.
muſ. Kirch. 2. *f.* 95. 97. 98.
Gualt. teſt. t. 72. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 86. *f.* 4.
Knorr Vergn. 6. *t.* 3. *f.* 1.
Murr. fund. teſtac. t. 2. *f.* 9.
Chemn. Conch. 6. *t.* 15. *f.* 155-157.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 86. *f.* 5.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 86. *f.* 8.
δ) *v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t.* 3. *f.* 5.
ε) *Bonann. recr.* 2. *Fn.* 93. *muſ. Kirch.* 2. *f.* 94.
Habitat in Mari mediterraneo, *echinato proxime affine, teſta tamen longe majore, magis convexa, altero latere quaſi truncata, marginem verſus tamen elevata, ex fuſco flava: faſciis interdum obſcurioribus pictae, cardinis dentibus in utraque valva* 2, *lateralibus in altera valva* 2, *in altera* 3.

echinatum. 8. C. teſta ſubcordata ſulcata: coſtis carinatis aculeatis. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 46. *t.* 13. *f.* 1. 2. *t.* 14. *f.* 1-4. *rar.* 1. *p.* 28.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1122. *n.* 79. *Fn. ſuec.* 2139.* *Muſ. Lud. Ulr.* 486. *n.* 36.* *Müll. zool. dan. prodr.* 2971. *Brit. zool.* 4. *n.* 38.
Fabr. Fn. groenl. p. 409. *n.* 410. Cardium teſta ſubcordata: ſulcis exaratis linea ciliari, aculeis inflexis plurimis.

 Rondel.

Rondel. teſt. 22. *Worm. muſ. p.* 253. *Aldrov. teſt. l.* 3. *c.* 45. Concha echinata.
Geſn. muſ. b. p. 43. Concha echinata prima.
Liſt. Conch. t. 324. *f.* 161.
an. angl. t. 5. *f.* 33.
Bonann. recr. 2. *f.* 90.
muſ. Kirch. 2. *f.* 88.
Gualt. teſt. t. 72. *f.* B.
Klein oſtr. t. 10. *f.* 40.
Seb. muſ. 3. *t.* 86. *f.* 3.
Coſta brit. Conch. p. 167. *t.* 14. *f.* 2.
Murr. teſtac. t. 2. *f.* 19.
Lesk. Naturg. 1. *t.* 10. *f.* 8.
Chemn. Conch. 6. *t.* 15. *f.* 158.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 86. *f.* 13.
γ) *Bonann. recr.* 2. *f.* 72.
muſ. Kirch. 2. *f.* 71.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *teſta ſpadicea: faſciis* 5 *albis, intus alba, ſulcis profundis* 20, *verſus cardinem rugoſis, coſtarum aculeis a medio verſus marginem increſcentibus verſus cardinem nullis.*

ciliare. 9. C. teſta ſubcordata: ſulcis elevatis triquetris; extimis aculeato ciliatis.
Liſt. Conch. t. 325. *f.* 162.
Gualt. teſt. t. 72. *f.* C.
Knorr Vergn. 6. *t.* 5. *f.* 5.
Chemn. Conch. 6. *t.* 17. *f.* 171. 172.
Habitat ad littus Africae occidentale, *coſtato affine, teſta teſtis echinati et aculeati minore, tenuiore, fragiliore et magis pellucida, nivea, ſulcis transverſe rugoſis, coſtis trigonis aculeatis.*

ciliatum. 10. C. teſta ſubcordata: ſulcis elevatis ſubtriquetris ciliatis.
O. Fabr. Fn. groenl. p. 410. *n.* 411.
Habitat ſat copioſum in fundo maris ſeptentrionalis *arenoſo vel argilloſo, echinato affine, teſta craſſa obliquata, convexa,* 19 *lineas lata,* 18 *longa, ſub epidermide cinerea vel griſea albida, intus alba glabra, ſulcis* 32-38, *undulatim ſtriatis, coſtis ad carinas ciliatis, mediis convexiuſculis lateralibus triquetris.*

tuberculatum. 11. C. teſta ſubcordata: ſulcis obtuſis nodoſis transverſim ſtriatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 486. *n.* 37.*

Liſt.

Liſt. Conch. t. 329. *f.* 166.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 2. *f.* 100.
Rumpf muſ. t. 48. *f.* 11.
Gualt. teſt. t. 71. *f.* M.
Argenv. zoom. t. 6. *f.* C. D.
Batem. app. t. 11. *f.* 39. a?
Seb. muſ. 3. *t.* 86. *f.* 7.
Knorr Vergn. 5. *t.* 30. *f.* 2. *et* 6. *t.* 8. *f.* 3.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 23. 24.
Chemn. Conch. 6. *t.* 17. *f.* 173.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 86. *f.* 2.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 86. *f.* 6.
δ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 86. *f.* 14.
ε) *Knorr Vergn.* 2. *t.* 29. *f.* 4.
ζ) *Knorr Vergn.* 3. *t.* 4. *f.* 5.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta varie picta, utplurimum fuſca faſciis obſcurioribus, aut alba: faſciis fuſcis, valde convexa transverſe rugoſa: coſtis* 20-23 *convexis interdum planiuſculis, hinc inde nodoſis, altero latere majoribus.*

Iſocardia. 12. C. teſta cordata: ſulcis ſquamis fornicatis imbricatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 487. *n.* 38.*
Liſt. Conch. t. 323. *f.* 160.
Bonann. recr. 2. *f.* 95.
muſ. Kirch. 2. *f.* 93.
Rumpf. muſ. t. 48. *f.* 9.
Argenv. Conch. t. 23. *f.* M.
Oear. gott. t. 29. *f.* 3.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 5. *f.* 56.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. p. 39. *vign.*
Chemn. Conch. 6. *t.* 17. *f.* 174-176.
Habitat in mari americano, *teſta* 2½ *pollices longa,* 2¼ *lata, ex cinereo alba, hinc inde rubro maculata aut nebuloſa, intus alba, medio purpurea, cardinis dente primario in altera valva unico.*

Fragum. 13. C. teſta ſubcordata ſubangulata: ſulcis notatis lunulis elevatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 488. *n.* 39.
Rumpf muſ. t. 44. *f.* G. Fragum album.
Liſt. Conch. t. 315. *f.* 152.
Bonann. recr. 3. *f.* 374.
muſ. Kirch. 2. *f.* 110.
Petiv. amb. aq. t 18. *f.* 21.

Gualt. teſt. t. 83. *f.* E.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 3. *f.* 3. 4.
Schroet. Journ. Naturg. 3. *t.* 2. *f.* 6.
Chemn. Conch. 6. *t.* 16. *f.* 166. 167.
β) *Knorr Vergn.* 4. *t.* 14. *f.* 5.
γ) *Gualt. teſt. t.* 71. *f.* N.
Habitat in India, *medio affine, at teſta magis trigona, alba, ſquamis ſulphureis, intus nivea, coſtis planiuſculis, an mera unedinis varietas?*

unedo. 14. C. teſta ſubcordata: ſulcis lunatis coloratis. *Muſ. Lud. Ulr.* 488. *n.* 40.
Argenv. Conch. t. 23. *f.* N. Fragum.
Liſt. Conch. t. 315. *f.* 151.
Bonann. recr. 3. *f.* 375.
muſ. Kirch. 2. *f.* 109.
Rumpf muſ. t. 44. *f.* F.
Petiv. amb. aq. t. 17. *f.* 4.
Valent. abh. t. 16. *f.* 23.
Gualt. teſt. t. 83. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 86. *f.* 12.
Knorr Vergn. 2. *t.* 29. *f.* 2.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 3. *f.* 25.
Chemn. Conch. 6. *t.* 16. *f.* 168. 169.
β) *Knorr Vergn.* 2. *t.* 29. *f.* 3?
Habitat rarior in India, *frago valde affine, at teſta duplo majore, ſulcorum ſquamis rubris rarioribus, vulvaeque labio altero alteri incumbente diſtinctum.*

muricatum. 15. C. teſta ſubcordata ſulcata lateribus muricata. *Muſ. Lud. Ulr.* 489. *n.* 41.*
Liſt. Conch. t. 322. *f.* 159. *et t.* 326. *f.* 163.
Knorr Vergn. 4. *t.* 14. *f.* 5.
Chemn. Conch. 6. *t.* 17. *f.* 177. 178.
Habitat in Oceano americano, *praeſertim ad ſinum* Campechienſem, *teſta margine ſerrata, cinerea, alba aut flavicante ſpadiceo mixta aut maculata, cardine intus virgis* 2 *rubris.*

magnum. 16. C. teſta oblonga: ſulcis angulatis latere ſerratis. *Muſ. Lud. Ulr.* 489. *n.* 42.*
Chemn. Conch. 6. *t.* 19. *f.* 191.
β) *Liſt. Conch. t.* 331. *f.* 168.
Bonann. recr. 2. *f.* 92.
muſ. Kirch. 2. *f.* 90.

v. Born

v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 3. *f.* 6. 7.
Chemn. Conch. 6. *t.* 17. *f.* 179.
γ) *Gualt. teſt. t.* 71. *f.* H.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 3. *f.* 10.
Chemn. Conch. 6. *t.* 17. *f.* 180.
δ) Basket Cockle. *Martyn univ. conchol.* 2. *t.* 80.
Habitat in India, β) *in* Jamaica *et inſulis* Antillis, *teſta margine ſerrata, ſulcis* 19, 27, 30 *transverſe rugoſis aſpera, flaveſcente, intus alba,* β) *ochroleuca maculis ſpadiceis varia,* γ) *cinerea maculis nigricantibus conſperſa.*

flavum. 17. C. teſta ſubovata ſulcata: latere anteriore ſcabro, poſteriore dentato. *Muſ. Lud. Ulr.* 490. *n.* 43.
Bonann. recr. 2. *f.* 72.
muſ. Kirch. 2. *f.* 79.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *t.* 7. *f.* 11. a. b.
β) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 3. *f.* 5.
γ) *Gualt. teſt. t.* 71. *f.* G.
δ) *Bonann. recr.* 2. *f.* 89.
muſ. Kirch. 2. *f.* 87.
ε) *Rumpf muſ. t.* 44. *f.* E.
Petiv. amb. aq. t. 8. *f.* 3.
Habitat in India, *teſta dorſo et poſterius utplurimum flava, interdum maculata, ceterum, intus quoque, alba; coſtis circiter* 27 *convexis, quarum* 5-6 *anterius ſpinis acutis,* 12-13 *poſterius tuberculis planis ſcabrae, reliquae laeves.*

laevigatum. 18 C. teſta obovata: ſtriis obſoletis longitudinalibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 490. *n.* 44.*
Liſt. Conch. t. 249. *f.* 83.
Gualt. teſt. t. 82. *f.* A.
Knorr Vergn. 2. *t.* 20. *f.* 4. 5. *t.* 10. *f.* 7. *et* 6. *t.* 6. *f.* 1.
Chemn. Conch. 6. *t.* 18. *f.* 189.
β) *Kaemmer Conch. Rudolſt. p.* 210. *t.* 12. *f.* 4?
γ?) Eggcockle. *Mart. univ. conch.* 2. *t.* 79.
Habitat in mari atlantico, *et* americano, *flavo affine, teſta glabra, margine intus ſerrata, ultra* 2 *pollices longa,* $1\frac{3}{4}$ *lata, ſulphurea, aurantia, rubra, variegata, alba, alba flavo, aut rubro miſta, aut faſciis transverſis flavis picta;* β) *nivea anterius rubella, intus a cardine deorſum maculis duabus purpureis oblongis, exterius lineis aureis picta, tenui, utrinque glabra.*

ſerratum. 19. C. teſta obovata laevi: ſtriis obſoletis, margine interiore ſerrato. *Muſ. Lud. Ulr.* 491. *n.* 45.*

Chemn. Conch. 6. t. 18. f. 185. 186.
Habitat in mari mediterraneo *et* indico; *laevigato minor, teſta flava minus convexa, et obſoletius ſtriata, margine exteriore crenulato, natibus regularibus.*

edule. 20. C. teſta antiquata: ſulcis viginti ſex obſolete recurvato imbricatis. *Fn. ſuec. 2141. It. oel. 42. Müll. zool. dan. prodr. 2972.*
Baſt. op. ſubſ. 2. p. 72. t. 8. f. 3. 4.
Liſt. Conch. t. 333. f. 170. et t. 334. f. 171.
an. angl. t. 5. f. 34.
Gualt. teſt. t. 71. f. F.
Knorr Vergn. 6. t. 8. f. 2. 4.
Chemn. Conch. 6. p. 141. Vign. 4. f. C. *et t. 19. f. 194.*
Habitat frequentiſſimum in Oceano europaeo, mari balthico, caſpio, mediterraneo, *teſta non admodum convexa, ſordide alba, rarius caerulea, aut flava, ſulcis ad 30 transverſe ſtriatis rugoſisque; incola eſculentus.*

islandicum. 21. C. teſta ſulcata: coſtis ad triginta ſex triquetris laevibus.
Chemn. Conch. 6. t. 19. f. 195.
Habitat in Islandia *et* Groenlandia, *eduli perquam affine, at ſulcis teſtae pluribus et profundioribus, ſtriis transverſis, praeter marginem exteriorem, nullis diſtinctum, teſta ſordida nigricante, nonnunquam faſciata.*

groenlandicum. 22. C. teſta antiquata glabra tenui murina: lineis angulatis ferrugineis picta, margine glabra: ſtriis longitudinalibus obſoletis.
Chemn. Conch. 6. t. 19. f. 198.
Habitat in Groenlandia *et* Islandia, *teſta ad* $2\frac{3}{4}$ *pollices longa et ad* $3\frac{1}{2}$ *pollices lata, faſciis interdum fuſceſcentibus picta; an mera edulis varietas?*

ruſticum. 23. C. teſta antiquata: ſulcis viginti remotis; interſtitiis rugoſis.
Regenſ. Conch. 1. t. 12. f. 77. 78.
Chemn. Conch. 6. t. 19. f. 197.
Habitat in maribus europaeis, *praecipue* mediterraneo, *etiam* caſpio, *eduli affine, at teſta anterius valvis clauſis carinata, ano evidente, ſed anguſto, ſulcis profundioribus, coſtis paucioribus magis convexis diſtinctum, teſta nunc ferruginea faſciis lividis, nunc alba, anterius fuſca intus caeruleſcente, nunc alba faſciis ferrugineis flavicantibus aut caeruleſcentibus.*

52. C.

glaucum. 52. C. teſta ſubantiquata anterius glauca: ſulcis viginti poſterius retrorſum imbricatis, natibus violaceis. *Poiret voyag. en Barbar 2. p. 13.*

Habitat ad Barbariae littora, *ad* 10 *lineas altum*, $11\frac{1}{3}$ *latum, et* 8 *profundum.*

pectinatum. 24. C. teſta ſubcordata pectinata. *Muſ. Lud. Ulr.* 492. *n.* 47.* *Murr. fund. teſtac. t.* 2. *f.* 18.

Habitat in mari mediterraneo, *teſtae albae ſtriis diſtantibus ſurſum ſcabris, cavitate ſub umbone flava, ano ovato impreſſo: marginibus prominulis.*

virgineum. 25. C. teſta triangulo rotundata aequilatera: rugis transverſis membranaceo recurvatis, cardinibus caeruleis.

β) *Chemn. Conch.* 6. *t.* 18. *f.* 181.

Gronov. zooph. t. 18. *f.* 5.

Habitat in mari mediterraneo, β) *in* indico *et* americano, *cardinis dentibus lateralibus ad mactras accedens, teſta pulchella, faſciata, epidermide glauca obtecta, intus alba,* β) *teſta tenui fragili longitudinaliter ſtriata, anterius et ad vulvam purpurea, ad umbonem rubra.*

trilaterum. 26. C. teſta triangulari gibba ſtriata.

Habitat in Mari caſpio, *an diſtincta ſpecies?*

Auricula. 27. C. teſta cordata ſubrhombea: coſtis utrinque viginti quatuor; ſulcis ſubtiliſſime crenulatis, natibus diſtantibus. *Forſk. Fn. arab. p.* 122. *n.* 52.

Regenſ. Conch. 2. (*ined.*) *t.* 9.

Habitat in Arabia *et* Aegypto, *teſta alba pellucida* $2\frac{1}{4}$ *pollicem longa*, $1\frac{1}{4}$ *lata, dorſi margine revoluto dentato.*

triſte. 28. C. teſta ovata laevi; rima anoque ſtriatis. *Syſt. nat.* X. 1. *p.* 680. *n.* 74. *Muſ. Lud. Ulr. p.* 491. *n.* 46.

Habitat - - - teſta laevi exolete cinerea, albo radiata, natibus reflexis.

monſtroſum. 29. C. teſta gibba altero latere impreſſa ochroleuca, altero convexa cordata albida flavo maculata, valvis dentato carinatis.

Chemn. Conch. 6. *t.* 14. *f.* 149. 150.

Habitat rariſſimum ad inſulas Nicobaricas.

Lima. 30. C. teſtae gibbae coſtis aculeatis: anterioribus tuberculis membranaceis recurvatis ad latera crenatis, ſulcis intermediis granulatis.

Chemn.

Chemn. Conch. 6. *t.* 15. *f.* 153. 154.
β) *Chemn. Conch.* 6. *p.* 161.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *t.* 7. *f.* 13. a. b. Cardium coronatum.
Habitat ad inſulas Nicobaricas, *teſta ochroleuca: margine anteriore incarnato, umbone rubello; in* β) *coſtis magis rotundatis, non aculeatis, ſed granulatis.*

ringens. 31. C. teſta rotunda ventricoſa alba: marginis dentibus profundis: anterioris roſeis.
Liſt. Conch. t. 330. *f.* 167.
Adanſ. Seneg. t. 18. *f.* 1.
Knorr Vergn. 4. *t.* 14. *f.* 3. *et* 6. *t.* 3. *f.* 4.
Chemn. Conch. 6. *t.* 16. *f.* 170.
Habitat ad Africae *littus, et in* mari americano.

papyraceum. 32. C. teſta pellucida cinerea: ſtriis longitudinalibus tenuibus.
Chemn. Conch. 6. *t.* 18. *f.* 184.
Habitat in India, *teſta fragillima, intus alba et purpuraſcenti maculata.*

aeolicum. 33. C. teſta craſſa: ſtriis anterioribus longitudinalibus, poſterioribus transverſis.
Liſt. Conch. t. 314. *f.* 150.
Bonann. recr. 2. *f.* 91.
muſ. Kirch. 2. *f.* 89.
Argenv. Conch. t. 21. *f.* A.
Knorr Vergn. 5. *t.* 26. *f.* 1. 2. *t.* 27. *f.* 3.
Chemn. Conch. 6. *t.* 18. *f.* 187. 188.
Habitat ad Guineae *et inſularum* Antillarum *littora, teſta valde convexa, ex albo et rubello varia.*

oblongum. 34. C. teſta flavicante oblonga turgida coſtata anterius glabra cordata margine crenata.
Chemn. Conch. 6. *t.* 19. *f.* 190.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 3. *f.* 8.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta ad* 3 *pollices longa, et* 2½ *fere lata; coſtis* 30.

craſſum. 35. C. teſta ſubfuſca oblongiuſcula craſſa antiquata: marginis dentibus profundioribus.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *t.* 7. *f.* 12.
β) *Liſt. Conch. t.* 332. *f.* 169.
Habitat in mari mediterraneo *et* ſeptentrionali, *oblongo affine, at teſta multo majore, minus anguſta, craſſiori, coſtis planioribus circiter* 23 *diſtinctum.*

36. C.

latum. 36. C. teſta lata inaequilatera intus alba: coſtis magnis planis ſpinuloſis.
Chemn. Conch. 6. *t.* 19. *f.* 192. 193.
Knorr Vergn. 6. *t.* 7. *f.* 6.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 3. *f.* 9.
Habitat rarius Tranquebariae *et ad inſulas* Nicobaricas, *teſta 2 pollices longa*, 2½ *lata, nunc vertice alba, medio flavicante, margine flava, nunc vertice fuſco-varia, ceterum flavicante: faſciis nonnullis fuſcis.*

exiguum. 37. C. teſta oblongiuſcula inaequaliter coſtata ſubfuſca.
Liſt. Conch. t. 317. *f.* 154.
Habitat - - - minutum, an diſtincta ſpecies?

maculatum. 38. C. teſta maculata confertim undulato-rugoſa: coſtis latis, ſulcis anguſtiſſimis intus dilute rubella.
Liſt. Conch. t. 328. *f.* 165.
Habitat in ſinu Campechienſi, *teſta* 3 *fere pollices longa,* 3¾ *lata.*

flexuoſum. 39. C. teſta rotundata fuſca: coſtis flexuoſis, ſulcis rugoſis.
Liſt. Conch. t. 343. *f.* 180.
Habitat - - - teſta 1¾ *pollices longa, et fere aeque lata.*

fluviatile. 40. C. teſta planiuſcula craſſa alba: coſtis planioribus.
Liſt. an. angl. p. 187. *t.* 5. *f.* 32.
Habitat rariſſimum ad oſtium fluvii Angliae Tees.

gaditanum. 41. C. teſta rotundata flavicante albo, rubro viridi fuſcoque varia decuſſatim ſtriata.
Bonann. recr. 2. *f.* 63.
muſ. Kirch. 2. *f.* 62.
Habitat in mari Gaditano, *utrum hujus generis, an arcae?*

braſilienſe. 42. C. teſta rotundata: coſtis latis planis minutiſſime crenatis.
Bonnan. recr. 3. *f.* 395.
muſ. Kirch. 2. *f.* 117.
Habitat frequens ad Braſiliae *littora.*

amboinenſe. 43. C. teſta oblongiuſcula alba nigricante-maculata: coſtis valde convexis.
Bonann. muſ. Kirch. 2. *f.* 129.
Habitat ad Amboinae *littora, teſta* 1¾ *pollices longa: coſtis circiter* 12.

ſquamoſum. 44. C. teſta cordata aequilatera ex albo fulvida intus purpuraſcente, coſtis imbricatim ſquamoſis.
Gualt. teſt. t. 71. *f.* N.
Habitat - - - frago affine, at dentibus ad marginem teſtae anteriorem nullis.

cancellatum. 45. C. teſta ſubrubra tenui rotundata decuſſatim ſtriata.
Gualt. teſt. t. 75. *f.* B.
Habitat - - - exiguum.

rubiginoſum. 46. C. teſta rubella inaequilatera: coſtis convexis transverſim ſtriatis.
Gualt. teſt. t. 83. *f.* D.
Habitat - - -

albidum. 47. C. teſta inaequilatera coſtata ſubalbida intus purpurea.
Gualt. teſt. t. 83. *f.* H.
Habitat - - - puſillum.

vireſcens. 48. C. teſta inaequilatera oblonga: coſtis ſubtilibus; ſupra duplicatis.
Gualt. teſt. t. 84. *f.* A.
Habitat - - - teſta fragili pellucida, ex albido vireſcente, maculis roſeis interdum varia, intus argentea.

faſciatum. 49. C. teſta rotundata albida: faſcia fuſca, coſtis acutis.
Knorr Vergn. 6. *t.* 8. *f.* 3.
Habitat - - - cardine exterius fuſco et cinereo.

307. MACTRA. *Animal* Tethys.

Teſta bivalvis, inaequilatera aequivalvis.

Cardo dente medio complicato cum adjecta foveola, lateralibus remotis inſertis.

Spengleri. 1. M. teſta laevi: vulva plana, rima lunula hiante.
Chemn. Conch. 6. *t.* 20. *f.* 199-201.
Spengl. catal. t. 3. *f.* 1-3.
Schroet. Litter. 1. *f.* 4-6.
Habitat ad caput bonae ſpei, *teſta manus fere magnitudine, ſubhiante, pallida, ſubdiaphana, ſubtriangulari,* 2½ *pollices*

lices longa, 3½ lata, latere anteriori ſubcarinata a limbis diſtincta, poſteriori planiuſcula ſtriata, vulva ad nates incurvas lunata, acuta, tota hiante in foſſulam cardinis, cujus dentes laterales trianguli. L. Spengler.

plicataria. 2. M. teſta transverſe rugoſo plicata diaphana, vulva planiuſcula, ano compreſſo oblongo.
Chemn. Conch. 6. *t.* 20. *f.* 202-204.
Habitat in Oceano indico, *teſta ovi latitudine*, 1-1¾ *pollices longa*, 1½-2½ *pollices lata, alba, papyri inſtar tenui, vulva anoque laevibus lanceolatis, illa planiuſcula, carina ab umbonibus diſtincta, hoc magis impreſſo, magis ovato, natibus incurvis recurvatis, cardinis dentibus lateralibus ex membranis* 2 *parallelis.*

papyracea. 3. M. teſta pellucidiſſima alba convexa anterius ſubhiante ſubtiliter ſtriata et coſtata.
Chemn. Conch. 6. *t.* 23. *f.* 231.
Habitat rariſſima ad inſulas Nicobaricas, *plicatariae affinis, at teſta magis convexa et inaequilatera, ad tellinas accedens, ſed cardine maſtrae.*

ſtriatula. 4. M. teſta laevi diaphana: umbonibus ſubſtriatis, vulva laevi impreſſa carina circumſcripta.
Gualt. teſt. t. 85. *f.* F.
Knorr Vergn. 6. *t.* 34. *f.* 1.
Chemn. Conch. 6. *t.* 21. *f.* 205. 206.
Habitat in mari mediterraneo, *et ad* littus Coromandel, *teſta alba, ad* 2½ *pollices longa, et* 3 *lata, ſubtrigona, ſatis convexa, anterius ſubhiante: valva lanceolata, umbonibus ſtriatis.*

ſtriata. 5. M. teſta craſſa triangulari ſtriis validis laevibus confertis arcuatis exarata.
Chemn. Conch. 6. *t.* 22. *f.* 222.
Habitat - - - *teſta alba, intus et ad umbones glabra.*

rotundata. 6. M. teſta obtuſe trigona albida, umbone lacteo-faſciato, natibus vulva et margine interiore atque anteriore ſubviolaceis.
Liſt. Conch. t. 263. *f.* 99.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *t.* 8. *f.* 1.
β) *Liſt. Conch. t.* 264. *f.* 100?
Habitat - - - *glabratae affinis, at teſta* 1¼ *pollicis longa*

ga et $1\frac{3}{4}$ *pollicis lata, anterius anguſtiori ſtriis ſubtilioribus exarata: margine tamen glaberrimo.*

glabrata. 7. M. teſta laevi diaphana ſtriata, umbonibus laeviſſimis, vulva anoque ſtriatis.
Gualt. teſt. t. 71. *f.* A.
Chemn. Conch. 6. *t.* 22. *f.* 216. 217.
Habitat in Oceano africano *et* indico, *teſta alba, ad* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, et* 2 *pollices lata, natibus laeviſſimis; limbo ſtriato, vulva nulla carina diſtincta.*

nitida. 8. M. teſta nivea nitente craſſa diaphana laevi, vulva carina diſtincta anoque convexiuſculis ſtriatis.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *t.* 8. *f.* 2. 3. *p.* 88.
Habitat - - - *glabratae affinis, at teſtae natibus retroverſis magis diſtantibus, rimaque triangulari diſtincta; teſta triangulari.*

corallina. 9. M. teſta laevi ſubdiaphana alba: faſciis lacteis.
Bonann. recr. 2. *f.* 53.
muſ. Kirch. 2. *f.* 52.
Rondel. teſt. 1. *p.* 32. *t.* 33.
Klein oſtr. t. 12. *f.* 80.
Gualt. teſt. t. 71. *f.* B.
Planc. Conch. t. 3. *f.* 4?
Chemn. Conch. 6. *t.* 22. *f.* 218. 219.
Habitat in mari mediterraneo, *et ad* Guineae *littora, teſta* 2 *pollices lata,* $1\frac{1}{2}$ *longa, triangulari, ano vulvaque obtuſis, natibus non antiquis, rima triangulari.*

lactea. 10. M. teſta tenui turgida pellucida alba anterius ſubtiliſſime ſtriata: faſciis lacteis.
Chemn. Conch. 6. *t.* 22. *f.* 220.
Habitat rarior in Oceano indico, *corallinae affinis et aequalis, at teſta tenuiore, magis convexa, anterius planiuſcula: margine obtuſo.*

ſtultorum. 11. M. teſta ſubdiaphana laevi obſolete radiata intus purpuraſcente, vulva gibba.
Syſt. nat. X. *p.* 681. *n.* 8. Cardium ſtultorum.
Adanſ. ſeneg. t. 17. *f.* 16. Lifor.
Liſt. Conch. t. 251. *f.* 85.
Gualt. teſt. t. 71. *f.* C.
Knorr Vergn. 6. *t.* 5. *f.* 1.
Murr. fund. teſtac. t. 2. *f.* 10.

v. Born

v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. p. 50. *vign.*
Chemn. Conch. 6. *t.* 23. *f.* 224-227.
Habitat in mari mediterraneo, atlantico *et* americano, *teſta valde convexa, ceterum ſatis trigona, fuſca, teſtacea, cinerea; (utplurimum obſolete) radiata.*

grandis. 12. M. teſta ſubdiaphana laevi cervina pallide radiata: umbone et cardine extra medium poſitis.
Chemn. Conch. 6. *t.* 23. *f.* 228.
Habitat rariſſima - - - m. ſtultorum affinis, at teſta majore $2\frac{1}{4}$ *pollicis longa,* $3\frac{1}{4}$ *lata, angulo extremo ſubhiante, latere anteriore productiori.*

ſolida. 13. M. teſta opaca laeviuſcula ſubantiquata. *Müll. zool. dan. prodr.* 2973.
Fn. ſuec. 2140. Cardium ſolidum.
Liſt. Conch. t. 253. *f.* 87. 88.
an. angl. t. 4. *f.* 24.
Bonann. recr. 2. *f.* 51. 52.
muſ. Kirch. 2. *f.* 50. 51.
Klein oſtr. t. 10. *f.* 42.
Rondel. teſt. 1. *c.* 7.
Knorr Vergn. 6. *t.* 8. *f.* 5.
Chemn. Conch. 6. *t.* 23. *f.* 229. 230.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 170. *f.* 1656.
Habitat frequentiſſima in Oceano europaeo, *teſta craſſa, alba, flaveſcente, cinerea aut fuſca, ſubantiquata, non raro cingulis lacteis aut faſciis caeruleis alisve picta, cardinis dentibus lateralibus minus, quam in congeneribus, elongatis, foveola majore, et dente intermedio minore.*

lutraria. 14. M. teſta ovali oblonga laevi, dentibus lateralibus nullis.
Mya lutraria. *Fn. ſuec.* 2128. *Muſ. Lud. Ulr.* 470. *n.* 9.
Liſt. Conch. t. 415. *f.* 259.
an. angl. p. 170. *t.* 4. *f.* 19.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 2. *f.* 19.
Rumpf muſ. t. 45. *f.* M.
Gualt. teſt. t. 90. *f.* A. 2?
Chemn. Conch. 6. *t.* 24. *f.* 240. 241.
Habitat ad oſtia fluviorum Oceani europaei, *teſta utrinque hiante,* $2\frac{1}{4}$ *pollices longa,* $4\frac{1}{4}$ *lata, robuſta, ſordide alba, antiquata, natibus convergentibus.*

Cygnus. 15. M. teſta nivea craſſa trilatera ſubtiliter transverſim ſtriata, anterius planiuſcula ſubtiliter rugoſa, ano lato impreſſo cordato tenuiter ſtriato.
Chemn. Conch. 6. *t.* 21. *f.* 207.
Habitat rariſſima ad Tranquebariae *littora, teſta pollicem longa, et ultra pollicem lata.*

maculata. 16. M. teſta obtuſe trigona laevi tenui pellucide ſpadiceo maculata, intus alba tenuiſſime ſtriata, ano cordato impreſſo.
Chemn. Conch. 6. *t.* 21. *f.* 208.
Habitat rariſſima in Oceano indico, *teſta circiter* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, et* $1\frac{3}{4}$ *lata.*

turgida. 17. M. teſta inflata obſolete ſtriata ochroleuca intus alba: natibus diſtantibus purpuraſcentibus, cardinis dente ſupernumerario triangulari duplici.
Chemn. Conch. 6. *t.* 21. *f.* 210. 211.
Habitat ad Tranquebariae *littus, teſta ad* $2\frac{3}{4}$ *pollices longa,* $3\frac{1}{2}$ *lata tenui, ſubpellucida, anterius et poſterius ſubtiliter ſtriata et rugoſa.*

violacea. 18. M. teſta tenui obſolete radiata ſubtiliter transverſim ſtriata, vulva anoque albidis, cardinis dente ſupernumerario duplici triangulari.
Chemn. Conch. 6. *t.* 22. *f.* 213. 214.
Knorr Vergn. 6. *t.* 5. *f.* 2?
Habitat ad Tranquebariae *littus, teſta 2 fere pollices longa,* 3 *lata, tenera, fragili, hinc inde hiante, vulvae oblongae margine elevato rugoſo.*

cuneata. 19. M. teſta cuneata caerulea ſubtiliter transverſim ſtriata, margine intus crenulato.
Chemn. Conch. 6. *t.* 22. *f.* 215.
Habitat - - - violaceae proxime affinis, at teſta minore pollicem lata, vix pollicem longa, rarius nivea.

glauca. 20. M. teſta ovata ſordide alba glauco radiata ſubtiliſſime transverſim ſtriata anterius rugoſa.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 3. *f.* 11. 12.
Chemn. Conch. 6. *t.* 23. *f.* 232. 233.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta* $2\frac{3}{4}$ *pollices longa,* $3\frac{1}{2}$ *lata: natibus retrorſum verſis; rima intermedia anguſta.*

pellucida. 21. M. teſta ovata tenui pellucida alba inaequaliter transverſim ſtriata.

Chemn.

Chemn. Conch. 6. t. 24. f. 234.
Habitat ad Guineae *littus, teſta fragili,* 1¼ *pollicem longa, 2 lata, antrorſum productiore et pauliſper biante.*

fragilis. 22. M. teſta ovata tenui laevi pellucida planiuſcula, vulva transverſim ſtriata rugoſaque.
Chemn. Conch. 6. t. 24. f. 235.
Habitat ad inſulas Nicobaricas, *pellucidae affinis, teſta anterius biante ſubplicata: margine acuto antrorſum ſubangulato poſterius rotundato.*

rugoſa. 23. M. teſta ovata ſordide alba, ſtriis elevatis longitudinalibus transverſas magis elevatas decuſſantibus.
Chemn. Conch. 6. t. 24. f. 236.
Habitat in Oceano europaeo, *teſta* 2¼ *pollicis longa,* 2¾ *lata, craſſa, intus magis alba.*

nicobarica. 24. M. teſta ovata tenui pellucida anterius laevi, poſterius cancellatim ſtriata.
Chemn. Conch. 6. t. 24. f. 237.
Habitat ad inſulas Nicobaricas.

complanata. 25. M. teſta ovata tenui arcuatim plicata: plicis transverſim ſtriatis, dentibus lateralibus nullis.
Chemn. Conch. 6. t. 24. f. 238.
Habitat in Oceano indico, *teſta alba aut caeruleſcente pollicem longa,* 2¼ *lata.*

Liſteri. 26. M. teſta tenerrima ſubrotunda albida: foveola dentis cardinis triangularis ampla pyriformi.
Liſt. an. angl. t. 4. f. 23.
Habitat ad oſtium fluvii Angliae Tees, *teſta* 1½ *pollicem longa, 2 lata.*

piperata. 27. M. teſta ovata compreſſa transverſe ſtriata: dentibus minimis; foveola magna obliquata. *Poiret voyage en Barbar. 2. p. 15.*
Bellon. aq. p. 404. Piperata chama latinis.
Aldrov. exang. p. 421. Chama piperata Bellonii.
Planc. Conch. p. 32. Tellina vilior.
Adanſ. Conch. p. 232 *t.* 17. *f.* 18. Calcinella.
Chemn. Conch. 6. t. 3. f. 21. Mya hiſpanica.
Petiv. gazoph. t. 9. f. 3.
Habitat in mari mediterraneo, 21 *circiter lineas lata,* 17 *alta, 7 profunda.*

308. DONAX. *Animal* Tethys.

Teſta bivalvis: margine (ſaepe) crenulato; antico obtuſiſſimo.

Cardo dentibus duobus; marginalique ſolitario (rarius duplici, triplici aut nullo) ſubremoto ſub ano.

Scortum. 1. D. teſta triangulo-cordata, vulva plana. *Muſ. Lud. Ulr.* 493. *n.* 48.*
Liſt. Conch. t. 377. *f.* 220.
Argenv. Conch. t. 21. *f.* L.
Knorr Vergn. 6. *t.* 7. *f.* 7?
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 4. *f.* 1. 2.
Chemn. Conch. 6. *t.* 25. *f.* 242-247.
Habitat in Oceano indico, *teſta cinerea hinc inde violaceo miſta, intus praeter umbonem violaceum nivea, cardinis dente marginali altero ſub valva poſito, in alterutra valva duplici: foveola intermedia.*

pubeſcens. 2. D. teſta anterius ſpinis ciliata.
Rumpf muſ. t. 42. *f.* F?
Chemn. Conch. t. 25. *f.* 248.
Habitat rarior in Oceano indico, *teſtae colore interno cardinisque ſtructura ſcorto ſimilis, at teſta extrinſecus cinerea aut cinereo albida argute decuſſatim ſtriata, anterius plana: laterum angulo carinata, valva hiante ovata: nymphis nudis ano ovato-oblonga.*

rugoſa. 3. D. teſta anterius rugoſa gibba: marginibus crenatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 494. *n.* 50.*
Adanſon Seneg. t. 18. *f.* 1. Paman.
Liſt. Conch. t. 375. *f.* 216.
Bonann. recr. 2. *f.* 37. 38.
muſ. Kirch. 2. *f.* 36. 37.
Gualt. teſt. t. 89. *f.* F.
Argenv. Conch. t. 22. *f.* L.
Klein oſtrac. t. 11. *f.* 61.
Seba muſ. 3. *t.* 86. *f.* 10. 11.
Chemn. Conch. 6. *t.* 25. *f.* 250-252. *et p.* 242. *Vign.*
Schroet. Journ. 3. *t.* 2. *f.* 9.

Habitat

Habitat in mari mediterraneo, atlantico, americano, *varietas rariſſima major in* indico, *teſta utplurimum* $\frac{3}{4}$ *pollicis longa*, $1\frac{1}{4}$ *lata*, *vario colore conſpicua*, *frequenter faſciata*, *intus violacea et alba*, *dente marginali nullo.*

Trunculus. 4. D. teſta anterius laevi intus violacea: marginibus crenatis. *Fn. ſuec.* 2142. *Muſ. Lud. Ulr.* 494. *n.* 51. *Müll. zool. dan. prodr.* 2974.
Adanſ. Seneg. t. 18. *f.* 2. Gafet.
Liſt. Conch. t. 376. *f.* 217.
an. angl. t. 5. *f.* 35.
Bonann. recr. 2. *f.* 47.
muſ. Kirch. 2. *f.* 48.
Gualt. teſt. t. 88. *f.* O.
Bytem. app. t. 11. *f.* 39. b.
Knorr Vergn. 1. *t.* 7. *f.* 7.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 4. *f.* 3. 4.
Chemn. Conch. 6. *t.* 26. *f.* 253. 254.
Habitat frequens in maribus europaeis, *etiam* atlantico et europaeo, *teſtae colore externo vario*, *ſtriis perpendicularibus ſubtiliſſimis.*

ſtriata. 5. D. teſta anterius obtuſiſſima undique ſtriata: margine denticulato, vulva ovata.
Knorr Vergn. 6. *t.* 28. *f.* 8.
Habitat in Europae auſtralis Oceano, *teſta alba*, *et tota, exceptis natibus*, *gibba*, *magis*, *quam in congeneribus.*

denticulata. 6. D. teſta anterius obtuſiſſima: labiis transverſe rugoſis, margine denticulato, nymphis dentiformibus.
Adanſ. Seneg. t. 18. *f.* 3. Naſar.
Liſt. Conch. t. 376. *f.* 218. 219.
Gualt. teſt. t. 89. *f.* D.
Knorr Vergn. 2. *t.* 23. *f.* 2. 3.
Chemn. Conch. 6. *t.* 26. *f.* 256. 257.
β) *Knorr Vergn.* 2. *t.* 23. *f.* 4. 5.
Habitat frequens in mari mediterraneo, atlantico, americano, *teſta cuneiformi*, *laevi*, *longitudinaliter punctato-ſtriata*, *alba albida*, *aut caeruleſcente*, (β. *ſtraminea*, *vulvae centro caeruleo*, *intus violacea*) *radiis faſciisve caeruleſcentibus interdum picta*, *intus albicante*, *vulva ſubrotunda minima*, *dente cardinis marginali altero ſub vulva.*

cuneata. 7. D. teſta cuneiformi: marginibus integerrimis. *Muſ. Lud. Ulr.* 495. *n.* 52.*

Liſt. Conch. t. 392. f. 231?
Knorr Vergn. 6. t. 7. f. 3.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. p. 52. vign.
Chemn. Conch. 6. t. 26. f. 260.
β) *Knorr Vergn. 6. t. 7. f. 7.*
γ) *Chemn. Conch. 6. t. 26. f. 267?*

Habitat in Tranquebariae *littore, teſta alba interdum caeruleo radiata (β flava aut rufa margine violacea) complanata pollicem longa, et* 1¾ *lata, anterius transverſim rugoſa: lineis perpendicularibus rugas decuſſantibus, ceterum ſubtiliter decuſſatim ſtriata, intus violacea et alba.*

Faba. 8. D. teſta gibba ſubtiliter transverſim ſtriata, flavicante maculata: umbonis apice et faſcia ad marginem externum integerrimum caeruleſcente, hac radio albo intercepta.
Chemn. Conch. 6. t. 26. f. 266.

Habitat - - - ſcriptae affinis, at teſta craſſiore, natibus verſus vulvam flexis, rima nulla, labiis clauſis diſtincta.

ſcripta. 9. D. teſta ovata compreſſa laevi, ſcripta lineis purpureis undatis: rima acuta, marginibus crenulatis. *Muſ. Lud. Ulr. 495. n. 53.**
Adanſ. Seneg. t. 17. f. 31. Sunet.
Liſt Conch. t. 379. f. 222. et t. 380. f. 323.
Bonann. recr. 2. f. 43.
muſ. Kirch. 2. f. 42.
Rumpf muſ. t. 43. f. L. M.
Petiv. amb. aq. t. 2. f. 7. et t. 18. f. 5.
Gualt. teſt t. 88. f. Q.
Klein oſtr. t. 11. f. 59.
Knorr Vergn. 6. t. 7. f. 4. 5.
Murr. fund. teſt. t. 2. f. 5.
Chemn. Conch. 6. t. 26. f. 261-265.
β) *Liſt. Conch. t. 381. f. 224.*

Habitat frequens ad littora Malabariae *et* inſularum Xylanearum, *teſtae lineis angulatis, rubellis, caeruleſcentibus aut fuſcis pictae cardine ad veneres propius accedens.*

10. D.

* *An diſtincta hujus generis ſpecies eſt, quam* Argenville *zoomorph. t. 5. f.* M. *depingendam curavit? Ad hoc genus referas quoque teſtas a* Chemnizio *Conch. 10. t. 172. f. 1668. 1669. depictas.*

muricata. 10. D. teſta ovata: ſtriis muricatis, margine denticulato. *Muſ. Lud. Ulr.* 496. *n.* 54.*
Habitat in Oceano indico, *teſta gibba rufeſcente: rima hiante antrorſum utrinque dente compreſſo terminata, ano nullo.*

Irus. 11. D. teſta ovali rugis membranaceis erectis ſtriatis cincta.
Gualt. teſt. t. 95. *f.* A.
Chemn. Conch. 6. *t.* 26. *f.* 268-270.
Habitat in mari mediterraneo, *cardine veneribus propior, teſta phaſeoli magnitudine alba, anterius obtuſiſſima rugoſa: rugis arcuatis, reflexo-erectis fere criſpis; exterioribus ſenſim anterioribus majoribus.*

laevigata. 12. D. teſta anterius obtuſa ad latera obſolete ſtriata, ex viridi flavicante intus et ad nates violacea, margine integerrimo, cardinis dente marginali nullo.
Chemn. Conch. 6. *t.* 25. *f.* 249.
Habitat rarior ad Tranquebar, *teſta 6 lineas ultra pollicem longa, et 3 ultra 2 pollices lata, vulvae anique labiis ſubincumbentibus.*

ſpinoſa. 13. D. teſta nivea intus caeruleſcente poſterius laevi perpendiculariter ſtriata, anterius truncata tenerrime cancellata, angulis ſubſpinoſis.
Chemn. Conch. 6. *t.* 26. *f.* 258.
Habitat rariſſima ad Tranquebariae *littus, natibus glabris, cardine rugoſam referens.*

incarnata. 14. D. teſta incarnata anterius truncata reticulatim ſtriata rugoſaque, poſterius cuneata ſtriis tenerrimis perpendicularibus exarata.
Chemn. Conch. 6. *t.* 26. *f.* 259.
Habitat Tranquebariae, *teſta interdum faſciis transverſis flavicantibus hinc inde picta.*

argentea. 15. D. teſta ovali laevi oleaginea intus argentea: marginis dentibus prope cardinem elatioribus acutis.
Gualt. teſt. t. 88. *f.* R.
Habitat - - -

bicolor. 16. D. teſta ovata ſtriis elevatis, pauciores transverſas decuſſantibus exarata rufa: radio in altero latere albo.
Gualt. teſt. t. 88. *f.* S.
Habitat - - -

radiata. 17. D. teſta ſtriis confertis arcuatis transverſis extrinſecus, perpendicularibus intus, rugis anterius inaequali fuſca hyalino maculata.

Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 104. *t.* 8. *f.* 3.

Habitat Tranquebariae, *teſta pollicem fere lata, et ultra* ½ *longa, anterius minus obtuſa radiis* 2 *albis picta, poſterius rotundata: limbo albo, intus nivea luteo et caeruleſcente maculata, cardinis dente medio in altera valva unico obtuſo, marginali in utroque duplici, margine integerrimo.*

ſtraminea. 18. D. teſta ſtriis tenerrimis perpendicularibus anterius coſtas transverſas decuſſantibus exarata ſtraminea: faſciis transverſis obſcurioribus: margine ſpadiceo poſterius integerrimo.

Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 105. *t.* 8. *f.* 4. a. b.

Habitat - - - *teſta ultra pollicem longa et* ¾ *lata intus incarnata, antrorſum violacea: parte anteriori limbo lato ſubconvexo diſtincta, natibus rubellis, cardinis dentibus marginalibus in utraque valva* 2.

candida. 19. D. teſta tota candida ſtriis teneris rarioribus arcuatis transverſis antrorſum obliquis, cardinis dentibus mediis tribus obliquis, margine integerrimo.

Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 106. *t.* 8. *f.* 5.

Habitat Tranquebariae, *teſta* ¾ *fere pollicis longa, et paulo latiore, tenui, fragili, inter ovatam et cuneatam quaſi media, anterius medio elevatiori, ſtriis marginem verſus in rugas abeuntibus.*

309. VENUS. *Animal* Tethys.

Teſta bivalvis; labiis margine antico incumbentibus.

Cardo dentibus tribus: omnibus approximatis; lateralibus apice divergentibus.

Vulva et *Anus* diſtincta.

* *Pubentes.*

Dione. 1. V. teſta ſubcordata transverſe ſulcata, pube ſpinoſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 497. *n.* 55.*

Liſt. Conch. t. 307. *f.* 140.

Bonann.

Bonann. muſ. Kirch. 2. *f.* 121.
Rumpf muſ. t. 48. *f.* 4.
Olear. muſ. 29. *f.* 4.
Pet. gaz. t. 31. *f.* 9.
Lochner muſ. Besler. t. 21. *f.* 11.
Gualt. teſt. t. 76. *f.* D.
Leſſer teſtaceoth. f. 134.
Argenv. Conch. t. 21. *f.* I.
Murray fund. teſtac. t. 2. *f.* 11. 16. 17.
Knorr Vergn. 1. *t.* 4. *f.* 3. 4.
— delic. nat. ſel. t. B. V. *f.* 9.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. p. 57. *vign. f.* a.
Chemn. Conch. 6. *t.* 27. *f.* 271-273.
Schroet. Litterat. 1. *f.* 1. 2.
Habitat rarior et pretioſa in Oceano americano.

Venerem filiam Dionis ſ. e concha maris natam finxere poëtae; hujus typus praecipue determinabit concharum partium metaphoricam denominationem.

Testa *bivalvis, aequivalvis, ſemicordata, rotundata, ſubincarnata, poſterius et anterius magis gibba umbonibus undique exaratis* ſtriis *transverſis, diſtantibus, parallelis, marginatis, ſubrecurvatis, aequalibus: exterioribus obtuſioribus, poſterius alternis altioribus acutioribusque et abbreviatis minoribus.* Intus *laevis, alba, ſub umbonibus fornicata.* Cardo ſiniſtrae *tridentatus: dentibus approximatis ſcrobiculo diſtinctis; denticulo intermedio compreſſo, anguſtiore: lateralibus divergentibus craſſiuſculis obtuſis.* Dextrae *cardo denticulis duobus approximatis compreſſis inter ſcrobiculos duos.* Margo *ambitus obtuſiſſimus integerrimus.* Nates *recurvatae, obtuſiuſculae, apice glabrae.* Anus *impreſſus, ovatus, laevis, incarnatus. Anterius* Pubes *ciliaris, utrinque, e natibus ad ſummum montis veneris, cingens vulvam ſpinis e ſtriis alternis tertiisve teſtae ortis, ſubulatis, depreſſis, adſcendentibus, antrorſum arcuatis, ſubtus canaliculatis, ſuperioribus ſenſim longioribus, longiſſimis longitudine ipſius rimae.* Vulvae *regio incarnata, oblique ſtriata ſurſum a rima ad pubem.* Labia *laeviora, incarnata, incluſa faſcia pallida, armata, a natibus ad medium rimae aculeis utrinque quinque breviſſimis; margo vulvae ſupra rimam connivet ſulco longitudinali, intra quem ſiniſtrae margo gibboſior ſe inſinuat.* Rima *lanceolata, hians labris prominulis, clauſa* hymene. Nymphae *cartilagineae, retractiores, longitudine rimae.*

Paphia. 2. V. teſta ſubcordata: rugis incraſſatis, pube rugis attenuatis, labris complicatis.
Liſt. Conch. t. 279. *f.* 116.
Bonann. recr. 2. *f.* 75.
muſ. Kirch. 2. *f.* 72.
Rumpf muſ. t. 48. *f.* 5.
Valent. Abh. t. 16. *f.* 29?
Spengl. ſelt. Conch. t. 1. *f.* 1.
Gualt. teſt. t. 85. *f.* A.
Argenv. Conch. t. 21. *f.* B.
Knorr Vergn. 2. *t.* 28. *f.* 2. *et* 6. *t.* 5. *f.* 6. *et t.* 6. *f.* 2.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 7. *f.* 11.
Chemn. Conch. 6. *t.* 27. *f.* 274-276.
β) *Chemn. Conch.* 6. *t.* 27. *f.* 277.
γ) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 5. *f.* 6.
Habitat ad inſulas Americae *oppoſitas, teſta alba: maculis, ſtriis, nebulis, anterius lineis angulatis ſubfuſcis picta, ultra* 2 *pollices longa,* 1¾ *lata, ano fuſco, coſtis transverſis latis convexis.*

Marica. 3. V. teſta ſubcordata decuſſatim ſtriata, pube lamelloſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 497. *n.* 56.*
Liſt. Conch. t. 280. *f.* 118?
Argenv. zoom. t. 12. *f.* C.
Chemn. Conch 6. *t.* 27. *f.* 282-286.
Habitat rariſſima in Oceano americano, *teſta alba, exterius radiis maculis veniſque ex fuſco rubelli picta: margine crenulato.*

Dyſera. 4. V. teſta ſubcordata: ſulcis transverſis remotis reflexis margine crenulato. *Muſ. Lud. Ulr.* 498. *n.* 57.*
Liſt. Conch. t. 277. *f.* 114. *t.* 278. *f.* 115. *t.* 285. *f.* 122. a.
Bonann. recr. 3. *f.* 348?
muſ. Kirch. 2. *f.* 103.
Gualt. teſt. t. 88. *f.* D.
Klein. oſtrac. t. 10. *f.* 48. 49.
Knorr Vergn. 4. *t.* 24. *f.* 3? 6. *t.* 10. *f.* 2? 2. *t.* 28. *f.* 3.
Gronov. zooph. t. 18. *f.* 8.
Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 4. *f.* 9?
Chemn. Conch. 6. *t.* 27. *f.* 279? 280? 281? *et t.* 28. *f.* 287-294.
β) *Liſt. Conch. t.* 280. *f.* 117?
Habitat in Oceano americano, *rarior et ſpecioſior in* indico, *teſta colore et pictura varia coſtis tenuibus ſaepius acutis inaequali.*

Bajana. 5. V. teſta fragili glabra: ſtriis transverſis rarioribus.
Bonann. muſ. Kirch. 2. *f.* 124. 125.
Habitat in Braſiliae *littore, teſta ochroleuca nigro-varia.*

excavata. 83. V. teſta lentiformi transverſim ſtriata: ano profunde impreſſo cordato, vulva lata.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 167. *n.* 34. *t.* 8. *f.* 10.
Habitat - - - ſinuatae ſimilis, at ſtriis teſtae acutis ſubtilioribus, anterius et poſterius in rugas abeuntibus, colore ex fuſco luteo aut ex albo cinereo, pube ſquamoſo-ſpinoſa diſtincta.

** *impuberes.*

† *ſubcordatae.*

verrucoſa. 6. V. teſtae ſulcis membranaceis ſtriatis antrorſum inprimis verrucoſis, margine crenulato.
Adanſ. Seneg. t. 16. *f.* 1. Cloniſſe.
Liſt. Conch. t. 284. *f.* 122.
Gualt. teſt. t. 75. *f.* H.
Argenv. Conch. t. 21. *f.* 60.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 4. *f.* 7.
Chemn. Conch. 6. *t.* 29. *f.* 299. a. 299. b. 300.
Habitat in mari mediterraneo, *ad* Angliae, Antillarum*que littora, paphiae affinis, teſta craſſa,* 2 *pollices longa et aeque lata flavicante, maculis radiisque paucis fuſcis varia.*

Lapicida. 148. V. teſta alba, antrorſum longitudinaliter, poſterius transverſim ſtriata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 356. *t.* 172. *f.* 1664. 1665.
Habitat ad inſulas Americae *mediae obverſas, corallia lapidesque calcareos rodere perhibita.*

divergens. 147. V. teſta alba: ſtriis ſubtiliſſimis divergentibus denſiſſimis.
Chemn. Conch. 10. *p.* 357. *t.* 172. *f.* 1666. 1667.
Habitat ad inſulas Americae *mediae obverſas.*

Caſina. 7. V. teſtae ſulcis transverſis recurvis acutis, margine poſteriori crenulato: pone anum canaliculato.
Liſt. Conch. t. 286. *f.* 123.
Chemn. Conch. 6. *t.* 29. *f.* 301? 302?
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 115. *t.* 8. *f.* 6.
Habitat rara in Oceano europaeo, *frequentius foſſilis, teſta alba maculis ſtriis, vibicibus ſubfuſcis varia, ano fuſco, umbonibus rubellis.*

8. V.

cancellata. 8. V. teſtae ſtriis transverſis membranaceis remotis, ano cordato. *Muſ. Lud. Ulr.* 506. *n.* 71.
Knorr Vergn. 6. *t.* 39. *f.* 4.
Chemn. Conch. 6. *t.* 13. *f.* 137. 138. *t.* 29. *f.* 304-307.
Habitat rara in Oceano indico, *teſta ultra pollicem longa et ultra* $1\frac{1}{2}$ *lata, cinerea: radiis nonnullis exoletis fuſcis, intus rubra aut ſubfuſca, ſtriis interdum quoque longitudinalibus exarata, margine crenulato.*

Gallina. 9. V. teſta radiata: ſtriis transverſis obtuſis, cardinis dente poſteriore minimo, margine crenulato. *Fn. ſuec.* 2143. *Müll. zool. dan. prodr.* 2975.
Liſt. Conch. t. 281. *f.* 119. *t.* 282. *f.* 120. *t.* 295. *f.* 131.
Klein. oſtr t. 10. *f.* 54.
Bytem. app. t. 11. *f.* 39. C?
Knorr Vergn. 5. *t.* 14. *f.* 2-5.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. p. 57. *vign. f.* b.
Chemn. Conch. 6. *t.* 30. *f.* 308-310.
β) *Liſt. Conch. t.* 295. *f.* 132?
Habitat in Oceano americano *et* maribus europaeis, *teſta craſſa, planiuſcula, pollicem longa et* $1\frac{1}{4}$ *lata, glaberrima colore varia, radiis utplurimum* 3 *ſubfuſcis aut rubellis: intermediis interdum lineis angulatis, ano cordato fuſco, vulva lineis maculisque fuſcis varia.*

guineenſis. 10. V. teſta cinerea intus nivea: ſtriis transverſis acutis: vulvae margine albo labiisque ſubtiliter ſtriatis roſeis: margine integerrimo.
Chemn. Conch. 6. *t.* 30. *f.* 311.
Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 4. *f.* 8.
β) *Chemn. Conch.* 6. *t.* 34. *f.* 312.
Habitat in Africae *littore* occidentali, *gallinae affinis teſta hinc inde dilute rubello miſta: ſtriis elevatis validis non ramoſis, ano cordato.*

Petulca. 11. V. teſta ſubſulcata: margine crenulato, rima ſubovata hiante, nymphis acutis.
Habitat in Oceano Europae auſtralioris, *teſta avellanae magnitudine albo fuſcoque nebuloſa: ano oblongo.*

flexuoſa. 12. V. teſtae ſulcis transverſis obtuſis, vulvae labiis angulo elevato diſtinctis.
Rumpf muſ. t. 43. *f.* A? O?
Gualt. teſt. t. 83. *f.* I.
Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 4. *f.* 10.

Chemn. Conch. 6. *t.* 31. *f.* 333. 334.

Habitat in Oceano americano *et* indico, *teſta pollicem longa, et* $1\frac{1}{4}$ *lata, albida rufo-punctata, aut radiata, aut cineraſcente maculis ſtriisque ſubfuſcis,* (*rarius nivea vulva anoque nigris, cardine caeruleo,*) *ſtriis transverſis vix crenatis vulvam verſus bifidis, vulva retuſa, rufa, oblique ſtriata: angulis lateralibus elevatis et gibbis, margine vix manifeſte crenulato.* Solander.

Erycina. 13. V. teſta transverſim parallele ſulcata: ſulcis obtuſiſſimis, vulva glabra, ano ovato.

Liſt. Conch. t. 268. *f.* 104.

Knorr Vergn. 4. *t.* 3. *f.* 5.

Chemn. Conch. 6. *t.* 32. *f.* 337-339.

Habitat in India, *Chionae affinis, teſta craſſa planiuſcula,* $2\frac{1}{4}$ *pollicis longa et* $2\frac{3}{4}$ *lata et majore, incarnata; radiis pluribus fuſcis et marginem verſus faſcia aurantia picta, ano aurantio, vulvae rima anguſta longa hiante, cardinis dentibus mediis* 4. J. Th. Fagraeus.

mercenaria. 14. V. teſta ſolida transverſe ſubſtriata laevi: margine crenulato, intus violacea, ano ovato. *Fn. ſuec* 2144. *Müll. zool. dan. prodr.* 2976.

Liſt. Conch. t. 271. *f.* 107.

Spengl. Schr. der berl. Naturf. 6. *p.* 307. *t.* 6. *f.* 1-3.

Chemn. Conch. 10. *t.* 171. *f.* 1659. 1660.

Habitat in Europae *et* Americae Oceano ſeptentrionali (*in* Sueciae *montibus foſſilis,*) *teſta ultra* 3 *pollices longa, et perinde fere lata, ovata, anterius anguſtata, ſub epidermide fuſca ſtraminea ſubtus et antrorſum radiis violaceis picta, ſtriis ſemicircularibus elevatis transverſis ſulcisque longitudinalibus ſubaſpera: ano cordato impreſſo longitudinaliter ſtriato, vulva glabra: Penſylvaniae incolis olim inſtar numi.*

islandica. 15. V. teſta transverſim ſtriata rudi, nymphis hiantibus, ano nullo. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 95. *t.* 28. *f.* 1-5. *prodr.* 2977. *var.* 1. *p.* 58. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 411. *n.* 412.

Brit. zool. 4. *p.* 80. *t.* 53. *f.* 47.

Liſt. Conch. t. 272. *f.* 108.

anim. angl. p. 173. *t.* 4. *f.* 22.

Petiv. muſ. n. 832.

Gualt. teſt. t. 58. *f.* B.

Coſta brit. Conch. p. 183. *t.* 14. *f.* 4.

Olafſ. isl. K. 1. §. 98. *t.* 11. *f.* 8. §. 239. 577. 901. *f.* 2.

Stroem.

Stroem. ſondm. I. *p.* 201. *n.* 9.
Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 4. *f.* 11.
Chemn. Conch. 6. *t.* 32. *f.* 341.
β) *Liſt. Conch. t.* 1057. *f.* 3.
γ) *Chemn. Conch. t.* 32. *f.* 342.
Adanſ. Seneg. t. 16. *f.* 7. Pitar.
Habitat in Oceano Europae ſeptentrionali, β) *in* mari caſpio, γ) *in* africano, *teſta* $3\frac{1}{2}$ *pollices longa, et* 4 *fere lata, craſſa epidermide tenui ſplendente transverſim ſtriata, junioribus flava, adultioribus fuſca obtecta, alba faſciis rubellis transverſis picta, intus tota alba: margine acuto itegerrimo, vulva longa anguſta clauſa: animal Islandis eſculentum piſciumqua eſca fulvum ſubquadratum: pallio pallido, apertura utraque tentaculis cincta.*

Chione. 16. V. teſta transverſe ſubrugoſa laevi, cardinis dente poſteriori lanceolato. *Muſ. Lud. Ulr.* 500. *n.* 58.*
Liſt. Conch. t. 269. *f.* 105.
Bonann. recr. 2. *f.* 64. 65.
muſ. Kirch. f. 63. 64.
Gualt. teſt. t. 86. *f.* A.
Argenv. Conch. t. 21. *f.* C.
Regenſ. Conch. I. *t.* 8. *f.* 17.
Knorr. Vergn. 6. *t.* 4. *f.* I.
Chemn. Conch. 6. *t.* 32. *f.* 343.
β) *Rumpf muſ. t.* 42. *f.* G.
Pet. aq. amb. t. 18. *f.* 20.
Chemn. Conch. 6. *t.* 32. *f.* 340.
γ) *Chemn. Conch.* 6. *t.* 33. *f.* 344.
Habitat in mari britannico, mediterraneo, atlantico, β) *ad* Sinae *et* Japoniae *littora*, γ) *in* India *teſta* $2\frac{1}{2}$ *pollices longa, et* $3\frac{1}{4}$ *lata ſubfuſca aut cervina radiis utplurimum obſcurioribus picta: margine integerrimo;* γ) *teſta glaberrima nivea: lineis angularibus obſcure rubellis.*

maculata. 17. V. teſta laevi: maculis exoletis ſparſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 500. *n.* 59.*
Adanſ. Seneg. I. *t.* 17. *f.* 15. Jouret.
Liſt. Conch. t. 270. *f.* 106.
Gualt. teſt. t. 86. *f.* J.
Argenv. Conch. t. 21. *f.* H.
Knorr. Vergn. 2. *t.* 28. *f.* 5. *et* 5. *t.* 20. *f.* 3.
Regenſ. Conch. I. *t.* 8. *f.* 16.
Chemn. Conch. 6. *t.* 33. *f.* 345.

Habitat

Habitat frequens in Oceano americano, *Chionae affinis, at teſta minore* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa,* $2\frac{1}{4}$ *lata, alba, ſubfuſca, aut ex fuſco viridi, maculis fuſcis aut ſpadiceis, interdum radiis 2 interruptis varia, cardinis dente poſteriori brevi, craſſo, obtuſo.*

Meretrix. 18. V. teſta glabra: vulva fuſca gibba; nymphis hiantibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 501. *n.* 60.*
Gualt. teſt. t. 76. *f.* C.
Argenv. Conch. t. 21. *f.* F.
Knorr Vergn. 6. *t.* 6. *f.* 3.
Schroet. Journ. 3. *t.* 2. *f.* 7.
Chemn. Conch. 6. *t.* 33. *f.* 347-352.
β) Venus paradoxa. *Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t.* 4. *f.* 12. 13.
Habitat rarior in Oceano indico, *praeſertim ad oſtia fluviorum, ſat ſpectabilis, teſta craſſa, convexa, glaberrima, nunc alba, nunc fuſca radiis nunc picta, nunc nullis intus alba: margine anteriore caeruleſcente, ano non diſtincto, margine teſtae integerrimo.*

laeta. 19. V. tumida glaberrima albo-radiata: labris ſubviolaceis.
Gualt. teſt. t. 88. *f.* V.
Knorr Vergn. 4. *t.* 24. *f.* 2. *et* 6. *t.* 10. *f.* 5.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 127. *t.* 8. *f.* 7.
Habitat in mari mediterraneo *et* indico, *teſta pene* $1\frac{1}{4}$ *pollicem longa,* $1\frac{1}{2}$ *lata, nitente, flavicante, radiis nunc albis, nunc caeruleſcentibus nunc ſubfuſcis, vulva oblonga infra acuminata, impreſſa, glabra, albo caeruleoque varia, ano ſubcordato impreſſo albo.*

caſtrenſis. 20. V. teſta triangulo-rotundata gibba glaberrima characteribus angularibus inſcripta. *Muſ. Lud. Ulr.* 501. *n.* 61.*
Liſt. Conch. t. 257. *f.* 92. 93. *t.* 258. *f.* 94. *t.* 259. *f.* 95. *t.* 262. *f.* 98. *t.* 287. *f.* 123. a.
Bonann. recr. 3. *f.* 376. 378.
muſ. Kirch. 2. *f.* 126. 311. 312.
Rumpf muſ. t. 42. *f.* K.
Valent. Abh. t. 15. *f.* 16.
Petiv. amb. aq. t. 5. *f.* 2.
Gualt. teſtac. t. 82. *f.* G. H.
Argenv. Conch. t. 21. *f.* M.
Leſſer teſtaceoth. f. 108. 109.
Knorr Vergn. 1. *t.* 21. *f.* 5. 2. *t.* 20. *f.* 2. 3. *t.* 4. *f.* 4. *et* 6. *t.* 6. *f.* 5. 6.

Regenſ.

Regenſ. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 3. 4. *t.* 4. *f.* 41.
Chemn. Conch. 6. *t.* 35. *f.* 367-381.
Habitat in Oceano indico *et* mari rubro, *teſta ad* 1½ *pollicem longa*, 1¾ *lata*, *ſtriis transverſis arcuatis ſubtiliſſimis exarata alba lineis fuſcis*, *ſpadiceis*, *luteis*, *triangula formantibus picta: margine integerrimo.*

Phryne. 21. V. teſta laevi anterius poſteriusque transverſe ſtriata; ano obcordato; venis violaceis.
Habitat in Oceano *magis* auſtrali.

Meroë. 22. V. teſta ovata compreſſa transverſe ſtriata: ſutura poſterius hiante. *Muſ. Lud. Ulr.* 502. *n.* 62.*
Liſt. Conch. t. 378. *f.* 221.
Arnenv. zoomorph. t. 12. *f.* B.
Knorr. Vergn. 6. *t.* 7. *f.* 2. 4. 6. 5. 6.
Chemn. Conch. 6. *t.* 43. *f.* 450-454.
Habitat in Oceano americano *et* indico, *teſta* 1½ *pollicem longa*, 2¼ *lata*, *aut alba lineis maculisque angularibus caeruleſcentibus*, *fuſcis vel roſeis aut violacea*, *aut faſciis alternis caeruleis et flammeis picta*, *intus alba*, *ſtriis transverſis exarata*, *natibus diſtantibus*, *vulva exciſa*, *margine denticulato.*

minuta. 23. V. teſta ſubovata transverſim ſtriata ſubpellucida, nymphis clauſis. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 412. *n.* 413.
Habitat frequens in ulvis foliaceis maris Islandiam alluentis, *islandicae affinis*, *teſta* 1-2 *lineas lata*, ¾-1½ *lineas longa tenera*, *fragili*, *oblonga exterius ex fuſco violacea: limbo albicante*, *intus alba*, *ſtriis longitudinalibus nullis.*

deflorata. 24. V. teſta ovali longitudinaliter rugoſa anterius violacea, nymphis atris.
Liſt. Conch. t. 425. *f.* 273.
Seb. muſ. 3. *t.* 86. *f.* 17?
Knorr Vergn. 2. *t.* 20. *f.* 5. *et* 5. *t.* 11. *f.* 2. *et t.* 21. *f.* 5.
Chemn. Conch. 6. *t.* 9. *f.* 79-82.
β) Tellina arenoſa. *Chemn. Conch.* 6. *t.* 9. *f.* 83.
Rumpf. muſ. t. 45. *f.* C.
Petiv. arab. aq. t. 17. *f.* 9.
Gualt. teſt. t. 85. *f.* G.
Habitat in mari atlantico *et* americano, β) *in* indico, *teſta ſolida ad* 2 *pollices longa*, *et* 3 *lata*, *magis longitudinalibus (in* β) *medio bifidis) ſtrias transverſas teneras decuſſan-*

cuſſantibus, inaequali, intus violacea (β. albida) exterius alba, cinerea, flavicante, rubella, vel caeruleſcente, aut radiis caeruleſcentibus rubellisve picta, cardinis dentibus in altera valva 2, in altera 1 fiſſo.

fimbriata. 25. V. teſta ovali gibba longitudinaliter ſtriata transverſe ſulcata: margine crenulato. *Muſ. Lud. Ulr.* 502. *n.* 63.*
Argenv. Conch. t. 21. *f.* G. Chama ſcobinata.
Liſt. Conch. t. 355. *t.* 172. *et t.* 1056. *f.* 1?
Rumpf muſ. t. 43. *f.* F.
Petiv. amb. aq. t. 18. *f.* 8.
Gualt. teſt. t. 75. *f.* C.
Klein oſtr. t. 10. *f.* 52.
v. Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 5. *f.* 4.
Chemn. Conch. 7. *p.* 3. *vign.* 8. *et t.* 43. *f.* 448. 449.
β) *Rumpf muſ. t.* 43. *f.* G. Tygers tong.
Petiv. amb. ab. t. 18. *f.* 10.
Habitat in Oceano indico, *teſta ſolida, 2 pollices longa 3 lata, alba (β. ſordide rubella margine nigricante, ſtriis longitudinalibus nullis) rima oblonga hiante, ano impreſſo, cardinis dentibus 2 mediis, et 2 lateralibus.*

reticulata. 26. V. teſtae ſtriis elevatis decuſſatis, ano cordato, margine integro. *Muſ. Lud. Ulr.* 503 *n.* 64.*
Liſt. Conch. t. 836. *f.* 173.
Gualt. teſt. t. 83. *f.* L.
Knorr Vergn. 6. *t.* 10. *f.* 3.
Chemn. Conch. 6. *t.* 36. *f.* 382-384.
β) *Gualt. teſt. t.* 88. *f.* A.
Habitat in India, *fimbriatae affinis, at teſta magis cordata, ut 2 pollices longa, 2½ lata ſit, minus gibba, alba ſubfuſco aut rubello nebuloſa, interdum radiata aut maculata, ſtriis tenerioribus, transverſis magis arcuatis, ano cordato gibbo, cardinis dentibus 3; β) nunc fuſco, nunc rubro maculata.*

ſquamoſa. 27. V. teſta reticulato-ſtriata retrorſum ſquamoſa.
Rumpf muſ. t. 44. *f.* M.
Petiv. amb. aq. t. 18. *f.* 17.
Gualt. teſt. t. 83. *f.* G.
Chemn. Conch. 6. *t.* 31. *f.* 335.
Habitat in India, *flexuoſae affinis, teſta flavicante aut ferruginea, vulva ſubglabra impreſſa oblongo-ovata venis lineisque caeruleis varia, ano fuſco, intus albo, margine crenato.*

Puerpera. 28. V. teſta ſubrotunda: ſtriis membranaceis decuſſatis, labiis flexuoſis. *Mant.* 2. *p.* 540.
Gualt. teſt. t. 76. *f.* G.
Argenv. Conch. t. 23. *f.* F.
Knorr Vergn. 6. *t.* 10. *f.* 1.
Chemn. Conch. 6. *t.* 36. *f.* 388. 389.
γ) *Liſter Conch. t.* 341. *f.* 178.
Habitat rara in India, *reticulatae affinis, at teſta magis rudi, ſolida, convexaque, ano plano vix impreſſo, exterius maculis, lineis, vibicibus fuſcis varia, antrorſum fuſca, intus caerulea.*

tripla. 29. V. teſta ſubtriangulari laevi, anterius et poſterius retuſa. *Mant.* 2. *p.* 545.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 108. *f.* 4. Tivel.
Liſt. Conch. t. 252. *f.* 86.
Gualt. teſt. t. 75. *f.* Q.
Chemn. Conch. 6. *t.* 31. *f.* 330-332.
β) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 6. *f.* 4.
Habitat in Africae *littore* occidentali, β) *in* mari mediterraneo, *teſta circiter pollicem longa,* $1\frac{1}{4}$ *lata, ſtriis transverſis tenerrimis exarata, rubella, ex fuſco lutea, alba, aut cinerea: radiis interdum* 2 *fuſcis,* β) *ex fuſco lutea, labiis caeruleſcentibus, ani ſtriis magis obſoletis, quam vulvae.*

plicata. 30. V. teſtae ſtriis transverſis membranaceis arcuatis, ano rubello cordato: labiis obliquis.
Argenv. Conch. t. 21. *f.* k.
Valent. Abh. t. 15. *f.* 21.
Chemn. Conch. 6. *t.* 28. *f.* 295-297.
Habitat rara et pretioſa in mari indico, β) *in* mediterraneo, *teſta dilute incarnata: umbone albido, vulva ſaturatius rubra, glabra, profunda; rima ampla, oblonga, biante.*

rugoſa. 31. V. teſtae gibbae ſtriis transverſis membranaceis arcuatis, ano cordato, margine crenulato. *Mant.* 2. *p.* 545.
Chemn. Conch. 6. *t.* 29. *f.* 303.
Habitat rarior in India, *teſta craſſa ultra* 2 *pollices longa et lata, ex cinereo alba, maculis oblongis ſpadiceis varia: vulva oblonga ſubimpreſſa, in ſiniſtra valva glabra fuſco alboque varia: rima oblonga ampla biante.*

32. V.

Caliſte. 32. V. teſtae ſtriis transverſis acutis antrorſum membranaceis, vulva breviore, ano inconſpicuo.
Schroet. Einl. in Conch. 3. p. 156. t. 8. f. 8 9.
Habitat in mari rubro, *guineenſi affinis, teſta anterius exterius caerulescente intus ſaturatius tincta, poſterius utplurimum ſordide alba.*

granulata. 33. V. teſta rotundata decuſſatim ſtriata anterius et margine crenulato violacea.
Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 4. f. 5. 6.
Chemn. Conch. 6. *t.* 30. *f.* 313.
Habitat in Oceano americano, *maricae affinis, at vulva glabra nunc livida nunc albo et caeruleſcente varia, teſta ipſa alba maculis lineisque angularibus lividis aut nigris varia, ano cordato impreſſo nigricante aut caeruleſcente.*

imbricata. 34. V. teſtae coſtis perpendicularibus imbricatis transverſim ſtriatis, margine crenato.
Liſt. Conch. t. 497. *f.* 52.
Chemn. Conch. 6. *t.* 30. *f.* 314. 315.
Habitat in Campania Gallorum *foſſilis, cardine venerem, reliquo habitu cardium referens.*

divaricata. 35. V. teſtae ſtriis transverſis teneris longitudinales marginem verſus divergentes decuſſantibus, ano ovato, margine crenato.
Liſt. Conch. t. 310. *f.* 146.
Chemn. Conch. 6. *t.* 30 *f.* 316.
Habitat - - - - teſta alba, lineis, venis maculisque fuſcis varia, vulva oblonga biante, venoſa, ex atro ſubfuſca, cardinis dentibus 4.

contraria. 36. V. teſta oblonga planiuſcula: ſtriis transverſis poſterius contrariis, margine crenato.
Chemn. Conch. 6. *t.* 30. *f.* 317-319.
Habitat ad Guineae *littora, cardio aeolico affinis, teſta verſicolore, vulvae anique margine interiori nigro maculato.*

Gallus. 37. V. teſta oblongo-ovata radiata: ſtriis transverſis confertis craſſis, vulva lata ovata, ano cordato.
Chemn. Conch. 6. *t.* 31. *f.* 324. 325.
Habitat ad Malabariae *littus, teſta* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa et ultra* 2 *lata, in junioribus cinerea, in adultioribus flavicante: radiis* 4 *obſcurioribus.*

flammea. 38. V. teſta transverſim ſtriata dorſo glabra: vulva latiſſima anoque cordato fuſco-lineatis.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 200. *t.* 8. *f.* 12.
β) Gallus radiatus. *Schroet. Einl. in Conch.* 3. *p.* 200. *n.* 146.
Habitat in mari rubro, *gallo affinis, at teſta umbonem caeruleſcentem verſus magis gibba alba vibicibus, lineis maculisque cinereis varia, in β) radiis* 3 *ſubfuſcis picta.*

Corbicula. 39. V. teſta triangulari laevi utrinque truncata flavicante-radiata, vulva anoque cordatis, margine integerrimo.
Knorr Vergn. 5. *t.* 15. *f.* 2. *et* 6. *t.* 10. *f.* 5.
Chemn. Conch. 6. *t.* 31. *f.* 326.
Habitat rara in mari atlantico *et* americano, *vulva ſubſpadicea rima ampla biante.*

hermaphrodita. 40. V. teſta triangulari glaberrima olivacea obſcure faſciata intus alba vel caeruleſcente, vulva cordata, ano ovato.
Martin. 1. *Manigf.* 1. *p.* 402. *t.* 1. *f.* 1. 2.
Chemn. Conch. 6. *t.* 31. *f.* 327-329.
Habitat rariſſima in Guineae *fluviis, teſta craſſa rudi, natibus convergentibus, cardinis dentibus crenatis.*

coaxans. 41. V. teſta viridi intus alba: ſtriis transverſis inaequalibus membranaceis, margine acuto.
Rumpf muſ. t. 42. *f.* H?
Chemn. Conch. 6. *t.* 32. *f.* 236.
Habitat in Zeylonae fluviis, *teſta* $2\frac{1}{2}$ *pollices longa et* 3 *lata: rima oblonga biante,* 2 *ex cardinis dentibus fiſſis.*

caſta. 42. V. teſta gibba nivea anterius convexa intusque ſubviolacea; vulva ſubrotunda, ano ovato violaceo-umbroſa, margine integerrimo.
Chemn. Conch. 6. *t.* 33. *f.* 346.
Habitat in India, *rima ampla, oblonga, biante, cardinis dente anteriori in utraque valva crenulato.*

affinis. 43. V. teſta tenui glabra convexa alba fuſco varia: ano elongato; labiis obliquis tumidis, cardinis dentibus quatuor.
Gualt. teſt. t 75. *f.* M.
Knorr Vergn. 4. *t.* 24. *f.* 2.
Chemn. Conch. t. 33. *f.* 353. 354.
Habitat in inſula S. Mauritii, *lactae affinis teſta radiis, maculis, lineis angularibus fuſcis picta, fragili, vulvae excavatae rima oblonga biante.*

44. V.

opima. 44. V. teſta craſſa convexa: vulva ovata, ano cordato-ovato, cardinis dentibus tantum tribus.
Chemn. Conch. 6. *t.* 34. *f.* 355-357.
Habitat in India, *teſta nunc pallida obſcurius radiata, nunc alba caeruleſcente maculata et nebuloſa, nunc griſea maculis nebulisque obſcurioribus varia.*

triradiata. 45. V. teſta convexa griſea: radiis tribus ex nigricante caeruleſcentibus, anoque elongato, labiis tumidis.
Chemn. Conch. 6. *t.* 34. *f.* 358.
Habitat ad Tranquebariae littus.

nebuloſa. 46. V. teſta ochroleuca cinereo et caeruleſcenti maculata: vulvae ovalis labiis anoque ovato caeruleſcentibus.
Chemn. Conch 6. *t.* 34. *f.* 359-361.
Habitat ad Tranquebariae littus, *teſta utplurimum* 4 *ex albo et cinereo variis picta.*

contemta. 47. V. teſta craſſa trigona aequilatera glabra: natibus convergentibus, cardinis dente primario crenulato.
Chemn. Conch. 6. *t.* 34. *f.* 362. 363.
Habitat ad Malabariae *littus, teſta minuta natibus nunc albis, nunc rubellis, nunc obſcurioribus, interdum littera ſanguinea M notatis.*

japonica. 48. V. teſta oblongo-ovata inaequilatera ad latera confertim transverſe ſtriata, ano oblongo-ovato.
Bonann. muſ. Kirch. 2. *f.* 134?
Chemn. Conch. 6. *t.* 34. *f.* 364.
Habitat - - - teſta fulveſcente aut lactea characteribus purpureis triangularibus et angulatis inſcripta: an hujus familiae?

ſtriata. 49. V. teſta ventricoſa anterius anguloſa: ſtriis transverſis craſſis laevibus ſubarcuatis, ano ovato.
Chemn. Conch. 6. *t.* 34. *f.* 365. 366.
Habitat rara ad inſulas Nicobaricas, *teſta ex cinereo alba intus ſub umbonibus flavicante, rima oblonga hiante, vulva glabra oblongo-ovali.*

crenata. 50. V. teſta trigona: ſtriis transverſis confertis elevatis; ſulcis intermediis et margine crenulatis, ano rugoſo fuſco cordato.
Bonann. recr. 2. *f.* 377.
muſ. Kirch. 2. *f.* 113.

 Chemn.

Chemn. Conch. 6. *t.* 36. *f.* 385.
β) Chemn. Conch. 6. *t.* 36. *f.* 386.
Habitat rara in India, *teſta ex cinereo alba, radiis, nubibus maculisque fuſcis varia, vulvae ovatae labiis plicatis.*

Textile. 51. V. teſta ovali glaberrima inaequilatera; vulva anoque oblongis; lineis dilute ſpadiceis aut caeruleſcentibus pictis, margine integerrimo.
Liſt. Conch. t. 400. *f.* 439.
Knorr Vergn. 2. *t.* 28. *f.* 4.
Chemn. Conch. 7. *t.* 42. *f.* 442. 443.
Habitat ad Malabariae *littus et in* mari rubro, *teſta ad* $1\frac{1}{4}$ *pollicem longa, et* $2\frac{1}{4}$ *lata flavicante aut dilutius incarnata venis caeruleſcentibus aut ſubfuſcis picta, vulvae labiis rotundatis.*

corrugata. 52. V. teſta ovata exalbida: ſtriis transverſis anterius craſſis validis, poſterius tenerrimis medio undulatis.
Chemn. Conch. 7. *t.* 42. *f.* 444.
Habitat in mari mediterraneo, *rima oblonga ampla hiante.*

monſtroſa. 53. V. teſta ovata albida decuſſatim ſtriata, cardinis in ſiniſtra valva dentibus modo duobus.
Chemn. Conch. 7. *t.* 42. *f.* 445. 446. a. b.
Habitat rariſſima ad inſulas Nicobaricas, *valva dextra ſiniſtram ſuperante tam ad cardinem, quam anterius poſteriusque prominentiis inaequali.*

pondero-ſa. 54. V. teſta ſolida inaequilatera anterius poſteriusque rugoſa cinerea: margine crenulato, cardinis dentibus duobus.
Chemn. Naturf. 19. *t.* 8. *f.* a-d. *et Conch.* 7. *t.* 69. *f.* A-D.
Habitat in Oceano auſtrali, *vulva oblongo-ovata, natibus verſus anum ovatum impreſſum verſis.*

ſubviridis. 55. V. teſta ſubviridi glabra ſolida: natibus prominentibus, margine integerrimo.
Liſt. Conch. t. 158. *f.* 13.
Habitat in - - - fluviis.

roſtrata. 56. V. teſta ovata: ſtriis perpendicularibus ſquamoſis transverſas decuſſantibus.
Liſt. Conch. t. 346. *f.* 183.
Klein oſtrac. t. 10. *f.* 51.
β) Liſt. Conch. t. 348. *f.* 186.
Habitat - - - teſta β) fuſco-maculata.

57. V.

fuſca. 57. V. teſta fuſca: ſtriis ſubtiliſſimis perpendicularibus.
Liſt. Conch. t. 423. *f.* 271.
Habitat - - - teſta 1¾ *pollicis longa, et* 2¼ *lata, an diſtincta hujus generis ſpecies?*

luſitanica. 58. V. teſta oblonga transverſim ſubtiliter ſtriata, margine crenato.
Bonann. recr. 2. *f.* 45.
muſ. Kirch. 2. *f.* 44.
Habitat in mari luſitanico.

punctulata. 59. V. teſta ovata alba, lineis badiis punctisque ſubflavis varia.
Bonann. recr. 2. *f.* 46.
muſ. Kirch. 2. *f.* 45.
Habitat in mari Drepanitano.

faſciata. 60. V. teſta tereti laevi radiis badiis et ſubflavis picta altera parte cyanea altera livida.
Bonann. recr. 2. *f.* 66.
muſ. Kirch. 2. *f.* 65.
Habitat - - - -

carnea. 61. V. teſta ovali inaequilatera ſubrugoſa carnea: radiis tribus.
Bonann. recr. 3. *f.* 382.
muſ. Kirch. 2. *f.* 115.
Habitat - - - teſta 1½ *pollicem longa,* 2½ *lata centrum verſus in roſae vel purpurae colorem vergente.*

virgata. 62. V. teſta intus violacea, extus chalybea: radiis luteis.
Rumpf muſ. t. 42. *f.* 1.
Petiv. aq. amb. t. 18. *f.* 16.
Habitat in Oceano indico, *coaxanti affinis at teſta tenuiori.*

verſicolor. 63. V. teſta ovali oblique ſtriata albida: radiis albis, fulvidis caeruleſcentibus rubriſque.
Gualt. teſt. t. 86. *f.* B. C.
Habitat - - - teſta inaequilatera profunde ſulcata.

variegata. 64. V. teſta ovata inaequilatera ſubtiliſſime ſtriata caeruleſcenti-punctata; radiis ſubfuſcis et nigricantibus.
Gualt. teſt. t. 89. *f.* H.
Habitat - - - teſtis lineis nonnullis transverſis albis inſignita.

amethyſtina. 65. V. teſta ovata violacea perpendiculariter ſtriata.
Argenv. Conch. t. 21. *f.* D.

Habitat - - - teſta ultra 1¾ *pollicis longa et* 2¼ *lata, an hujus generis?*

calipyga. 66. V. teſta poſterius ovata transverſe inaequaliter ſtriata lineis angularibus picta.
Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 5. *f.* 1.
β) *Bonann. recr.* 2. *f.* 62.
muſ. Kirch. 2. *f.* 61.
Habitat ad Ulyſſiponenſe *littus, teſta flavicante, lineis fuſcis picta: umbone niveo.*

Senegalenſis. 67. V. teſta ovata ſubtiliſſime decuſſatim ſtriata alba aut carnea fuſco varia.
Adanſ. Seneg. t. 17. *f.* 11. Lunot.
Habitat in Senegalia, *minuta, teſta ſeſquipollicem lata et duplo breviori.*

Matadoa. 68. V. teſta triangulari alba aut flava: ſulcis transverſis parallelis circiter quadraginta.
Adanſ. ſeneg. t. 18. *f.* 5. Matadon.
Habitat rariſſima in Senegalia, *triplae affinis, teſta ſeſquipollicem longa.*

ſuccincta. 86. V. teſta cordata ſulcis transverſis remotis excavatis: margine crenulato. *Mant.* 2. *p.* 546.
Habitat - - - teſta magnitudine extimi digiti, ſulcis 14 *ano ovato impreſſo, vulvae rima exciſa.*

compreſſa. 87. V. teſta ſubcordata compreſſiſſima transverſe ſulcata. *Mant.* 2. *p.* 546.
Habitat - - - teſtae margine integerrimo, vulva anoque linearibus ſubexciſis.

auſtralis. 88. V. teſta cordata nitida alba, characteribus fuſceſcentibus notata: margine integro. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 355. *t.* 171. *f.* 1662.
β) *Mart. univ. Conchol. t.* 40?
Habitat in Oceano auſtrali.

gigantea. 89. V. teſta ovata livida: radiis numeroſiſſimis interruptis caeruleſcentibus, ano impreſſo ovato. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 354. *t.* 171. *f.* 1661.
Favann. Conch. t. 49 *f.* 91.
Habitat ad Zeylonae, Floridae *littora.*

†† *orbi-*

†† *orbiculatae.*

tigerina. 69. V. teſta lentiformi: ſtriis crenatis decuſſatis, ano impreſſo ovato. *Muſ. Lud. Ulr.* 503. *n.* 65.*
Adanſ. ſeneg. t. 16. *f.* 3. Codock.
Liſt. Conch. t. 337. *f.* 174.
Bonann. recr. 2. *f.* 69.
muſ. Kirch. 2. *f.* 70.
Rumpf muſ. t. 43. *f.* H.
Petiv. amb. aq. t. 18. *f.* 9.
Gualt. teſt. t. 77. *f.* A.
Argenv. Conch. t. 21. *f.* E.
Bytem. app. t. 11. *f.* 44.
Knorr Vergn. 4. *t.* 2. *f.* 1. *et t.* 3. *f.* 2. *et* 6. *t.* 37. *f.* 2.
Chemn. Conch. 6. *t.* 37. *f.* 390. 391.
β) *Knorr Vergn.* 4. *t.* 3. *f.* 2?
γ) Venus orbicularis. *Syſt. nat.* X. 1. *p.* 688. *n.* 118.
Habitat in Oceano americano *et* indico, *ſatis magna, teſta interdum tota alba, interdum anterius et poſterius rubella intusque rubra: umbone flavo; ſtriis perpendicularibus evidentioribus, margine intus glabro exterius crenato, vulva lineari, ano anguſto, cardinis dentibus mediis* 2.

proſtrata. 70. V. teſta orbiculata transverſe ſtriata, labiis ſcabro-membranaceis. *Muſ. Lud. Ulr.* 504. *n.* 66.*
Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 5. *f.* 6.
Chemn. Conch. 6. *t.* 29. *f.* 298.
Habitat ad littus Coromandel, *teſta complanata nigra, cinerea aut ſubfuſca,* 2 *pollices longa, et paulo minus lata, natibus reflexis, vulva ſubpubente, rima oblonga patula, ano cordato.*

penſylvanica. 71. V. teſta lentiformi glabro-rugoſa alba: anterius utrinque ſulco longitudinali. *Muſ. Lud. Ulr.* 504. *n.* 67.*
Liſt. Conch. t. 305. *f.* 138.
Argenv. Conch. t. 21. *f.* N.
Knorr Vergn. 4. *t.* 14. *f.* 4.
Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 5. *f.* 8.
Schroet. Journ. 31. *t.* 2. *f.* 8.
Chemn. Conch. 7. *t.* 37. *f.* 394-396.
β) Venus ſulco longitudinali utrinque altero ad anum. *Liſt. Conch. t.* 265. *f.* 101? *t.* 298. *f.* 135.
Chemn. Conch. 7. *t.* 39. *f.* 408. 409.
γ) Venus fragilis. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 313. *n.* 314?

Habitat in Oceano americano, *teſta ad* 2 *pollices longa, alba, ſolida, rima lineari, ano exili rugoſo cordato, margine integerrimo.*

ſpuria. 72. V. teſta alba ſubglabra: ſulco anterius longitudinali cardinisque dentibus lateralibus nullis.
Liſt. Conch. t. 296. *f.* 133.
Chemn. Conch. 7. *t.* 38. *f.* 399.
Habitat in mari Islandiam inſulamque Ferroe *alluente, penſylvanicae affinis, at rima ampliori, rimaque oblonga.*

incruſtata. 73. V. teſta lentiformi glaberrima laeviſſima punctis excavata.
Muſ. Lud. Ulr. 505. *n.* 68.*
Habitat in Oceano indico, *teſta intus cruſta craſſa albida obducta, an forſan eadem cum tigerina, forſan aetate et arte deformata?*

punctata. 74. V. teſta lentiformi longitudinaliter ſulcata intus punctata.
Muſ. Lud. Ulr. 505. *n.* 69.*
Rumpf muſ. t. 43. *f.* D.
Petiv. amb. aq. t. 18. *f.* 6.
Gualt. teſt. t. 75. *f.* D.
Chemn. Conch. 7. *t.* 37. *f.* 397. 398.
Habitat rara in India, *teſta ſolida-antiquata ultra* 2 *pollices longa, et* $2\frac{1}{4}$ *lata alba hinc inde rubello miſta, intus cruſta craſſa ochroleuca interdum laevi obducta, ceterum rubra, margine integerrimo.*

exoleta. 75. V. teſta lentiformi transverſim ſtriata pallida obſolete radiata, ano cordato. *Fn. ſuec.* 2145. *Muſ. Lud. Ulr.* 506. *n.* 70.* *Müll. zool. dan. prodr.* 2978.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 16. *f.* 4. Cotan.
Liſt. Conch. t. 292. *f.* 128. *et t.* 297. *f.* 134.
Gualt. teſt. t. 75. *f.* F.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 5. *f.* 9.
Chemn. Conch. 7. *t.* 38. *f.* 402. 404.
β) Venus Lupinus. *Syſt. nat.* X. 1. *p.* 689. *n.* 123.
γ) Venus teſta aequilatera. *Chemn. Conch.* 7. *t.* 38. *f.* 406.
Liſt. Conch. t. 293. *f.* 129.

Habitat

An diſtinctae ſpecies, et ſi, cui familiae adſcribendae Venus teſta ovata laevi tenera a Müllero *zool. dan. prodr.* 2979. *et* Venus teſta ovata minus convexa craſſa, *n.* 2980. *notatae?* a Liſtero *Conch. t.* 274. *f.* 110. *depicta?* a Bytemeiſter *app. t.* 11. *f.* 39. e. *delineata?*

Habitat in Norwegiae Angliaeque *littore*, γ) *teſta magis aequilatera flavicante aut ex cinereo alba ad* inſulas Antillas, *proſtratae affinis, at teſta magis convexa labiis non ſcabris diſtincta, 2 fere pollices longa et perinde lata, intus cruſta craſſa albida obducta, ano ferrugineo.*

tumidula. 90. V. teſta gibba: ſulcis transverſis remotis obſoletiuſculis. *Mant.* 2. *p.* 546.

Habitat - - - teſtae margine integerrimo, vulvae rima ſimplici, ano impreſſo rhombeo-excavato.

ſinenſis. 91. V. teſta longitudinaliter ſtriata: arcubus transverſis albis violaceisque, margine intus crenato.
Chemn. Conch. 10. *p.* 356. *t.* 171. *f.* 1663.
Habitat in mari Sinam *alluente.*

ſinuata. 76. V. teſta lentiformi transverſim ſtriata alba: rima oblonga attepla hiante, cardinis dentibus quatuor.
Liſt. Conch. t. 294. *f.* 130.
Chemn. Conch. 7. *t.* 38. *f.* 400. 401.
β) *Liſt. Conch. t.* 290. *f.* 126.
γ) *Liſt. Conch. t.* 289. *f.* 125.
Gualt. teſt. t. 75. *f.* N?
Chemn. Conch. 7. *t.* 38. *f.* 3.
Habitat rarior ad inſulas Nicobaricas, *exoletae affinis, at teſta minus orbiculari, magis convexa, ſtriis magis elevatis diſtincta.*

borealis. 77. V. teſta lentiformi: ſtriis transverſis membranaceis erectis remotiſſimis.
Liſt. an. angl. p. 174. *t.* 4. *f.* 123.
Gualt teſt. t. 75. *f.* 5.
Chemn. Conch. 7. *t.* 39. *f.* 412-414.
Habitat in Oceano europaeo ſeptentrionali, *teſta* 1½ *pollicem longa, et paulo latiori ſub epidermide ſpadicea alba, angulata, ad rimam longam et anguſtam recta et quaſi truncata, ſtriis inaequalibus, et ſi cum exoleta compares, remotioribus, ano oblongo-ovato cardinis dente in altera valva* 1. *in altera* 2.

pectinata. 78. V. teſta ſublentiformi: ſulcis longitudinalibus rugoſis, pube antrorſum ramoſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 507. *n.* 72.*
Liſt. Conch. t. 312. *f.* 148. *t.* 313. *f.* 149.
Rumpf muſ. t. 42 *f.* D.
Petiv. amb. aq. t. 18. *f.* 14.

Gualt.

Gualt. teſt. t. 72. *f.* E. F. *et t.* 75. *f.* A.
Argenv. Conch. t. 21. *f.* P.
Knorr Vergn. 6. *t.* 3. *f.* 3.
Chemn. Conch. 7. *t.* 39. *f.* 415-419.
Habitat in Oceano indico *et* americano, *teſta ultra*, $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa et* 2 *fere lata nunc magis nunc minus convexa, nunc alba: ano maculisque quibusdam anterioribus fuſcis, nunc per totam ſuperficiem fuſco maculata, nunc anterius maculis vibicibusque ex atro fuſcis notata: ano cordato, margine inaequaliter crenato.*

ſcripta. 79. V. teſta lentiformi compreſſa ſtriata: poſterius angulo recto angulata. *Muſ. Lud. Ulr.* 507. *n.* 73.*
Rumpf muſ. t 43. *f.* C. Chama literata rotunda.
Argenv. Conch. t. 24. *f.* M. Chama optica.
Pet. amb. aq. t. 18. *f.* 3.
Gualt. teſt. t. 77. *f.* C.
Knorr Vergn. 5. *t.* 15. *f.* 3.
Chemn. Conch. 7. *t.* 40. *f.* 420-426.
β) *v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t.* 5. *f.* 7.
Chemn. Conch. 7. *t.* 39. *f.* 410. 411.
Habitat rariſſima in Oceano indico, β) *in* mari rubro, *teſta utrinque truncata, poſterius quidem magis, intus alba: macula fuſca, extrinſecus varia: margine integerrimo, vulva anoque ſpadiceo-maculatis.*

edentula. 80. V. teſta ſubgloboſo-lenticulari rugoſa edentula: ano ovato. *Muſ. Lud. Ulr.* 508. *n.* 74.*
Liſt. Conch. t. 260. *f.* 96.
Gualt. teſt. t. 88. *f.* B.
Chemn. Conch. 7. *t.* 40. *f.* 427-429.
Habitat in Oceano americano, *teſta diaphana exalbida, recenti rubella, intus praeter marginem utrinque integerrimum aurea; ano ovato-acuto, valde excavato, rima anguſta, naribus anum verſus verſis.*

cincta. 81. V. teſta valde convexa annulis cincta: ſulcis intermediis crenatis ano cordato, margine crenulato.
Chemn. Conch. 6. *t.* 36. *f.* 387.
Habitat - - - teſta minuta alba maculis et nebulis ferrugineis varia, intus ſub umbone maculis aliquot purpureis.

concentrica. 82. V. teſta alba ſuborbiculari compreſſa: ſtriis concentricis, margine integerrimo, ano cordato.

Adanſ.

Adanſ. Seneg. 1. *t.* 16. *f.* 5. Doſin.
Liſt. Conch. t. 261. *f.* 91. *t.* 288. *f.* 124. *et t.* 291. *f.* 127.
Gualt. teſt. t. 76. *f.* F.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 5. *f.* 5.
Chemn. Conch. 7. *t.* 37. *f.* 392. 393.
Habitat in mari atlantico, americano, *teſta ſatis magna: rima hiante, cardinis dentibus* 4 *obliquis approximatis.*

juvenilis. 84. V. teſta lentiformi: ſtriis transverſis confertis circularibus anterius et poſterius in rugas terminatis, ano cordato, margine integerrimo.
Chemn. Conch. 7. *t.* 38. *f.* 405.
Habitat in India *teſta alba: maculis ſpadiceis, faſciis radiisque albis variis, rima oblonga, ampla, hiante, ſinuata.*

Hiſtrio. 85. V. teſta lentiformi: ſtriis transverſis acutis arcuatis, margine integro, ano cordato, ferrugineo.
Chemn. Conch. 7. *t.* 38. *f.* 407.
Habitat rarior in India, *teſta maculis radiisque ſpadiceis varia, vulva elongata, lata, ſinuata, maculis albis ſpadiceisque varia.*

globoſa. 86. V. teſta globoſo hyalina: ſtriis transverſis ſubtiliſſimis, margine integerrimo, cardinis dentibus duobus.
Chemn. Conch. 7. *t.* 40. *f.* 430. 431.
Habitat rariſſima in mari rubro, *teſta ultra pollicem longa, et pene* $1\frac{1}{4}$ *lata, ano vulvaque vix impreſſis.*

Pectunculus. 87. V. teſta orbiculari aequilatera transverſim rugoſa rufo variegata.
Liſt. Conch. t. 254. *f.* 89. *t.* 255. *f.* 90. *et t.* 256. *f.* 91.
Habitat in Japonia.

albida. 88. V. teſta orbiculari ſubcompreſſa aequilatera alba: ſtriis transverſis ſubtilibus.
Liſt. Conch. t. 273. *f.* 109.
β) *Liſt. Conch. t.* 274. *f.* 110.
Habitat in Jamaica.

campechienſis. 89. V. teſta orbiculari inaequilatera: ſtriis transverſis confertis acutis.

Liſt.

An huic generi inſerendae teſtae, a Chemnizio *Conch.* 10. *t.* 172. *f.* 1670. 1671. *depictae?*

Liſt. Conch. t. 283. *f.* 121.
Habitat in ſinu Campechienſi, *teſta* $2\frac{1}{4}$ *pollices longa.*

craſſa. 90. V. teſta orbiculari ſolida compreſſa: ſtriis transverſis ſubtilibus, radiis rubris.
Liſt. Conch. t. 299. *f.* 136.
Habitat - - -

purpuraſcens. 91. V. teſta orbiculari ſubtiliter transverſim ſtriata purpuraſcente radiata.
Liſt. Conch. t. 303. *f.* 144.
β) *Liſt. Conch. t.* 304. *f.* 145.
Klein. oſtr. t. 11. *f.* 57.
Habitat - - -

rubra. 92. V. teſta orbiculari inaequilatera ſpadicea obſcurius radiata: ſtriis transverſis confertis craſſis.
Liſt. Conch. t. 306. *f.* 139.
Habitat in Jamaica.

puſilla. 93. V. teſta orbiculari aequilatera albida perpendiculariter ſtriata.
Liſt Conch. t. 311. *f.* 147.
Habitat - - - *an forſan cardii ſpecies?*

violacea. 94. V. teſta intus violacea: ſtriis perpendicularibus ſquamoſis, margine denticulato.
Liſt. Conch. t. 338. *f.* 175.
Habitat - - - *teſta mediae magnitudinis, longiore quam lata.*

ſpadicea. 95. V. teſta ſpadicea: ſtriis perpendicularibus verſus marginem ſquamoſis.
Liſt. Conch. t. 340. *f.* 177.
Habitat - - - *teſta* 2 *pollices longa, et pene* $2\frac{1}{2}$ *lata.*

cancellata. 96. V. teſta ſubrufa cancellata.
Liſt. Conch. t. 344. *f.* 181.
Habitat - - - *exilis.*

bengalenſis. 97. V. teſta orbiculari ſubaequilatera: ſtriis craſſis perpendicularibus, natibus anum verſus verſis.
Liſt. Conch. t. 345. *f.* 182.
Habitat in Bengala, *ſatis magna.*

aurea. 98. V. teſta ſuborbiculari aurea inaequilatera ſuborbiculari: ſtriis transverſis ſubtilibus confertis.

Liſt.

Liſt. Conch. t. 404. f. 249.
Habitat - - -

obſcura. 99. V. teſta fuſca: ſtriis perpendicularibus tenuiſſimis.
Liſt. Conch. t. 423. f. 271.
Habitat - - - *teſta* 1¾ *pollicis longa*, 2¼ *lata.*

purpurata. 100. V. teſta orbiculari ſubaequilatera perpendiculariter rugoſa: radiis purpureis.
Liſt. Conch. t. 424. f. 272.
Habitat - - - *teſta* 1½ *pollicem fere longa, et* 1¾ *lata.*

Nux. 101. V. teſta lentiformi teſtacea rugoſa, ano cordato.
Bonann. recr. 2. f. 39.
muſ. Kirch. 2. f. 38.
Habitat in mari Jonico.

rugata. 102. V. teſta orbiculari teſtacea ſubaequilatera: rugis transverſis diſtantibus.
Bonann. recr. 2. f. 54.
muſ. Kirch. 2. f. 52.
Habitat - - -

gibbula. 103. V. teſta lentiformi transverſim ſtriata, antrorſum truncata.
Bonann. recr. 2. f. 55.
muſ. Kirch. 2. f. 53.
Habitat - - -

ſtellata. 104. V. teſta orbiculari laevi aurea: ſtella ad umbonem candida.
Bonann. recr. 2. f. 62.
Habitat in Ulyſſiponenſi *littore.*

italica. 105. V. teſta orbiculari lutea: ſtriis transverſis elevatis diſtantibus.
Bonann. recr. 2. f. 76.
muſ. Kirch. 2 f. 75.
Habitat in mari mediterraneo, Italiam *alluente.*

braſiliana. 106. V. teſta lentiformi fuſco lutea: ſtriis transverſis tenerioribus diſtantibus, ano cordato vulvaque latis caeruleſcentibus.
Bonann. recr. 3. f. 345.
muſ. Kirch. 2. f. 102.
β) *Bonann. recr. 3. f. 380.*
muſ. Kirch. 2. f. 114.
Habitat frequens in Braſiliae *littore, natibus anum verſus inflexis.*

107. V.

pellucida. 107. V. teſta orbiculari pellucida laevi: vulva dilute aurea ſpadiceo maculata, ano cordato viridi rubroque venoſo.
Bonann. recr. 3. *f.* 397.
muſ. Kirch. 2. *f.* 118.
Habitat in Braſiliae *oris.*

holoſericea. 108. V. teſta orbiculari ſolida candida: ſtriis extrinſecus undulatis aureis, faſciaque verſus marginem lata flava lineis transverſis fuſcis varia.
Bonann. recr. 3. *f.* 398.
muſ. Kirch. 2. *f.* 119.
Habitat - - - pellucida major, pictura opus holoſericeum puncto franceſe Italis dictum ſimulans.

macaſſarica. 109. V. teſta orbiculari ventricoſa craſſa ſubfuſca albo radiata: ſtriis annularibus.
Leers catal. p. 129. *n.* 1240. Eykenhouts doublet.
Rumpf muſ. t. 43. *f.* K.
Petiv. amb. aq. t. 18. *f.* 13.
Habitat in Macaſſar.

aurantia. 110. V. teſta ſuborbiculari aurantia.
Valent. Abh. t. 15. *f.* 20.
Habitat - - - teſta 2 fere pollices longa, et 2¼ lata; an hujus familiae?

fulva. 111. V. teſta lentiformi fulva: ſtriis circularibus ſubtiliſſimis.
Gualt. teſt. t. 75. *f.* E.
Habitat - - -

albicans. 112. V. teſta orbiculari transverſim ſtriata albida lineis angularibus characteribus maculisque fuſcis varia.
Gualt. teſt. t. 75. *f.* G.
Habitat - - - caſtrenſi affinis.

candida. 113. V. teſta orbiculari alba reticulatim ſtriata.
Gualt. teſt. t. 75. *f.* L.
Habitat - - -

undulata. 114. V. teſta ſuborbiculari transverſim ſtriata exalbida lineis undulatis punctisque rubellis varia.
Gualt. teſt. t. 75. *f.* O.
β) *Gualt. teſt. t.* 75. *f.* P.
γ) *Gualt. teſt. t.* 75. *f.* R.
δ) *Gualt. teſt. t.* 76. *f.* A.
Habitat - - -

lineata. 115. V. teſta orbiculata aequilatera alba: ſtriis transverſis ſubtilibus, marginem verſus craſſioribus.
Gualt. teſt. t. 77. f. B.
Habitat - - -

laevis. 116. V. teſta laevi ſubaequilatera albida.
Gronov. zooph. 3. p. 260. n. 1090.
Gualt. teſt. t. 77. f. F.
β) *Gualt. teſt. t. 77. f. G.*
Habitat - - - *an diſtincta ſpecies?*

cornea. 117. V. teſta orbiculari laevi inaequilatera livido-cornea: linea transverſa alba.
Gualt. teſt. t. 82. f. B.
Habitat - - -

guttata. 118. V. teſta orbiculata fulvida ad marginem albo guttata.
Gualt. teſt. t. 82. f. F.
Habitat - - -

rufeſcens. 119. V. teſta inaequilatera rufeſcente laevi: lineis nonnullis transverſis.
Gualt. teſt. t. 85. f. D.
Habitat - - -

virens. 120. V. teſta lentiformi cancellatim ſtriata radiata margine crenulata virente obſcurius maculata.
Argenv. zoomorph. t. 5. f. B. Palourde.
Habitat - - -

maculoſa. 121. V. teſta alba maculato-radiata arcuatim ſtriata: macula media griſea magna ſurſum attenuata.
Argenv. zoomorph. t. 12. f. G.
Habitat - - -

coſtata. 122. V. teſta tota incarnata: coſtis longitudinalibus rugas transverſas remotiores decuſſantibus.
Knorr Vergn. 4. t. 3. f. 3.
Habitat - - - *teſta* 1¼ *pollicem longa,* 1½ *lata.*

Wauaria. 123. V. teſta tenui convexiuſcula ſubtiliter transverſim ſtriata intus nivea, extrinſecus littera W punctis multis adſperſis inſignita, natibus inflexis.
Regenſ. Conch. 1. t. 7. f. 12.
Habitat - - - *ſcriptae affinis.*

tumens. 124. V. teſta tumida ſolida nivea laevi, marginem verſus rugis aliquot transverſis exarata.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 16. *f.* 7. Pitas.
Habitat ad Africae *littus* occidentale, *teſta epidermide ſordide alba veſtita,* 1¾ *pollicis longa, ultra* 2 *lata, cardinis dentibus* 4 *in utraque valva.*

diaphana. 125. V. teſta tenui orbiculari pellucida laeviſſima nivea: cardinis in utraque valva dentibus duobus.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 16. *f.* 8. Felan.
Habitat in Africae *littore* occidentali, *diametri ſeſquipollicaris.*

dura. 126. V. teſta ſuborbiculari compreſſa dura transverſim ſulcata rubella fuſco radiata intus violacea.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 17. *f.* 12. Pégon.
Habitat ad Africae *littus* occidentale, *teſta* 2 *fere pollices longa nitente.*

nivea. 127. V. teſta alba pellucida ſubhiante: ſulcis viginti diſtantibus marginem verſus in rugas abeuntibus.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 17. *f.* 17. Fatan.
Habitat ad Africae *littus* occidentale, *teſta* 6 *fere pollices lata,* 4½ *longa, an hujus generis?*

eburnea. 128. V. teſta orbiculari compreſſa nivea: ſulcis longitudinalibus rotundatis ſtrias transverſas decuſſantibus.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 18. *f.* 3. Jajon.
Habitat ad Africae *littus* occidentale, *teſtae diametro* 9 *linearum, ſulcis circiter* 26-30, *cardinis dentibus breviſſimis.*

lucida. 129. V. teſta lucida dilute fulva intus et extrinſecus ſulcis longitudinalibus ſubtiliſſimis exarata.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 18. *f.* 4. Movin.
Habitat ad Africae *littus* occidentale, *teſta* 16 *circiter lineas longa vix anguſtiore.*

diſcors. 130. V. teſta orbiculari convexiuſcula ſtriis longitudinalibus: mediis perpendicularibus; exterioribus obliquis divergentibus transverſas decuſſantibus: ſulcis intermediis et margine interno crenatis.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 199. *t.* 8. *f.* 11.
Habitat - - - *teſta inaequilatera albida aut ochroleuca, ſtriis non raro undulatis, aut radiis, interdum maculis nebuliſque nonnullis fuſcis varia, intus alba, ano cordato oblon-*

oblongo; vulva anguſta oblonga fuſca: labiis cancellatis albis nigro lineatis.

aculeata. 131. V. teſta orbiculari ſubaequilatera: coſtis acutis elevatis tuberculatis, margine denticulato crenato, cardinis dentibus mediis duobus.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 200. *t.* 8. *f.* 13.
Habitat - - - teſta rarius unicolore rubra perſici florum aemula, frequentius alba fuſco ſtriata, vulva minuta, ſulcis profundis.

††† *ovales, ſupra rimam* ſubangulatae.

litterata. 132. V. teſta ovata anterius ſubangulata: ſtriis transverſis ſubundulatis. *Fn. ſuec.* 2146. *Muſ. Lud. Ulr.* 508. *n.* 75.*
Argenv. Conch. t. 21. *f.* A. Chama litterata.
Rumpf muſ. t. 43. *f.* B. Chama literata oblonga.
Liſt. Conch. t. 402. *f.* 246.
Bonann. recr. 2. *f.* 67.
muſ. Kirch. 2. *f.* 66. 120.
Petiv. amb. aq. t. 18. *f.* 2.
Valent. Abh. t. 13. *f.* 6. *t.* 14. *f.* 13.
Gualt. teſt. t. 86. *f.* E? F.
Knorr Vergn. 1. *t.* 6. *f.* 4.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 4. *f.* 39.
Chemn. Conch. 7. *t.* 41. *f.* 432-434.
β) Venus litterata nebuloſa. *Chemn. Conch.* 7. *t.* 41. *f.* 435.
Valent. Abh. t. 14. *f.* 10. 11. 12. 14.
Knorr Vergn. 6. *t.* 14. *f.* 1.
γ) Venus litterata punctata. *Chemn. Conch.* 7. *t.* 41. *f.* 436. 437.
Valent. Abh. t. 15. *f.* 19.
δ) Venus litterata conſperſa. *Chemn. Conch.* 7. *t.* 42. *f.* 438.
ε) Venus litterata radiata *Chemn. Conch.* 7. *t.* 42. *f.* 439.
ζ) Venus litterata maculoſa. *Martin. allg. Naturg.* 1. *p.* 267. *t.* 12. *f.* 4.
η) *Valent. Abh. t.* 14. *f.* 7-9. *et t.* 15. *f.* 17. 18.
ϑ) *Regenſ. Conch.* 1. *t.* 4. *f.* 40?
Habitat rarior in India, *teſta ad* 2 *pollices longa,* 3 *lata, characteribus lineisque fuſcis picta, vulva longa anguſta profunda: rima longiuſcula lata, natibus minutis.*

geographica. 133. V. teſta inaequilatera tenui ſubtiliter decuſſatim ſtriata, alba, rufo reticulata.
Gualt. teſt. t. 86. *f.* H.
Chemn. Conch. 7. *t.* 42. *f.* 440.
Habitat in mari mediterraneo.

rotundata. 134. V. teſta ovata anterius ſubangulata: ſtriis transverſis, cardinis dente intermedio bifido. *Muſ. Lud. Ulr.* 509. *n.* 76.*
Argenv. zoom. t. 12. *f.* D.
Olear. gotl. t. 29. *f.* 2.
Knorr Vergn. 2. *t.* 18. *f.* 4.
Chemn. Conch. 7. *t.* 42. *f.* 441.
Habitat rarior in Oceano indico, *teſta ad* 1½ *pollicem longa, et* 3 *lata, ſubfuſca aut maculoſa flava radiis ex maculis fuſcis luteisque compoſitis picta, ano ex ovato lanceolato.*

decuſſata. 135. V. teſta ovata anterius angulata decuſſatim ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 509. *n.* 77.*
Gualt. teſt. t. 85. *f.* E. I. L.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 5. *f.* 2. 3.
Chemn. Conch. 7. *t.* 43. *f.* 455. 456.
Habitat frequens in mari mediterraneo, *teſta ad* 1½ *pollices longa et* 2 *lata, ſolida, convexa, colore varia, radiata, maculata, aut virgata, intus alba flavo miſta, ano minimo retuſo, vulva longa anguſta margine interno utplurimum caerulea; cardinis dentium intermedio rarius* 2 *fiſſis.*

virginea. 136. V. teſta ſubovata anterius ſubangulata: ſtriis transverſis inaequilineatis, vulva tumida.
Chemn. Conch. 7. *t.* 42. *f.* 447. *t.* 43. *f.* 457. 458. *et* a. b. c.
Habitat frequens in mari adriatico *aliisque, decuſſatae ſimilis, at teſta minore, ſtriis perpendicularibus nullis diſtincta, rubella, interdum radiata, maculis cinereis, aut lineis angularibus fuſcis varia, intus alba aut flavicante, ad latera interdum aut marginem caerulea, nunc magis nunc minus ovata, ſtriis transverſis nunc magis nunc minus conſpicuis: Incola edulis.*

virginica. 137. V. teſta ovata transverſim rugoſa: cardinis dentibus duobus.
Liſt. Conch. t. 390. *f.* 229.
Habitat in Virginia, *teſta pollicem longa, et* 1½ *lata.*

cruentata. 138. V. teſta ovata inaequilatera transverſim ſtriata rubro maculata.
Liſt. Conch. t. 396. *f.* 243.
Klein oſtr. t. 10. *f.* 50.
β) *Liſt. Conch. t.* 403. *f.* 247.
Habitat - - - *teſta ſtriis exaſperata.*

luteſcens. 139. V. teſta ovata transverſim ſtriata exterius radiata marginem verſus characteribus lineis maculisque varia, intus luteſcente.
Liſt. Conch. t. 404 *f.* 248.
Habitat - - -

ſanguinolenta. 140. V. teſta ovali laevi flaveſcente: maculis punctisque rubris.
Bonaun. recr. 2. *f.* 68.
muſ. Kirch. 2. *f.* 67.
Habitat ad Neapolitanum *littus, teſta* 1¼ *pollicem longa,* 1¾ *lata.*

argentea. 141. V. teſta oblongiuſcula laevi argentea: lineis nigris in faſcias coadunatis.
Bonann. recr. 2. *f.* 85.
muſ. Kirch. 2. *f.* 85.
Habitat in Gaditano *littore, an hujus generis.*

donacina. 142. V. teſta oblongiuſcula complanata anterius transverſim ſulcata, margine interno crenulato, vulva anoque lineari excavatis.
Knorr Vergn. 6. *t.* 28. *f.* 7.
Habitat - - - teſta 1¼ *pollicem longa,* 1¾ *lata, nunc unicolore, nunc maculis, lineis angulatis aliterve varia, vulvae rima minuta vix hiante, cardinis dentibus modo* 2.

afra. 143. V. teſta ſulcata: umbone acuminato; ano excavato rugoſo cordato.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 16. *f.* 6. Gordet.
Habitat in Africae *littore* occidentali, *teſta pollicem lata, ſulcis ſubtilioribus ultra* 130 *exarata.*

dealbata. 144. V. teſta oblonga tenui complanata vivo animali caeruleſcente, mortuo nivea.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 17. *f.* 18. Calcinelle.
Habitat ad Africae *littus* occidentale, *teſta* 1½ *pollicem lata, dimidio anguſtiori; an hujus familiae?*

lithophaga. 145. V. teſta ovata reticulata utrinque hiante: cardinis dentibus binis; alternis bifidis. *Retzius act. Taurin.* 1786. 1787. *add. p.* 11-14. *f.* 1. 2.
Habitat Liburni *ad* rupes littoreas, *intra lapidem calcareum poroſum flavicantem.*

310. SPONDYLUS. *Animal* Tethys.

Teſta inaequivalvis, rigida.
Cardo dentibus 2 recurvis cum foveola intermedia.

Gaedaropus. 1. Sp. teſta ſubaurita ſpinoſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 510. *n.* 78.*
Boccon. obſerv. 1674. *t.* 304. Concha hiſtricina.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 14. *f.* 6. Gouron.
Liſt. Conch. t. 206. *f.* 40.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 2. *f.* 21.
Rumpf muſ. t. 47. *f.* E.
Petiv. amb. aq. t. 20. *f.* 6.
Gualt. teſt. t. 99. *f.* F.
Argenv. Conch. t. 20. *f.* B.
zoomorph. t. 12. *f.* A.
Klein oſtr. t. 8. *f.* 23. *et t.* 9. *f.* 37.
Seb. muſ. 3. *t.* 89. *f.* 7.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 4. *f.* 48.
Knorr delic. t. B. IV. *f.* 1.
Vergn. 1. *t.* 7. *f.* 1.
Murray teſtaceol. t. 2. *f.* 14.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. p. 76. *vign.*
Chemn. Conch. 7. *t.* 44. *f.* 459.
β) *Bonann. recr. et muſ. Kirch.* 2. *f.* 20. 22.
Gualt. teſt. t. 101. *f.* A.
Argenv. Conch. t. 20. *f.* E.
Chemn. Conch. 7. *p.* 63. *vign.* 9. *f.* a. b.
γ) *Chemn. Conch.* 7. *p.* 63. *vign.* 9. *f.* c.
δ) *Chemn. Conch.* 7. *t.* 44. *f.* 460.
ε) *Rumpf muſ. t.* 48. *f.* 1.
Gualt. teſt. t. 101. *f.* B.
Argenv. Conch. t. 19. *f.* E. H.
Seb. muſ. 3. *t.* 88. *f.* 1.
Chemn. Conch. 7. *t.* 44. *f.* 461. 462.
ζ) *Chemn. Conch.* 7. *t.* 45. *f.* 463.
η) *Chemn. Conch.* 7. *t.* 45. *f.* 464.
ϑ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 89. *f.* 8.
Knorr Vergn. 5. *t.* 9. *f.* 1. *et* 6. *t.* 9. *f.* 1.

Chemn.

Spondyli *tota teſtae ſtructura ad oſtreas accedunt, ſed dentibus cardinis differunt, ſpinis vulvarum chemis propiores, ſcopulis utplurimum adhaerentes, teſta altera convexa, altera planiore.*

Chemn. Conch. 7. *t.* 45. *f.* 465.
ι) *Chemn. Conch.* 7. *t.* 45. *f.* 466.
κ) *Chemn. Conch.* 7. *t.* 45. *f.* 468.
λ) *Chemn. Conch.* 7. *t.* 45. *f.* 469.
μ) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 7. *f.* 2. 3.
Chemn. Conch. 7. *t.* 45. *f.* 470.
ν) *Rumpf muſ. t.* 48. *f.* 2.
Argenv. Conch. t. 19. *f.* G.
Seb. muſ. 3. *t.* 88. *f.* 10. 11. *et t.* 89. *f.* 5.
Knorr Vergn. 1. *t.* 9. *f.* 2.
Chemn. Conch. 7. *t.* 46. *f.* 472.
ξ) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 9. *f.* 2.
Chemn. Conch. 7. *t.* 47. *f.* 474.
ο) *Chemn. Conch.* 7. *t.* 47. *f.* 476.
π) *Seb. muſ.* 3. *t.* 88. *f.* 4.
Chemn. Conch. 7. *t.* 47. *f.* 477. 478.
ρ) *Bonann. recr. et muſ. Kirch.* 2. *f.* 18.
Knorr Vergn. 6. *t.* 12. *f.* 3.
Chemn. Conch. 7. *t.* 69. *f.* E. F.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 213. *t.* 8. *f.* 14. 15.
σ) *Liſt. Conch. t.* 207. *f.* 41.
τ) *Liſt. Conch. t.* 208. *f.* 42.
υ) *Liſt. Conch. t.* 209. *f.* 43.
φ) *Valent. Abh. t.* 16. *f.* 24.
χ) *Gualt. teſt. t.* 99. *f.* E. b.
ψ) *Gualt. teſt. t.* 100. *f.* A.
ω) *Argenv. Conch. t.* 20. *f.* I.
αα) *Seb. muſ.* 3. *t.* 88. *f.* 2.
ββ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 88. *f.* 3.
γγ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 88. *f.* 5.
δδ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 88. *f.* 6.
εε) *Seb. muſ.* 3. *t.* 88. *f.* 7.
ζζ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 88. *f.* 9.
ηη) *Seb. muſ.* 3. *t.* 89. *f.* 1.
ϑϑ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 89. *f.* 2.
ιι) *Seb. muſ.* 3. *t.* 89. *f.* 3.
κκ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 89. *f.* 4.
λλ) *Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 14. *f.* 7. Satal.
μμ) *Schroet. Einl. in Conch.* 3. *p.* 224. *n.* 42. *t.* 8. *f.* 16.
νν) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 115. *f.* 984.
ξξ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 115. *f.* 985. 986.
οο) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 115. *f.* 987.
ππ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 115. *f.* 988-990.
ρρ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 116. *f.* 991.

 Habitat

Habitat in mari mediterraneo, δ) *et* κ) *in* mari rubro, ε) *in* ſinenſi, β) γ) ζ) η) λ) μ) ν) ξ) ο) π) *in* Oceano indico, ϑ) *et* ι) *in* americano, *teſtae colore nunc ſimplici purpureo, aurantio, albo, perſici florum aemulo, nunc ſtriis, maculis, punctis, faſciis, ſpinarum colore diverſo vario, magnitudine, craſſitie in immenſum varians.*

regius. 2. Sp. teſta inaurita ſpinoſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 511. *n.* 79.*
Argenv. Conch. t. 20. *f.* G.
Chemn. Conch. 7. *t.* 46. *f.* 471.
β) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 6. *f.* 2.
γ) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 13. *f.* 1.
δ) *Argenv. Conch. t.* 20. *f.* L?
ε) *Argenv. Conch. t.* 20. *f.* M?
Habitat rariſſimus in India, γ) *prope* Maltam, *teſta majore ſubgloboſa, intus alba, exterius purpureſcente, kermeſina, ignea, aurantia, rarius alba, ſpinis utplurimum longioribus, ad* 2 *pollices longis, interdum cylindricis, margine crenato.*

plicatus. 3. Sp. teſta inaurita mutica plicata. *Muſ. Lud. Ulr.* 511. *n.* 80.*
Adanſ Seneg. 1. *t.* 14. *f.* 2. Garin.
Liſt. Conch. t. 210. *f.* 44. *et t.* 1059. *f.* 1.
Gualt. teſt. t. 99. *f.* E. *et t.* 104. *f.* F?
Schroet. Litterat. 1. *t.* 1. *f.* 7.
Chemn. Conch. 7. *t.* 47. *f.* 479-482.
β) *Regenſ. Conch.* 1. *t.* 9. *f.* 30.
Habitat in Oceano indico *et* americano, mari rubro, mediterraneo, β) *in* Guinea, *teſta alba lineis veniſque nunc flavicantibus et rubellis, nunc ſubfuſcis et violaceis varia,* β) *aurantia.*

citreus. 4. Sp. teſta oblonga plicata ſpinoſa.
Argenv. Conch. t. 20. *f.* K.
Habitat - - - teſta imbricata, 2 *circiter pollices longa,* $1\frac{3}{4}$ *lata, citrea, aut rubra margine interno aurantio.*

311. CHAMA. *Animal* Tethys.

Teſta bivalvis, groſſior.

Cardo callo gibbo, oblique inſerto foſſulae obliquae.

Vulva clauſa absque nymphis.

Cor. 1. Ch. teſta ſubrotunda laevi: natibus recurvatis, rima hiante. *Muſ. Lud. Ulr.* 516. *n.* 88.*
Liſt. Conch. t. 275. *f.* 111.
Bonann recr. 2. *f.* 88.
muſ. Kirch. 2. *f.* 92.
Rumpf muſ. t. 48. *f.* 10.
Gualt. teſt. t. 71. *f.* E.
Seb. muſ. 3 *t.* 86. *f.* 1.
Ginann. adriat. t. 2. *t.* 19. *f.* 129.
Knorr Vergn. 6. *t.* 8. *f.* 1.
Chemn. Conch. 7. *t.* 48. *f.* 483.
Habitat in mari adriatico *verſus* Dalmatiam, *etiam* caſpico, *teſta grandi intus alba, exterius ſub epidermide nigricante ex albo et ſubfuſco varia, craſſa, ſubrotunda, transverſim rugoſa clauſa, margine integerrimo, valvis figura cor turgidum referentibus, natibus rubellis, magnis, inſtar cornu arietis contortis, ani regione retuſa, in medio pauliſper elevata; vulva ovato-oblonga: nymphis nudis ligamento coriaceo obtectis.*

Gigas. 2. Ch. teſta plicata fornicato-ſquamoſa: ano hiante. *Muſ. Lud. Ulr.* 512. *n.* 81.*
Rumpf muſ. t. 42. *f.* A. B. Chama ſquamata.
Argenv. Conch. t. 23. *f.* E. Imbricata.
Liſt. Conch. t. 351. *f.* 189. *t.* 352. *f.* 189. b. *t.* 353. *f.* 190. *t.* 354. *f.* 191.
Bonann. recr. 2. *f.* 83. 84.
muſ. Kirch. 2. *f.* 82. 83.
Petiv. amb. aq. t. 5. *f.* 13. *et t.* 7. *f.* 13.
Gualt. teſt. t. 92. *f.* A-G. *et t.* 93. *f.* B.
Klein oſtr. t. 10. *f.* 53.
Lochner muſ. Besler. t. 20.
Olear. muſ. t. 29. *f.* 6.
Knorr delic. t. B. III. *f.* 1.
Vergn. 1. *t.* 19. *f.* 3. *et* 6. *t.* 36. *f.* 3.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 10. *f.* 48.

Murray teſtaceol. t. 2. *f.* 12. 20.
Chemn. Conch. 7. *t.* 49. *f.* 492-496.
β) *Chemn. Conch.* 7. *t.* 49. *f.* 497.
Habitat in Oceano indico, *teſta lucida alba, extrinſecus interdum roſea, aut ex flavo rubro alboque varia, ad minimum* ¾ *pollices longa, et* 1¾ *lata, ſed ſaepius omnium concharum maxima, ut* 532 *libras pondere aequet, animali inhabitante tam grandi, ut* 120 *hominibus cibo inſervire queat, tamque robuſto, ut navium funes diſcindere, hominumque manus reſecare vivum valeat; teſtae coſtis, ſulcis, ſquamis magnitudine variis, ani hiatu ovali: ambitu tumido crenato, teſtae margine dentato, cardine praeter callum ſub vulva dente armato.*

Hippopus. 3. Ch. teſta plicata muricata; ano retuſo clauſo dentato. *Muſ. Lud. Ulr.* 513. *n.* 82.*
Rumpf muſ. t. 42. *f.* C. Chama aſpera obtuſa.
Argenv. Conch. t. 23. *f.* H. Folium braſſicae.
Liſt. Conch. t. 349. *f.* 187. *t.* 350. *f.* 188.
Bonann. recr. 2. *f.* 81. 82.
muſ. Kirch. 2. *f.* 80. 81.
Petiv. amb. aq. t. 18. *f.* 15.
Gualt. teſt. t. 93. *f.* A.
Leſſer teſtaceoth. f. 124.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 10. *f.* 49.
Knorr Vergn. 1. *t.* 22. *f.* 1. 2. *et* 6. *t.* 9. *f.* 3.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. p. 79. *vign.*
Chemn. Conch. 7. *t.* 50. *f.* 498. 499.
Habitat in Oceano indico, *teſta ad* 5 *pollices longa, et* 7 *lata, alba, extrinſecus maculis rubris et purpureis varia, interdum flavicante, ventricoſa, cardinis callis flavis, in altera valva* 2.

antiquata. 4. Ch. teſta ſubcordata: ſulcis longitudinalibus ſtriisque transverſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 514. *n.* 84.*
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 16. *f.* 2. Ajar.
Bonann. recr. 2. *f.* 98.
muſ. Kirch. 2. *f.* 96.
Valent. Abh. t. 16. *f.* 30.
Gualt. teſt. t. 71. *f.* I. L.
Knorr Vergn. 2. *t.* 20. *f.* 3. *et t.* 14. *f.* 2.
Chemn. Conch. 7. *t.* 48. *f.* 488-491.
Habitat in mari atlantico, americano, indico, *teſta inaequilatera, maculis fuſcis, rarius ferrugineis varia, coſtis* 19-22

19-22 utplurimum transverſim ſtriatis, margine dentato, natibus anum verſus inflexis, vulvae rima profunda clauſa.

trapezia. 5. Ch. teſta trapezia gibba: ſulcis longitudinalibus crenulatis.
Müll. zool. dan. prodr. 2981.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 236. *n.* 5. *t.* 8. *f.* 17.
Habitat in mari norwegico, *teſta parva, piſi magnitudine alba, extrinſecus antrorſum fuſca albo miſta, inſtar arcae noae gibboſa margine crenulata: ſtriis circiter* 20 *nodulis obtuſis inaequalibus, natibus parum recurvatis, ano ovato cordato, vulva oblonga, diſtincta, plana, extus crenata.*

ſemiorbiculata. 6. Ch teſta ſuborbiculata compreſſa rudi decuſſatim ſtriata.
Muſ. Lud. Ulr. 514. *n.* 85.*
β) *Linné Lehrb. Thierr.* 2. *t.* 37. *f.* k?
Habitat - - - teſta longitudinaliter ſtriata, ſquamis annotinis imbricata, ani lobo albido, margine poſteriori crenato.

calyculata. 7. Ch. teſta oblonga: ſulcis imbricatis, anterius retuſa.
Adanſ Seneg. 1. *t.* 15. *f.* 8. Jeſon.
Liſt. Conch. t. 347. *f.* 184. *n.* 185.
Gualt. teſt. t 90. *f.* F.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 5. *f.* 10. 11.
Chemn. Conch. 7. *t.* 50. *f.* 500. 501.
β) *Liſt. Conch. t.* 348. *f.* 186?
γ) *Bonann. muſ. Kirch.* 2. *f.* 127.
Habitat in mari atlantico, americano *et* indico, *interdum foſſilis, teſta ultra* ½ *pollicem longa,* 1½ *lata, alba, juniore fuſca, cardinis dentibus* 2, *margine exteriori ſerrato, interiore laevi.*

cordata. reniformis. 8. Ch. teſta cordata transverſim ſtriata, hinc elongata compreſſa. *Muſ. Lud Ulr.* 515. *n.* 86.*
β) *Knorr Vergn.* 2. *t.* 23. *f.* 7.
Chemn. Conch. 7. *t.* 50. *f.* 502. 503.
Habitat - - - β) *in* mari rubro *et* indico, *teſta ferruginea* β) *ſpadicea, ſulcis inferne, non verſus marginem exteriorem, transverſis, diſtinctis, obtuſis: angulo inter rimam et marginem exteriorem elongato obſcuriore.*

ſatiata. 9. Ch. teſta ſubrotunda: ſulcis dentatis punctis interſtinctis, ano retuſo.

Habitat

Habitat - - - teſta alba extrinſecus rufeſcente: ſulcis elevatis longitudinaliter dentatis, alternis brevioribus, margine crenulato, ano cordato.

oblonga. 10. Ch. teſta oblonga anterius angulata: dentibus anterioribus acutis. *Muſ. Lud. Ulr.* 515. *n.* 87.*
Chemn. Conch. 7. *t.* 50. *f.* 504. *f.* 505.
Habitat rarior ad Guineae *littora, mytilo modiolo ſtructura affinis, teſta ſubdiaphana alba ſubtiliſſime decuſſatim ſtriata; intus citrea, margine integerrimo, cardinis dentibus* 3 *mediis, et laterali oblongo acuto, foveolae inter binos dentes alterius valvae intermediae inſerto.*

Lazarus. 11. Ch. teſta imbricata lamellis laceris, nate oblique ſubſpirali. *Muſ. Lud. Ulr.* 513. *n.* 83.*
Argenv. Conch. t. 20. *f.* F. Placenta foliacea.
Rumpf muſ. t. 47. *f.* C. *t.* 48 *f.* 3.
Valent. Abh. t. 13. *f.* 4. *t.* 16. *f.* 22.
Seb. muſ. 3. *t.* 88. *f.* 12. *t.* 89. *f.* 6. 9. 11.
Knorr Vergn. 1. *t.* 8. *f.* 1.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 5. *f.* 12-14.
Chemn Conch. 7. *t.* 51. *f.* 507-509.
Habitat in India, *ſcopulis adhaerens, teſta flava, aut alba natibus rubris intus glabra: valva ſuperiore paulo minore et planiore, in inferioris cardine callo obtuſo, craſſo, lato, ad alterutrum latus crenato: foveola obliqua adjacente.*

gryphoides. 12. Ch. teſta orbiculata muricata: valvula altera planiore; altera nate productiore ſubſpirali.
Rondel. teſt. 1. *c.* 25. Concha rugata.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 15. Jataron.
Liſt. Conch. t. 212. *f.* 47. *t.* 213. *f.* 48.
Gualt. teſt. t. 101. *f.* C. D. E. F.
Klein oſtr. t. 12. *f.* 86.
Knorr Vergn. 6. *t.* 16. *f.* 1.
Chemn. Conch. 7. *t.* 51. *f.* 510-513.
Geſn. aq. 316.
Aldr. exſang. 458.
Sloan. jam. t. 241. *f.* 4-7.
β) *Gualt. teſt. t.* 101. *f.* L.
γ) *Knorr Vergn.* 3. *t.* 6. *f.* 1.
δ) *Kaemmerer Cabin. Rudolſt. p.* 234. *vign. f.* 1. 2.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 255. *t.* 8. *f.* 19.

ε) *Chemn.*

ε) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 116. *f.* 992.
ζ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 116. *f.* 993.
Habitat in mari mediterraneo, americano, indico, *fixa teſtae proportione et cardine Lazaro affinis, teſta alba, flava, rubra, ſanguinea, albo rubroque varia, ſquamis nunc magis foliaceis, nunc fornicatis et muricatis.*

bicornis. 13. Ch. teſta valvulis conicis: natibus corniformibus obliquis tubuloſis valvula longioribus.
Columm. purp. c. 19. *p.* 43.
Major teſtac. t. 2.
Liſt. Conch. t. 214. *f.* 49.
Gualt. teſt. t. 101. *f.* G.
Klein oſtr. t. 12. *f.* 87. 88.
Chemn. Naturf. 20. *t.* 1. *f.* 1-5.
Conch. 7. *t.* 52. *f.* 516-520.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 245. *t.* 8. *f.* 18.
Habitat rara in Oceano indico *et* americano, *etiam* mediterraneo *gryphoidi affinis, teſta utrinque flava, rubra aut alba, imbricatim lamellata, rarius rugoſa.*

Arcinella. 14. Ch. teſta ſulcata muricata excavato-punctata, cardinis callo ſeſſili.
Liſt. Conch. t. 355. *f.* 192.
Bonann. recr. 3. *f.* 336.
muſ. Kirch. 2. *f.* 101.
Olear. muſ. t. 29. *f.* 3.
Leſſer teſtaceoth. f. 98.
Knorr Vergn. 6. *t.* 14. *f.* 1. *et t.* 36. *f.* 1. 2.
Chemn. Conch. 7. *t.* 52. *f.* 522. 523.
Habitat rarior in Oceano americano, *teſta* 2 *pollices lata, et pene aeque longa, alba, ſpinis rarius roſeis, intus flavicante, margine crenata; ano cordato, impreſſo, verrucoſo, rugoſo magno ad alterum latus appendice ſaepius aucto.*

Moltkiana. 15. Ch. teſta obtuſe triangula aequilatera plicata, vulva elevata plicis ſtriisque obliquis inaequali.
Chemn. Conch. 7. *t.* 48. *f.* 484-487.
Habitat - - - *Ch. cordi affinis, nucis avellanae oblongae magnitudine, teſta lactea, opaca; natibus pauliſper diſtantibus, cardinis dente ſub natibus anguſto rotundato ſcrobi*

Chamae *plurimae fixae adhaerent aliis corporibus, valva ſuperiore ſaepius planiore.*

ſcrobi profundae appoſito, cui dens alterius valvae inſeritur, alteraque antrorſum foveola longa profunda inter binos dentes intermedia, et paulo magis retrorſum alio adhuc rotundato et dilatato dente.

concamerata. 16. Ch. teſtae rugis transverſis, ſtrias latas longitudinales decuſſantibus; utriusque valvae medio intus camera aucto.
Walch. Naturf. 12. *p.* 53. *t.* 1. *f.* 5-7.
Chemn. Conch. 7. *t.* 50. *f.* 506. a-d.
Habitat rariſſima in Oceano americano, *teſta parva, albida.*

macerophylla. 17. Ch. teſta rotundata ſeriatim lamellata: margine interno crenulato.
Seb. muſ. 3. *t.* 88. *f.* 8.
Knorr Vergn. 1. *t.* 21. *f.* 2. *et* 5. *t.* 24. *f.* 1.
Chemn. Conch. 7. *t.* 52. *f.* 514. 515.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 89. *f.* 12?
Habitat in Oceano americano, *gryphoidi perquam affinis, teſta nunc flava, nunc rubra nunc albo rubroque varia, intus nunc alba, nunc rubra,* β) *elegantiſſime variegata; valva utraque convexa, lamellis marginem verſus increſcentibus; an varietas Lazari?*

foliacea. 18. Ch. teſta alba: ſtriis transverſis foliaceis ſerratis, interſtitiis crenatis, natibus recurvatis.
Liſt. Conch. t. 215-217. *f.* 51-53.
Klein oſtr. t. 12. *f.* 81.
Chemn. Conch. 7. *t.* 52. *f.* 521.
β) *Liſt. Conch. t.* 215. *f.* 50.
Habitat in mari mediterraneo *et* americano, *foſſilis quoque in* Campania Galliae, *teſta nunc ſubrotunda nunc oblonga.*

arata. 19. Ch. teſta rotundata alba, fuſco undulata: coſtis trigonis perpendicularibus rugoſis, margine inaequali.
Bonann. recr. 2. *f.* 86.
muſ. Kirch. 2. *f.* 84.
Habitat rara in Syracuſano *littore, utrum hujus generis, an ad cardia referenda.*

fuſca. 20. Ch. teſta rugoſa oblonga anguſta fuſca: valvae inferioris nate protenſa rotundata ſubincurva.
Gualt. teſt. t. 101. *f.* 1.
Habitat - - - -

citrea. 21. Ch. teſta ſubrotunda ventricoſa inaequivalvi muricata: ſpinis ſparſis inaequalibus ſquamoſis.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 4. *f.* 44.
Habitat in Oceano americano, *teſta citrea, cardine ad chamas accedente.*

Thaca. 22. Ch. teſta ſubrotunda longitudinaliter ſtriata, ano retuſo.
Molin. hiſt. nat. Chil. p. 178.
Habitat ad littus Chilenſe *in arena ſe occultans, teſta alba violacea et flava intus eleganter purpuraſcente diametri* 4 *pollicum, verme incola ſapidiſſimo.*

rugoſa. 23. Ch. teſta ſuborbiculata: ſulcis profundiſſimis, rugis ſubimbricatis, margine dupliciter plicato. *Mant.* 2. *p.* 546.
Habitat - - - teſta magnitudine extimi digiti, gibba, craſſa, ſulcis 30, *margine interiore obtuſo plicato, exteriore unguibus eminentibus concavis e ruga eductis, cardine ſulcis* 2 - 3 *obliquis verſus vulvam declinatis.*

gryphica. 24. Ch. teſta obliqua lacuna laterali, rugoſa, cardinis collo dentato. *Mant.* 2. *p.* 546.
Habitat in Barbaria, *Anomiae Gryphi facie, teſta ponderoſiſſima, craſſiſſima, pugni magnitudine, natibus oblique verſus anum* incurvatis longitudinaliter *concavum, vulva longitudinaliter canaliculata, verſus nates obliqua.*

corallíophaga. 25. Ch. teſta cylindrica alba diaphana decuſſatim ſtriata: ſtriis transverſis arcuatis imbricatis. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 359. *t.* 172. *f.* 1673. 1674.

312. ARCA. *Animal* Tethys?
Teſta bivalvis aequivalvis.
Cardo dentibus numeroſis acutis alternis inſertis.

* *margine integerrimo.*

† *natibus recurvatis.*

tortuoſa. 1. A. teſta parallelepipeda ſtriata: valvula obliquè carinata.
Muſ. Lud. Ulr. 517. *n.* 861.*
Rumpf muſ. t. 47. *f.* k. Oſtreum tortuoſum.
Bonann. muſ. Kirch. 2. *f.* 122. 123.
Petiv. amb. aq. t. 20. *f.* 9.

Gualt.

Gualt. teſt. t. 95. *f.* B.
Argenv. Conch. t. 19. *f.* I.
Klein oſtr. t. 8. *f.* 16.
Leſſer teſtaceoth. f. 137.
Knorr Vergn. 1. *t.* 23. *f.* 3.
Martin. Beſch. berl. Naturf. 3. *t.* 6. *f.* 14.
Chemn. Conch. 7. *t.* 53. *f.* 524. 525.
Habitat rara et pretioſa in Oceano indico, *teſta alba, interdum ſubfuſco-maculata aut nebuloſa triplo latiore quam longa, extrinſecus varia directione et intus ſtriata, valvis diſſimilibus, margine intus, in junioribus utrinque crenato.*

†† *natibus inflexis.*

Noae. 2. A. teſta oblonga ſtriata apice emarginata, natibus remotiſſimis, margine hiante. *Muſ. Lud. Ulr.* 517. *n.* 90.*
Rondel. aq. 2. *p.* 27. Concha rhomboides.
Liſt. Conch. t. 368. *f.* 208. *et t.* 369. *f.* 209. Muſculus Matthioli.
Rumpf muſ. t. 44. *f.* P. Arca Noae.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 18. *f.* 9. Muſſole.
Bonann. recr. 2. *f.* 32. Concha rhomboides.
muſ. Kirch. 2. *f.* 31.
Petiv. amb. aq. t. 17. *f.* 10.
Gualt. teſt. t. 87. *f.* G. H. I?
Argenv. Conch. t. 23. *f.* G.
Leſſer teſtaceoth. f. 138.
Knorr delic. t. B. V. *f.* 2.
Vergn. 1. *t.* 16. *f.* 1. 2.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 73.
Martini Beſch. berl. Naturf. 3. *t.* 6. *f.* 5.
Chemn. Conch. 7. *t.* 53. *f.* 529-531. a. b. *et t.* 54. *f.* 532. 533.
β) *Argenv. Conc. t.* 29. *f.* 20. A.
Habitat in mari mediterraneo, rubro, atlantico, americano, indico, *teſta alba, rarius unicolore, frequentius ſubfuſco luteo aut fuſco maculata nebuloſa, ſtriata, unduloſa, venoſa, rhomboidea, margine extimo crenato, interno integro.*

barbata. 3. A. teſta oblonga ſtriis barbata: natibus approximatis, margine clauſo. *Fn. ſuec.* 1147. *Muſ. Lud. Ulr.* 518. *n.* 91.*
Müll. zool. dan. prodr. 2982.
Rondel. teſt. 14. Chama aſpera.
Liſt. Conch. t. 231. *f.* 65.

Bonann.

Bonann. recr. 2. *f.* 79.
muſ. Kircher. 2. *f.* 78.
Gualt. teſt. t. 91. *f.* F.
Argenv. Conch. t. 72. *f.* M.
Knorr Vergn. 2. *t.* 2. *f.* 7.
Murray teſtaceol. t. 2. *f.* 22.
Martini Beſch. berl. Naturf. 3. *t.* 6. *f.* 8.
Chemn. Conch. t. t. 54. *f.* 535.
β) Arca tortuoſa. *Müll. zool. dan. prodr.* 2983.
γ) *Gualt. teſt. t.* 90. *f.* B.
Martini Beſch. berl. Naturf. 3. *t.* 6. *f.* 12.
Chemn. Conch. 7. *t.* 54. *f.* 534.
δ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 88. *f.* 13.
Chemn. Conch. 7. *t.* 54. *f.* 536. *f.* 537.
Muſ. Teſſin. t. 6. *f.* 1.
ε) *Rumpf muſ. t.* 44. *f.* L. Pecten ſaxatilis?

Habitat in mari mediterraneo, rubro, indico, β) *in* norwegico, γ) *etiam in* americano, *teſta ſub fibris ſubſpadicea, interdum albo mixta, decuſſatim ſtriata: fibris in ſectionis angulo nodulosis.*

Modiolus. 4. A. teſta oblonga ſtriata anterius angulata.

Habitat in mari mediterraneo, *teſta mytili modioli figura, fabae majoris magnitudine, exterius flaveſcente, intus alba aut ſubviolacea: cardine elongato, valvis anterius profundius ſtriatis, poſterioribus natibus vix vel parum longioribus.* Zoega.

Pella. 5. A. teſta ovata pellucida ſubſtriata: vulva prominente diſtincta, cardine ciliari.

Chemn. Conch. 7. *t.* 55. *f.* 546.

Habitat in mari mediterraneo, *teſta alba, nitidiſſima, magnitudine ſeminis helianthi annui, ſubtrigona: ſtriis ſubtiliſſimis transverſis ſemilunatis, natibus mediis vulva transverſe ſtriata, cardinis dentibus, ſub vulva praeſertim, ſubulatis, acutiſſimis, margine intus et extrinſecus edentulo.* Logie.

ovata. 6. A. teſta ovata decuſſatim ſtriata nivea epidermide pulla obtecta: margine hiante.

Chemn. Conch. 7. *t.* 54. *f.* 538.

Habitat in mari rubro, *teſta magna, ano excavato undulatim ſulcato et ſtriato; an hujus familiae?*

pellucida. 7. A. teſta pellucida fragili anterius poſteriusque rotundata obſolete ſtriata: cardinis dentibus acutiſſimis.
Spengl. Catal. t. 1. *f.* 10. 11.
Chemn. Conch. 7. *t.* 55. *f.* 541. a. b.
Habitat ad inſulas Nicobaricas, *teſta tenui ſtraminea, rarius fuſca intus fuſceſcente.*

roſtrata. 8. A. teſta convexiuſcula transverſim ſtriata poſterius rotundata anterius in roſtrum acutum producta.
Martini Beſch. Berl. Naturf. 3. *t.* 7. *f.* 17. 18.
Schroet. Fluſconch. t. 9. *f.* 2.
Chemn. Conch. 7. *t.* 55. *f.* 550. 551. a. b.
Habitat in mari Baltico *et* Norwegico, *tellinae roſtratae affinis, teſta epidermide vireſcente tecta, ad* ½ *pollicem longa, et* 1¼ *lata, natibus minutis, antrorſum flexis.*

ſtriata. 9. A. teſta lentiformi copioſiſſime decuſſatim ſtriata lateritia intus rubella, ano triangulari, cardine arcuato.
Chemn. Conch. 7. *t.* 58.
Habitat in mari rubro, *teſta pollicem lata et paulo longiori.*

pulchella. 10. A. teſta ſubrotunda biradiata: ſtriis transverſis arcuatis.
Rumpf muſ. t. 47. *f.* 1.
Habitat - - - an hujus generis et ordinis?

afra. 11. A. teſta exalbida epidermide albicante tecta ſubtiliſſime decuſſatim ſulcata oblique truncata.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 18. *f.* 8. Jabet.
Habitat ad Africae *littus occidentale, teſta* 4-5 *lineas longa, et* 3 *lata, ſulcis longitudinalibus* 40-50, *transverſis* 20, *natibus approximatis, margine clauſo.*

foſſilis. 12. A. teſta craſſa ſubrotunda longitudinaliter ſtriata transverſim coſtata: coſtis undulatim ſtriatis.
Schroet. neue Litterat. 2. *f.* 3. 4.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis reperta in Ducatu Limburgenſi, *teſta* 3 *pollices longa,* 3¼ *lata.*

cancellata. 13. A. teſta cancellatim ſtriata barbata, margine medio hiante.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 294. *t.* 9. *f.* 2.
Habitat in Oceano americano, *teſta ſub epidermide muſcoſa utrinque ſubfuſca, exterius albo miſta, utrinque* 4 *pilorum faſciculis fimbriatis hiata, natibus ſubrecurvis, ano lanceolato.*

14. A.

minuta. 14. A. teſta compreſſiuſcula transverſim ſtriata: fine remotiore attenuato; oppoſito rotundato. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 414. *n.* 415. *Müll. zool. dan. prodr.* 2985.

Chemn. Conch. 10. *t.* 170. *f.* 1657. 1658.

Habitat rariſſima in maris Groenlandiam *alluentis profundis, teſtae figura ad myas accedens, teſta ochroleuca glabra, clauſa,* $2\frac{1}{2}$ *lineas longa,* 4 *lata, natibus conniventibus, albis, acutis, non ſtriatis.*

** *margine crenato.*

† *natibus recurvatis.*

lactea. 15. A. teſta ſubrhomboidea obſolete decuſſatim ſtriata diaphana.

Liſt. Conch. t. 235. *f.* 69.

Bonann. recr. 2. *f.* 34.

muſ. Kirch. 2. *f.* 33.

Chemn. Conch. 7. *t.* 55. *f.* 547.

nodulosa. β) Arca teſta oblonga nodulis ſtriata, natibus incurvis remotis, margine integerrimo clauſo. *Müll. zool. dan. prodr.* 2984.

Habitat in omni mari europaeo, *fabae equinae magnitudine, natibus approximatis.*

antiquata. 16. A. teſta oblique cordata multiſulcata: ſulcis muticis. *Muſ. Lud. Ulr.* 518. *n.* 91.*

Adanſ. Seneg. 1. *t.* 18. *f.* 7. Anadara.

Liſt. Conch. t. 230. *f.* 64. *et t.* 236. *f.* 70.

Bonann. recr. et muſ. Kirch. 2. *f.* 73. 74.

Rumpf muſ. t. 44. *f.* 1.

Petiv. amb. aq. t. 17. *f.* 8.

Gualt. teſt. t. 87. *f.* B. C.

Klein. oſtr. t. 11. *f.* 73.

Gronov. zooph. t. 18. *f.* 13.

Knorr Vergn. 1. *t.* 24. *f.* 3. 4.

Murray teſtaceol. t. 2. *f.* 15.

Chemn. Conch. 7. *t.* 55. *f.* 548. 549.

Habitat in Oceano indico, americano, mari mediterraneo, *teſta ſatis magna alba, epidermide piloſa obtecta, vulvae regione quaſi angulo compreſſo prominente.*

ſenilis. 17. A. teſta oblique cordata octoſulcata laevi, margine plicato. *Muſ. Lud. Ulr.* 518. *n.* 92.*

 Adanſ.

---

* *An huic generi accenſendae, et cuinam ejus tribui et familiae conchae ab* Argenville *Conch. t.* 29. *f.* 17. a. *et a* Knorr *Vergn.* 1. *t.* 21. *f.* 4. *delineatae?*

Adanſ. Seneg. I. *t.* 18. *f.* 5. Fagan.
Liſt. Conch. t. 238. *f.* 72.
Gualt. teſt. t. 87. *f.* D.
Argenv. Conch. t. 23. *f.* k
Chemn. Conch. 7. *t.* 56. *f.* 554-556.
Habitat in Oceano americano, *et ad* Africae *littus occidentale, teſta craſſa ultra* 3 *pollices longa et* 4 *lata alba, epidermide nigra, aut (in junioribus) fuſca thalaſſino miſta obducta, anterius hiante.*

granoſa. 18. A. teſta ſubcordata: ſulcis muricatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 519. *n.* 93.*
Column. purp. 11. *p.* 29. 30.
Major teſt. t. 10. *f.* 3.
Liſt. Conch. t. 241. *f.* 78. *et t.* 242. *f.* 79.
Rumpf muſ. t. 44. *f.* k.
Petiv. amb. aq. t. 17. *f.* 7.
Galt. teſt. t. 87. *f.* E.
Argenv. Conch. t. 23. *f.* C
Klein oſtr. t. 10. *f.* 45. 46.
Knorr Vergn. 6. *t.* 34. *f.* 2.
Martini Beſch. berl. Naturf. 3. *t.* 6. *f.* 10.
Chemn. Conch. 7. *t.* 56. *f.* 557.
Habitat in Oceano indico *et* americano, *teſta alba, ad* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, et* $1\frac{3}{4}$ *lata, fere aequilatera, coſtis circiter* 20 *validis ſpinoſo tuberculatis.*

Corbicula. 19. A. teſta ovata compreſſiuſcula: ſtriis perpendicularibus confertim noduloſis, natibus obtuſis approximatis.
Chemn. Conch. 7. *t.* 56. *f.* 558
β) *Liſt. Conch. t.* 234. *f.* 68.
Klein oſtr. t. 10. *f.* 43. 44.
Chemn. Conch. 7. *t.* 65. *f.* 559.
Habitat ad inſulas Nicobaricas, *granoſae affinis, teſta* 10 *circiter lineas longa et pollicem lata,* β) *ſubgloboſa intus capillariter ſtriata.*

decuſſata. 20. A. teſta lenticulari decuſſatim ſubſtriata, rima clauſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 519. *n.* 94.*
Regenſ. Conch. I. *t.* 2. *f.* 22.
Knorr Vergn. 5. *t.* 30. *f.* 3.
Chemn. Conch. 7. *t.* 57. *f.* 561.
Habitat in Oceano americano, *teſta maculis fuſcis ſparſis varia, ſtriis transverſis nudo oculo vix conſpicuis, cardine leviter arcuato.*

aequilatera. 21. A. teſta lenticulari ſubaequilatera extrinſecus intusque perpendiculariter ſtriata alba: maculis ſpadiceis.
Chemn. Conch. 7. *t.* 57. *f.* 562.
Habitat rarior in Oceano americano, *decuſſatae affinis, at teſta tenuiore, natibus approximatis.*

pallens. 22. A. teſta lenticulari ſubobliqua decuſſatim ſtriata, rima anguſtiſſima. *Muſ. Lud. Ulr.* 519. *n.* 95.*
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 270. *t.* 9. *f.* 1.
Habitat in Oceano indico *et* americano, *teſta aequilatera intus alba, exterius pallide interdum hinc inde obſcurius maculata et nebuloſa, ſtriis ſubtilibus, transverſis ſubtiliſſimis confertiſſimis, natibus mediis conniventibus, cardine arcuato.*

Cucullus. 23. A. teſta ventricoſa decuſſatim ſtriata: vulva cordata, valvis intus coſta curvata violaceo-faſciata auctis; altera prominente, natibus remotis.
Martini Beſch. Berl. Naturf. 3. *t.* 7. *f.* 15. 16.
Chemn. Conch. 7. *t.* 53. *f.* 526-528.
Habitat ad inſulas Nicobaricas, *teſta ultra* 2 *pollices longa, et ultra* 3 *lata, extrinſecus cinnamomea; utrum hujus, an ſequentis familiae?*

magellanica. 24. A. teſta utrinque rotundata decuſſatim ſtriata ſpadicea: margine externo in medio inflexo repando, natibus approximatis.
Chemn. Conch. 7. *t.* 53. *f.* 539.
Habitat in freto magellanico.

reticulata. 25. A. teſta ſubrhomboidea decuſſatim ſtriata alba: natibus approximatis, vulva cordata.
Liſt. Conch. t. 233. *f.* 67.
Martini Beſch. Berl. Naturf. 3. *t.* 6. *f.* 9.
Chemn. Conch. 7. *t.* 54. *f.* 540.
Habitat - - - arcae Noae affinis; utrum hujus, an ſequentis familiae?

candida. 26. A. teſta pellucida rhomboidali anterius producta poſterius truncata decuſſatim ſtriata: natibus remotis, margine poſterius hiante; hiatu ovato ciliato.
Chemn. Conch. 7. *t.* 55. *f.* 542.
β) *Chemn. Conch.* 7. *t.* 55. *f.* 544.
Habitat in Oceano americano *et ad* Africae littus occidenta-

 le,

le, *teſta alba, quaſi granulata, epidermide villoſa ex atro ſubfuſca obducta.*

indica. 27. A. teſta inaequivalvi ovata: ſtriis planis longitudinalibus ſulcisque profundis, vulva cordata.
Liſt Conch. t. 232. *f.* 66.
Martini Beſch. Berl. Naturf. 3. *t.* 6. *f.* 13.
Chemn. Conch. 7. *t.* 55. *f.* 543.
β) *Mart. Beſch. Berl. Naturf.* 3. *t.* 6. *f.* 11.
Chemn. Conch. 7. *t.* 56. *f.* 552.
Habitat in Oceano indico, *teſta* ¾ *pollicis longa, et* 1½ *lata, alba, epidermide fuſca villoſa tecta.*

jamaicenſis. 28. A. teſta anterius truncata poſterius rotundata: coſtis perpendicularibus crenatis vel noduloſis.
Liſt. Conch. t. 229. *f.* 64.
Habitat ad Jamaicam, *utrum hujus, an ſequentis familiae?*

campechienſis. 29. A. teſta ovata: ſtriis perpendicularibus latis crenatis aut ſquamoſis, cardine arcuato.
Liſt Conch. t. 237. *f.* 71.
β) *Liſt. Conch. t.* 243. *f.* 74?
Habitat in ſinu Campechienſi, β) *apud* Börbados.

lata. 30. A. teſta latiuſcula cancellata anterius truncata: vulva cordata.
Gualt. teſt. t. 90. *f.* C.
Habitat - - - teſta ventricoſa vix pollicem lata et dimidio breviore; utrum hujus, an ſequentis familiae?

ſenegalenſis. 31. A. teſta ovata longitudinaliter ſulcata transverſim ſubrugoſa alba.
Adanſ Seneg. 1. *t.* 18. *f.* 6. Robet.
Habitat ad Africae *littus occidentale, teſta* 8 *lineas longa, et* 10 *lata interdum ſubrubella, intus quoque ſulcata.*

†† *natibus inflexis.*

undata. 32. A. teſta lenticulari inaurita laeviuſcula: margine plicato.
Bonann. recr. 2. *f.* 60. 61.
muſ. Kirch. 2. *f.* 58. 60.
Gualt. teſt. t. 72. *f.* G.
Knorr Vergn. 6. *t.* 14. *f.* 4.
Martini Beſch. Berl. Naturf. 3. *t.* 6. *f.* 2.
Chemn. Conch. 7. *t.* 57. *f.* 560.

Habitat

Habitat in Oceano americano, *pectunculo affinis, teſta ad 2 pollices longa, et perinde lata aequivalvi, ſubtiliſſime et confertim transverſe ſtriata, fuſco maculata, intus alba, interdum quoque fuſco maculata, natibus approximatis, cardine arcuato.*

Pectunculus. 33. A. teſta lenticulari ſubaurita ſulcata: ſulcis ſubimbricatis, margine plicato. *Muſ. Lud. Ulr.* 520. *n.* 96.*
Liſt. Conch. t. 239. *f.* 73.
Bonann. muſ. Kirch. 2. *f.* 129.
Gualt. teſt. t. 72. *f.* H.
Knorr Vergn. 5. *t.* 12. *f.* 4.
Martini Beſch. berl. Naturf. 3. *t.* 6 *f.* 3. 4.
Chemn. Conch. 7. *t.* 58. *f.* 568. 569.
Habitat rarior in Oceano americano *et* mari rubro, *teſta planiuſcula, ad* 1½ *pollicem longa, vix latiori, alba maculis ſparſis fuſcis interdum teſſellatis varia, intus fuſca, albo nonnunquam intermiſto, ſtriis* 16-20, *cardine arcuato.*

pectinata. 34. A. teſta lenticulari inaurita longitudinaliter ſtriata: ſtriis laevibus.
Chemn. Conch. 7. *t.* 58. *f.* 570. *n.* 1. 2. *et f.* 571.
β) *Liſt. Conch. t.* 239. *f.* 81.
Klein oſtrac. t. 10. *f.* 41.
Habitat in Oceano americano, *pectunculo affinis, at teſta minore magis convexa, fuſca, ſpadicea, aut lutea punctata, maculata, nebuloſa, aut undulata, intus ſubfuſca aut alba.*

Glycymeris. 35. A. teſta ſuborbiculata gibba ſubſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 521. *n.* 97.
Liſt. Conch. t. 247. *f.* 82. Chama glycymeris.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 18. *f.* 10. Vovan.
Bellon. aq. 408.
Rondel. teſt. 31.
Gualt. teſt. t. 82. *f.* C. D.
Knorr Vergn. 1. *t.* 21. *f.* 4. *et* 6. *t.* 14. *f.* 3.
Chemn. Conch. 7. *t.* 57. *f.* 564.
Habitat in mari mediterraneo, *ad* Africae littus occidentale, *in* Oceano americano *piloſa minor, magis laevis et plana, ſtriis transverſis oculo nudo vix conſpicuis, cardine arcuato, ſuperficie nunc cinerea, nunc ſpadicea, nunc rubra, nunc flava, nunc maculata, nunc nebuloſa, nunc undulata, nunc lineis angulatis notata.*

piloſa. 36. A. teſta ſuborbiculata aequilatera piloſa.
Gualt. teſt. t. 73. *f.* A. Ponderoſa ſerico indumento.
Bonann. recr, 2. *f.* 80. Nux piloſa.
muſ. Kirch. 2. *f.* 79.
Liſt. Conch. t. 240. *f.* 77.
Knorr Vergn. 2. *t.* 23. *f.* 6. *et* 6. *t.* 12. *f.* 4.
Martini Beſch. berl. Naturf. 3. *t.* 6. *f.* 1.
Chemn. Conch. 7. *t.* 57. *f.* 565. 566.
β) *Bonann. recr.* 2. *f.* 78.
muſ. Kirch. 2. *f.* 77.
γ) *Liſt. Conch. t.* 246. *f.* 80?
Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 6. *f.* 1. a. b.
δ) *Bonann. muſ. Kirch.* 2. *f.* 131?
Habitat in mari mediterraneo, *in* Oceano aſiatico *et* americano, *teſta* 2½ *pollices longa et* 2¾ *lata fuſca, intus alba, interdum fuſco maculata, epidermide villoſa tecta, ſtriis perpendicularibus obliquis, intus quoque conſpicuis, rugas transverſas decuſſantibus.*

nummaria. 37. A. teſta ſubrotunda laevi ſubaurita transverſim ſtriata.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta unguis magnitudine nitido glabra rufa undulata: ſtriis ſubtiliſſimis.*

Nucleus. 38. A. teſta oblique ovata laeviuſcula: cardine triangulari.
Gualt. teſt. t. 88. *f.* R.
Chemn. Conch. 7. *t.* 58. *f.* 574. a. b.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *hinc inde etiam in* Europa *foſſilis, teſta avellanae magnitudine, ſub epidermide olivacea alba intus argentea, ſubtrigona, ſtriis perpendicularibus ſubtiliſſimis, transverſis arcuatis paucis, ano ſubcordato.*

rhomboidea. 39. A. teſta tota alba rhomboideo cordata coſtata: coſtis anterioribus et dorſalibus nodulofis, natibus remotis.
Liſt. Conch. t. 244. *f.* 75.
Gualt. teſt. t. 87. *f.* A.
Knorr Vergn. 4. *t.* 14. *f.* 2.
Chemn. Conch. 7. *t.* 56. *f.* 553. a. b.
Habitat in Oceano indico *et* americano, *vulva cordata, ano rhomboidali.*

marmorata. 40. A. teſta aequilatera tenui planiuſcula ſubtiliſſime decuſſatim ſtriata, natibus approximatis, cardine arcuato.
Chemn. Conch. 7. *t.* 57. *f.* 563.

Habitat

Habitat in Oceano americano, *teſta alba, characteribus maculisque flavicantibus varia.*

anguloſa. 41. A. teſta ventricoſa longitudinaliter ſtriata et lineata altero latere angulata, natibus approximatis, cardine arcuato.
Liſt. Conch. t. 245. *f.* 76.
Chemn. Conch. 7. *t.* 57. *f.* 567.
Habitat ad littus Africae occidentale *et in* Oceano americano, *teſta fuſca, aliter atque aliter maculata.*

Scapha. 42. A. teſta oblonga maxime depreſſa ſtriata: natibus vix prominulis. *Gronov. zooph. t.* 18. *f.* 7.
Habitat ad inſulam Zeylon.

313. OSTREA. *Animal* Tethys.

Teſta bivalvis (plurimis) inaequivalvis, ſubaurita.

Cardo edentulus foſſula cava ovata, ſulcisque (in plurimis) lateralibus transverſis.

Vulva anusve nullus.

* *valvis auriculatis radiatis*, Pectines.

† *aequilateres, auriculis aequalibus.*

maxima. 1. O. teſtae radiis rotundatis longitudinaliter ſtriatis. *Fn. ſuec.* 2148. *Muſ. Lud. Ulr.* 522. *n.* 98. *Müll. zool. dan. prodr.* 2989.
Liſt. an. angl. t. 5. *f.* 29. Pecten maximus.
Conch. t. 263. *f.* 1. *et t.* 167. *f.* 4.
Bonann. recr. 2. *f.* 8.
muſ. Kirch. 2. *f.* 7.
Gualt. teſt. t. 98. *f.* A. B. *t.* 99. *f.* A.
Knorr Vergn. 1. *t.* 14. *f.* 1. 2. *et* 2. *t.* 14. *f.* 1. *et t.* 17. *f.* 1. 3?
Regenſ. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 19. *et t.* 7. *f.* 3.
Bytem. app t. 12. *f.* 50.
Chemn. Conch. 7. *t.* 60. *f.* 585-587.
β) *Liſt. Conch. t.* 168. a.
γ) *Knorr del. nat ſel. t.* B. II. *f.* 2?
Vergn. 1. *t.* 4. *f.* 2?

Habitat in omni fere mari europaeo, *teſta* 5 *circiter pollices longa*, 5½ *lata, auriculis magnis decuſſatim ſtriatis, cardinis foſſula ampla profunda, valva inferiore convexa alba, ſaepius faſciis maculisve rubris varia, ſuperiore plana rubra, radiis circiter* 14.

jacobaea. 2. O. teſtae radiis quatuordecim angulatis longitudinaliter ſtriatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 522. *n.* 99.*
Liſt. Conch. t. 165. *f.* 2. *t.* 166. *f.* 3.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 2. *f.* 3. 4.
Gualt. teſt. t. 99. *f.* B.
Leſſer teſtaceoth. f. 139.
Knorr Vergn. 2. *t.* 22. *f.* 3. 5. *t.* 28. *f.* 4. *et* 6. *t.* 38. *f.* 1.
Chemn. Conch. 7. *t.* 60. *f.* 588. 589.
Habitat frequens in mari mediterraneo, *maximae affinis, teſtae ſulcis transverſim ſtriatis, valvae ſuperioris planae radiis rotundatis, non longitudinaliter, ſed transverſe ſtriatis, auriculis laeviſſimis.*

Ziczac. 3. O. teſtae radiis octodecim explanatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 523. *n.* 100.*
Liſt. Conch. t. 168. *f.* 5.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 11. *f.* 53.
Knorr Vergn. 2. *t.* 19. *f.* 3. *et t.* 20. *f.* 1.
Chemn. Conch. 7. *t.* 61. *f.* 590-592.
Habitat in Oceano americano, *teſta nunc unicolore, nunc variegata, auriculis ſubtiliter rugoſis, valvae inferioris convexae radiis* 18-20 *et ultra ſubtiliſſime transverſim ſtriatis, intus ſtriis perpendicularibus duplo pluribus; in valva ſuperiore plana lineis angularibus picta radiorum numero duplo majore.*

ſtriatula. 4. O. teſtae radiis ſedecim obliteratis transverſe membranaceo ſtriatis, margine integerrimo. *Muſ. Lud. Ulr.* 523. *n.* 101.*
Habitat in Oceano indico, *mediae magnitudinis, teſta ex purpureo alboque varia intus flaveſcente: radiorum interſtitiis albis, valva inferiore vix magis convexa, quam ſuperior.*

5. O.

Oſtreae *multae ad cardinem interius ſulcis transverſis numeroſis parallelis in utraque valva oppoſitis gaudent, probe diſtinguendae ab arcis polyleptoginglymis, quarum dentes numeroſi alternatim intrant alterius ſinus.* Pectines *exſiliunt ex aquis, aquam in dimidiam ulnae longitudinem exſpuere valent, vaſculoque aperto minus profundo retenti circumjacentia guttulis aquae inquinant, aquae immiſſi et demerſi mox valvas aperiunt, easdemque ſaepius rapide et cum ſonitu claudunt.*

minuta. 5. O. teſtae radiis viginti convexis. *Muſ. Lud. Ulr.* 524. *n.* 102.*

Habitat in Oceano indico, *avellanae magnitudine, teſta inferiore alba valde convexa, ſuperiore alba fuſco nebuloſa planiore plicata.*

Pleuronectes. 6. O. teſta aequivalvi: radiis duodecim duplicatis, extus laevi. *Muſ. Lud. Ulr.* 524. *n.* 103.*

Rumpf muſ. t. 45. *f.* A. B. Amuſium.

Argenv. Conch. t. 27. *f.* G. Umbella ſ. Solea.

Bonann. recr. 3. *f.* 354.

muſ. Kirch. 2. *f.* 108.

Petiv. amb. aq. t. 17. *f.* 14.

Gualt. teſt. t. 73. *f.* B.

Klein oſtr. t. 9. *f.* 30.

Leſſer teſtaceoth. f. 89.

Knorr Vergn. 1. *t.* 20. *f.* 3. 4.

Chemn. Conch. 7. *t.* 61. *f.* 595.

β) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 21. *f.* 6.

Habitat in Oceano indico, *teſta nunc rubella, nunc carnea, nunc hepatica, in β) aurantia rubro radiata, intus argentea, ad* $4\frac{1}{2}$ *pollices longa, utrinque hiante.*

Laurentii. 7. O. valva ſuperiore ſubconvexa laevi: lineis perpendicularibus tenerrimis ſtrias ſubtiliſſimas transverſas concentricas ſecantibus, inferioris radiis viginti quatuor, intus ſtriis quadraginta octo.

Chemn. Conch. 7. *t.* 61. *f.* 593.

Habitat rariſſima ad Americae auſtralis *littora, teſta* 2 *pollices* 8 *lineas longa, et perinde lata, valva ſuperiore ſpadicea radiis albis maculisque albidis varia, inferiore alba flavicante obumbrata: radiis paulo obſcurioribus.*

japonica. 8. O. teſta aequivalvi convexiuſcula flavo marginata: valvae ſuperioris lineis obſoletis faſcias transverſas concentricas decuſſantibus: ſtriis intus elevatis quadraginta octo.

Chemn. Conch. 7. *t.* 62. *f.* 596.

Habitat rarior ad Guineae *et* Japoniae *littora, pleuronecti affinis, at teſta craſſiore, auriculis ſubtiliter rugoſis, et infra nodo auctis, valva inferiore ochroleuca glaberrima, teſta ad* $5\frac{1}{2}$ *pollices longa et lata.*

magellanica. 9. O. teſta ſubaequivalvi glabra: ſtriis oblongis confertis.

Chemn. Conch. 7. *t.* 62. *f.* 597.

Habitat in freto magellanico, *pleuronecti affinis, teſta lateritia non radiata intus glaberrima, valva ſuperiore magis*

gis convexa, inferiore magis plana, quam in affinibus, auriculis transverſim ſtriatis.

hybrida. 10. O. teſtae radiis novem aut decem: interſtitiis longitudinaliter ſtriatis, margine intus repando.
Liſt. Conch. t. 173. *f.* 10.
Klein oſtr. t. 9. *f.* 31.
Chemn. Conch. 7. *t.* 63. *f.* 601. 602.
Habitat in mari norwegico, *teſta tenui: valva inferiore alba, ſuperiore ſanguinea, venis lineisque angularibus picta.*

Radula. 11. O. teſta ſubaequivalvi: radiis duodecim convexis; ſtriis decuſſatis crenatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 525. *n.* 105.*
Rumpf muſ. t. 44. *f.* A. Radula.
Liſt. Conch. t. 174. *f.* 11? *t.* 175. *f.* 12.
Pet. amb. aq. t. 17. *f.* 1.
Gualt. teſt. t. 74. *f.* L.
Argenv. Conch. t. 24. *f.* D.
Knorr Vergn. 5. *t.* 9. *f.* 4.
Chemn. Conch. 7. *t.* 63. *f.* 599. 600.
Habitat rarior in Oceano indico, *teſta oblonga* $3\frac{1}{4}$ *pollices longa,* $2\frac{3}{4}$ *lata, alba, vel albo fuſcoque varia, ſatis complanata, ut tamen valva inferior magis convexa ſit, auriculis rugoſis ſtriis obliquis exaratis.*

imbricata. 12. O. teſta ſubaequivalvi planiuſcula radiis novem inaequalibus imbricatim ſquamoſis.
Chemn. Conch. 7. *t.* 69. *f.* G.
Habitat in mari rubro, *radulae affinis, teſta albida purpureo maculata ad marginem pauliſper crenata, radiis alternatim majoribus.*

ſubrotunda. 13. O. teſta ſubrotunda: radiis octo convexis ſpadiceis, auriculis ſubrotundis albis: limbo luteo.
Knorr Vergn. 2. *t.* 19. *f.* 4.
Habitat - - - *teſta excolore,* $1\frac{3}{4}$ *pollicis longa,* 2 *lata.*

Plica. 14. O. teſta ſubaequivalvi: radiis ſex convexis laeviuſculis, decuſſatim ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 526. *n.* 106.*
Rumpf muſ. t. 44. *f.* O. Pallium maculatum.
Liſt. Conch. t. 171. *f.* 8.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 2. *f.* 9. 10.
Petiv. amb. aq. t. 2. *f.* 10.
Gualt. teſt. t. 74. *f.* C. C.
Argenv. Conch. t. 24. *f.* C.

Chemn.

Chemn. Conch. 7. *t.* 62. *f.* 598. a. b.
β) *Gualt. teſt. t.* 73. *f.* E?
Habitat rara in India, *teſta alba, aut alba fuſco maculata, aut rubra albo maculata* 1¾ *pollicis circiter longa,* 1 *lata, ſtriis transverſis rarioribus margine repando.*

crenata. 15. O. teſta ſubrotunda: radiis convexis; exterioribus ſecundum longitudinem ſubtiliter ſtriatis, margine profunde crenato.
Liſt. Conch. t. 170. *f.* 7.
Habitat - - - *auriculis transverſe ſtriatis.*

ſinuoſa. 16. O. teſta ovata creberrime et ſubtiliſſime ſtriata: margine intus crenato.
Liſt. an. angl. t. 5. *f.* 31.
Conch. t. 172. *f.* 9.
Habitat in mari britannico, *teſta crocea variegata.*

ſquamoſa. 17. O. teſta oblonga: radiis ſquamoſis; interſtitiis latioribus perpendiculariter ſtriatis.
Liſt. Conch. t. 184. *f.* 21.
Habitat - - - *teſta lineis angulatis maculisque varia: auriculis perpendiculariter rugoſis.*

dubia. 18. O. teſta ſubrotunda: radiis octodecim imbricato ſquamoſis.
Liſt. Conch. t. 192. *f.* 29.
Habitat - - - *teſta ultra* 1¼ *pollicis longa, auriculis transverſim ſtriatis.*

elegans. 19. O. teſtae radiis viginti laevibus: interſtitiis transverſim ſtriatis, margine repando.
Liſt. an. angl. t. 5. *f.* 30.
Habitat ad Britanniae magnae *littora, teſta* 2 *circiter pollices longa pauliſper latiore, rubente albo maculata, auriculis transverſim ſtriatis.*

verſicolor. 20. O. teſta complanata: radiis octodecim laevibus; interſtitiis cancellatis.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 2. *f.* 6.
Habitat - - - *teſta lutea, alba, thalaſſina, nigricante aut ſanguinea: auriculis transverſim ſtriatis.*

roſea. 21. O. teſta ſubrotunda: radiis quinque.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 2. *f.* 16.
Habitat - - - *mediae magnitudinis, teſta roſea radiis albis, aut viridi, ſubflavo lurido et porraceo miſta, radiis lividis.*

22. O.

fuſca. 22. O. teſta fuſca: radiis planis verſus cardinem evaneſcentibus.
Bonann. recr. 2. f. 87.
muſ. Kirch. 2. f. 86.
Klein oſtr. t. 9. f. 35.
Habitat in mari indico, *teſta intus candida; valva inferiore convexa, ſuperiore plana.*

tenuis. 23. O. teſta tenui plana purpurea: ſtriis minutiſſimis perpendicularibus circulares decuſſantibus, intus elevatis.
Gualt. teſt. t. 73. f. C.
Habitat - - - mediae magnitudinis.

lutea. 24. O. teſta tenui lutea: radiis craſſis.
Gualt. teſt. t. 73. f. D.
β) *Regenſ. Conch.* 1. *t.* 7. *f.* 4. 5?
Habitat - - - mediae magnitudinis.

muricata. 25. O. teſta ſubrotunda ex albo crocea: radiis convexis ſubtiliſſime et acutiſſime muricatis.
Gualt. teſt. t. 73. f. I.
Habitat - - - teſta $2\frac{1}{2}$ *pollices longa.*

conſperſa. 26. O. teſta ſubrotunda ſpadicea albo nigroque punctata: radiis craſſis.
Gualt. teſt. t. 73. f. O.
Habitat - - - teſta puſilla.

nodulofa. 27. O. teſta ſubrotunda fuſca: lineis transverſis punctisque nigris, radiis convexis nodoſis.
Gualt. teſt. t. 73. f. P.
Habitat - - - mediae magnitudinis.

radiata. 28. O. teſta tenui albido roſea albo virgata: radiis convexis.
Gualt. teſt. t. 73. f. Q.
Habitat - - - noduloſa paulo major.

punctata. 29. O. teſta oblonga lutea albo maculata: natibus albo fuſceque variis, radiis crenatis.
Gualt. teſt. t. 74. f. G.
Habitat - - - teſta 2 pollices longa: auriculis cancellatis.

aculeata. 30. O. teſta tenui roſeo albidoque varia ſubrotunda: radiis craſſis ſquamoſo-aculeatis.
Gualt. teſt. t. 74. f. H.
Habitat - - - punctatae magnitudine.

plana. 31. O. teſta complanata tenui candida: cardine croceo, radiis rotundis latis.

Gualt.

Gualt. teſt. t. 74. *f.* I.
Habitat - - - -

puſilla. 32. O. teſta oblonga rubra minutiſſime ſtriata.
Gualt. teſt. t. 74. *f.* AA.
Habitat - - -

flaveſcens. 33. O. teſta utrinque convexiuſcula intus flavicante: radiis convexis.
Regenſ. Conch. I. *t.* I. *f.* 8.
Habitat - - - *teſta exigua.*

Flabellum. 34. O. teſta ſubrotunda ruberrima: cardine maculisque nonnullis albis, radiis laevibus.
Regenſ. Conch. I. *t.* 9. *f.* 33.
Habitat - - - *mediae magnitudinis.*

ſpondylodes. 35. O. teſta glabra rubra.
Regenſ. Conch. I. *t.* 9. *f.* 34.
Habitat - - - *ſpondylo affinis, at auriculis aequalibus.*

violacea. 36. O. teſta utrinque planiuſcula exterius fuſca intus violacea.
Regenſ. Conch. I. *t.* II. *f.* 52.
Habitat in mari mediterraneo, *diametri pollicaris.*

aurantia. 37. O. teſta ſubrotunda plicata ſubtiliter ſecundum longitudinem ſtriata: faſcia verſus cardinem ſemicirculari alba.
Regenſ. Conch. I. *t.* II. *f.* 56.
Habitat - - -

vittata. 38. O. teſta intus purpurea, extrinſecus faſciis fuſcis rubrisque alternis varia: radiis convexis.
Regenſ. Conch. I. *t.* II. *f.* 59.
Habitat - - - *inter minores.*

miniata. 39. O. teſta alba maculis rubris confluentibus varia: radiis aſperis, valvae convexioris lamellis transverſis criſpis.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 7. *f.* I.
Habitat - - - *teſta* I *pollicem* 6 *lineas longa, et* I. *p.* 4. *l. lata.*

inflata. 70. O. teſta utrinque convexa clauſa oblonga pellucida: radiis 32.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 6. *f.* 7. 8.
Chemn. Conch. 7. *t.* 68. *f.* 649. b.
Habitat rariſſima - - - *teſta ochroleuca tenui duplo longiori quam lata.*

†† *auri-*

†† *auriculis inaequalibus: altera ſaepius intus ciliato ſpinoſa.*

Pallium. 40. O. teſta aequivalvi: radiis duodecim convexis, ſtriata ſcabra ſquamis imbricata. *Muſ. Lud. Ulr.* 526. *n.* 107.*
Rumpf muſ. t. 44. *f.* B. Pecten ſecundus.
Argenv. Conch. t. 24. *f.* I. Pallium ducale.
Liſt. Conch. t. 187. *f.* 25?
Valent. Abh. t. 16. *f.* 26.
Petiv. amb. aq. t. 17. *f.* 2.
Gualt. teſt. t. 74. *f.* F.
Seb. muſ. 3. *t.* 87. *f.* 8-12.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 6. *f.* 59.
Knorr Vergn. 2. *t.* 5. *t.* 21. *f.* 1. 2. *et t.* 27. *f.* 2.
Murray teſtaceol. t. 2. *f.* 4.
Chemn. Conch. 7. *t.* 64. *f.* 607.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 87. *f.* 17?
γ) *Knorr Vergn.* 1. *t.* 19. *f.* 2.
Habitat in India, *teſta ſolida, rubro, albo fuſcoque varia, auriculis ſtriatis, crenatis aut ſquamoſis: altera longiore, margine teſtae denticulato.*

ſanguinolenta. 41. O. teſta aequivalvi: radiis novem craſſis obtuſis: interſtitiis longitudinaliter ſtriatis nodoſis et aculeatis.
Chemn. Conch. 7. *t.* 64. *f.* 608.
Habitat in mari rubro, *pallio affinis, teſta alba ſanguineo-maculata: margine plicato crenato; limbo purpuraſcente, auricularum ſtriis transverſis nodulosis.*

maculoſa. 42. O. teſta aequivalvi lutea ſpadiceo maculata: radiis duodecim craſſis, planiuſculis, auriculis albis lateritio variis: coſtis transverſis ſquamoſis.
Knorr Vergn. 2. *t.* 19. *f.* 5.
Habitat - - -

nodoſa. 43. O. teſtae radiis novem nodoſo-veſicularibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 527. *n.* 108.*
Rondel. teſt. 25. Concha corallina.
Argenv. Conch. t. 24. *f.* F. Pecten corallinus.
Liſt. Conch. t. 186. *f.* 24.
Bonann. muſ. Kirch. 2. *f.* 138.
Rumpf muſ. t. 48. *f.* 7. 8.
Gualt. teſt. t. 99. *f.* C. D.
Seb. muſ. 3. *t.* 87. *f.* 1-5.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 4. *f.* 38.

Knorr delic. t. B. II. *f.* 5.
Vergn. 1. *t.* 5. *f.* 1. *et* 4. *t.* 13. *f.* 5.
Spengler Beſch. berl. Naturf. Fr. 2. *t.* 13. *f.* 1. 2.
Chemn. Conch. 7. *t.* 64. *f.* 609-611.
β) *Knorr Vergn.* 2. *t.* 21. *f.* 5?
γ) *Knorr Vergn.* 3. *t.* 24. *f.* 1. *et t.* 25. *f.* 1?
Habitat in Oceano africano *et* americano, *teſta nunc rubra, nunc kermeſina, nunc rubro alboque, nunc ſpadiceo alboque varia flavedine intermiſta, teſta ſuperiore magis convexa, quam inferiore: auricula intus et ſubtus ſpinoſa.*

Pes felis. 44. O. teſta radiis novem ſtriatis ſcabris: auricula altera minuta. *Muſ. Lud. Ulr.* 527. *n.* 109.*
Bonann. recr. 2. *f.* 7.
muſ. Kirch. 2. *f.* 8.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 6. *f.* 2.
Chemn. Conch. 7. *t.* 64. *f.* 612. *et t.* 65. *f.* 613.
Habitat ad Africae *littora, teſta parva, tenui, pellucida, utplurimum ſubincarnata maculata et venoſa, intus glabra, alba, radiis ſubundulatis, marginis plicis crenatis, auricularum ſtriis transverſis nodoſis.*

pellucens. 45. O. teſta ſubaequivalvi: radiis novem, laevi: fornice ſquamis cochleari-hemiſphaericis. *Muſ. Lud. Ulr.* 528. *n.* 110.*
β) *Chemn. Conch.* 7. *t.* 66. *f.* 625-627?
Habitat in mari africano, *teſta ovata minuta, pellucida, glabra, alba: valva ſuperiore rubro maculata.*

obliterata. 46. O. teſta extus laevi: radiis viginti quatuor duplicatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 525. *n.* 104.*
Chemn. Conch. 7. *t.* 66. *f.* 622-624.
Habitat rara in Oceano indico, *pleuronecti affinis, at teſta minore, ſubtiliſſime decuſſatim ſtriata, teſta inferiore dilute rubente, ad cardinem ſubflaveſcente, ſuperiore obſcure rubra, aut ſubſpadicea.*

ſanguinea. 47. O. teſta aequivalvi: radiis viginti duobus ſcabris, ſemiaurita. *Muſ. Lud. Ulr.* 528. *n.* 111.*
Liſt. Conch. t. 185. *f.* 22.
Gualt. teſt. t. 74. *f.* M?
Chemn. Conch. 7. *t.* 66 *f.* 628.
Habitat in mari mediterraneo, atlantico, americano, *teſta ſubrotunda planiuſcula ſanguinea, ſpadicea, aut kermeſina,*

ſina, ad 2 pollices longa, et 1¾ lata, radiorum interſtitiis perpendiculariter ſtriatis:

varia. 48. O. teſta aequivalvi: radiis triginta ſcabris compreſſis echinatis, uniaurita. *Muſ. Lud. Ulr.* 529. *n.* 112.*
Liſt. Conch. t. 178. *f.* 15.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 2. *f.* 5.
Gualt. teſt. t. 73. *f.* G. N. *et t.* 74. *f.* R.
Argenv. Conch. t. 24. *f.* H.
Knorr Vergn. 2. *t.* 18. *f.* 3. 5. *t.* 11. *f.* 3. *et t.* 12. *f.* 5. 6. *t.* 16. *f.* 2.
Chemn. Conch. 7. *t.* 66. *f.* 633. 634.
Habitat in mari mediterraneo, *ſanguineae affinis, at teſta colore magis varia, magis convexa, utrinque aculeata margine magis crenata, radiis pluribus magis convexis: interſtitiis profundioribus non ſtriatis, auricula altera minima duplici aculeorum ordine armata, altera rugoſo plicata, ſubtus 5-7 aculeis armata.*

Puſio. 49. O. teſta aequivalvi: radiis quadraginta filiformibus, uniaurita. *Muſ. Lud. Ulr.* 529. *n.* 113.*
Liſt. Conch. t. 181. *f.* 18. *et t.* 189. *f.* 23.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 2. *f.* 15.
Knorr Vergn. 4. *t.* 12. *f.* 2. *et* 5. *t.* 13. *f.* 2. *et t.* 28. *f.* 3.
Chemn. Conch. 7. *t.* 67. *f.* 635. 636.
Habitat in mari mediterraneo, atlantico, americano, *teſta avellanae utplurimum magnitudine, interdum duplo majore, paulo longiore, quam lata, nunc hyalina maculis rubentibus, nunc crocea rubrave maculis albis varia, auricula altera vix conſpicua, altera infra crenam acute ſpinoſa.*

glabra. 50. O. teſta aequivalvi: radiis decem laevibus planiuſculis, internis ſtriis elevatis duplicatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 530. *n.* 114.*
Bonann. muſ. Kirch. et recr. 2. *f.* 11-13.
Gualt. teſt. t. 73. *f.* H. *et t.* 74. *f.* A-D. F. Z.
Klein oſtr. t. 9. *f.* 29.
Seb. muſ 3. *t.* 87. *f.* 16.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 10. *t.* 3. *f.* 30. 31. *t.* 8. *f.* 15? *t.* 9. *f.* 28. *et t.* 11. *f.* 60.
Knorr Vergn. 1. *t.* 8. *f.* 5. 2. *t.* 10. *f.* 2. *et t.* 18. *f.* 5. *et* 5. *t.* 9. *f.* 2. *et t.* 10. *f.* 5. 6.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 6. *f.* 4.
Chemn. Conch. 7. *t.* 67. *f.* 638-645.

Habitat

Habitat in ſinu adriatico, mari mediterraneo, *et ad* Guineam, *teſta ſubrotunda 2 pollices longa et lata, rubra, flava, vel fuſca, rarius unicolore, quam maculata aut nebuloſa, interdum alba: valva ſuperiore fuſco maculata, ſulcis nonnunquam lineatis, auriculis aequalibus, margine repando.*

operculaused ris. 51. O. teſta radiis viginti ſubrotunda decuſſatim ſtriato-ſcabra, operculo convexiore. *Muſ. Lud. Ulr.* 530. *n.* 115.* *Müll. zool. dan. prodr.* 2997.
Liſt. Conch. t. 190. *f.* 27. *et t.* 191. *f.* 28.
Seba muſ. 3. *t.* 87. *f.* 15.
Knorr Vergn. 2. *t.* 3. *f.* 2? 3?
Chemn. Conch. 7. *t.* 67. *f.* 646.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 317. *t.* 9. *f.* 3.
n. Litterat. 3. *p.* 304.
β) Pecten (vigintiſulcatus) teſta aequivalvi intus et extus ſulcata fulva, maculis raris rufis, interſtitiis rugoſis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2996?
γ) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 28. *f.* 4?
Habitat in mari adriatico *et* ſeptentrionali, *teſta hiante utplurimum variegata, in* γ) *aurorae in modum tincta, ad* $2\frac{1}{4}$ *pollices longa, et* $2\frac{1}{2}$ *lata, radiis acutis, interdum rotundatis, margine repando, intus dentato, auriculis decuſſatim ſtriato-rugoſis, longiore emarginata, et ſub inciſura ſpinoſa.*

gibba. 52. O. teſta aequivalvi: radiis viginti glabris, gibba. *Muſ. Lud. Ulr.* 531. *n.* 116.*
Gualt. teſt. t. 73. *f.* F.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 11. *t.* 2. *f.* 16. 17. *t.* 5. *f.* 51. *et t.* 11. *f.* 51.
Knorr Vergn. 1. *t.* 18. *f.* 2. 2. *t.* 5. *f.* 4. *et t.* 17. *f.* 2. *et* 5. *t.* 13. *f.* 9.
Brown jam. t. 40. *f.* 10.
Chemn. Conch. 7. *t.* 65. *f.* 619. 620.
β) *Liſt. Conch. t.* 182. *f.* 19.
Habitat in mari atlantico *et* americano, *teſta utrinque convexa rubra, rarius unicolore, quam albo maculata, ſtriis longitudinalibus ſubtiliſſime crenatis notata, margine crenato, auriculis aequalibus.*

ſulcata. 53. O. teſta alba carneo-maculata: radiis glabris, fornicis 32, operculis 28.

 v. Born

v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 6. f. 5. 6.
Chemn. Conch. 7. t. 63. f. 603. 604.
Habitat ad Malabariae *littus, teſta circiter* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, et paulo latiore, margine plicato crenato, fornicis auricula emarginata ſpinoſa, operculo complanato.*

hiſtrionica. 54. O. teſta tenui complanata pellucida ſubtiliter transverſim rugoſa: radiis undecim.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 2. f. 14.
Knorr Vergn. 4. t. 12. f. 3.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. p. 97. vign. f. 6. et t. 6? f. 3.
Chemn. Conch. 7. t. 65. f. 614.
Habitat - - - teſta albo-rubro-et nigro maculata, radiis undatis, auriculis ſubaequalibus.

iſlandica. 55. O. teſta orbiculari: circulis purpureis, radiis centum. *Müll. zool. dan. prodr.* 2990.
Fabr. Fn. groenl. p. 415. *n.* 416. Pecten teſta ſuborbiculari aurita: radiis plano-convexis ſulcatis numeroſis; alternis minoribus integris, interne crocea.
It. wgoth. t. 5. f. 7.
Liſt. Conch. t. 1057. f. 4.
Gualt. teſt. t. 73. f. K.
Seb. muſ. 3. t. 87. f. 7.
Knorr delic. t. B. II. *f. 3. 4.*
Vergn. 1. t. 4. f. 1. et t. 5. f. 2. et 5. t. 15. f. 1.
Spengler Schr. berl. naturf. Geſ. 1. t. 5. f. 5.
Chemn. Conch. 7. t. 65. f. 615. 616.
Habitat in mari ſeptentrionali *varietate innumera, teſta ad* $3\frac{1}{2}$ *pollices longa et* $3\frac{1}{4}$ *lata, vix hiante, rarius exalbida, quam vivaciſſima rubedine aut flavedine tincta faſciisque transverſis ſemilunaribus ornata, operculo utplurimum elegantiore, radiis 50-100 ſquamis acutis imbricatis aſperis, margine crenato, auriculis ſtriis transverſis ſquamoſis notatis, majore emarginata ſpinoſa. Vermis incola edulis.*

triradiata. 56. O. teſta ſubaequivalvi glabra immaculata: ſtriis minutiſſimis. *Müll. zool. dan. 2. t. 60. f. 1. 2. rar. 2. p. 57. prodr.* 2991.
Habitat paſſim in variis Norwegiae ſinuum *fucis, teſta rubra maculis parvis albis varia, intus rubente, radiis in operculo tribus: incolae ovario flavicante.*

57. O.

fuci. 57. O. teſta ſubaequivalvi ſtriata maculata marginem verſus ſcabra.
Müll. zool. dan. 2. *t.* 60. *f.* 3-5. *rar.* 2. *p.* 58. *prodr.* 2994. Pecten ſtriatus.
Habitat in fuco ſaccharino, *teſta rufa albidis candidisve maculis varia, intus rubra glaberrima: maculis pellucentibus operculi radiis exſoletis, incolae ovario ſplendide rubro.*

tigerina. 58. O. teſta ſubaequivalvi ſtriata glabra rubra: maculis albidis. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 60. *f.* 6-8. *rar.* 2. *p.* 59. *prodr.* 2993.
Habitat in Oceani ſeptentrionalis fucis, *rarior, fornice profundius ſulcata, maculisque magnis undulatis confluentibus pallide luteis varia, operculo guttato, incolae ovario albo.*

ſeptemradiata. 59. O. teſta ſubaequivalvi ſtriata glabra: radiis convexis ſeptem. *Müll. zool. dan. prodr.* 2992.
Habitat in Oceano ſeptentrionali.

arata. 60. O. teſta ſubaequivalvi intus et exterius ſulcata rubea, hinc ſcabra illinc glabra. *Müll. zool. dan. prodr.* 2995.
Habitat in Oceano ſeptentrionali.

ſenatoria. 61. O. teſta utrinque convexa: radiis 22 rotundatis transverſe rugoſis; interſtitiis longitudinaliter granulatim ſtriatis.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 3. *f.* 36?
Chemn. Conch. 7. *t.* 65. *f.* 617.
Habitat in Oceano indico, *teſta* 2 *pollices* 9 *lineas longa, et pene perinde lata, extrinſecus ſpadicea violaceo alboque varia, intus violacea, ad ambitum obſcure badia.*

citrina. 62. O. teſta aurantia: radiis 22 rotundatis, margine plicato, fornice planiore.
Valent. Abh. t. 13. *f.* 1.
Chemn. Conch. 7. *t.* 65. *f.* 618.
Habitat in India, *radiis nonnullis ſquamoſis ſulcisque quibusdam granulato-lineatis.*

turgida. 63. O. teſta aequabiliter convexa: radiis 20 glabris; interſtitiis confertim transverſe rugoſis, margine plicato-dentato.
Liſt. Conch. t. 169. *f.* 6.
Chemn. Conch. 7. *t.* 65. *f.* 621. a. b.
Habitat rarior in Oceano indico *et* americano, *auriculis minimis, fornice alba, operculo ex flavicante, fuſco, albo et*

et cinereo varia, forſan ad tertiam pectinum familiam releganda.

ſulphurea. 64. O. teſta complanata tenui pellucida ſtriata: radiis plurimis fornicato-imbricatis, margine plicato-crenato.
Seb. muſ. 3. *t.* 87. *f.* 13. 18.
Chemn. Conch. 7. *t.* 66. *f.* 629.
β) Pecten aurantius. *Seb. muſ.* 3. *t.* 87. *f.* 14.
Chemn. Conch. 7. *t.* 66. *f.* 630. 631.
Habitat in mari rubro, *teſta ſulphurea fragili* 2 *circiter pollices longa, et paulo anguſtiore, fornicis radiis aequalibus, operculi alternatim minoribus; β) teſta aurantia, interdum ſanguinea; cardine aurantio, faſciaque ſemilunari alba, aut albo et dilute ſpadiceo varia: limbo ſanguineo.*

porphyrea. 65. O. teſta convexa purpurea intus alba aut ſanguinea: radiis 25 craſſis rotundatis ſquamoſis.
Chemn. Conch. 7. *t.* 66. *f.* 632.
Habitat in mari rubro, *teſta* 2 *pollices et* 3 *lineas longa, et aeque lata, maculis nonnullis albis varia.*

vitrea. 66. O. teſta hyalina margine acuta: radiis tenuiſſimis, ſquamularum arcubus concentricis.
Chemn. Conch. 7. *t.* 67. *f.* 637. a.
β) *Chemn. Conch.* 7. *t.* 67. *f.* 637. b. c.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *inter fucos et zoophyta, lentis utplurimum magnitudine, teſta levi fragili alba β) albo rubroque varia, auricula altera emarginata ſpinoſa.*

tranquebaria. 67. O. teſtae radiis viginti rotundatis: interſtitiis ſubtiliter rugoſis, margine repando.
Liſt. Conch. t. 179. *f.* 16.
Gualt. teſt. t. 73. *f.* L. M.
Knorr Vergn. 2. *t.* 4. *f.* 2. 3.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 7. *f.* 2.
Chemn. Conch. 7. *t.* 67. *f.* 647. 648.
Habitat copioſiſſima ad Tranquebar, *teſta nunc unicolore, ſaepius aurantia, nunc maculis undulatis fuſcis, rubris, rubellis, cinereisve varia, operculo magis convexo.*

ſauciata. 68. O. teſta alba purpureo maculata: radiis plurimis inaequalibus, margine crenato.
Chemn. Conch. 7. *t.* 69. *f.* H.
Habitat in mari rubro.

crenulata. 69. O. teſta oblonga: radiis ſtriisque undulatis, faſciis transverſis interruptis, margine crenulato.
Liſt. Conch. t. 175. *f.* 12. a.
Habitat - - - exigua.

innominata. 70. O. teſta ſubrotunda maculata: ſulcis profundis ſubtiliter transverſim ſtriatis, margine crenato.
Liſt. Conch. t. 175. *f.* 12. b.
Habitat - - - crenulata paulo major, auricula altera vix conſpicua.

ſubrufa. 71. O. teſta ſubrotunda ſubrufa: radiis viginti quatuor, auriculis decuſſatim ſtriatis.
Liſt. Conch. t. 180. *f.* 17.
Habitat - - - mediae magnitudinis.

ſquamata. 72. O. teſta ſubrotunda: radiis craſſis parallele ſquamoſis ad latera aculeatis.
Liſt. Conch. t. 183. *f.* 20.
Habitat - - - teſta convexa maculata.

anonyma. 73. O. teſta oblongiuſcula: radiis anguſtis ſquamoſis, interſtitiis latioribus perpendiculariter ſtriatis, auriculis perpendiculariter rugoſis.
Liſt. Conch. t. 184. *f.* 21.
Habitat - - - teſta lineis angularibus maculisque varia.

decemradiata. 74. O. teſta complanata: radiis decem laevibus explanatis inaequalibus, auriculis transverſim ſtriatis.
Liſt. Conch. t. 188. *f.* 26.
Habitat - - -

tenuis. 75. O. teſta tenui: radiis depreſſis ſquamoſis, auriculis brevibus.
Rumpf muſ. t. 44. *f.* C.
β) Regenſ. Conch. 1. *t.* 10. *f.* 45.
Habitat in India, *teſta nunc badia, nunc cinerea nigro maculata,* (*etiam in* mari ſeptentrionali) *nunc alba, nunc miniata, nunc citrina.*

Valentini. 76. O. teſtae radiis viginti, faſciis transverſis ſemilunaribus.
Valent. Abh. t. 13. *f.* 2.
Habitat in India, *maximae affinis, teſta rubra, at auriculis inaequalibus.*

media. 77. O. teſta oblongiuſcula: radiis confertis.
Gualt. teſt. t. 74. f. N. O.
Habitat - - - teſta mediae magnitudinis ex rubro crocea, vel ex piceo nigricante.

crocea. 78. O. teſta crocea; radiis ſquamoſo-muricatis alternatim minoribus.
Gualt. teſt. t. 74. f. P.
Habitat - - - parva.

florida. 79. O. teſta ſubrotunda alba: maculis roſeis.
Gualt. teſt. t. 74. f. Q.
Habitat - - - teſta parva radiata; an diſtincta ſpecies?

ochroleuca. 80. O. teſta oblongiuſcula ochroleuca: radiis altera parte laevibus, altera granulatis.
Gualt. teſt. t. 74. f. S.
Habitat - - - puſilla.

muſtelina. 81. O. teſta muſtelina: maculis faſciisque flavis, radiis laevibus, auriculis transverſim ſtriatis.
Gualt. teſt. t. 74. f. T.
Habitat - - - teſta 2¼ pollicis longa et perinde lata.

flammea. 82. O. teſta crocea oblongiuſcula ſubtiliſſime perpendiculariter ſtriata.
Gualt. teſt. t. 74. f. V.
Habitat - - - exilis.

incarnata. 83. O. teſta oblongiuſcula incarnata: faſciis rubris interruptis, radiis explanatis.
Gualt. teſt. t. 74. f. X.
Habitat - - - parva.

guttata. 84. O. teſta ſubrotunda flaveſcente rubro punctata: radiis ad cardinem inaequaliter convergentibus.
Gualt. teſt. t. 74. f. B. B.
Habitat - - - parva.

depreſſa. 85. O. teſta ochroleuca: radiis explanatis bifidis.
Gualt. teſt. t. 74. f. DD.
Habitat - - - teſta pollicem longa, et paulo latiore.

86. O.

Cuinam familiae adſcribendae, ſi quidem diſtinctae ſint, ſpecies ab Argenville *Conch. t. 24. f. A. et t. 29. f. 19. a. et zoomorph. t. 6. f. A. delineatae?*

regia. 86. O. teſta ſubrotunda ruberrima: radiis rotundatis.
Seb. muſ. 3. *t.* 87. *f.* 6.
Habitat - - - pallio affinis, at auricula fornicis profunde emarginata.

palliata. 87. O. teſta aequivalvi: radiis numeroſis laevibus.
Knorr Vergn. 1. *t.* 19. *f.* 2.
Habitat - - - pallio affinis, at teſta minus ſcabra, rarius radiata, ſtraminea: faſciis purpureis undulatis.

ſeminuda. 88. O. teſta aurantia oblonga ad medium usque ſquamoſo-muricata: radiis viginti duobus.
Knorr Vergn. 6. *t.* 9. *f.* 4.
Habitat - - - teſta 1¾ *pollicis longa,* 1¼ *lata, auriculis ſubtiliter ſquamoſis.*

modeſta. 89. O. teſta ſubrotunda cana: maculis ſubfuſcis rubellis et caeruleſcentibus, radiorum interſtitiis latis.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 5. *f.* 55.
Habitat - - - faſciis ad cardinem 2 *filiformibus.*

principalis. 90. O. teſta purpurea margine fuſca: radiis ſquamoſis a medio ad cardinem laevibus.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 63.
Habitat - - - pallio affinis.

verſicolor. 91. O. teſta variegata: radiis pectinatis laevibus.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 64.
Habitat - - - teſta 1¾ *pollicis longa, variae affinis.*

††† *valvis altero latere magis gibbis.*

flavicans. 92. O. teſta ſubaequivalvi: radiis octo ſtriatis, margine altero rotundato. *Muſ. Lud. Ulr.* 531. *n.* 117.*
Habitat in Oceano *magis* auſtrali, *teſta quaſi obliqua, alba fuſco rubroque varia, intus alba: radiis flavis, auricula altera breviſſima.*

faſciata. 93. O. teſta aequivalvi: radiis viginti ſcabris; interſtitiis ſtriatis: auriculis aequalibus exoletis. *Muſ. Lud. Ulr.* 532. *n.* 118.*
Liſt. Conch. t. 177. *f.* 14.
Gualt. teſt. t. 74. *f.* E E. *t.* 88. *f.* F F. G.
Habitat in mari atlantico *et* americano, *teſta alba pellucida; utrinque hiante intus ſubtiliter ſtriata: margine crenato.*

fragilis. 94. O. teſta aequivalvi: radiis viginti quinque, margine integerrimo, auriculis acutis.
Chemn. Conch. 7. *t.* 68. *f.* 650.
Habitat rara ad inſulas Nicobaricas, *faſciatae affinis, at teſta planiore: radiis pluribus, fragili, teni,* $1\frac{1}{4}$ *pollicis longa, et dimidio anguſtiori diſtincta.*

Lima. 95. O. teſta aequivalvi: radiis viginti duobus imbricatis; ſquamis altero margine rotundato, auriculis obliteratis. *Muſ. Lud. Ulr.* 532. *n.* 119.*
Argenv. Conch. t. 24. *f.* E. Lima.
Bonann. recr. 2. *f.* 71.
muſ. Kirch. 2. *f.* 69.
Rumpf muſ. 44. *f.* D.
Petiv. amb. aq. t. 8. *f.* 4.
Gualt. teſt. t 88. *f.* F.
Klein oſtr. t. 9. *f.* 35.
Knorr Vergn. 6. *t.* 34. *f.* 3.
Chemn. Conch. 6. *t.* 68. *f.* 651.
β) *Gualt. teſt. t.* 88. *f.* E?
Habitat in mari mediterraneo, rubro, indico, *teſta alba ad* 3 *pollices longa,* $2\frac{3}{4}$ *lata ſatis plana, radiorum numero incerto: ſquamis elatis, acutis, auriculis rugoſis.*

glacialis. 96. O. teſta aequivalvi: radiis quinquaginta imbricatis interruptis, auriculis aequalibus; altera inaequaliter plicata.
Liſt. Conch. t. 176. *f.* 13.
Klein oſtr. t. 9. *f.* 32. 33.
Knorr Vergn. 6. *t.* 38. *f.* 5.
Chemn. Conch. 7. *t.* 68. *f.* 652
β) *Chemn. Conch.* 7. *t.* 68. *f.* 653.
Habitat in Oceano americano, *limae affinis teſta nivea* 3 *pollices longa,* $2\frac{1}{4}$ *lata, at radiis longe pluribus margine crenato,* β) *integerrimo.*

hians. 97. O. teſta exalbida tenui undique hiante obliqua: radiis exoletis undulatis ſtriisque transverſis rotundatis ſemilunaribus.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 332. *t.* 9. *f.* 4.
Habitat in Norwegia, *teſta* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, ultra* $\frac{3}{4}$ *pollicis lata, auriculis exiguis acutis, margine crenato, intus integerrimo.*

excavata. 98. O. teſta ſolide alba: ſtriis longitudinalibus undulatis, annulisque paucioribus transverſis, intus laevi, uniaurita, margine integerrimo.

Chemn.

Chemn. Conch. 7. *t.* 68. *f.* 654.
Habitat rariſſima ad Norwegiae *littora, teſta* 5 *pollices longa,* 3¼ *lata.*

*** rudes, vulgo* Oſtreae *dictae.*

Malleus. 99. O. teſta aequivalvi triloba: lobis transverſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 533. *n.* 121.*
Rumpf muſ. t. 47. *f.* H. Oſtreum diviſum.
Argenv. Conch. t. 19. *f.* A. Malleus brachiatus.
Liſt. Conch. t. 219. *f.* 54.
Bonann. muſ. Kirch. 2. *f.* 120.
Petiv. amb. aq. t. 20. *f.* 10.
Gualt. teſt. t. 96. *f.* D. E.
Seb. muſ. 3. *t.* 91. *f.* 4. 5. *et t.* 93. *f.* 1. 2.
Knorr Vergn. 3. *t.* 3. *f.* 1.
Spengl. ſelt. Conch. t. 1. *f.* A.
Chemn. Conch. 8. *t.* 70. *f.* 655. 656.
Habitat rara et pretioſa in Oceani indici *et* auſtralis abyſſo, *teſta nigra, rarius glutinis ſcriniariorum more tincta, biante, cruciata,* 6 *circiter pollices longa,* 4¾ *lata, valvis lamellatis.*

Valſella. 100. O. teſta ſubpellucida anguſta elongata fragili lamellata altero fine rotundata lamellata intus laeviſſima lucida.
Chemn. Conch. 8. *t.* 70. *f.* 657.
β) *Martini allgem. Naturg.* 4. *t.* 147. *f.* 2.
Habitat in mari rubro, *teſta fragili violacea, ſpadicea aut ferruginea ad cardinem biante,* 3½ *pollices longa,* 1 *lata, extrinſecus aſpera, fine rotundato tenuiore.*

anatina. 101. O. teſta pellucida lamellata lateraliter incurva.
Spengl. catal. raiſ. t. 6. *f.* 1. 2.
Chemn. Conch. 8. *t.* 70. *f.* 658. *et t.* 71. *f.* 659.
Habitat rara ad inſulas Nicobaricas, *teſta tenui fragili, ex albo et violaceo varia, anati ſedenti aliquantum ſimili, pollicem lata, primo* 1½ *pollicem perpendiculari, tum incurva, et denuo* 1½ *pollicem longa.*

diluviana. 102. O. teſta extus plicata: margine dentibus erectis acutangulis.
Habitat - - - in Sueciae *montibus calcareis, foſſilis, magnitudine edulis et ultra, margine introrſum ad angulum cum teſta ipſa rectum erecto; dentibus quaſi ſerra exſectis exterius quaſi ex lamellis imbricatis compoſitis, margine plano ſaepe transverſim ſtriato: Valvis pectinatim plicatis;*

catis; rugis acutis: Vix videtur diſtincta hujus generis ſpecies.

Folium. 103. O. teſta ovata lateribus obtuſe plicata paraſitica. *Muſ. Lud. Ulr.* 534. *n.* 122.*
Rumpf muſ. t. 47. *f.* A. Oſtreum Cratium.
Petiv. amb. aq. t. 10. *f.* 1.
Argenv. Conch. t. 19. *f.* F.
Klein oſtr. t. 8. *f.* 22.
Knorr Vergn. 1. *t.* 23. *f.* 2.
Spengl. ſelt. Conch. t. 1. *f.* H.
Chemn. Conch. 8. *t.* 71. *f.* 662-666.
β) *Schroet. n. Litterat.* 2. *p.* 78. *t.* 1. *f.* 5. 6.
Habitat in Oceano indico, *gorgoniis non raro adhaerens, teſta ſtraminea, ſpadicea, violacea, intus argentea, cardinis loco foſſula trigona, valva ſuperiore dorſo circiter medio turgida, utrinque rugoſa et transverſim coſtata, inferiore minore planiore medio canaliculata.*

orbicularis. 104. O. teſta orbiculata plana: margine integro crenato.
Gualt teſt. t. 104. *f.* G.
Chemn. Conch. 8. *t.* 74. *f.* 680?
Habitat - - - teſta alba, magnitudine extimi articuli pollicis, margine obtuſiſſimo.

edulis. 105. O. teſta ſemiorbiculata: membranis imbricatis undulatis, valva altera plana integerrima. *Fn. ſuec.* 2149. *Muſ. Lud. Ulr.* 534. *n.* 123.* *Müll. zool. dan. prodr.* 2986.
Geſn. aq. 2. *p.* 37. Oſtrea.
Bonann. recr. 2. *p.* 108. *f.* 70. Oſtrea.
muſ. Kirch. 2. *f.* 68.
Aldr. exſang. 482. Oſtrea Rondeletii marina.
Liſt. anim. angl. p. 176. *t.* 4. *f.* 26. 27. Oſtreum vulgare maximum.
Conch. t. 202. *f.* 36. *et t.* 203. *f.* 37.
Rondel. aq. 2. *p.* 37.
Gualt. teſt. t. 102. *f.* A. B.
Ginann. adr. 2. *t.* 18. *f.* 127.
Baſter op. ſubſ. 2. *p.* 62. *t.* 8. *f.* 1. 2. 8. 9.
Argenv. zoomorph. t. 5. *f.* A.
Knorr Vergn. 3. *t.* 24. *f.* 2. *et t.* 25. *f.* 2.
Chemn. Conch. 8. *t.* 74. *f.* 682.
β) *Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 14. *f.* 3. Vetan.
Liſt. Conch. t. 193. *f.* 30. *et t.* 194. *f.* 31. Oſtrea major ſulcata, inaequaliter utrinque ad cardinem denticulata.

Klein

Klein oſtr. t. 8. *f.* 21.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 6. *f.* 9. 10.
Chemn. Conch. 8. *t.* 73. *f.* 672. 673.
γ) *Martini allgem. Naturg.* 4. *t.* 148. *f.* 3. 4.
δ) *Chemn. Conch.* 8. *t.* 71. *f.* 660?
ε) *Chemn. Conch.* 8. *t.* 71. *f.* 661?
ζ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 116. *f.* 994-996.

Habitat in Oceano europaeo *et* indico, β) *etiam ad* caput bonae ſpei, *ſcopulis affixa, aut in fundo haerens teſta intus alba glabra, interdum matris perlarum ad inſtar nitente, colore ceterum, forma et magnitudine plurimum variante, ad* 3½ *pollices longa, et* 4 *lata; incola vermis eſculenta* γ) *praeſertim ſapidiſſima.*

ſemiaurita. 106. O. teſta ovalis ſemiaurita laevi baſi obliqua. *Muſ. Lud. Ulr.* 535. *n.* 134.*
Gualt. teſt. t. 84. *f.* H.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 365. *t.* 9. *f.* 6.

Habitat in mari mediterraneo, *teſta* 1½ *pollicem longa, et* 1¼ *lata, ſordide olivacea, lineis undulatis albis nonnunquam varia tenuiſſima, valva utraque convexa in roſtrum terminata, cardinis foſſulis* 5 *rotundis.*

fornicata. 107. O. teſta rudi oblonga lineari: cardinibus divergentibus interne fornicatis. *Forsk. fn. arab. p.* 124. *n.* 61.
Chemn. Conch. 8. *t.* 71. *f.* 667. a. b.

Habitat in mari rubro, *teſta tota ſpadicea fragili membranacea, digiti longitudine, ad cardinem in roſtrum elongatum acutangulum terminata.*

ſinenſis. 108. O. teſta rudi lamellata inaequali intus glabra: valva inferiore majore excavata in roſtrum terminata: plicis decem obtuſis.
Chemn. Conch. 8. *t.* 72. *f.* 668.

Habitat ad Sinae littora, *teſta pulla, intus ad cardinem exalbida,* 4 *pollices longa,* 3 *et* 10 *lineas lata.*

ſpondyloidea. 109. O. teſta aequivalvi pellucida complanata ovali roſtrata glabra: valva ſuperiore ſtriis granulatis perpendicularibus undulatis, margine acutiſſimo.
Chemn. Conch. 8. *t.* 72. *f.* 669. 670.

Habitat in India, *teſta* 2 *lineas ultra* 3 *pollices longa et* 5. *l. ultra* 2 *p. lata alba: maculis rarioribus ſpadiceis.*

110. O.

Forskåh-lii. 110. O. teſta plicata in roſtrum elongatum incurvatum cavum terminata: coſtis intermediis, rugoſo ſpinoſo imbricatis, valva altera plana.
Chemn. Conch. 8. *t.* 72. *f.* 671. a. b. c.
Habitat in mari rubro, *teſta pollicem lata, et* 2 *cum* 3 *lineis longa, valva planiore exalbida altera ſubviolacea.*

plicatula. 111. O. teſta longitudinaliter plicata: plicis rugoſis, valva inferiore paulo minore et planiore.
Gualt. teſt. t. 104. *f.* A.
Chemn. Conch. 8. *t.* 73. *f.* 674.
Habitat in mari americano *et* mediterraneo, *formà et magnitudine varia, teſta utplurimum cinerea, violaceo intermiſto, interdum alba rubro aut caeruleſcente ſtriata.*

roſtrata. 112. O. teſta oblonga rugoſa: valva ſuperiore lamellata margine denticulata, altera excavata longitudinaliter ſulcata, roſtro prominente.
Gualt. teſt. t. 102. *f.* D.
Chemn. Conch. 8. *t.* 73. *f.* 676.
Habitat in mari mediterraneo, *valva ſuperiore ex viridi flavicante, altera violaceo alboque varia, intus cretacea.*

virginica. 113. O. teſta ſubaequivalvi craſſa rudi lamelloſa: valvae alterius roſtro prominente.
Liſt. Conch. t. 200. *f.* 34.
Chemn. Conch. 8. *t.* 73. *f.* 677.
β) *Liſt. Conch. t.* 201. 35.
Chemn. Conch. 8. *t.* 74. *f.* 678.
Habitat in Oceano americano *et* indico, *teſta ad* 9 *pollices longa, et* 4 *lata, exalbida, aut ochracea, intus nitente alba.*

Cornu copiae. 114. O. valva ſuperiore plana, inferiore excavata ſtratis, ſquamis, rugis plicisque inaequali in roſtrum elongatum terminato.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 6. *f.* 11. 12.
Chemn. Conch. 8. *t.* 74 *f.* 679.
Habitat in Oceano indico *et* africano.

paraſitica. 115. O. teſta tenui: valva inferiore convexa craſſiori; altera plana.
Rumpf muſ. t. 46. *f.* O.
Petiv. amb. aq. t. 19. *f.* XI.
Klein. oſtr. t. 8. *f.* 17.

Chemn.

Chemn. Conch. 8. *t.* 74. *f.* 681.
β) *Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 14. *f.* 1. Gaſar.
γ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 116. *f.* 997.
Habitat in mari indico *et* atlantico, *arborum littoralium praeſertim mangiferae radicibus affixa, forma et magnitudine varians, ut teſta interdum palmam virilem aequet.*

exalbida. 116. O. teſta tenui: valva ſuperiore longiore magisque convexa.
Knorr Vergn. 5. *t.* 14. *f.* 3. 4.
Habitat in mari adriatico, *aliis teſtaceis nunc gregatim nunc ſolitarie affixa, teſta ad* $1\frac{1}{2}$ *pollicem usque longa, ceterum magnitudinis formaeque variae, utplurimum exalbida, rarius flava aut violacea.*

criſtata. 117. O. teſta rugoſa imbricatim lamellata: margine obtuſe plicato dentato, apice altero producto. *v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt.* 1. *p.* 98. *t.* 7. *f.* 3.
Habitat - - - teſta pollicem et 10 *lineas lata, alba: maculis ſparſis nigris, cardinis dente medio lato conico.*

ſenegalenſis. 118. O. teſta aequivalvi ſubrotunda laevi complanata.
Adanſ. Seneg. 1. *p.* 202. *t.* 14. *f.* 5. Rojel.
Habitat ad Africae littus occidentale, *ſaxis adhaerens, teſta diametri bipollicaris ſpadicea, intus exalbida.*

ſtellata. 119. O. teſta tenui depreſſa rudi inaequali: valva ſuperiore coſtata, coſtis ſparſim ſpinoſis.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 377. *n.* 119. *t.* 9. *f.* 7. a. b.
Habitat ad Guineam, *cardine aliis corporibus affixa, teſta nunc ſubrotunda nunc oblonga, tenuiſſima, alba, radiis, virgis maculisque rubris aut caeruleſcentibus.*

ovalis. 120. O. teſta ovali tenuiſſima in roſtrum breve acutum laterale canaliculatum producta: ſtriis obſoletis perpendicularibus inaequalibus.
Schroet Einl. in Conch. 8. *p.* 378. *n.* 120. *t.* 9. *f.* 8.
Habitat - - - teſta pollicem circiter longa, fragili exalbida, intus argentea alba nitente, valva inferiore ſuperiorem longitudine et latitudine ſuperante.

papyracea. 121. O. teſta ſubrotunda nivea tenuiſſima pellucida: valva ſuperiore in roſtrum breve acutum terminata.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 378.
Habitat intrinſecus in lepadis tintinnabuli *teſta, firmiſſime adhaerens.*

annulata. 122. O. teſta aequivalvi orbiculari alba: ſemicirculis concentricis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2987.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *an diſtincta a reliquis ſpecies?*

retuſa. 123. O. teſta aequivalvi oblonga alba glabra ſtriata: umbone a cardine remoto. *Müll. zool. dan. prodr.* 2988.
Habitat in Oceano ſeptentrionali.

*** *cardinis linea perpendiculariter ſulcata.*

Perna. 124. O. teſta aequivalvi obovata inaequali: hinc rotundiore.
Liſt. Conch. t. 199. *f.* 33. *et t.* 228. *f.* 63.
Klein. oſtr. t. 8. *f.* 19. 20.
Seb. muſ. 3. *t.* 90.
Martini Beſch. berl. Naturf. 3. *t.* 7. *f.* 20. 21.
Chemn. Conch. 7. *t.* 59. *f.* 579. 580.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 351. *t.* 9 *f.* 5.
Habitat rara in Oceano indico *et* americano, *teſta ad* 2½ *pollices longa, figura pernae, alba, interdum ferruginea, lamellata, ad cardinem laevi, roſtro brevi, recto, aperto.*

Iſognomum. 125. O. teſta aequivalvi: lobo laterali majore. *Muſ. Lud. Ulr.* 533. *n.* 120.*
Rumpf muſ. t. 47. *f.* 1.
Petiv. amb. aq. t. 20. *f.* 11.
Klein oſtr. t. 8. *f.* 15.
Seb. muſ. 3. *t.* 91. *f.* 6.
Chemn. Conch. 7. *t.* 59. *f.* 584.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 91. *f.* 7.
γ) *Gualt. teſt. t.* 97. *f.* A.
Valent. Abh. t. 13. *f.* 3
Seb. muſ. 3. *t.* 91. *f.* 8.
Knorr Vergn. 4. *t.* 10. *f.* 1. 2. *et* 6. *t.* 13. *f.* 1.
Mart. Beſch. Berl. Naturf. 3. *t.* 7. *f.* 19
Chemn. Conch. 7. *t.* 59. *f.* 582.
δ) *Chemn. Conch.* 7. *t.* 59. *f.* 583.
Habitat rarior et pretioſa in Oceano indico, γ) *quoque in* auſtrali, *teſta interdum ultra* 5, γ) *ad* 7½ *pollices longa, et in medio* 1¾ *lata, nigra violaceo intermiſto, intus margaritacea, lamellata, roſtro aperto.*

Ephippium. 126. O. teſta aequivalvi orbiculata compreſſa membranacea. *Muſ. Lud. Ulr.* 525. *n.* 135.*
Liſt. Conch. t. 227. *f.* 62.

Klein

Klein oſtrac. t. 18. *f.* 18.
Seb. muſ. 3. *t.* 90. *ſer. ſac. fig.* 1. *et ult.*
Knorr Vergn. 6. *t.* 21. *f.* 1.
Martin. Beſch. berl. Naturf. 3. *t.* 7. *f.* 22.
Chemn. Conch. 7. *t.* 58. *f.* 576. 577.
Habitat rariſſima in Oceano indico *et ad* caput bonae ſpei, *teſta nigricante, ferruginea aut purpuraſcente intus margaritacea,* 5 *pollices aliquando longa, et* 5½ *lata, biante, ſubrotunda, lamellata: margine acutiſſimo.*

picta. 127. O. teſta aequivalvi tenui pellucida ad cardinem acuminata, altero fine dilatata: margine acutiſſimo.
Mart. Beſch. berl. Naturf. 3. *t.* 7. *f.* 23. 24.
Chemn. Conch. 7. *t.* 58. *f.* 575.
Habitat in mari rubro, *teſta nonnullas lineas ultra pollicem lata, duosque longa ex fuſco luteſcente: radiis dilutioribus undulatis.*

Legumen. 128. O. teſta complanata cana tenui pellucida lamellata: cardinis linea obliqua; ſulcorum interſtitiis nigris.
Chemn. Conch. 7. *t.* 59. *f.* 578.
Habitat rara ad inſulas Nicobaricas, *teſta* 4 *lineas lata, et* 2 *ultra pollicem longa, macula ad umbonem livida.*

alata. 129. O. teſta complanata fragili pellucida marginem verſus dilatata, cardinis linea obliqua in roſtrum parvum terminata.
Chemn. Conch. 7. *t.* 59. *f.* 581.
Habitat rara in Oceano americano.

mytiloides. 130. O. teſta ſubaequivalvi ovata ventricoſa recta. *Hermann Schr. berl.* Naturf. 2. *n.* 11. *p.* 271. *t.* 9. *f.* 9.
Habitat - - - foſſilis in Alſatia *prope* Gundershofen.

torta. 131. O. teſta aequivalvi intorta. *Hermann Schr. berl. Naturf.* 2. *p.* 276.
Habitat - - - foſſilis in Alſatia *prope* Gundershofen.

Pes lutrae. 132. O. teſta aequivalvi lauri cuneata: plicis ſenis obtuſis. *Mant.* 2. *p.* 547.
Gualt. teſt. t. 74. *f.* C C.
Liſt. Conch. t. 171.
Argenv. Conch. t. 27. *f.* A.
Habitat teſta ex purpuraſcente alboque varia longitudinaliter ſubtiliſſime ſtriata; an hujus tribus? an hujus etiam quadridentata, a Schroetero *Einl. in Conch.* 3. *Vorr. p.* XVI. *memorata?*

314. ANOMIA. *Animal* Corpus Ligula *emarginata ciliata: ciliis valvae ſuperiori affixis:* Brachiis 2 *linearibus corpore longioribus conniventibus porrectis, valvae alternis utrinque ciliatis: ciliis affixis valvae utrique.*

Teſta inaequivalvis: valva altera planiuſcula, altera baſi magis gibba: harum altera baſi ſaepe perforata.

Cardo cicatricula lineari prominente introrſum dente laterali; valvae vero planioris in ipſo margine.

Radii duo oſſei pro baſi animalis.

Craniolaris. 1. A teſta orbiculata: valva gibboſiore conico convexa, planiore baſi foveolis tribus.
Retz. Schr. berl. Naturf. 2. *t.* 1. *f.* 2. 3.
Chemn. Conch. 8. *t.* 76. *f.* 687. a. b.
β) *Chemn. Conch.* 8. *t.* 76. *f.* 688. *α. β.*
Habitat rariſſima in mari mediterraneo *et ad inſulas* Philippinenſes (*frequentius foſſilis*, nummulus Brattenburgenſis,) *teſta albida, vix pollicem longa, et* $\frac{3}{4}$ *lata, valva inferiore ſolidiore, intus tuberculis* 3 *laevibus inaequali.*

pectinata. 2. A. teſta oblonga ramoſo-ſulcata: gibboſiore poſterius foveolis duobus.
Chemn. Conch. 8. *t.* 76. *f.* 689. 690.
Habitat in mari mediterraneo, (*frequentius foſſilis*) *teſta exalbida, pollicem circiter longa, et* $\frac{3}{4}$ *lata, valva planiore perforata, altera ſtriis longitudinalibus aſperis, ſquamoſis, hinc inde bifidis inaequali.*

Ephippium. 3. A. teſta ſuborbiculata rugoſo-plicata planiore perforata.
Liſt. Conch. t. 204. *f.* 38.
Bonann. recr. 2. *f.* 56.

Bonann. muſ. Kirch. 2. f. 55.
Gualt. teſt. t. 97. f. B.
Ginann. adr. 2. t. 27. f. 172.
Argenv. Conch. t. 19. f. C.
Chemn. Conch. 8. t. 76. f. 692. 693.
Habitat in Oceano indico *et* americano, *teſta utplurimum alba, interdum rubella, 2 pollices longa, 2¼ lata, tenera ſublamellata.*

Cepa. 4. A. teſta obovata inaequali violacea: ſuperiore convexa, inferiore perforata.
Knorr Vergn. 6. t. 9. f. 5.
Murray teſtaceol. t. 2. f. 13.
Chemn Conch. 8. t. 76. f. 694. 695.
β?) Anomia violacea. *Dict. encyclop. p. 71. n. 4.*
Habitat frequens in mari mediterraneo, atlantico, americano, *teſta figurae variae, nucis juglandis utplurimum magnitudine, valva inferiore alba, ſuperiore ex rubeſcente caeruleſcente.*

electrica. 5. A. teſta ſubrotunda flava laevi, altera convexo gibboſa.
Rumpf muſ. t. 47. f. L. Oſtreum electricum.
Liſt. Conch. t. 205. f. 39?
Petiv. amb. aq. t. 20. f. 8.
Knorr Vergn. 5. t. 25. f. 6.
Chemn Conch. 8. t. 76. f. 691.
Habitat ad Africae littus *ſeptentrionale et occidentale, cepae affinis, at colore, teſta minore, tenera, chartae inſtar tenui, valva inferiore planiore, foramine ovali pertuſa, et minuto in cardinis regione umbone diſtincta.*

Squamula. 6. A. teſta orbiculata integerrima plana: margine altero gibba laevi. *Fn. ſuec.* 2151: *Müll. zool. dan. prodr.* 2998.
It. wgoth. 170. Patella.
Chemn. Conch. 8. t. 76. f. 696.
Habitat frequentiſſima in Oceano Europae ſeptentrionali, *aliis marinis adhaerens, minuta, valva planiori teneriori utplurimum perforata.*

 7. A.

In duo genera divulſit anomias inter foſſilia frequentiores O. Fr. Müllerus, *eas ſcilicet, quarum animal branchiis gaudet cincinnatis, et in quarum teſta valva ſuperior deorſum perforata, et cardo in altera dentibus uncinatis armatus, terebratulas, eas autem, quarum animal branchiis gaudet ſimplicibus, et in quarum teſta cardo edentulus eſt, et valva inferior perforata, anomias nuncupando.*

patelliformis. 7. A. teſta ovata convexa ſubdiaphana ſtriata: vertice poſteriori recurvo laevi. *Fn. ſuec.* 2152.* *Müll. zool. dan. prodr.* 2999.

Habitat in mari norwegico, *rarior, patellae luteae affinis, teſta albida tenera fragilis, ſtriis longitudinalibus ſubtiliſſimas transverſas decuſſantibus, roſtro obſoleto valva inferiore plana, laevi, baſi perforata.*

Scobinata. 8. A. teſta ſubrotunda laevi intus ſcabra, nate perforata.
Gualt. teſt. t. 96. *f.* A.
Chemn. Conch. 8. *t.* 78. *f.* 704?
Schroet. Journ. für Liebh. Steinr. 3. *t.* 2. *f.* 4.
Einl. in Conch. 3. *p.* 389. *t.* 9. *f.* 9.

Habitat in Pelago, *teſta tenui pellucida, alba, tenerrime ſtriata, intus argentea: margine externo glabro acuto.*

aurita. 9. A. teſta obovata ſtriata ſubaurita: nate perforata.
Gualt. teſt. t. 96. *f.* B.

Habitat in mari norwegico, *capiti ſerpentis affinis, at dorſo teſtae penitus aequabili diſtincta.*

retuſa. 10. A. teſta obovata ſtriata retuſa: convalle longitudinali, nate perforata. *Fn. ſuec.* 2153. *Müll. zool. dan. prodr.* 3000.

Habitat in Pelago norwegico, *alcyoniis adhaerens.* Pennant.

Gryphus. 11. A. teſta oblonga laevi: altera valva plica laterali obſoleta; nate incurvata altera brevi planiuſcula.
Muſ. Teſſin. p. 92. *t.* 5. *f.* 9.
Olear. muſ. 67. *t.* 33. *f.* 3.
Rumpf muſ. t. 59. *f.* B.
Liſt. an. angl. p. 238. *t.* 8. *f.* 45.
Columu. aq. p. 54. *t.* 52.
Bonan. recr. 2. *f.* 31.

Habitat - - - hactenus modo foſſilis reperta, teſta lamellata, rugoſa, magnitudinis formaeque variae.

Pecten. 12. A. teſta ſemiorbiculata depreſſa multiſtriata: valva altera plana.
Liſt. anim. angl. p. 243. *t.* 9. *f.* 49.

Habitat - - - hactenus modo foſſilis inventa, et rarius quidem, in Anglia, *teſta in regione cardinis linea transverſa notata.*

ſtriatula. 13. A. teſta ſubrotundo-dilatata utrinque gibba ſtriata: valvis aequalibus.

Habitat - - - hactenus modo inter foſſilia detecta, teſta rotundata, ſed duplo latiori, quam longa, poſterius magis gibboſa, anterius margine tenui.

truncata. 14. A. teſta ſuborbiculata obſolete ſtriata: cardine truncato. *Müll. zool. dan. prodr.* 3001.
Liſt. Conch. t. 462. *f.* 23.
an. angl. t. 9. *f.* 50.
Andreae Br. a. d. Schw. t. 1. *f.* d-g.
v. Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 6. *f.* 14.
Chemn. Conch. 8. *t.* 77. *f.* 701. α. β.
Schroet. Journ. für Liebh. Steinr. 3. *t.* 2. *f.* 5.
Habitat in maris Norwegici coralliis, *ſtriatulae affinis, at cardine recto exciſo diſtincta, teſta exalbida, latiori quam longa, ſubtiliſſime decuſſatim rugoſa convexa, intus granulata.*

reticularis. 15. A. teſta cordata decuſſatim ſtriata: valva breviore magis gibboſa.
Muſſ. Teſſ. p. 88. *t.* 5. *f.* 5.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis, teſtae lateribus prominulis compreſſis, natis planioris valva parum prominente.

plicatella. 16. A. teſta dilatato-lunata plicata: ſulcis longitudinaliter ſtriatis, media latiore.
Habitat - - - hactenus tantummodo foſſilis praecipue in Helvetia, *teſtae lateribus ſubmucronatis, plicis longitudinalibus, natum ſuperiore admodum prominente.*

criſpa. 17. A. teſta dilatato-triangulari plicata: ſulcis rugoſis, media latiore.
Muſ. Teſſ. t. 5. *f.* 7.
Liſt. anim. angl. t. 9. *f.* 56.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis reperta in Anglia, Helvetia, Eifalia, *teſtae fere lunatae ſulcis 5-6 rugis arcuatis transverſis, lateribus ſubmucronatis, natum ſuperiore prominente.*

lacunoſa. 18. A. teſta ſubrotunda multiſulcata: valvis apice plicatis, altera breviore lacunoſa, apice quadridentata.
Muſ. Teſſin. t. 5. *f.* 6.
Columm. de purp. c. 15. *p.* 35. Concha altera anomia ſtriata trilobos.
Liſt. an. angl. p. 249. *t.* 9. *f.* 57.
Grew. muſ. t. 19. *f.* 6.

Klein oſtr. t. 11. *f.* 57.
Habitat - - - modo foſſilis.

pubeſcens. 19. A. teſta obovata ſulcata: vulva altera nate ad cardinem dehiſcente apertura.
Müll. zool. dan. prodr. 3007? Terebratula teſta tomentoſa ſubquinquangulari longitudinaliter ſtriata.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 397. *t.* 9. *f.* 10. a. b.
Habitat in Oceani Norwegici zoophytis, *teſta alba parva, magnitudine vix ſeminis cucumeris, ſubaequivalvi, pilis breviſſimis erectis diſtantibus, an forſan a ſpongiae ſpecie adhaerente? hirta, non retuſa, nec plicata, cardinis inſtar longitudinaliter ſulcata: Valv. alterius natis poſterius prominens alteram valvam verſus foramen offert.* Zoega.

farcta. 20. A. teſta ſubrotunda multiſulcata: valvis convexis apice octodentatis.
Habitat - - - hactenus modo inter foſſilia deprehenſa in Helvetia, Weſtphalia, *teſta nonnunquam fere globoſa.*

Caput ſerpentis. 21. A. teſta obovata ſtriata tomentoſa: valva altera nate longiori perforata. *Fn. ſuec.* 2154.
Gründler Naturf. 2. *t.* 3. *f.* 1-6.
Andreae Br. a. d. Schweiz t. 1. *f.* c.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 6. *f.* 13.
Schroet. Abh. Naturg. 2. *t.* 5. *f.* 8. a. b. *et f.* 9. a. b.
Chemn. Conch. 8. *t.* 78. *f.* 712.
Habitat in maris norwegici abyſſo *madreporae proliferae ut plurimum adhaerens, teſta alba, longitudinaliter et parumper transverſe ſtriata, anterius compreſſa, fragili: margine crenulato, cardine utrinque ad latus prominente in utraque valva dente armato; valva ſuperiore poſterius prominente et utrinque longiore, anterius declinata, medio ſulco exarata, apice perforato ligamento affixa coralliis aliisve zoophytis; valva inferiore rotundata, anterius retuſa.*

Terebratula. 22. A. teſta obovata laevi convexa: valva altera triplicata, altera biplicata. *Fn. ſuec.* 2155.
Columm. purp. c. 12. *f.* 1. *p.* 32.
Liſt. anim. angl. p. 240. *t.* 8. *f.* 46?
Klein. oſtr. t. 11. *f.* 74.
Habitat - - - hactenus modo ſed copioſiſſime foſſilis reperta, nate alterius valvae prominente pertuſa.

angulata. 23. A. teſta baſi laterum compreſſe anterius plicata: medio tridentato.
Muſ. Teſſ. p. 96. t. 5. f. 4.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis, teſtae ceterum laevis antrorſum plicis numero variis.

Hyſterita. 24. A. teſta dilatata laevi convexa ſtriata ſubtriloba anterius depreſſa: margine acuto.
Muſ. Teſſin. p. 90. t. 5. f. 1-3.
Wolf. Haſſ. ſubterr. t. 3. f. 3-5.
Worm. muſ. t. 83.
Habitat - - - hactenus tantummodo inter foſſilia reperta in Haſſia, et vicinis Moguntini electoratus *terris, magnitudine et quodammodo etiam figura varians, teſta laevi, rarius, et tunc quidem ſubtiliſſime, ſtriata, valva altera breviore medio quam maxime convexa, ad latera depreſſa, altera longiore plana vulvae faciem referente in roſtrum longiuſculum terminata.*

biloba. 25. A. teſta biloba aequali ſtriata.
Habitat - - - modo foſſilis. Pennant.

Placenta. 26. A. teſta orbiculata plana pellucida: cardinum callis linearibus binis teſtae interne adnatis. *Muſ. Lud. Ulr. 536. n. 126.**
Liſt. Conch. t. 225. f. 60. et t. 226. f. 61.
Seb. muſ. 3. t. 90 fig. var.
Knorr Vergn. 2. t. 24. f. 1.
Chemn. Conch. 8. t. 79. f. 716.
Habitat frequens in Oceano indico, *teſta 5 pollices longa lataque, et adhuc majore, alba, intus nitente argentea, tenera, pellucida, tenui, fragili, ſtriis ſubtiliſſimis longitudinalibus rugas transverſas arcuatas decuſſantibus, valva ſuperiore penitus complanata.*

Sella. 27. A. teſta ſubquadrangula convexa arctiſſime clauſa aenea margine repanda.
Bonann. muſ. Kirch. 2. f. 135?
Seb. muſ. 3. t. 90. fig. med.
Knorr Vergn. 4. t. 18. f. 2. et 5. t. 29. f. 1.
Chemn. Conch. 8. t. 79. f. 714.
β) Sella minor, altera valva alba.
Rumpf muſ. t. 47. f. B.
Petiv. amb. aq. t. 20. f. 3.
Gualt. teſt. t. 104. f. B.

Seb. muſ. 3. *t.* 90. *f. plur.*
Habitat in Oceano indico, *placentae proxime affinis, teſta lamellata intus nitente nonnunquam ultra* 7 *pollices longa lataque, radiis nonnullis dilute ſpadiceis, ſtriisque innumeris longitudinalibus, ad marginem iridis coloribus ludente, cardinis callis* 2 *ad umbonem convergentibus.*

ſpinoſa. 29. A. teſta ſpinis longitudine teſtae.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis reperta in Anglia. Solander.

aculeata. 30. A. teſta ſubrotunda aculeata: vertice laevi poſterius recurvo. *Müll. zool. dan. prodr.* 3005.
Chemn. Conch. 8. *t.* 77. *f.* 702.
Habitat in maris Norwegici fucis *et* zoophytis, *valva inferiori plana, laevi ad verticem perforata.*

muricata. 31. A. teſta hyalina ventricoſa: vertice dextrorſum flexo, valva ſuperiore longitudinaliter ſtriata: ſtriis in ſquamas ſpinasque cavas deſinentibus.
Chemn. Conch. 8. *p.* 65. *vign.* 13. *f.* A. B.
β) *Chemn. Conch.* 8. *p.* 65. *vign.* 13. *f.* C. D.
Habitat ad Guineam, *teſta nivea, in β*) *majore minusque convexa, valva inferiore plana tenuiſſima; foraminis ambitu elevato; dente laterali.*

ſquama. 32. A. teſta oblonga margine rotundata: valva altera plana, tenera laevi; apicis foramine amplo ovato, altera convexiuſcula longitudinaliter ſtriata.
Chemn. Conch. 8. *t.* 77. *f.* 697.
Habitat in mari Norwegico, *ſquamula major, teſta fragili, valva plana aliis corporibus adhaerente.*

punctata. 33. A. teſta orbiculata hyalina tenui punctata: valva planiore apice perforata: punctis exterius impreſſis.
Chemn. Conch. 8. *t.* 77. *f.* 698.
Habitat ad inſulam Feroe, *teſta exigua fragili, punctis in valva convexa extrinſecus elevatis.*

undulata. 34. A. teſtae margine crenato, valva planiore tenuiſſima laevi: foramine ovali amplo pertuſa, convexae ſtriis transverſis arcuatis longitudinales undulatas decuſſantibus.
Müll. zool. dan. prodr. 3003? Anomia teſta ſubovata pellucida, ſupra ſtriis transverſis undulatis.
Chemn. Conch. 8. *t.* 77. *f.* 699.

Habitat

Habitat in mari ſeptentrionali *et* mediterraneo; *teſta interdum rubella.*

capenſis. 35. A. teſta longitudinaliter ſtriata ſubtruncata margine rotundato crenata; valvae planioris coſta infra biſpinoſa.
Chemn. Conch. 8. *t.* 77. *f.* 703. a. b. c.
Habitat ad caput bonae ſpei, *teſta nunc rubella, nunc alba.*

detruncata. 36. A. teſta truncata orbiculata longitudinaliter ſtriata: valva planiore coſtis intus tribus, altera intus longitudinaliter ſtriata ſepto medio bipartita.
Gualt. teſt. t. 96. *f.* C.
Chemn. Conch. 8. *t.* 78. *f.* 705. a. b. c. d.
Habitat in mari mediterraneo, *coralliis adhaerens, teſta parva: vertice perforato.*

ſanguinolenta. 37. A. teſta cornea laevi utrinque convexa: valva ſuperiore emarginata ad latera radiata; dorſo elevato ſanguineo, apiceque prominente perforato.
Chemn Conch. 8. *t.* 78. *f.* 706.
Habitat in India, *teſta pellucida.*

vitrea. 38. A. teſta ovata ventricoſa hyalina tenuiſſima: cardinis praeter dentes laterales in valva inferiore radiis duobus oſſeis, valvae ſuperioris apice prominente perforato.
Argenv. zoomorph. t. 12. *f.* E.
Knorr Vergn. 4. *t.* 30. *f.* 4.
Walch Naturf. 3. *t.* 3. *f.* 5.
Andr. Br. v. d. Schw. t. 2. *f.* 2. b.
Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. p. 116. *vign.*
Spengl. catal. raiſ. t. 4. *f.* 1. 2.
Schroet. Journ. 3. *t.* 2. *f.* 1.
Chemn. Conch. 8. *t.* 78. *f.* 707-709.
Habitat rarior in mari mediterraneo, *teſta intus nitente,* 1½ *pollicem circiter longa, et ultra pollicem lata.*

Cranium. 39. A. teſta laevi ventricoſa transverſim ſubtiliter ſtriata.
Müll. zool. dan. prodr. 3006. Terebratula Cranium.
Schroet. Journ. 3. *t.* 2. *f.* 2.
Habitat in mari Norwegico, *teſta* ¾ *pollicis lata, et paulo longiori, planiore et breviore, quam in vitrea tenuiſſima, ſub epidermide ſordide fuſceſcente nivea pellucida, ſtriis ſubtiliſſimis transverſis in valva longiore apice perforata alias ſubtiliſſimas undulatas confertas decuſſantibus.*

dorſata. 40. A. teſta cordata ſolida annulis rugisque arcuatis transverſis ſtriis ſulcisque longitudinalibus inaequali, valvae convexae apice perforato dorſoque elevato.
Günther Naturf. 3. *t.* 3. *f.* 1-3.
Chemn. Conch. 8. *t.* 78. *f.* 710. 711.
Habitat in freto magellanico, *frequentius foſſilis, teſta cinerea: margine repando cinereo.*

pſittacea. 41. A. teſta cornea ſubtiliſſime longitudinaliter ſtriata: valva breviore gibba, longioris complanatae apice incurvato perforato; foramine triangulari.
Liſt. Conch. t. 211. *f.* 46.
Argenv. Conch. t. 23. *f.* O.
Klein oſtr. t. 12. *f.* 84. 85.
Spengl. cat. raiſ. t. 4. *f.* 8.
Chemn. Conch. 8. *t.* 78. *f.* 713. a. b. c.
Habitat rariſſima in mari Groenlandiam *alluente, teſta ſatis magna pellucida: margine acuto laevi angulato.*

tridentata. 42. A. teſta flaveſcente pellucida tenui ſubtiliſſime transverſim ſtriata tricuſpide: cuſpidibus tubuloſis, valvis connatis.
Forsk. Fn. arab. p. 124. *n.* 63.
Chemn. Conch. 8. *p.* 65. *vign.* 13. *f.* a. b. c. d. F. G.
Habitat rarior in mari mediterraneo, *plicis in latere ampliore ſulcisque quatuor longitudinalibus, vertice obtuſo ſemiorbiculato.*

ſpondylodes. 43. A. teſta ovali antiquata: roſtro obtuſo canaliculato.
Liſt. Conch. t. 211. *f.* 45.
Klein oſtr. t. 12. *f.* 82. 83.
Habitat - - -

ventricoſa. 44. A. teſta ſubovata ſolida, roſtro canaliculato.
Schroet. Journ. 2. *t.* 2. *f.* 3.
Habitat - - - *madreporae proliferae adhaerens, an vitreae affinis, teſta ſordide ochroleuca, apicis foramine amplo, altero latere longiore.*

gryphoides. 45. A. teſta ovali laevi ſolida opaca: valvae majoris roſtro rectiuſculo obtuſo truncato.

Schroet.

An diſtinctae hujus generis ſpecies, quas Bonanni *recr.* 2. *f.* 50. *et muſ. Kirch.* 2. *f.* 49. *et ea, quam* Martini *Berlin. Samml.* 3. *t.* 5. *f.* 12. *delineatas dedere? Nonne huc referenda etiam protypa* peridiolithorum, *in Eifalia potiſſimum obviorum?*

Schroet. Journ. 4. *t.* 2. *f.* 8.
Habitat - - - *grypho affinis, teſta exalbida.*

fleXuoſa. 46. A. teſta tenuiſſima lamellata: medio ſellae inſtar excavato, valva ſuperiore plana, inferiore verticem verſus convexa: foramine orbiculari infra verticem perforata.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 418. *t.* 9. *f.* 11.
Habitat in mari norwegico, *madreporae proliferae adhaerens, teſta quaſi infumata, valvae inferioris parte convexa argentea.*

rugoſa. 47. A. teſta obovata: valva ſuperiore plurimam partem convexa confertim ſubtiliſſime rugoſa, inferioris tenuiſſimae laevis foramine reniformi.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 419. *t.* 9. *f.* 12.
Habitat in mari norwegico, *madreporae proliferae affixa, teſta exalbida: margine acutiſſimo.*

cylindrica. 48. A. teſta tenuiſſima cylindrica extrorſum anguſtata: valva ſuperiore gibba, inferiori excavata.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 419. *t.* 9. *f.* 13.
Habitat in mari norwegico, *echini cidaridis aculeis adhaerens.*

Nucleus. 49. A. teſta glabra ovali longitudinaliter ſulcata.
Müll. zool. dan. prodr. 3008. Terebratula Nucleus.
Habitat in mari norwegico.

avenacea. 50. A. teſta pyriformi verſus cardines protracta ſubcompreſſa.
Müll. zool. dan. prodr. 3004.
Habitat in Oceano ſeptentrionali.

ſandalium. 51. A. teſta turbinata dorſo plana cavitate ſtriata, operculo plano hemiſphaerico. *Mart.* 2. *p.* 547.
Habitat - - - *inter foſſilia modo, potiſſimum Eifaliae reperta, madreporae turbinatae quodammodo figura teſta ſolida craſſa, magnitudine extimi pollicis, operculo concentrice ſtriato.*

315. MYTILUS. *Animal* Aſcidia?

Teſta bivalvis, rudis, ſaepius affixa byſſo, utplurimum craſſiori.

Cardo (in plurimis) edentulus, diſtinctus, (paucis exceptis) linea ſubulata excavata longitudinali.

* Paraſitici, *unguibus affixis*.

Criſta galli. 1. M. teſta plicata ſpinoſa: labro utroque ſcabro. *Muſ. Lud. Ulr.* 537. *n.* 128.
Rumpf muſ. t. 47. *f.* D. Oſtreum plicatum minus.
Argenv. Conch. t. 20. *f.* D. Auris porci ſ. Criſta galli.
Pet. aq. amb. t. 20. *f.* 2.
Gualt. teſt. t. 104. *f.* E.
Knorr del. t. B. IV. *f.* 8.
Vergn. 4. *t.* 10. *f.* 3-5. 5. *t.* 16. *f.* 1. *et t.* 17. *f.* 1-3.
Chemn. Conch. 8. *t.* 75. *f.* 683. 684.
β) *Gualt. teſt. t.* 104. *f.* D.
Chemn. Conch. 8. *t.* 73. *f.* 675.
γ) *Davil. catal. ſyſtem.* 1. *p.* 288. *t.* 19. *f.* 10?
δ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 116. *f.* 998.
Habitat gregaria in Oceani indici, β) maris rubri, *potiſſimum gorgoniis, teſta ex purpura ſubviolacea, dilute cinnamomea, vel badia punctis elevatis aſpera intus glabra mellea, ſubaequivalvi, clauſa, plicis acutis* 5-8-10 *obliquis vel rectis, foveola ad cardinem trigona.*

Hyotis. 2. M. teſta plicata imbricata ſquamis compreſſis patulis, labro utroque laevi. *Muſ. Lud. Ulr.* 548. *n.* 129.*
Gualt. teſt. t. 103. *f.* A.
Argenv. zoomorph. t. 12. *f.* F.
Chemn. Conch. 8. *t.* 75. *f.* 685.
Habitat rarior in pelagi gorgoniis, *teſta rugoſa ſordida ex vireſcente lutea, lamellata, plicis huc illuc curvatis, nucleis cavis canaliculatis obſeſſis.*

Frons. 3. M. teſta plicata laeviuſcula: labro altero ſcabro. *Muſ. Lud. Ulr.* 537. *n.* 127.*
Argenv. Conch. t. 19. *f.* D. Cratium ſ. Folium.

Liſt.

Liſt. Conch. t. 197. *f.* 32. *t.* 198. *f.* 32. a?
Gualt. teſt. t. 104. *f.* C.
Knorr Vergn. 4. *t.* 8. *f.* 3.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. p. 121. *vign. f.* b.
Chemn. Conch. 8. *t.* 75. *f.* 686.
Habitat in Oceani americani gorgoniis, *teſta rubella, caeruleſcente, fuſca, utplurimum ovali, margine utrinque plicato, denticulato, valva inferiore glabra medio canaliculata, ſuperiore ad marginem punctis elevatis ſcabra: coſta media elevata.*

** Plani *ſ. compreſſi ut plani appareant et ſubauriti.*

margaritiferus. 4. M. teſta compreſſo plana ſuborbiculata baſi transverſa imbricata tunicis dentatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 538. *n.* 130.*
Imper. hiſt. nat. 905. Concha margaritifera.
Rumpf muſ. t. 47. *f.* F. Matrix perlarum.
Argenv. Conch. t. 20. *f.* A. Gallina guttata.
Liſt. Conch. t. 221. *f.* 56. *t.* 223. *f.* 57. *et t.* 224. *f.* 58.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 2. *f.* 1.
Petiv. amb. aq. t. 20. *f.* 4. 7.
Gualt. teſt. t. 84. *f.* E. F. G.
Knorr Vergn. 2. *t.* 25. *f.* 1-3. *et* 4. *t.* 18. *f.* 1.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. p. 121. *vign. f.* a.
Chemn. Conch. 8. *t.* 8. *f.* 717-721. a. b.
Habitat in Oceano indico *et* americano, *teſta ſolida, ad* 8 *pollices longa et adhuc latiori, intus margaritacea (hinc matrix perlarum potiſſimum) exterius nunc unicolore, praeſertim ſmaragdina, nunc ſpadicea, aut perſici florum: ad inſtar tincta radiis albis, vel albida radiis viridibus: juniorum teſta altera altero latere aurita, uti pecten, cardine rectiſſimo, longitudine totius teſtae; ex ligamento cardinis androdamas, ex verme incola teſtaque laeſa uniones.*

Unguis. 5. M. teſta ſubrotunda longitudinaliter ſtriata pellucida ſubaurita. *Muſ. Lud. Ulr.* 539. *n.* 131.*
Habitat in mari mediterraneo, *teſta tenerrima hyalina, ſubtiliſſime perpendiculariter ſtriata, magnitudine unguis humani; nonne ad oſtreas pertinet?*

*** *ventricoſiuſculi.*

lithophagus. 6. M. teſta cylindrica utrinque extremitatibus rotundatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 539. *n.* 132.*
Rondel. aq. 2. *p.* 49. Pholas.

Rumpf muſ. t. 46. *f.* F. Pholas.
Argenv. Conch. t. 26. *f.* K. Dactylus.
zoomorph. t. 7. *f.* 5.
Jonſt. exſang. t. 15. *f.* 18. 19.
Liſt. Conch. t. 427. *f.* 268. *et t.* 437. *f. alt.*
Bonann. recr. 2. *f.* 27-29?
muſ. Kirch. 2. *f.* 27. 28?
Petiv. amb. aq. t. 19. *f.* 13.
Gualt. teſt. t. 90. *f.* D.
Leſſer teſtaceoth. f. 132.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 7. *f.* 4.
Chemn. Conch. 8. *t.* 82. *f.* 729. 730.

β) Mytilus cinnamomeus. *Chemn. Conch.* 8. *t.* 82. *f.* 732.

Habitat in mari mediterraneo, indico, americano, *in coralliis teſtaceis, ſaxis ſaepe duriſſimis foveas pro habitaculo excavans laeviſſimas, teſta nonnunquam pollicem lata et ultra* 3 *longa, maris mediterranei fragili, indici coriacea, ſtriis transverſis arcuatis exarata, nigra, badia aut vireſcente, intus opalino-caeruleſcente, albido-argentea, aut margaritacea.*

rugoſus. 7. M. teſta rhomboideo-ovali rugoſa obtuſa antiquata. *Müll. zool. dan. prodr.* 3011.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 429. *t.* 9. *f.* 14. a. b.
Habitat in Norwegiae lacuſtribus *ad* oſtia maris, *teſta magnitudine vix ultimi articuli minimi digiti, ovali: utroque tamen fine obtuſiſſima, colore triſti cano, intus dimidiato caeruleo et albo, ſtriis ſubtiliſſimis longitudinalibus rugas transverſas conſertas decuſſantibus.*

bilocularis. 8. M. teſta caerulea ſtriata: umbonibus fornicatis, diſſepimento albo. *Muſ. Lud. Ulr.* 540. *n.* 133.*
Spengl. catal. raiſ. t. 6. *f.* 3 5.
Chemn. Conch. 8. *t.* 82. *f.* 736. α. β. *f.* 737. 1-3.
Habitat rarus ad inſulas Nicobaricas, *teſta ovata anterius plana medioque excavata et foramine ovali hiante, poſterius convexa, epidermide viridi tecta.*

exuſtus. 9. M. teſta ſtriata: ventre angulato, margine crenato. *Muſ. Lud. Ulr.* 540. *n.* 134.*

Liſt.

Mytili *paraſitici potiori jure oſtreis accenſendi, quibuſcum cardinis quoque foveola conveniunt; an ad hanc mytilorum tribum etiam ſpectant tanquam diſtinctae ſpecies conchae ab* Argenvill. *conch. t.* 20. *f.* C. *et altera f.* H. *et a* Knorrio *Vergn.* 1. *t.* 29. *f.* 2. *delineatae?*

Liſt. Conch. t. 365. *f.* 205.
Chemn. Conch. 8. *t.* 84. *f.* 754.
Habitat in Oceano americano *et* mari rubro, *teſta* 1½ *pollicem longa, ferruginea, albida flavicante, aut fuſca, intus caeruleſcente, dentibus ad latera cardinis* 4-5.

barbatus. 10. M. teſta laeviuſcula ferruginea exterius apice barbata. *Fn. ſuec.* 2157. *Müll. zool. dan. prodr.* 3012.
Ginann. adr. 2. *p.* 36. *t.* 27. *f.* 169. Muſculus obſcurus piloſus.
Gualt. teſt. t. 91. *f.* H. 2?
Chemn. Conch. 8. *t.* 84. *f.* 749.
Habitat in mari mediterraneo, norwegico, *lithophytis adhaerens, teſta ad* ¾ *pollicis longa, ſub epidermide ferruginea ex rubello caerulea aut albida.*

edulis. 11. M. teſta laeviuſcula violacea: valvis anterius ſubcarinatis poſterius retuſis, natibus acuminatis. *Fn. ſuec.* 2156. *Muſ. Lud. Ulr.* 541. *n.* 135.* *It. oel.* 43. *It. wgoth.* 170. *Müll. zool. dan. prodr.* 3013. *Brünn. ſpol. mar. adr. p.* 108. O. *Fabr. Fn. groenl. p.* 417. *n.* 417.
Geſn. aq. 277. Mytulus.
Bell. aq. 397. Mytulus.
Mery act. par. 1711. *t.* 3. *f.* 4. 5.
Rondel. aq. 2. *p.* 46.
Aldrov. exſang. 512.
Liſt. Conch. t. 362. *f.* 200.
anim. angl. t. 4. *f.* 28.
Bonann. recr. 2. *f.* 30.
muſ. Kirch. 2. *f.* 29.
Ginann. adr. 2. *p.* 36. *t.* 23. *f.* 168.
Baſt. op. ſubſ. 3. *p.* 101. *t.* 11. *f.* 9-11.
Heyda anat. mytal. 1683. 8.
Argenv. zoomorph. t. 5. *f.* D. E. F.
Knorr Vergn. 1. *t.* 4. *f.* 5. 6. 4. *t.* 15. *f.* 1. *et* 5. *t.* 25. *f.* 1.
Regenſ. 1. *t.* 7. *f.* 8. *t.* 11. *f.* 58. *et t.* 12. *f.* 71. 72.
Chemn. Conch. 8. *t.* 84. *f.* 750. 751. 755.
β) *Liſt. Conch. t.* 362. *f.* 201.
γ) *Liſt. Conch. t.* 362. *f.* 202.
δ) *Liſt. Conch. t.* 363. *f.* 204.
ε) *Gualt. teſt. t.* 7. *f.* A?

Habitat

Huc referendi quoque lithophago affines, truncatus, cordatus, curvirostris et donacinus, a Schroetero *Einl. in Conch.* 3. *Vorr. p.* XV. XVI. *memorati.*

Habitat in mari caſpio, balthico, mediterraneo, oceano europaeo *et* indico, *intra tropicos utplurimum maximus, intra arcticum minimus, teſta ſubtrigona ſub epidermide ſubfuſca aut vireſcente nitidiſſime violacea, rarius fuſca, flavicante, aut radiata, ad* 3½ *pollices longa, pinnae more byſſo exſerendo inſtructa; incola plebejis edulis, concoctu difficillimus, etiam cepis additis, certis anni temporibus, an ab aſteria ophiuro comeſto? venenatus.*

ungulatus. 12. M. teſta laevi ſubcurvata: margine poſteriori inflexo, cardine terminali bidentato. *Muſ. Lud. Ulr.* 541. *n.* 136.*

Liſt. Conch. t. 360. *f.* 199. *et t.* 364. *f.* 203?

Gualt. teſt. t. 91. *f.* E.

Regenſ. Conch. I. *t.* 4. *f.* 47.

Chemn. Conch. 8. *t.* 84. *f.* 756.

β) *Chemn. Conch.* 8. *t.* 84. *f.* 747.

Habitat in mari mediterraneo *et ad* caput bonae ſpei, β) *ad* novam Seelandiam, *eduli affinis, ſed teſta majore ultra* 5 *pollices longa, et* 2½ *lata, viridi, caeruleſcente, aut virore intermiſto nigra, annulata natibus diſtantibus acutis, cardinis apice dentibus* 6 *ſulco crenis ad* 100 *notato, valvis valde convexis pecorum ungulas referentibus.*

bidens. 13. M. teſta ſtriata ſubcurvata: margine poſteriori inflexo, cardine terminali bidentato.

Liſt. Conch. t. 356. *f.* 193. *t.* 358. *f.* 196. *et? t.* 366. *f.* 206.

Klein oſtr. t. 9. *f.* 24.

Knorr Vergn. 4. *t.* 30. *f.* 3. 5. *t.* 13. *f.* 6? *et* 6. *t.* 4. *f.* 3.

Chemn. Conch. 8. *t.* 83. *f.* 742. 743.

Habitat in mari mediterraneo, aethiopico, atlantico, freto magellanico, *angulato affinis, pollicis transverſi magnitudine, at teſta longitudinaliter ſtriata, ſub epidermide cinerea, fuſca, caerulea aut nigra pulcerrime tincta.*

Modiolus. 14. M. teſta laevi: margine anteriori carinato, natibus gibbis, cardine ſublaterali. *Muſ. Lud. Ulr.* 542. *n.* 137.* *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 53. *f.* 1-5. *rar.* 2. *p.* 3-6. *prodr.* 3014.

Argenv. Conch. t. 22. *f.* C. Muſculus papuanus.

Adanſ. Seneg. I. *t.* 15. *f.* I. Lulat.

Liſt. Conch. t. 356. *f.* 195. *et t.* 359. *f.* 198.

Rumpf muſ. t. 46. *f.* B. C? E?

Petiv. amb. aq. t. 19. *f.* 2? 10. 12?

Gualt. teſt. t. 91. *f.* H. I.

Klein oſtr. t. 9. *f.* 25. *et? t.* 11. *f.* 67.

Knorr Vergn. 4. *t.* 15. *f.* 3.

Chemn.

Chemn. Conch. 8. *t.* 85. *f.* 757-760.
β) *Liſt. Conch. t.* 356. *f.* 194.
Klein oſtr. t. 12. *f.* 78. 79.
γ) *Liſt. Conch. t.* 1057. *f.* 5.
Habitat in mari mediterraneo, oceano ſeptentrionali, indico, americano, *fucis, teſtaceis, zoophytis adhaerens, teſta ad* ½ *pedem longa, et* 2¼ *pollicem lata, ſub epidermide nigra, cinerea aut fulva, caeruleſcente aut admiſto candore caerulea, aut alba vel flavicante radiis rubris, aut dimidiato ſpadicea et alba, umbonibus tumidis oblongis, natibus retrorſum prominentibus, vulvae regione recurvato ſtriata, parte poſteriore ultra nates protuberante, cardine ante nates cartilagineo, incola ipſo rubro et aurantio eduli.*

cygneus. 15. M. teſta ovata anterius compreſſiuſcula fragiliſſima, cardine laterali.
Müll. verm. terr. et fluviat. 2. *p.* 208. *n.* 394. *zool. dan. prodr.* 3010. Mytilus teſta ovata antice convexa natibus integris.
Liſt. Conch. t. 156. *f.* 11.
an. angl. app. p. 146. *t.* 2. *f.* 29.
Gualt. teſt. t. 7. *f.* F.
Argenv. Conch. 1. *t.* 24. *n.* 10. *f.* 5. 6. 7. 11.
zoomorph. t. 8. *f.* 12.
Schroet. Fluſconch. t. 3. *f.* 1.
Chemn. Conch. 8. *t.* 85. *f.* 762.
β) Mytilus (radiatus) teſta ovali antice compreſſiuſcula poſtice radiata. *Müll. hiſt. verm. terr. et fluv.* 2. *p.* 209. *n.* 395.
Liſt. Conch. t. 155. *f.* 10.
Ginann. adriat. 2. *p.* 51. *t.* 3. *f.* 15.
γ) *Liſt. Conch. t.* 150. *f.* 5?
Habitat frequens in Europae lacubus *et ad* fluviorum oſtia, *teſta a* 12 *lineis ad* 6 *pollices lata, et a* 20 *lineis ad* 3½ *pollices longa hiante ſub epidermide transverſim rugoſa ſaepe nitida, anterius interdum ochroleuca: radiis viridibus, intus alba opaca natibus minutis retroverſis, conniventibus.*

anatinus. 16. M. teſta ovali compreſſiuſcula fragiliſſima margine membranaceo, natibus decorticatis. *Fn. ſuec.* 2158.
Müll. hiſt. verm. terr. et fluv. 2. *p.* 207. *n.* 393 *zool. dan. prodr.* 3009. Mytilus teſta ovali antice compreſſa, natibus decorticatis.

 Liſt.

Liſt. Conch. t. 153. *f.* 8.
Klein oſtr. t. 9. *f.* 26.
Gualt. teſt. t. 7. *f.* E.
Argenv. Conch. 1. *t.* 24. *n.* 10. *f.* 1. 2.
zoomorph. t. 8. *f.* 8. 11.
Rondel. piſc. p. 214.
Geſn. aq. p. 281.
Petiv. gazoph. t. 93. *f.* 8. 9.
Schroet. Flusconch. t. 1. *f.* 2. 3.
Chemn. Conch. 8. *t.* 86. *f.* 763.
β) *Liſt. Conch. t.* 154. *f.* 9.
γ) *Liſt. Conch. t.* 151. *f.* 6?
Habitat in Europae aquis dulcibus, *frequentius in ſtagnantibus, a mya pictorum fragilitate et cardine diſtinctiſſimus, mytilo cygneo ſimilior, an vere diſtinctus? anatum cibus, teſta tenerrima pellucidâ, 8-30 lineas lata, 11-54 longa, utrinque rotundata, virideſcente nitida, ſtriis apertura parallelis ſubtiliſſimis ſtrigisque paucis nigricantibus notata, intus glabra, nitida, albâ, caerulea, vel caeruleſcente, luteoque varia, et iridis coloribus micante.*

viridis. 17. M. teſta laevi ovata membranacea pellucida, cardine terminali. *Muſ. Lud. Ulr.* 542. *n.* 138.*
Habitat in Oceano meridionali, *teſta viridi, tenerrima, ungue minori.*

ruber. 18. M. teſta rugoſa: valvis obliquis anterius dilatatis, margine cardinali apicem aequante. *Muſ. Lud. Ulr.* 543. *n.* 139.*
Habitat in Oceano magis auſtrali, *teſta rubra, minuta, convexa: cardinis dente breviſſimo compreſſo.*

albus. 19. M. teſta transverſim ſtriata, natibus gibbis, cardine laterali. *Molin. hiſt. natur. Chil. p.* 177.
Habitat frequens ad littus Chilenſe, *teſta 6 circiter pollices longa, et ad $3\frac{1}{2}$ lata ſub caerulea epidermide nivea caeruleo tincta, verme incola albo ſapidiſſimo.*

ater. 20. M. teſta ſulcata poſterius ſquamoſa. *Molin. hiſt. natur. Chil. p.* 177.
Habitat ad littus Chilenſe, *albo minor, teſta pinnae more aſpera, obſcure caerulea, incola nigro non eduli.*

diſcors. 21. M. teſta ovali cornea ſubdiaphana anterius longitudinaliter poſterius transverſaliter ſtriata. *Müll. zool. dan. prodr.* 3014. *O. Fabr. Fn. groenl.* 418.

Her

Hermann Naturf. 17. *t.* 3. *f.* 5-8.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. p. 121. *vign.*
Chemn. Naturf. 10. *t.* 1. *f.* 8.
Conch. 8. *t.* 86. *f.* 764-768.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 444. *t.* 9. *f.* 15.
Habitat in Oceano ſeptentrionali *et* auſtrali, *ſcopulis byſſi interventu affixa, anatum cibus, teſta* $2\frac{1}{2}$-22 *lineas longa,* $1\frac{2}{3}$-$13\frac{1}{2}$ *lata, cornea, plurimam partem fuſca, viredine potiſſimum ad marginem intermiſta, intus caeruleſcente cum rubore aut ex viridi albicante, in* 3 *quaſi areas diviſa, quarum media ſtrias vix conſpicuas transverſas aut nullas habet; incolae non edulis, pes albus, labia fulva, branchiae et aperturae anteriores brunneae, dorſum fuſcum.*

Hirundo. 22. M. teſta laevi: valvis bilobis; lobo cardinali longiore tenuioreque. *Muſ. Lud. Ulr.* 543. *n.* 140.*
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 15. *f.* 6. Chanon.
Rumpf muſ. t. 46. *f.* G. Avicula.
Argenv. Conch. t. 19. *f.* B. Avicula ſ. Hirundo.
Liſt. Conch. t. 220. *f.* 55. *et t.* 224. *f.* 59.
Bonann. recr. 2. *f.* 58.
muſ. Kirch. 2. *f.* 57.
Petiv. aq. amb. t. 19. *f.* 9.
Gualt. teſt. t. 94. *f.* B.
Klein oſtr. t. 8. *f.* 13. *et t.* 9. *f.* 38.
Knorr delic. t. B. IV. *f.* 7.
Vergn. 4. *t.* 8. *f.* 5. *et* 5. *t.* 10. *f.* 1. 2.
Chemn. Conch. 8. *t.* 81. *f.* 722-725.
β) *Chemn. Conch.* 8. *t.* 81. *f.* 726.
γ) *Chemn. Conch.* 8. *t.* 81. *f.* 727.
δ) *Gualt. teſt. t.* 94. *f.* A?
Knorr Vergn. 6. *t.* 2.
Chemn. Conch. 8. *t.* 81. *f.* 728.
ε) *Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 15. *f.* 7. Eſſan.
ζ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 171. *f.* 1672.
Habitat in Oceano indico, americano, atlantico, mediterraneo, *teſta magnitudine, craſſitie, forma, colore, pictura varia, ſubtiliſſime et confertim transverſe rugoſa, intus margaritacea, baſi contracta.*

pholadis. 23. M. teſta oblonga anterius obtuſiore rudi transverſaliter rugoſa. *Mant.* 2. *p.* 548. *It. wgoth. t.* 5. *f.* 22. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 11. *t.* 87. *f.* 1-3.
Chemn. Conch. 8. *t.* 82. *f.* 735.

Habitat in Oceano ſeptentrionali, *in coralliis et ſaxis pholadis more habitaculum ſibi excavans, teſta magnitudine fabae ½ pollicem longa, 1¼ lata, vix utroque fine clauſili, inconſpicua, cardine edentulo, aut denticulo obſoleto.*

ſtriatulus. 24. M. teſta ſubtiliſſime ſtriata: cardine terminali unidentato.
Mant. 2. *p.* 548.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 7. *f.* 5?
Chemn. Conch. 8. *t.* 83. *f.* 744. a? b?
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 449. *t.* 9. *f.* 16.
Habitat in Oceano ſeptentrionali *et* indico, *teſta* 1¼ *pollicem longa, et* ½ *lata, formae ſemilunatae, qua potiſſimum ab exuſto diſcrepat, anterius dilatata, ſubdiaphana ſpadicea: margine extrorſum ſubtiliſſime crenato.*

vulgaris. 25. M. teſta altero latere planiuſcula inflexa: natibus incurvis convergentibus, cardine unidentato.
Chemn. Conch. 8. *t.* 82. *f.* 732.
Habitat frequens in Oceano americano, *teſta intus dilute margaritacea: epidermide fuſca.*

plicatus. 26. M. teſta rhombea inaequilatera tenuiſſima transverſim ſtriata rugoſaque, natibus incurvis poſterioribus.
Chemn. Conch. 8. *t.* 82. *f.* 733.
Habitat ad inſulas Nicobaricas, *teſta hyalina, fragiliſſima, intus dilute argentea, altero latere rotundata, altero dilatata anguloſa.*

niveus. 27. M. teſta ovata ſubdiaphana ſubtiliſſime longitudinaliter ſtriata: margine acuto, cardine bidentato.
Chemn. Conch. 8. *t.* 82. *f.* 734.
Habitat rariſſimus ad inſulas Nicobaricas, *teſta nivea, intus glaberrima.*

afer. 28. M. teſta ſubtrigona anterius dilatata poſterius planiuſcula hiante: natibus acuminatis retrorſum verſis, margine acutiſſimo.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 7. *f.* 6. 7.
Knorr Vergn. 4. *t.* 15. *f.* 5?
Chemn. Conch. 8. *t.* 83. *f.* 739-741.
Habitat in maris mediterranei auſtralioribus, *et ad* Africae littus, *teſta ad* 4 *pollices longa, et* 2 *lata, intus ochroleuca iridis coloribus varia, exterius ſtraminea, aut ex virente et flavicante miſta lineisque angularibus rubellis picta; an myae Pernae varietas?*

29. M.

ſmaragdinus. 29. M. teſta ſubtrigona planiuſcula: cardine in altera valva bidentato, in altera unidentato.
Chemn. Conch. 8. *t.* 83. *f.* 745.
β) Chemn. Conch. 8. *t.* 84. *f.* 746.
Habitat ad Tranquebariae littora, *teſta viridi intus ſubmargaritacea, β) ad* Guineam *habitans, teſta fuſca, margine, interdum quoque maculis diſci viridibus.*

verſicolor. 30. M. teſta ſubtrigona planiuſcula: cardine unidentato, margine glabro acutiſſimo.
Argenv. Conch. t. 22. *f.* Q.
Chemn. Conch. 8. *t.* 84. *f.* 748.
Habitat in Guineae *littore, afro affinis, teſta ad* 3 *pollices longa et ultra* 2 *lata, ſub epidermide fuſca, ſtriis tranſverſis confertis faſciisque* 2 *obſcure viridibus, utrisque arcuatis notata ex violaceo, albo et ſpadiceo varia; an ad myam pernam referendus?*

coralliophagus. 31. M. teſta medio carinata margine crenata: umbone obtuſo.
Chemn. Conch. 8. *t.* 84. *f.* 752.
Habitat in Oceano indico *et* americano, *corallifero, ſcopulos pholadis inſtar perforans, teſta* ¾ *pollicis circiter longa.*

lineatus. 32. M. teſta trigona extrorſum dilatata: lineis angulatis decuſſantibus et confluentibus, cardine bidentato.
Chemn. Conch. 8. *t.* 84. *f.* 753.
Habitat - - - *teſta minuta ex flavo ſordide vireſcente, intus dilute argentea.*

Faba. 33. M. teſta ovali rufa ſtriata: margine crenulato. *Müll. zool. dan. prodr.* 3015. *O. Fabr. Fn. groenl.* 419.
Chemn. Conch. 8. *t.* 85. *f.* 761.
Habitat in maris Groenlandiam *alluentis ſcopulis, byſſo aeneo ſe affigens, anatis hiemalis et hiſtrionicae cibus, teſta inflata ſemipellucida, laevigata, ſub epidermide rufa alba, intus glaberrima, margaritacea.*

fluviatilis. 34. M. teſta tenui ſubcuneata intus rubeſcente: natibus recurvis magnis.
Liſt. Conch. t. 157. *f.* 12.
Habitat in Europae aquis dulcibus, *anatino affinis, an vere diſtincta hujus generis ſpecies?*

fuſcus. 35. M. teſta oblonga anguſta ſubtiliter transverſim ſtriata, altero latere emarginata, altero rotundata: natibus prominulis curvis.

Liſt. Conch. t. 359. *f.* 197.
Habitat - - - *teſta minuta, fuſca.*

mammarius. 36. M. teſta lata brevi retrorſum rotundata: natibus mammarum inſtar protuberantibus.
Liſt. Conch. t. 361. *f.* 199. b.
Klein oſtr. p. 129. *t.* 9. *f.* 27.
Habitat - - -

perſicus. 37. M. teſta lata ſub cortice aſpero rugoſo luteo intus lactea.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 2. *f.* 17.
Habitat in mari Perſico, *teſta duplo latiori, quam longa.*

pictus. 38. M. teſta lata laeviſſima flammea vel roſea albo faſciata: natibus obtuſis.
Bonann. recr. 2. *f.* 35.
muſ. Kirch. 2. *f.* 34.
Habitat in mari Luſitanico, *teſta triplo latiore, quam longa.*

undatus. 39. M. teſta lata utrinque rotundata vinoſa: ſtriis undulatis vireſcentibus et caeruleſcentibus, margine ſerrato.
Bonann. recr. 2. *f.* 36.
muſ. Kirch. 2. *f.* 35.
Habitat in mari Luſitanico, *teſta, quam picti, longiore.*

faſciatus. 40. M. teſta pellucida nitente caeruleſcente: faſcia vinoſa et carnea.
Bonann recr. 3. *f.* 352.
muſ. Kirch 2. *f.* 106.
Habitat in mari Braſiliam *alluente, teſta ſemipalmam lata, at dimidio breviore.*

purpureus. 41. M. teſta poſterius rotundata dilutius incarnata intus purpurea: margine denticulato.
Bonann. recr. 3. *f.* 384.
muſ. Kirch. 2. *f.* 116.
Habitat frequens in Braſiliae *littore.*

ſaxatilis. 42. M. teſta auriformi exterius rugoſa granulata: margine barbato, externo dilatato rotundato.
Rumpf muſ. t. 46. *f.* D.
Habitat ad Amboinam, *ſcopulis praeſertim durioribus affixus, anatum ſuumque cibus, articulo digiti latior, ſed brevior.*

43. M.

argenteus. 43. M. teſta transverſim ſtriata utrinque rotundata fuſca intus argentea, natibus rotundatis.
Gualt. teſt. t. 7. *f.* D.
Habitat - - -

fulgidus. 44. M. teſta anguſtata nitente aurorea ad latera violaceo-maculata: natibus rotundatis dilatatis.
Argenv. Conch. t. 22. *f.* D.
Habitat in freto magellanico, *teſta matris perlarum inſtar nitida.*

azureus. 45. M. teſta gibba azurea ſubtus flavicanti ſtriata: natibus obtuſis.
Argenv. Conch. t. 22. *f.* H.
Habitat - - - *teſta pollicem circiter lata*, 1¾ *longa: margine inferiori anguſtato.*

murinus. 46. M. teſta murina violaceo maculata margine lato rotundato roſea: natibus acuminatis rectis.
Argenv. Conch. t. 22. *f.* K.
Regenſ. Conch. I. *t.* 9. *f.* 32.
Habitat ad Guineam.

teſtaceus. 47. M. teſta elongata anguſtata ſub epidermide teſtacea nitente ex argenteo, caeruleo, rubello, flavo, fuſcoque varia.
Knorr Vergn. 4. *t.* 15. *f.* 4.
Habitat - - - *modiolo affinis, at teſta majore et pulchriore.*

virgatus. 48. M. teſta extrorſum dilatata ex viridi flava: virgis roſeis, natibus obtuſis curvis.
Knorr Vergn. 4. *t.* 4. *f.* 2.
Habitat - - - *rubro affinis.*

cordatus. 49. M. teſta oblonga tenuiſſima alba obſolete ſtriata poſterius hiante: hiatu cordato.
Spengl. Beſch. berl. naturf. Geſ. 2. *t.* 9. A. *f.* 3-5.
Catal. raiſ. t. 5. *f.* 13-17. *coll. f.* 12.
Martini Beſch. berl. naturf. Geſ. 2. *t.* 12. *f.* 1.
β) Heart muſcle. *Mart. univ. Conch.* 2. *t.* 77.

Ggg ggg ggg g 4 *Habitat*

An diſtinctae a reliquis ſpecies, quas Liſterus Conch. *t.* 1055. *f.* 9. *et t.* 357. *f.* 195. b. *et ex eo Klein oſtr. t.* 12. *f.* 76. 77. *ſiſtit? an a* Müllero *zool. dan. prodr.* 3016. memoratus mytilus teſta ovata, oblonga planiuſcula?

Habitat in Oceano *potiſſimum* indico, β) auſtrali, *coralliis et teſtaceis adhaerens, nonnunquam inhaerens, cardine omnino mytili; an diſtinctum genus?*

ſtagnalis. 50. M. teſta ovali planiuſcula transverſim coſtata.
Schroet. Fluſconch. t. 1. f. 1.
Habitat in Schwanſee, *ſtagno* ducatus Iſenacenſis, *cygneo affinis, at teſta longe majore ad* 8 *pollices lata, et* 4½ *longa, minusque convexa, vireſcente radiis obſcurius viridibus picta et marginem verſus ex luteo fuſca diſtinctus.*

zellenſis. 51. M. teſta ovali convexa poſterius rotundata anterius elongata et obtuſe acuminata, natibus exoletis.
Schroet. Fluſconch. t. 2. f. 1.
Habitat in foſſa, *moenia* urbis Cellenſis *circumdante, cygneo affinis, at teſta majore, 7 pollices lata, 3 longa, ex vireſcente flava.*

roſeus. 52. M. teſta ſuborbiculata: ſulcis 15 triangularibus criſtatis et dentibus triangularibus alternis.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 14. *f.* 4. Bajet.
Habitat ad Africae littus occidentale, *teſta roſea intus alba ad marginem purpurea, 3 pollices lata, et paulo breviore; an hujus generis et tribus?*

puniceus. 53. M. teſta gibba acuminata: ſulcis quindecim, margine dentato.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 15. *f.* 2. Aber.
Habitat ad Africae littus occidentale, *teſta* 14 *lineas longa et dimidio anguſtiori, ſub epidermide fulva violacea aut punicea, interdum fuſco viridique intermiſto; cardinis dentibus 4 minimis.*

niger. 54. M. teſta complanata tenui ſubtiliſſime ſulcata ſub epidermide nigra nitidiſſime lactea.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 15. *f.* 3. Dotel.
Habitat ad Africae *mediae littus occidentale, teſta tenerrima ſesquipollicem longa ſulcis circiter* 100 *exarata, cardinis dente* 1-2 *minimis.*

laeviga-tus. 55. M. teſta complanata laevi ſub epidermide craſſa fulva roſea: margine integerrimo.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 15. *f.* 4. Fonet.
Habitat in Africae littore occidentali, *teſta* 2½ *pollicem longa et dimidio anguſtiore intus margaritacea, epidermidi interdum virore intermiſto, cardinis dentibus* 2-3.

56. M.

dubius. 56. M. teſta transverſim rugoſa, utrinque obtuſa fulva intus margaritacea: natibus exoletis, cardine edentulo.
Adanſ Seneg. 1. *t.* 17. *f.* 21. Mutal.
Habitat in Africae mediae aquis dulcibus, *teſta ad* 5 *pollices lata*, 2 *longa*, *an hujus generis?*

polymorphus. 57. M. teſta quinqueloculari: valvis carinatis latere incumbente planiuſculis, natibus acutis deorſum inflexis. *Pall. it.* 1. *app. n.* 85.
Habitat in mari *nuclei pruni magnitudine*, *quadruplo major in* aquis dulcibus Ruſſiae, *glomeratim penicillis radiatis lapidibus et teſtaceis adhaerens*, *teſta ſubfuſca*, *loculorum diſſepimentis breviſſimis.*

Canaliculus. 58 M. teſta laeviuſcula brunnea intus verſicolore, ſcrobiculo cardinis canaliculato. *Martyn. univerſ. conchol.* 2. *t.* 78.
Habitat ad novam Seelandiam.

316. PINNA. *Animal* Limax.

Teſta ſubbivalvis fragilis erecta hians, emittens barbam byſſinam.

Cardo edentulus coalitis in unam valvis.

rudis. 1. P. teſta ſulcata: ſquamis fornicatis per ſeries digeſtis. *Muſ. Lud. Ulr.* 544. *n.* 41.*
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 15. *f.* 5. Apan.
Liſt. Conch. t. 373. *f.* 214.
Ginann. adr. 2. *t.* 25. *f.* 166.
Gualt. teſt. t. 79. *f.* C.
Chemn. Conch. 8. *t.* 88. *f.* 773.
β) *Rumpf muſ. t.* 46. *f.* 11. Pinna lata.
Pet. amb. aq. t. 19. *f.* 6.
Gualt. teſt. t. 81. *f.* A.
Chemn. Conch. 8. *t.* 88. *f.* 774.
Habitat rarior in Oceano americano *et* atlantico, β) *in* indico *et* mari rubro, *teſta* 12-16 *pollices longa*, $4\frac{1}{4}$-8 *lata*, *rubra ſulcis* 6-8 *exarata*, β) *nigra ſulcis vix conſpicuis.*

pectinata. 2. P. teſta dimidia longitudinaliter ſtriata: latere altero transverſe ſubrugoſo. *Gualt. teſt. t.* 79. *f.* A.

Argenv. zoomorph. t. 5. *f.* N?
Chemn. Conch. 8. *t.* 87. *f.* 770. *
β) *Chemn. Conch.* 8. *t.* 87. *f.* 771.
Habitat in Oceano indico, *teſta triangulari cornea*, 3 *pollices longa*, *et* 4 *lata*, β) *minore*, *tenuiore*, *rariore*, 4 *pollices et* 5 *lineas longa*, 2 *p. et* 5 *lineas lata.*

nobilis. 3. P. teſta ſtriata: ſquamis canaliculato-tubuloſis ſubimbricatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 544. *n.* 142.
Bonann. recr. 2. *f.* 24.
muſ. Kirch. 2. *f.* 26.
Gualt. teſt. t. 78. *f.* B.
Seb. muſ. 3. *t.* 91. *f.* 3.
Knorr. del. t. B. V. *f.* 3.
Vergn. 2. *t.* 26. *f.* 1.
Chemn. Conch. 8. *t.* 89. *f.* 775. 776.
β) *Liſt. Conch. t.* 372. *f.* 213?
Chemn. Conch. 8. *t.* 89. *f.* 777.
γ) *Knorr Vergn.* 2. *t.* 26. *f.* 2.
Chemn. Conch. 8. *t.* 92. *f.* 785.
δ) *Argenv. Conch. t.* 22. *f.* F.
Chemn. Conch. 8. *t.* 86. *f.* 769.
Habitat in mari mediterraneo, adriatico, americano, *teſta ſubfuſca*, *margine externo rotundata*, 7½ *pollices longa*, *et* 3¾ *lata*, *ſquamis extrorſum majoribus ad* ½ *pollicem longis*, *rectis: valvarum parte dimidia coſtata*, *altera transverſim rugoſa: rugis partem latiorem verſus ſtrias decuſſantibus. Tendo graecis in deliciis.*

muricata. 4. P. teſta ſtriata: ſquamis concavis ovatis acutis. *Muſ. Lud. Ulr.* 545. *n.* 143.*
Haſſelq. it. 447. *n.* 137. Concha Pinna.
Liſt. Conch. t. 370. *f.* 210. Pinna tenuis ſtriata muricata.
Rumpf muſ. t. 46. *f.* M. Pinna lata altera.
Pet. amb. aq. t. 19. *f.* 14.
Gualt. teſt. t. 79. *f.* D.
Seb. muſ. 3. *t.* 92. *ſer.* 1. *f. prim. et ult.*
Knorr Vergn. 6. *t.* 20. *f.* 1.
Chemn. Conch. 8. *t.* 91. *f.* 781.

Habitat

Byſſus, quam pinnae largiter praebent, ſerici inſtar operibus textilibus in Italia meridionali inſervit, ſerico adhuc potior, eo quod tinctura non egeat pinnae *ipſae erectae in ſinubus potiſſimum tranquillis maris paulo calidioris utplurimum gregatim habitant, neque a ſepia vexatae, neque a cancro adverſus hoſtem defenſae, caro vermis incolae multis delicioſa.*

Habitat in Oceano indico, *teſta tenui, pellucida, cornea, ultra* 5 *pollices longa, et* 3 *fere lata: ſtriis alternis echinatis.*

rotundata. 5. P. teſta ſquamis obſoletis: margine rotundata. *Muſ. Lud. Ulr.* 545. *n.* 144.*
Gualt. teſt. t. 80. *f.* A. B.
Seb. muſ. 3. *t.* 91. *f.* 1.
Chemn. Conch. 8. *t.* 93. *f.* 79.
Habitat in maris mediterranei *ſinubus tranquillis, teſta oblonga, albida, non raro ultra* 2 *pedes longa: rugis perpendicularibus undulatis, parallelis, ſquamis in latiori parte ſubtiliſſimis concavis, acutis, rarioribus.*

ſquamoſa. 6. P. teſta ſquamis ſubtiliſſimis undulatis rugisque flexuoſis latis: infra acuminata nuda.
Liſt. Conch. t. 374. *f.* 215.
Gualt. teſt t. 78. *f.* A.
Argenv. Conch. t. 22. *f.* B.
Chemn. Conch. 8. *t.* 92. *f.* 784.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta* 13 *fere pollices longa et* 6½ *lata, infra albida, ſupra ſubſpadicea, margine externo angulato.*

carnea. 7. P. teſta tenui carnea nuda longitudinaliter ſulcata: margine externo acuto ſubrotundato.
Knorr Vergn. 2. *t.* 23. *f.* 1.
Habitat - - - maculis interdum albis varia.

ſaccata. 8. P. teſta laevi ſaccata erectiuſcula ſubfaſtigiata. *Muſ. Lud. Ulr.* 546. *n.* 145.*
Rumpf muſ. t. 46. *f.* N. Pinna alba.
Petiv. amb. aq. t. 19. *f.* 7.
Liſt. Conch. t. 370. *f.* 211? *et t.* 371. *f.* 212?
Gualt. teſt. t. 79. *f.* F.
Chemn. Conch. 8. *t.* 90. *f.* 779?
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 481. *t.* 9. *f.* 17.
Habitat rariſſima in mari mediterraneo *et* indico, *teſta tenui inferius albida, ſuperne rubella,* 5¾ *pollices longa,* 2¾ *lata, ſuperius plana margine rotundata, inferius gibba, ſquamis nuda, ſtriis* 10. *extrorſum lateſcentibus longitudinalibus.*

digitiformis. 9. P. teſta laevi tubuloſa digitiformi incurva margine ſummo membranacea. *Muſ. Lud. Ulr.* 546. *n.* 146.*

Habitat

Habitat in Oceano indico, *teſta planiuſcula, oblonga, pellucida.*

lobata. 10. P. teſta nuda lobata. *Muſ. Lud. Ulr.* 547. *n.* 147.*
Habitat in Oceano indico, *teſta ſtraminea, ſtriis purpureis picta, membranacea, dum valvae explicantur, obcordata: lobis lateralibus rotundatis latioribus, a cardine ad lobos nervus; a nervo lineae laterales ductae.*

vitrea. 11. P. teſta hyalina longitudinaliter ſubundulatim ſtriata: ſtriis rarius ſquamatis ſtrias ad marginem transverſas decuſſantibus.
Gualt. teſt. t. 78. *f.* C. *et t.* 79. *f.* E.
Chemn. Conch. 8. *t.* 87. *f.* 772.
Habitat rariſſima in Oceano indico.

incurva. 12. P. teſta anguſtata elongata nuda carinata: rugis transverſis undulatis.
Bonann. recr. 2. *f.* 23.
muſ. Kirch. 2. *f.* 25.
Rumpf muſ. t. 46. *f.* I. K.
Petiv. amb. aq. t. 19. *f.* 4. 5.
Klein oſtr. t. 11. *f.* 71.
Chemn. Conch. 8. *t.* 90. *f.* 778.
Habitat in Oceano indico, *teſta ſpectabili, dilute cornea, ad cardinem curvata, ſtriis paucis longitudinalibus notata.*

bicolor. 13. P. teſta tenui ad marginem lateralem inflexa flavicante: radiis ex atro ſubfuſcis, ſtriis paucis longitudinalibus.
Chemn. Conch. 8. *t.* 90. *f.* 780.
Habitat rarior in mari rubro, *teſta cornea elongata, ſtriis ad marginem curvatum nonnullis transverſis arcuatis, margine ſupremo rotundato.*

exuſta. 14. P. teſta planiuſcula cornea nigricante radiata maculata et nebuloſa: ſtriis multis laevibus, paucioribus ſpinoſis: ſquamis canaliculatis.
Seb. muſ. 3. *t.* 91. *f.* 2.
Chemn. Conch. 8. *t.* 91. *f.* 782.
Habitat rarior in Oceano indico auſtrali.

Vexillum. 15. P. teſta truncata extrorſum: dilatata nuda cornea hinc inde nigro nebuloſa anterius longitudinaliter ſtriata, poſterius transverſim rugoſa.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 7. *f.* 8.
Chemn. Conch. 8. *t.* 91. *f.* 783.

Habitat

Habitat rariſſima in India, *teſta quaſi alata, margine laterali curvo.*

papyracea. 16. P. teſta tenuiſſima cornea fragili longitudinaliter coſtata: margine extremo ſubrotundato.
Chemn. Conch. 8. *t.* 93. *f.* 786.
Habitat in Oceano indico, *dorſo coſtarum rarius ſquamato, in teſtae medio macula ex violaceo ſubfuſca, et ad marginem lateralem rugis nonnullis transverſis.*

ſanguinea. 17. P. teſta planiuſcula ſubincurva ſanguinea: ſtriis perpendicularibus raris laevibus.
Gualt. teſt. t. 79. *f.* B.
Habitat - - - teſta 3 *pollices longa; an diſtincta ſpecies?*

bullata. 18. P. teſta rectiſſima tenui perpendiculariter ſtriata: rugis ad marginem inferiorem transverſis ſpinoſis.
Gualt. teſt. t. 79. *f.* C.
Habitat - - - an diſtincta a reliquis ſpecies?

317. ARGONAUTA. *Animal* Sepia, *aut* Clio. *Teſta* univalvis ſpiralis involuta membranacea unilocularis.

Argo. 1. A. carina utrinque ſubdentata. *Muſ. Lud. Ulr.* 548. *n.* 148.*
Bellon. aq. t. 380. Nautilus.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 1. *f.* 13. Nautilus ſ. Naupilius.
Rumpf muſ. t. 18. *f.* 1. 4. A. B. Nautilus tenuis.
Gualt. teſt. t. 11. *f.* A. B. *et t.* 12. *f.* A. B. C. Cymbium.
Olear. muſ. p. 66. *t.* 32. *f.* 4. Nautilus.
Teſſin epiſt. 1. *n.* 28. Cymbium
Klein oſtr. t. 1. *f.* 3. Nautilus ſulcatus.
Argenv. Conch. t. 5. *f.* A. B. C. Nautilus papyraceus.
zoomorph. t. 2. *f.* 2. 3.
Liſt. Conch. t. 554. 555.
Lochn. muſ. Besler t. 19.
Muſ. Gottwald. t. 40. *f.* 272-274.
Leſſer teſtaceoth. t. 1. *n.* 6.
Seb. muſ. 3. *t.* 84. *f.* 4-12.
Ginann. adr. 2. *t.* 3. *f.* 29.
Murray teſtac. t. 1. *f.* 8.

Knorr del. t. B. I. *f.* 3 4.
Vergn. 1. *t.* 2. *f.* 1. 2. 4. *t.* 99. *f.* 1. *et* 6. *t.* 31.
β) *Martin. Conch.* 1. *t.* 17. *f.* 156.
γ) *Martin. Conch.* 1. *t.* 17. *f.* 157
δ) *Martin. Conch.* 1. *t.* 17. *f.* 158. 159.
ε) *Martin. Conch.* 1. *t.* 18. *f.* 160.
ζ) *Martin. Conch.* 1. *vign.* 8. *f.* 2.
Habitat in Pelago, mari indico, mediterraneo, *teſta alba interdum flaveſcente ſtriis coſtisve laevibus vel nodulofis, non raro bifurcis, carina utplurimum fuſceſcente: Incola navigat emiſſa, aqua exonerata ſentina ſupinus in ſumma aquarum, membranam mirae tenuitatis extendit; brachia duo retorquens, caeteris ſubremigans, velificat, demum hauſta ſe mergens aqua.* Plinius IX. 29.

vitreus. 2. A. carina medio dentata.
Argenv. zoom. t. 10. *f.* B.
Martin. Conch. 1. *p.* 239. *t.* 18. *f.* 163.
Habitat - - - *rariſſimus teſta conica transverſim coſtata carina convexa, apertura ovali.*

Cymbium. 3. A. carina rugoſa mutica.
Gualt. teſt. t. 12. *f.* D.
Mart. Conch. 1. *t.* 18. *f.* 161.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta vix minimae arenulae magnitudine, depreſſa, tenera, rugoſa: rugis ſtrias ſubtiles longitudinales decuſſantibus.*

Cornu. 4. A. carina annulis quatuor laevibus elevatis.
Spengl. Beſch. berl. Naturf. 2. *p.* 458. *t.* 13. *f.* 3-5.
Chemn. Conch. 10. *t.* 137. *f.* 1271-1273.
Favann. Conch. t. 5. *f.* 1.
Habitat ad caput bonae ſpei, *teſta lineam alta*, 5 *lata, tenera, pellucida, ſtriis flexuoſis notata, ſpirae anfractibus omnibus exterius conſpicuis disjunctis, apertura parallelogramma.*

arctica. 5. A. perforata, carina integra. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 386. *n.* 384.
Pallas ſpic. zool. 10. *p.* 38. Clio helicina.
Habitat frequens, vere potiſſimum et auctumno, in ſuperficie maris Groenlandiam *alluentis, teſta fragiliſſima diametri* 3½ *linearum alba, ſubtiliter ſulcata, umbilico perforato.*

318. NAUTILUS. *Animal* (*Rumpf muſ. t.* 17. *f.* B.)
Teſta univalvis, iſthmis perforatis concamerata, polythalamia.

* *ſpirales rotundati.*
† *anfractibus contiguis.*

Pompilius. 1. N. teſtae apertura cordata, anfractibus obtuſis laevibus.
Muſ. Lud. Ulr. 549. *n.* 149.*
Rondel. aq. p. 97. Cochlea margaritifera.
Bellon. aq. t. 382. Nautilus alter.
Rumpf muſ. t. 17. *f.* A. C. Nautilus major craſſus.
Jonſt. aq. t. 10 *f.* 1. 2. 7.
Liſt. Conch. t. 550. *f.* 1. 3. *t.* 551.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 1. *f.* 1. 2.
Gualt. teſt. t. 17. A. *f.* A. B. *t.* 17. B. *et* 18.
Argenv. Conch. t. 5. *f.* E. F.
Pet. amb. aq. t. 3. *f.* 7.
gazoph. t. 99. *f.* D.
Breyn. polyth. 14.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 1.
Seb. muſ. 3. *t.* 84. *f.* 1-3.
Besl. gazoph. t. 22. *f. prim. et ult.*
Lochner muſ. Besler. t. 19. *f.* 5. 6.
Muſ. Gottwald. t. 40. *f.* 271. aa. b. *t.* 41. *f.* 276.
Leſſer teſtaceoth. t. 2. *f.* 11.
Chemn. Beytr. 2. *Teſtaceoth. tit.*
Knorr delic. t. B. *f.* 1. 2. *et t.* B. I. *f.* 1. 2.
Vergn. 1. *t.* 1. *f.* 1. 2. *et t.* 2. *f.* 3. *et* 4. *t.* 22. *f.* 1. 2?
Martin. Conch. 1. *p.* 226. *vign.* 10. *t.* 18. *f.* 164-167.
β) *Liſt. Conch. t.* 552. *f.* 4.
Knorr del. nat. ſel. t. B. 3. *f.* I.
Favann. Conch. t. 7. *f.* D. 3.
catal. raiſ. t. 2.
Chemn. Conch. 10. *t.* 137. *f.* 1274. 1275.
Habitat in Indico et africano Oceano, *teſta ſaepius grandi, ſolida, ſub cortice albo, maculis virgatis fuſcis ſtriis flexuoſis ſpectabili matris perlarum inſtar nitente, hinc ſaepius decorticata et pulchra pictura elaborata, ad pocula aquae potatorum orientalium praeparatur.*

2. N.

Calcar. 2. N. teſtae apertura lineari, anfractuum geniculis elevatis.
Planc. Conch. 12. *t.* 1. *f.* 3. 4.
Gualt. teſt. t. 19. *f.* B. C.
Lederm. microſc. t. 8. *f.* c. d.
Martin. Conch. 1. *t.* 19. *f.* 168. 169.
Habitat in mari adriatico, *minutus; an vere diſtincta a reliquis ſpecies?*

criſpus. 3. N. teſtae apertura ſemicordata anfractuum geniculis crenatis.
Planc. Conch. 10. *t.* 1. *f.* 2.
Gualt. teſt. t. 19. *f.* A. D.
Ginann. adr. t. 14. *f.* 112.
Lederm. microſc. t. 8. *f.* 6.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta minuta utrinque umbilicata, granulata, ſtriata: ſtriis flexuoſis, dorſo carinato, ſiphone centrali, cameris medio pauliſper inflexis.*

Beccarii. 4. N. teſtae apertura obovata, anfractibus tortuoſis: geniculis inſculptis.
Planc. Conch. 8. *t.* 1. *f.* 1.
Gualt. teſt. t. 19. *f.* H. H. I.
Ginann. adr. 2. *t.* 14. *f.* 111.
Lederm. microſc. 16. *t.* 8. *f.* a. *et t.* 4. *f.* B.
Murray teſtac. t. 1. *f.* 16.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 1. *f.* 3.
Martin. Conch. 1. *t.* 19. *f.* 178. 179. *et t.* 20. *f.* 175-177.
ammonoides. β) Nautilus teſta compreſſa: apertura lineari: anfractibus contiguis; ſtriis elevatis multiradiata. *Gronov. zooph. t.* 19. *f.* 5. 6.
Habitat in mari mediterraneo *et* adriatico, *inter protypos cornuum ammonis foſſilium princeps, teſta ſubdepreſſa, minuta.*

balthicus. 5. N. teſta alba convexa: apertura lineari, anfractuum primo reliquos longe ſuperante.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 20. *t.* 1. *f.* 2.
Naturf. 17. *p.* 120.
Habitat in mari balthico, *fucorum radicibus adhaerens, n. Beccarii affinis, teſta nunc opaca, nunc nitente, ſaepius pellucida, anfractibus nunc laevibus, nunc ſtriatis, nunc coſtatis, nunc tuberculatis.*

6. N.

Nautili *plurimi etiamnum in pelagi abyſſo latent, et noti hactenus, Pompilio, Spirula, Orthoceratite et foſſilibus exceptis, tam exiles, ut armato oculo examinari penitius debeant.*

Helicites. 6. N. anfractibus occultis.
Schroet. Einl. in Stein. 4. *t.* 10. *f.* 2.
Habitat - - - hactenus tantummodo foſſilis repertus in monte S. Petri *ad* Moſae Trajectum, *lentis utplurimum magnitudine, teſta nunc convexiuſcula, nunc depreſſa, nunc laevi, nunc ſtriata.*

rugoſus. 7. N. teſtae apertura lineari, anfractibus compreſſis incraſſato-marginatis.
Habitat in Oceano auſtrali, *minutus, teſta alba, depreſſo-plana: diſſepimentis internis extrinſecus prominulis, ſ. rugis transverſis ſecundum diſſepimenta.*

umbilicatus. 8. N. teſtae apertura compreſſo-lineari, anfractibus compreſſis, umbilico concavo.
Columm. phytob. 2. *t.* 38. *f.* E.
Habitat Liburni, *minutus, teſta praeſertim ad carinam, ſulcis transverſis ſecundum diſſepimenta oblique articulata.*

†† *anfractibus disjunctis.*

Spicula. 9. N. teſtae apertura orbiculari, anfractibus cylindricis. *Muſ. Lud. Ulr.* 549. *n.* 150.*
Swammerd. bibl. nat. 1. *t.* 7. *f.* 7. 8.
Liſt. Conch. t. 550. 2.
Bonann. muſ. Kirch. 1. *f.* 39.
Rumpf muſ. t. 20. *f.* 1.
Gualt. teſt. t. 19. *f.* E.
Argenv. Conch. t. 5. *f.* G. G.
Breyn. polyth. 21. *f.* 2.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 6.
Scheuchz. Schweiz. Naturg. 3. *f.* 15.
Bytem. app. t. 11. *f.* 49.
Knorr Vergn. 1. *t.* 2. *f.* 6.
Martin. Conch. 1. *p.* 254. *vign.* 11. *f.* 1-3. *et t.* 20. *f.* 184. 185.
Habitat in Oceano americano *et* indico, *teſta pollicem circiter magna, exalbida, intus matris perlarum inſtar nitente orbiculari, anfractibus introrſum ſenſim decreſcentibus, primo prominulo rectiuſculo, ſiphone teſtae parietibus contiguo, an protypus lituitarum?*

Spengleri. 10. N. teſta laevi: tuberculis quatuor conicis.
Spengl. Schr. daeniſh. Geſ. 1. *p.* 373. *t.* 2. *f.* 9. b. c.
Habitat in arena buccinorum caſſideorum Indiae, *teſta minima.*

unguiculatus. 11. N. teſta diaphana: ſeptis intermediis exterius protuberantibus, tuberculis conicis ſex.
Spengl. Schr. daen. Geſ. 1. *p.* 373. *t.* 2. *f.* 9. d.
Habitat in arena buccini caſſidei Indiae, *teſta minuta, tenera, nitida, alba ſubcoſtata.*

** elongati *rectiuſculi.*

Semilituus. 12. N. teſtae apice incurvato-ſpirali, anfractibus contiguis.
Columm. phytob. 2. *t.* 38. *f.* D. Semilituus.
Martin. Conch. 1. *t.* 20. *f.* 186. 187.
Habitat Liburni, *ad littus, teſta minima convexiuſcula, diſſepimentis extrinſecus per inciſuras conſpicuis, non raro umbilicata.*

Lituus. 13. N. teſta ſubconica: articulis globoſis ſenſim decreſcentibus, apice incurvato ſpirali.
Spengl. Schr. daen. Geſ. 1. *p.* 373. *t.* 2. *f.* 10. d-g.
Klein Danz. naturf. Geſ. Schr. 2. *p.* 47. *t.* 1. *litt.* a.
Habitat rarior in mari rubro, *frequentior inter foſſilia.*

obliquus. 14. N. teſta recto-ſubarcuata: articulis oblique ſtriatis.
Gualt. teſt. t. 19. *f.* N.
Martin. Conch. vign. 1. *f.* H. h.
Habitat in mari adriatico *et* mediterraneo, *teſta minuta ambitu crenata; ſiphone centrali: an protypus orthoceratitarum incurvorum?*

Raphaniſtrum. 15. N. teſta ſubcylindrica: articulis toroſis; ſtriis elevatis duodenis, ſiphone centrali regulari.
Lederm. microſc. t. 4. *f.* X. *poſter.*
Habitat in mari mediterraneo, *unguis magnitudine, raphano major; an protypus orthoceratitae cylindrici?*

Raphanus. 16. N. teſta articulata: articulis toroſis; ſtriis elevatis ſedenis, ſiphone ſublaterali obliquo.
Planc. Conch. t. 1. *f.* 6.
Gualt. teſt. t. 19. *f.* L. L L. M.
Lederm. microſc. t. 4. *f.* X. *prior, et t.* 8 *f.* F.
Habitat in mari adriatico *et* mediterraneo, *minutus, an protypus orthoceratitae conici?*

Granum. 17. N. teſta ovato-oblonga: articulis toroſis; ſtriis elevatis octonis interruptis, ſiphone obliquo.
Habitat in mari mediterraneo, *minutus, ſtriis ad articulorum genicula admodum contractis a raphano diſtinctus.*

18. N.

Radicula. 18. N. teſta oblongo-ovata: articulis toroſis glabris.
Planc. Conch. 14. *t.* 1. *f.* 5.
Lederm. microſc. t. 8. *f.* e. *et t.* 4. *f.* 1. f.
Habitat rariſſimus in mari adriatico, *minutus, ſiphone ſublaterali.*

Faſcia. 19. N. teſtae articulis ſtriatis: geniculis laevibus elevatis.
Gualt. teſt. t. 19. *f.* O.
Mart. Conch. 1. *vign.* 1. *f.* DD.
Habitat in mari adriatico, *minutus, teſta conica, confertim ſtriata, apice obtuſa, margine denticulata: ſiphone centrali.*

inaequalis. 20. N. teſta cylindrica: articulis octo, ſecundo, tertioque breviſſimis, apertura marginata.
Spengl. daen. Geſ. Schr. 1. *p.* 373. *t.* 2. *f.* 10. a. b. c.
Habitat in maris rubri arena, *teſtacea replente, teſta minuta nivea.*

Siphunculus. 21. N. teſta laevi: articulis cylindricis remotis: geniculis attenuatis cylindricis.
Gualt. teſt. t. 19. *f.* R. S.
Martini Conch. 1. *vign.* 1. *f. f.* F. FF.
Habitat in freto ſiculo, *rupi coralliferae adhaerens, teſta minuta, articulis* 11, *alternatim anguſtioribus et latioribus.*

Legumen. 22. N. teſta compreſſa articulata, hinc marginata: ſiphone laterali. *Planc. Conch.* 8. *t.* 1. *f.* 7.
Gualt. teſt. t. 19. *f.* P.
Lederm. microſc. t. 8. *f.* g.
Martin. Conch. 1. *vign.* 1. *f.* e. E. I.
Habitat in mari adriatico, *teſta minuta ſubconica, apice ad alterum latus cultrato, ad alterum leviter arcuato.*

Orthoceras. 23. N. teſtae anfractibus carinato ſtriatis. *It. oel.* 140.
Muſ. Teſſin. 86. Nautilus rectus.
Scheuchz. helv. 7. *f.* 8. *diluv.* 938. Alveolus.
Gmelin act. Petrop. 3. *p.* 246.
Gron. lap. 71.
Habitat in alto pelago, *frequenter foſſilis, an diſtinctarum reliquis ſpecies protypus?*

Belemnita. 24. N. teſta aequabili laevi conica acuta.
Habitat - - - frequens inter foſſilia omnis Europae, *nonne potius hujus generis, quàm alcyonii?*

319. CONUS. *Animal* Limax.

Teſta univalvis, convoluta, turbinata.
Apertura effuſa, longitudinalis, linearis, edentula, baſi integra.
Columella laevis.

* Truncati *ſ. ſpira fere truncata.*

marmoreus. 1. C. teſta conica fuſca: maculis ovatis albis, ſpirae anfractibus canaliculatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 550. *n.* 151.
Olear. muſ. t. 31. *f.* 2.
Muſ. Gottwald. t. 14. *f.* 104. a. 104. b.
Liſt. Conch. t. 787. *f.* 39.
Bonanni. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 123.
Rumpf muſ. t. 32. *f.* N. *et* I.
Valent. Abh. t. 3. *f.* 25. *t.* 5. *f.* 43. *et t.* 7. *f.* 65. A.
Petiv. gazoph. t. 47. *f.* 11.
Gualt. teſt. t. 22. *f.* D.
Argenv. Conch. t. 12. *f.* M. O.
Seb. muſ. 3. *t.* 46. *f.* 1-4. 13-19. *et t.* 47. *f.* 1-4. *et t.* 22. *f.* 2. 3.
Knorr Vergn. 1. *t.* 7. *f.* 4. *et t.* 15. *f.* 2. *et* 4. *t.* 17. *f.* 1.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 5. *f.* 53.
Martin. Conch. 2. *t.* 62. *f.* 685. 686.
β) *Valent. Abh. t.* 2. *f.* 10. *et t.* 5. *f.* 44.
Knorr Vergn. 1. *t.* 7. *f.* 4.
Seb. muſ. 3. *t.* 46. *f.* 5-12.
Martini Conch. 2. *t.* 62. *f.* 687. 688.
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 138. *f.* 1279.
δ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 139. *f.* 1292.
Habitat in Aſia, β) *rarior, teſta ſubtiliter ſtriata, interdum atra aut fulva, maculis ſubtrigonis in* β) *paucioribus et in faſcias confluentibus; ſpirae paulo elatioris anfractibus emarginatis tuberculato ſpinoſis.*

imperialis. 2. C. teſta albida: faſciis longitudinalibus lividis cingulisque linearibus albo fuſcoque articulatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 550. *n.* 152.*
Rumpf muſ. t. 34. *f.* H. I. Kroon hoorn.
Argenv. Conch. t. 12. *f.* E. F. Corona imperialis.
Liſt. Conch. t. 766. *f.* 15.
Valent. Abh. t. 3. *f.* 26.

Gualt.

Gualt. teſt. t. 22. *f.* A.
Klein. oſtr. t. 4. *f.* 84.
Seb. muſ. 3. *t.* 47. *f.* 18-21.
Knorr Vergn. 2. *t.* 11. *f.* 2.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 3. *f.* 35.
Martini Conch. 2. *t.* 62. *f.* 690-692.
β) *Martini Conch.* 2. *t.* 62. *f.* 693?
γ) *Chemn Conch.* 10. *t.* 139. *f.* 1289.
δ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 139. *f.* 1290. 1291.
Habitat rarior - - - teſta ſatis magna alba, faſciis ut plurimum 2 luteis, cingulisque pluribus ex lineis interruptis albis fuſcisque conflatis, ſpira plana, magis minusve emarginata, virgisque undulatis fuſcis picta.

litteratus. 3. C. teſta conica alba: punctis fuſcis. *Muſ. Lud. Ulr.* 551. *n.* 153.
Rumpf. muſ. t. 31. *f.* D. Voluta muſicalis.
Liſt. Conch. t. 773. *f.* 19? *t.* 774. *f.* 20.
Bonann. recr. 3. *f.* 132? 363.
muſ. Kirch. 3. *f.* 357.
Gualt. teſt. t. 21. *f.* G. O.
Seb. muſ. 3. *t.* 45. *f.* 1-5.
Muſ. Gottwald. t. 14. *f.* 101. c. 101. d.
Knorr delic. t. B. III. *f.* 4.
Vergn. 1. *t.* 16. *f.* 3. 3. *t.* 3. *f.* 2. *et* 4. *t.* 26. *f.* 1.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 3. *f.* 29. *et t.* 4. *f.* 46.
Martini Conch. 2. *t.* 60. *f.* 666-668.
β) *Gualt. teſt. t.* 22. *f.* B. C.
Seb. muſ. 3. *t.* 44. *f.* 5. 7. *t.* 45. *f.* 8. 9. 12-15. *et t.* 47. *f.* 25.
Knorr Vergn. 3. *t.* 6. *f.* 4. *et* 5. *t.* 24. *f.* 5.
Martini Conch. 2. *t.* 669.
Habitat in Oceano aſiatico, *teſta interdum rubella aut flaveſcente, punctis ſ. potius maculis ſubcubicis, in ſeries digeſtis: faſciis nonnunquam obſoletis flavis interſitis, aut in* β) *lineis ſpadiceis, ſpira maculis virgatis fuſcis picta, nunc magis plana, nunc magis convexa.*

Generalis. 4. C. teſta conica nitida: ſpira plana muricata; anfractibus canaliculatis.
Liſt. Conch. t. 786. *f.* 35.
Rumpf muſ. t. 33. *f.* Y.
Petiv. gazoph. t. 27. *f.* 11.
Valent. Abh. t. 1. *f.* 9.
Gualt. teſt. t. 20. *f.* G.

Argenv. Conch. t. 12. *f.* T.
zoomorph. t. 3. *f.* F.
Seb. muſ. 3. *t.* 54. *f.* 11-13.
Muſ. Gottwald. t. 13. *f.* 100. 100. a.
Olear. muſ. t. 31. *f.* 5.
Knorr Vergn. 1. *t.* 7. *f.* 3. 2. *t.* 5. *f.* 2. *et* 3. *t.* 17. *f.* 4. 5. *et t.* 18. *f.* 3. 4.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 6. *f.* 65.
Martin. Conch. 2. *t.* 58. *f.* 645-652.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 140. *f.* 1301-1303.
Habitat paulo rarior in India, *teſta pulla, lutea, flava vel aurantia, nunc latiore nunc anguſtiore: faſciis* 2-4 *albis, maculis virgatis pictis; ſpira albida, maculis virgatis undatis varia medio acuminata.*

Virgo. 5. C. teſta conica: baſi caeruleſcente. *Muſ. Lud. Ulr.* 551. *n.* 153.*
Liſt. Conch. t. 753. *f.* 1. *t.* 754. *f.* 2. *et t.* 758. *f.* 3.
Rumpf muſ. t. 31. *f.* E.
Gualt. teſt. t. 20. *f.* B.
Bonann recr. 3. *f.* 365.
muſ. Kirch. 3. *f.* 356.
Klein oſtr. t. 4. *f.* 83.
Seb. muſ. 3. *t.* 47. *f.* 8. 9.
Knorr Vergn. 2. *t.* 24. *f.* 4. *et* 3. *t.* 22. *f.* 1.
Muſ. Gottwald. t. 13. *f.* 99. h. *et t.* 14. *f.* 105. a. 105. b.
Martin. Conch. 2. *t.* 53. *f.* 585-589.
β) *Knorr Vergn.* 4. *t.* 16. *f.* 5.
Martin. Conch. 2. *t.* 63. *f.* 701. 702.
γ) *Liſt. Conch. t.* 767. *f.* 17.
Valent. Abh. t. 6. *f.* 52. *et t.* 8. *f.* 73.
Gualt. teſt. t. 21. *f.* H.
Seb. muſ. 3. *t.* 55. *f.* 4-9.
Knorr Vergn. 2. *t.* 12. *f.* 3.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 8 *f.* 19.
Martin. Conch. 2. *t.* 59. *f.* 653. 654.
δ) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 11. *f.* 4?
ε) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 138. *f.* 1281.
Habitat in Oceano africano, *teſta laevi flavicante, frequentius nivea, in* γ) *albo rubroque teſſellata, in* β) *alba: faſcia ſtraminea, ſpira caerulea, aut caerulea: ſpira alba; faſcia ochroleuca.*

Capitaneus. 6. C. teſta conica glabra baſi fuſca: ſpira convexiuſcula. *Muſ. Lud. Ulr.* 552. *n.* 155.*

Liſt.

Liſt. Conch. t. 780. *f.* 27. *t.* 781. *f.* 28?
Valent. Abh. t. 3. *f.* 22. 23. *et t.* 6. *f.* 49.
Muſ. Gottw. t. 12. *f.* 85. b. c. *et t.* 13. *f.* 99. c-g.
Knorr Vergn. 1. *t.* 7. *f.* 6. *et t.* 15. *f.* 3. 2. *t.* 6. *f.* 3. *et* 5. *t.* 16. *f.* 2.
Martini Conch. 2. *t.* 59. *f.* 660-662.
β) *Gualt. teſt. t.* 20. *f.* I.
γ) *Rumpf muſ. t.* 33. *f.* X.
Argenv. Conch. t. 12. *f.* K.
Gualt. teſt. t. 22. *f.* M.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 7. *f.* 7.
δ) *Bonann. recr.* 3. *f.* 361.
muſ. Kircher. 3. *f.* 354.
Seb. muſ. 3. *t.* 42. *f.* 26-36.
ε) *Bonann. recr. et muſ. Kirch.* 3. *f.* 139.
ζ) *Valent. Abh. t.* 5. *f.* 47.
Gualt. teſt. t. 20. *f.* Q.
Seb. muſ. 3. *t.* 42. *f.* 40. 41.
Martini Conch. 2. *t.* 57. *f.* 630. 631.
η) *Favann. Conch.* 2. *t.* 15. *f.* A?
Chemn. Conch. 10. *t.* 138. *f.* 1280.
ϑ) *Gualt. teſt. t.* 25. *f.* F.
Chemn. Conch. 10. *t.* 140. *f.* 1298.
ι) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 144. A. *f.* a. b.
κ) *Kaemm. Cab. Rudolſt. t.* 7. *f.* 4.
Habitat in Aſia, *teſta olivacea, lutea, fuſca, ſpadicea aut intermedia, rarius unicolore frequentius faſcia aut* 2 *albis, maculis virgatis undulatis vel quadratis variis, et praeterea crebro punctorum macularumve ſeriebus picta, ſpira rarius plana, utplurimum maculis virgatis varia.*

Tribunus. 7. C. teſta alba: faſciis tribus flavicantibus ſpadiceo maculatis, ſpira convexiuſcula, baſi transverſim ſtriata.
Martin. Conch. 2. *t.* 59. *f.* 655.
Habitat - - - teſta lineis ſpadiceis undulatis rarioribus picta.

Miles. 8. C. teſta conica rudi: baſi fuſca, ſpira convexa.
Argenv. Conch. t. 12. *f.* L. Pſeudo-Archithalaſſus.
Liſt. Conch. t. 786. *f.* 34.
Rumpf muſ. t. 33. *f.* W.
Gualt. teſt. t. 20. *f.* N.
Seb. muſ. 3. *t.* 42. *f.* 23-25.
Muſ. Gottwald. t. 13. *f.* 99. a 99. b.

Knorr Vergn. 1. *t.* 15. *f.* 4. *et* 3. *t.* 1. *f.* 2. 3.
Martini Conch. 2. *t.* 59. *f.* 663. 664.
Habitat in India, *teſta albida aut flaveſcente lineis longitudinalibus undulatis notata, baſi transverſim ſtriata, faſcia ſpiram fuſco maculatam verſus fuſca.*

Cingulum. 72. C. teſta conica ex luteo flavicante: cingulo medio elevato ſolitario, ſpira acuta. *Mant. univ. Conch.* 1. *t.* 39.
Habitat ad inſulas amicas.

** pyriformes, *baſi rotundata ſubcylindrica ſesquilongiore, quam ſpira.*

Princeps. 9. C. teſta flava: lineis fuſco purpureis longitudinalibus ramoſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 552. *n.* 156.*
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 138?
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 30. *t.* 1. *f.* 3.
β) *Liſt. Conch. t.* 779. *f.* 26.
Gualt. teſt. t. 25. *f.* Q.
Argenv. Conch. t. 12. *f.* B.
Seb. muſ. 3. *t.* 47. *f.* 30. 31.
Knorr Vergn. 3. *t.* 4. *f.* 2.
Martini Conch. 2. *t.* 63. *f.* 699. 700.
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 138. *f.* 1276.
Habitat - - - teſta $2\frac{1}{4}$ *pollices longa: faſciis duabus albis hinc inde fuſco maculatis, ſpira obtuſa ſubtiliſſime transverſim ſtriata, maculis ſpadiceis, ſuperne atris varia; teſta in* β) *breviore ex atro fuſca.*

Ammiralis. 10. C. teſta baſi punctato-ſcabra. *Muſ. Lud. Ulr.* 553. *n.* 157.*
larvatus. α) faſciis nullis.
Mart. Conch. 2. *t.* 57. *f.* 635. a.
americanus. β) faſciis irregularibus.
a) teſta fuſca albo nebuloſa maculataque.
Rumpf muſ. t. 34. *f.* E.
Seb. muſ. 3. *t.* 46. *f.* 20.
Martin. Conch. 2. *t.* 57. *f.* 640.
b) teſta ſpadiceo reticulata nebuloſaque, faſcia interdum alba.
Rumpf muſ. t. 34. *f.* F. Proarchithalaſſus.
Argenv. zoomorph. t. 10. *f.* K. L. V.
Seb. muſ. 3. *t.* 48. *f.* 11. 12. 20. 23.
Knorr Vergn. 5. *t.* 24. *f.* 4.
Martin. Conch. 2. *t.* 57. *f.* 638. 639.

c) teſta

c) teſta alba fuſco maculata, guttata, nebuloſa punctata.
Liſt. Conch. t. 759. f. 4. et t. 777. f. 24.
Gualt. teſt. t. 21. f. L.
Knorr Vergn. 6. *t.* 13. *f.* 5.
Mart. Conch. 2. *t.* 61. *f.* 678.

d) teſta alba, faſciis aurantio lineatis.
Argenv. zoom. t. 10. *f.* G.
Seb. muſ. 3. *t.* 44. *f.* 6.
Mart. Conch. 2. *t.* 53. *f.* 590.

e) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 140. *f.* 1297.

f) faſciis regularibus.

anglicus. a) faſcia unica, *α*) cingulis pluribus punctatis albis, teſta rubra, ſpira fuſco maculata.
Gualt. teſt. t. 20. *f.* P.
Knorr Vergn. 5. *t.* 17. *f.* 5. *et t.* 24. *f.* 2.
Martin. Conch. 2. *t.* 61. *f.* 680.

coronatus. b) cingulo punctorum rubellorum, lineisque transverſis elevatis.
Argenv. zoomorph. t. 10. *f.* M.
Martin. Conch. 2. *p.* 275. *vign.* 26. *p.* 214. *f.* 1.

c) faſcia flava media, cingulisque punctatis pluribus.
Argenv. zoomorph. t. 10. *f.* N.
Martin. Conch. 2. *vign.* 26. *p.* 214. *f.* 2.

d) teſta fuſca, faſcia alba, ſerieque macularum albarum obliqua.
Knorr Vergn. 5. *t.* 25. *f.* 3.

regius. a) faſciis duabus *α*) faſciis aurantiis obſcurius lineatis: interſtitiis albis, punctis maculisque undulatis aurantiis.
Seb. muſ. 3. *t.* 46. *f.* 22. 23.
Martin. Conch. 2. *t.* 61. *f.* 677.

b) faſciis albo fuſcoque variis, teſta alba: maculis undatis fuſcis.
Martin. Conch. 2. *t.* 62. *f.* 684.

c) faſciis flavicantibus trifariam fuſco lineatis, teſta alba fuſco ſtriata.
Knorr Vergn. 3. *t.* 6. *f.* 3.

d) faſciis fuſcis granulato ſtriatis, teſta albo fuſcoque nebuloſa.
Martin. Naturgeſch. 1. *p.* 378. *t.* 19. *f.* 12.

Coni *pauciſſimi europaci, multi parum, ſi patriam nativamque formam ſpectes, noti, et, ſi in nullo alio genere, in hoc certe, difficillimum, ex iconibus et in muſeis aſſervatis ſpeciminibus certo determinare, quid ſpecies ſit, quid varietas, quantum arti in exornando exemplo debeatur:* Ammiralium 10 *et varietates nitidas, turbinis ſcalaris et oſtreae* Mallei *aemulas nobilitavit docta ignorantia, pretiavit, quam patiuntur opes, ſtultitia, emtitavit barbara luxuria.*

ordinarius. ε) faſciis tribus.
a) teſta teſtacea albo maculata, faſciis albis ſubreticulatis: media cingulo articulato.
Knorr Vergn. 4. *t.* 3. *f.* 1.
Rumpf muſ. t. 34. *f.* C. Admiral.

guineenſis. b) teſta ſtraminea: faſcia media lineis angulatis aurorae modo tinctis picta.
Argenv. zoomorph. t. 10. *f.* Q.*
Chemn. Conch. 10. *t.* 144. A. *f.* i. k.

ſurinamenſis. c) teſta badia, faſciis maculatis: infima fuſco alboque punctata, cingulis punctato articulatis pluribus.
Argenv. zoomorph. t. 10. *f.* R.
Martin. Conch. 2. *p.* 282. *vign.* 26. *p.* 214. *f.* 5.
†) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 139. *f.* 1293.
d) teſta fuſca: maculis cordatis albis, faſciis albis: media maculis duabus quadratis.
Knorr Vergn. 4. *t.* 3. *f.* 1.

d) faſciis quatuor.

ſummus. a) teſta ferruginea maculis albis ſparſis: faſciis flavis tenuiſſime reticulatis: tertia cingulo albo maculato.
Rumpf muſ. t. 34. *f.* B. Opper admiral.
Argenv. Conch. t. 12. *f.* N. Architbalaſſus primus.
Petiv. gazoph. t. 28. *f.* 4. (male).
amb. t. 15. *f.* 18.
Seb. muſ. 3. *t.* 48. *f.* 5. 6.
Knorr delic. t. B. V. *f.* 6.
Vergn. 1. *t.* 8. *f.* 2.
Regenſ. Conch. 2. *t.* 1. *f.* 1.
Favann. Conch. t. 17. *f.* I¹.
Spengl. ſelt. Conch. t. 1. *f.* E.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 7. *f.* 11.
Martin. Conch. 2. *t.* 57. *f.* 634.
Chemn. Conch. 10. *t.* 141. *f* 1308.
††) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 141. *f.* 1309.

occidentalis. b) teſta teſtacea albo maculata: faſciis flavis reticulatis, cingulo articulato.

c) faſciis quinque et pluribus.
Argenv. zoom. t. 10. *f.* O. P.
Seba muſ. 3. *t.* 48. *f.* 4.
Martin. Conch. 2. *t.* 57. *f.* 635.

Cedo nulli. δ) cingulis punctato-articulatis.
a) teſta flava rubro picta, cingulis lacteis 11.
Argenv. zoom. t. 10. *f.* H.
Seb. muſ. 3. *t.* 48. *f.* 8.

Knorr

Knorr Vergn. 6. *t.* 1. *f.* 1.
Martini Conch. 2. *t.* 57. *f.* 633.
b) teſta aurantia lineis elevatis interruptis ſpadiceis confertis.
Spengl. Beſch. berl. Naturf. 1. *t.* 9. *f.* 6.
Chemn. Conch. 10. *t.* 141. *f.* 1306.
Habitat in Oceano, Americam auſtralem *alluente, varietate fere infinita, pretioſus.*

Vicarius. 11. C. teſta teſtacea albo maculata: faſciis quatuor flavis immaculatis; ſecunda angulo diviſa.
Argenv. Conch. t. 12. *f.* H. Archithalaſſus ſecundus.
Rumpf muſ. t. 34. *f.* D.
Petiv. amb. t. 15. *f.* 11.
Knorr Vergn. 4. *t.* 3. *f.* 1.
Favann. Conch. t. 17. *f.* I[5].
Chemn. Conch. 10. *t.* 141. *f.* 1307.
Habitat - - -

Senator. 12. C. teſta conica laevi glabra: ſpirae anfractibus obtuſis ſcriptis.
Liſt. Conch. t. 784. *f.* 31?
Valent. Abh. t. 6. *f.* 50?
Martin. Conch. 2. *t.* 59. *f.* 659.
Habitat - - - *teſta flava albo maculata ſtriisque transverſis albo-fuſcoque articulatis numeroſiſſimis notata.*

nobilis. 13. C. teſta ſubcylindrica laevi glabra. *Muſ. Lud. Ulr.* 554. *n.* 158.*
Argenv. Conch. t. 12. *f.* M? Tigris lutea.
Valent. Abh. t. 3. *f.* 21.
Seb. muſ. 3. *t.* 43. *f.* 13? 14?
Martin. Conch. 2. *t.* 62. *f.* 689.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 36. *t.* 1. *f.* 4.
Favann. Conch. t. 14. *f.* E[2].
Chemn. Conch. 10. *t.* 141. *f.* 1312.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 141. *f.* 1313. 1314.
Habitat - - - *teſta nitidiſſima flava, aut fuſca, aliquando in olivaceum vergente, albo maculata, ſtriis transverſis obſoletis ſubtiliter punctatis.*

genuanus. 14. C. cingulis linearibus albo fuſcoque articulatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 554. *n.* 159.
Rumpf muſ. t. 34. *f.* G. Geneſeſche Toot.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 6. *f.* 1. Jamar.
Liſt. Conch. t. 767. *f.* 16. *et t.* 769. *f.* 17. b?
Olear. muſ. t. 32. *f.* 3.

Bonann. recr. 3. *f.* 337.
muſ. Kircher. 3. *f.* 336.
Gualt. teſt. t. 22. *f.* G. H.
Argenv. Conch. t. 12. *f.* Q.
Seb. muſ. 3. *t.* 48. *f.* 1-3.
Knorr Vergn. 3. *t.* 1. *f.* 1.
Martin. Conch. 2. *t.* 56. *f.* 624. 625.

Papilio. β) *Argenv. Conch. t.* 12. *f.* V. Ala papilionis.
Martin. Conch. 2. *t.* 56. *f.* 623.
Habitat ad Guineae littora, *teſta rubra: faſciis alternatim fuſco rubroque teſſellatis.*

glaucus. 15. C. teſta baſi emarginata ſtriata: ſpirae inermis anfractibus contiguis. *Muſ. Lud. Ulr.* 555. *n.* 160.*
Rumpf muſ. t. 33. *f.* GG. Botervegie van Boer.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 128.
Valent. Abh. t. 9. *f.* 84.
Gualt. teſt. t. 22. *f.* F.
Seb. muſ. 3. *t.* 45. *f.* 6. *t.* 55. *f.* 10. *et tres ic. inter* 20. *et tres inter* 23.
Muſ. Gottwald. t. 14. *f.* 101. e. x. c. H. c. o. d. ⊙. d. x. *et f.* 103.
Knorr Vergn. 1. *t.* 17. *f.* 4. *et* 2. *t.* 7. *f.* 1.
Mart. Conch. 2. *t.* 61. *f.* 670-674.
Chemn. Conch. 10. *t.* 138. *f.* 1277. 1278.
Habitat in India *et* Africa, *teſta maculis fuſcis, ſpadiceis, rubris, utplurimum ſeriatis varia, ſpira transverſim ſtriata, nunc magis nunc minus convexa, maculis interdum quadratis, rarius virgatis varia.*

Monachus. 16. C. teſta gibba fuſco-caeruleſcente nebulata acuta baſi ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 555. *n.* 161.*
Rumpf muſ. t. 33. *f.* CC. Capucinus f. Anicula.
Liſt. Conch. t. 756. *f.* 8.
Gualt. teſt. t. 25. *f.* M?
Seb. muſ. 3. *t.* 47. *f.* 27. *et t.* 48. *f.* 46. 47.
Knorr Vergn. 3. *t.* 27. *f.* 2.
Martin. Conch. 2. *t.* 55. *f.* 612. a-d.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 142. *f.* 1319. 1320.
Habitat in India? *teſta nonnunquam ſeriatim punctata.*

minimus. 17. C. teſta cineraſcente punctis oblongis cincta. *Muſ. Lud. Ulr.* 556. *n.* 162.*
Knorr Vergn. 5. *t.* 25. *f.* 5. *et* 6. *t.* 1. *f.* 5.

Martin. Conch. 2. *t.* 55. *f.* 613.
Habitat - - -

Ruſticus. 18. C. teſta ovata baſi rugoſa muricatoque ſcabra: ſpira conico-convexa. *Muſ. Lud. Ulr.* 556. *n.* 163.*
α) faſcia nulla.
Rumpf muſ. t. 32. *f.* R. Voluta cinerea.
Seb. muſ. 3. *t.* 43. *f.* 32?
Gualt. teſt. t. 25. *f.* R.
Martin. Conch. 2. *t.* 52. *f.* 578.
β) faſcia albido nebulata.
Gualt. teſt. t. 25. *f.* E.
Seb. muſ. 3. *t.* 42. *f.* 37-39.
Argenv. Conch. t. 12. *f.* D.
Knorr Vergn. 4. *t.* 13. *f.* 3.
Muſ. Gottwald. t. 12. *f.* 86. b?
Martin. Conch. 2. *t.* 63. *f.* 694. 695.
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 144. A. *f.* e. f?
Habitat in Africa, *teſta livida: β) lineis punctisque nigricantibus varia.*

Mercator. 19. C. teſta ovata alba: faſciis reticulatis flavis. *Muſ. Lud. Ulr.* 557. *n.* 164.*
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 6. *f.* 3. Tilin.
Liſt. Conch. t. 788. *f.* 41.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 136.
Valent. Abh. t. 7. *f.* 65. B.
Argenv. Conch. t. 12. *f.* P.
Seb. muſ. 3. *t.* 54.
Knorr Vergn. 2. *t.* 1. *f.* 4.
Muſ. Gottwald. t. 12. *f.* 92. a.
Martin. Conch. 2. *t.* 56. *f.* 619. 620. 621?
Habitat ad Africae *littus occidentale; teſta mediae magnitudinis interdum flavicante: faſciis nonnunquam fuſcis aut ſpadiceis.*

betulinus. 20. C. teſta baſi ſubemarginata rugoſa: ſpira planiuſcula mucronata. *Muſ. Lud. Ulr.* 557. *n.* 165.*
Liſt. Conch. t. 762. *f.* 11.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 131.
Rumpf muſ. t. 31. *f.* C.
Gualt. teſt. t. 21. *f.* B.
Seb. muſ. 3. *t.* 44. *f.* 1-4. *et t.* 45. *f.* 7. 10. 11.
Muſ. Gottwald. t. 13. *f.* 101. a. b.

Knorr Vergn. 2. *t.* 11. *f.* 3.
Martin. Conch. 2. *t.* 60. *f.* 665.

Meduſa. β) *Martin. Conch.* 2. *t.* 61. *f.* 675?
γ) *Knorr Delic.* 1. *t.* B. III. *f.* 5?
Chemn. Conch. 10. *t.* 142. *f.* 1321.
Habitat in India, *teſta ſatis magna, flava, utplurimum ochroleuca, faſciis teſſellatim maculatis lineisque intermediis fuſcis aut luteſcentibus varia; in* β) *alba ſeriebus tribus characterum violaceorum, in* γ) *alba faſciis, maculis punctisque fuſcis varia.*

figulinus. 21. C. teſta baſi ſubemarginata rugoſa: ſpira acuminata, anfractibus planiuſculis. *Muſ. Lud. Ulr.* 558. *n.* 166.*
Rumpf muſ. t. 31. *f.* V. *et t.* 33. *f.* 1. Voluta filoſa.
Liſt. Conch. t. 785. *f.* 32.
Valent. Abh. t. 4. *f.* 34.
Gualt. teſt. t. 20. *f.* E.
Argenv. Conch. t. 12. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 54. *f.* 1-4. 8.
Muſ. Gottwald. t. 13. *f.* 98. a-f.
Knorr Vergn. 3. *t.* 11. *f.* 2. *et* 5. *t.* 25. *f.* 2.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 10. *f.* 47.
Martin. Conch. 2. *t.* 59. *f.* 656-658.
β) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 15. *f.* 2?
γ) *Chemn. Conch.* 10. *p.* 27. *t.* 138. *f.* 1285.
Habitat paulo rarior in India, *teſta ad* 3 *pollices longa, fuſca, ferruginea, flava, rarius olivacea, lineis et ſpira obſcurioribus, intus utplurimum alba, faſcia interdum* 1-2 *flava, vel alba; in* β) *teſta magis elongata, aurantia lineis obſcurioribus faſciisque duabus flavicantibus varia, ſpira rubella nigro maculata.*

ebraeus. 22. C. teſta ovata alba: faſciis nigris ex maculis transverſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 558. *n.* 167.*
Rumpf muſ. t. 33. *f.* BB. Muſica ruſticorum.
Argenv. Conch. t. 12. *f.* G. Hebraica.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 6. *f.* 5. Coupet.
Liſt. Conch. t. 779. *f.* 25.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 122.
Gualt. teſt. t. 25. *f.* T.
Valent. Abh. t. 11. *f.* 94.
Petiv. gaz. 99. *f.* 12.
Seb. muſ. 3. *t.* 47. *f.* 28. 29.
Muſ. Gottwald. t. 14. *f.* 101. e. *f.* 104. c. d.

Knorr Vergn. 3. *t.* 6. *f.* 2.
Martin. Conch. 2. *t.* 56. *f.* 617.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 144. A. *f.* q. r.
Habitat in India, *teſta minore, interdum rubella, maculis parallelogrammis nonnunquam ſpadiceis.*

Stercus muſcarum. 23. C. teſta baſi emarginata ſtriata: ſpirae anfractibus canaliculatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 559. *n.* 168.*
Rumpf muſ. t. 33. *f.* Z. Voluta arcuata.
Liſt. Conch. t. 757. *f.* 9.
Bonann. muſ. Kirch. 3. *f.* 408.
Gualt. teſt. t. 25. *f.* N. O.
Argenv. Conch. t. 13. *f.* E.
Petiv. gazoph. t. 75. *f.* 1.
Seb. muſ. 3. *t.* 55. *f.* 1.
Knorr delic. t. B. V. *f.* 7.
Vergn. 1. *t.* 7. *f.* 5. *et* 6. *t.* 16. *f.* 4.
Muſ. Gottwald. t. 12. *f.* 88. a. b. c.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 7. *f.* 2.
Martin. Conch. 2. *t.* 64. *f.* 711-713.
β) *Rumpf muſ. t.* 33. *f.* 2?
Seb. muſ. 3. *t.* 55. *f.* 23?
Martin. Conch. 2. *t.* 63. *f.* 698. 698. a?
γ) *Liſt. Conch. t.* 761. *f.* 10.
Rumpf muſ. t. 33. *f.* AA.
Gualt. teſt. t. 25. *f.* P.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 7. *f.* 12.
Martin. Conch. 2. *t.* 63. *f.* 696. 697.
δ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 139. *f.* 1294?
ε) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 140. *f.* 1295?
Habitat in Aſia, *teſta longa, anguſta alba punctis nigris aut rubris ſparſis, interdum glomeratis, rarius in faſcias aggregatis, anfractibus obtuſis, in* β) *et* γ) *coronatis.*

varius. 24. C. teſta elongata muricata: ſpira coronata acuta. *Muſ. Lud. Ulr.* 559. *n.* 169.*
Liſt. Conch. t. 775. *f.* 21.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 129.
Rumpf muſ. t. 34. *f.* L.
Gualt. teſt. t. 20. *f.* F.
Argenv. Conch. t. 12. *f.* R.
zoomorph. t. 10. *f.* X.
Seb. muſ. 3. *t.* 44. *f.* 19-22. *et t.* 48. *f.* 14-17. 24. 25.
Knorr Vergn. 1. *t.* 8. *f.* 4. *et t.* 24. *f.* 5.

Regenſ.

Regenſ. Conch. 1. *t.* 7. *f.* 9. 10.
Martin. Conch. 2. *t.* 61. *f.* 679. *et t.* 62. *f.* 682.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 48. *f.* 26-28.
Favann. Conch. t. 16. *f.* E³.
Chemn. Conch. 10. *t.* 138. *f.* 1284.
Habitat in Oceano indico, *teſta alba, fuſco, ſpadiceo luteove nebuloſa: ſtriis granulatis per totam ſuperficiem decurrentibus.*

achatinus. 25. C. teſta elongata ſubtiliter transverſim ſtriata varie nebuloſa albo punctata: ſpira brevi fuſco maculata; apice rubro.
Seb. muſ. 3. *t.* 44. *f.* 30.
Muſ. Gottwald. t. 12. *f.* 89. b. 90.
Martin. Conch. 2. *t.* 52. *f.* 579. 580.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 44. *f.* 29.
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 140. *f.* 1296?
δ) *Chemn. Conch. t.* 142. *f.* 1347.
Habitat in Oceano americano.

radiatus. 26. C. teſta radiis faſciisque albis.
Valent. Abh. t. 6. *f.* 51.
Martin. Conch. 2. *t.* 53. *f.* 584.
Habitat - - - - *teſta fuſca, lutea aut cinerea.*

leoninus. 27. C. teſta luteo vel ſpadiceo maculata: faſciis ſaepius transverſis albis luteisve ex granis aut maculis.
Liſt. Conch. t. 772. *f.* 18. *et t.* 777. *f.* 23.
Rumpf muſ. t. 34. *f.* M.
Valent.

Coronatae *teſtae vocantur, quarum anfractus ſuperne tantum notantur tuberculis ſ. mucronibus; inter teſtas coronatas et calvas nulla datur differentia ſpecialis. An ad conos referendae cochleae a* Liſtero *t.* 776. *f.* 22. *et t.* 778. *f.* 24. b. *a* Bonanni *muſ. Kirch.* 3. *f.* 391. *ab* Argenville *zoomorph. t.* 11. *f* D. *et in muſ.* Gottwald. *t.* 12. *f.* 85. II. III. *f.* 87. *f.* 89. a. *t.* 13. *f.* 97. b. c. *f.* 100. b. *f.* 101. e. x. *et f.* 102. *delineatae? An diſtinctae ſpecies, et ſi, cuinam tribui inſerendae quas* Liſterus *Conch. t.* 743. *f.* 39. *t.* 765. *f.* 14. *t* 768. *f.* 17. a. *t.* 771. *f.* 17. d. *t.* 778. *f.* 24. a. *t.* 782 *f.* 29 *t.* 785. *f.* 33. *t.* 786. *f.* 36. *et* 37. *t.* 789. *f.* 42. *et t.* 790. *f.* 43. Bonanni *recr. et muſ. Kircher.* 3. *f.* 124. 125. a. b. *f.* 127. 137. *recr.* 3. *f.* 318 *muſ. Kirch.* 3. *f.* 314. *et* 407. *Rumpf muſ. t.* 33. *f.* DD. *Gualt. teſt. t.* 20. *f.* C. D. *t.* 21. *f.* A. C. I. Q. *t.* 22. *f.* E. L. *t.* 25. *f.* D. G. *et t.* 26. *f.* A. *ab* Argenville *Conch. t.* 12. *f.* I. S. *Seb. muſ.* 3. *t.* 42. *f.* 12. 13. *t.* 43. *f.* 15. 16. 17. 18. 19. 23. 28. 33. 34. 35. *t.* 44. *f.* 16. 17. 23. 26. *t.* 47. *f.* 5. 6. 7. 26. *t.* 48. *f.* 913. 18. 19. 21. 29. (32. 34. 37. 38.) (31. 35. 36. 39. 40. 43.) 41. 44. 42. 45 *t.* 54. *f.* 5. 6. 9. 10. *t.* 55. *f.* 11. *Knorr Vergn.* 2. *t.* 1. *f.* 6. *t.* 5. *f.* 3. 5. *t.* 19. *f.* 2. *t.* 27. *f.* 5. 5. *t.* 24. *f.* 3. 6. *t.* 1. *f.* 5. *Muſ. Gottwald. t.* 12. *f.* 86. a. *et t.* 13. *f.* 100. a. *delineatas ſiſtunt?*

Valent. Abh. t. 6. f. 48.
Bonann. recr. 3. f. 130. 364.
muſ. Kirch. 3. f. 130. 358.
Gualt. teſt. t. 21. f. N.
Seb. muſ. 3. t. 42. f. 10. 11. 22. et t. 44. f. 13-15.
Regenſ. Conch. 1. t. 3. f. 37.
Martin. Conch. 2. t. 55. f. 603. 604. 606. 607.
β) *Knorr Vergn. 3. t. 12. f. 4. et 5. t. 22. f. 2.*
Regenſ. Conch. 1. t. 11. f. 54. 55.
Martin. Conch. 2. t. 55. f. 605.
γ) *Martin. Conch. 2. t. 55. f. 608.*
δ) *Martin. Conch. 2. t. 55. f. 609-611.*
ε) *Seb. muſ. 3. t. 43. f. 29. 30.*
ζ) *Knorr Vergn. 2. t. 1. f. 7.*
η) *Knorr Vergn. 2. t. 1. f. 6.*
ϑ) *Knorr Vergn. 2. t. 1. f. 5?*
ι) *Knorr Vergn. 6. t. 1. f. 3?*
κ) *Knorr Vergn. 6. t. 1. f. 4.*
λ) *Gualt. teſt. t. 21. f. D.*
Favann. Conch. 2. t. 14. f. C¹.
Chemn. Conch. 10. t. 140. f. 1299.
μ) *Chemn. Conch. 10. t. 140. f. 1300.*
Habitat in Oceano indico, *ſpira parum acuta.*

jaſpideus. 28. C. teſta ſubolivacea, punctis multifariis faſciaque obliqua albis.
Martin. Conch. 2. t. 55. f. 612.
β) *Muſ. Gottwald. t. 13. f. 97. a.*
Habitat - - - teſta oblonga, parva.

nebuloſus. 29. C. teſta fuſca caeruleo nebuloſa alboque maculata.
Gualt. teſt. t. 25. f. R.
Valent. Abh. t. 9. f. 74.
β) *Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. f. 126.*
Knorr Vergn. 3. t. 16. f. 2.
Regenſ. Conch. 1. t. 12. f. 68.
Martin. Conch. 2. t. 55. f. 614.
Habitat - - - teſta anguſta, ſpiram verſus convexiuſcula; an varietas minimi?

oculatus. 30. C. teſta conica flava: ocellis faſciaque albis, baſi oblique ſtriata.
Martin. Conch. 2. t. 56. f. 616.
Habitat - - - ſpira parum prominente, an hujus tribus?

coffeae. 31. C. teſta brevi fuſca: faſciis duabus albis; ſpirae propiore fuſco maculata.
Martin. Conch. 2. *t.* 56. *f.* 618.
Habitat - - - *teſta mediae magnitudinis.*

Amadis. 32. C. teſta dilute fuſca: faſcia lata cingulisque ſupra infraque articulatis; ſpira acuta coronata ſubtiliter transverſim ſtriata.
Argenv. zoomorph. t. 10. *f.* S.
Conch. t. 1. *f.* 5.
Knorr Vergn. 6. *t.* 5. *f.* 3?
Martin. Conch. 2. *t.* 58. *f.* 642. 643.
Favann. Conch. t. 15. *f.* M.
Chemn. Conch. 10. *t.* 142. *f.* 1322. 1323.
Habitat - - - *teſta nunc anguſtiori, nunc magis ventricoſa.*

fulmineus. 33. C. ſpira acuta labioque ſpadiceo maculatis, virgis ſpadiceis per totam teſtam decurrentibus, baſi acuta oblique ſtriata.
Mart. Conch. 2. *t.* 58. *f.* 644.
Habitat - - - *an hujus tribus?*

acachnoideus. 34. C. teſta ſpadiceo reticulata: faſciis duabus tribusve obſcurioribus, ſpira coronata acuta.
Argenv. zoomorph. t. 10. *f.* T.
Knorr Vergn. 6. *t.* 4. *f.* 4.
Spengl. ſelt. Conch. t. 1. *f.* D.
Martin. Conch. 2. *t.* 61. *f.* 676.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 144. A. *f.* c. d.
Habitat pretioſus - - - *an hujus tribus?*

coſtatus. 35. C. teſta fuſca: faſcia alba rubello undulata, ſtriis craſſis latisque, ſpira noduloſa; faſcia granulata.
Gualt. teſt. t. 20. *f.* O.
Habitat - - -

leucoſtictus. 36. C. teſta alba fuſco nebuloſa virgata et maculata: punctorum alborum et fuſcorum ſeriebus pluribus, ſpira coronata.
Liſt. Conch. t. 759. *f.* 4. *et t.* 777. *f.* 24.
Gualt. teſt. t. 21. *f.* L.
Knorr Vergn. 6. *t.* 13. *f.* 5.
Martin. Conch. 2. *t.* 61. *f.* 678.
β) *Martin. Naturg.* 1. *p.* 378. *t.* 19. *f.* 12.
γ) *Gualt. teſt. t.* 20. *f.* L?
δ) *Gualt. teſt. t.* 21. *f.* M?

ε) *Seb.*

ε) *Seb. muſ.* 3. *t.* 48. *f.* 36. 37.
Chemn. Conch. 10. *t.* 140. *f.* 1305.
Habitat in Oceano americano, *ſpira utplurimum acuta.*

citrinus. 37. C. teſta citrina lineis nigris interruptis inferne varia, ſpira coronata baſique albis.
Mart. Conch. 2. *t.* 61. *f.* 681.
Habitat ad Curacas.

inſularis. 38. C. teſta alba ſpadiceo nebuloſa maculata punctataque, ſpira acuta.
Martin. Conch. 2. *t.* 61. *f.* 683.
Habitat - - -

coronatus. 39. C. teſta cingulis articulatis maculisque teſſellatis alternis: ſpira coronata.
Gualt. teſt. *t.* 20. *f.* R.
Valent. Abh. *t.* 3. *f.* 24.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 134?
Muſ. Gottwald. *t.* 12. *f.* 91. a? b? *f.* 92. b. *f.* 93. a. b. d. e.
β) *Martin. Conch.* 2. *t.* 63. *f.* 709.
γ) *Martin. Conch.* 2. *t.* 63. *f.* 710.
δ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 139. *f.* 1286.
ε) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 139. *f.* 128. *t.* 1288.
Habitat - - - *teſta minuta varietate innumera, faſcia ſaepius alba.*

punctatus. 40. C. teſta faſciis duabus lineisque pluribus punctorum ex luteo fuſcorum: ſpira punctis lineisque luteis varia.
Knorr Vergn. 6. *t.* 13. *f.* 6.
Habitat - - - *rarior.*

zeylanicus. 41. C. teſta nivea roſeo fuſcoque nebuloſa: cingulis pluribus articulatis maculisque albo ſpadiceoque variis, ſpira acuminata.
Martin. neueſt. Manigfalt. 1. *p.* 445. *t.* 2. *f.* 20.
Chemn. Conch. 10. *t.* 142. *f.* 1318.
Habitat - - - *baſi oblique ſulcata.*

ſolidus. 69. C. teſta conica craſſa: transverſim ſtriata albo fuſcoque nebuloſa: faſcia lata ſpiraque pyramidali albis; anfractibus canaliculatis. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 59. *t.* 141. *f.* 1310.
Habitat - - -

*** elongati, *baſi rotundata, cylindro duplo longiore, quam ſpira.*

Clavus. 42. C. teſta ſtriis convexis laevibus: baſi caeruleſcente.
Liſt. Conch. t. 744. *f.* 34.
Knorr Vergn. 5. *t.* 11. *f.* 5.
Martin. Conch. 2. *t.* 52. *f.* 570.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 143. *f.* 1327.
Habitat rariſſimus in mari indico, *teſta anguſta, longa, flava, maculis albis, majoribus ſpadiceo marginatis reticulata: faſciis* 2 *ſaturatioribus albo maculatis, ſpira maculata ſenſim in mucronem obtuſum deſinente.*

Nuſſatella. 43. C. teſta ſubcylindrica rubra inermi ſtriis tuberculatis ſcabra.
Rumpf muſ. t. 33. *f.* EE. Terebellum granulatum.
Gualt. teſt. t. 25. *f.* L.
Argenv. Conch. t. 13. *f.* P.
Muſ. Gottwald. t. 13. *f.* 96. a. b. c. *et t.* 43. *f.* 52. a.
Knorr Vergn. 2. *t.* 4. *f.* 7.
Martin. Conch. 2. *t.* 51. *f.* 567.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 143. *f.* 1329.
Habitat rarior ad Aſiae inſulam Nuſſatello, *teſta pallida rubro nebuloſa maculataque, rarius tota alba, granulis ſtriarum transverſarum ex luteo fuſcis, ſpira in mucronem obtuſum abeunte.*

Terebellum. 44. C. teſta alba caeruleo obumbrata ſubcylindrica annulato-ſtriata: faſciis flavis.
Martin. Conch. 2. *t.* 52. *f.* 577.
β) *Liſt. Conch. t.* 745. *f.* 36.
Chemn. Conch. 10. *t.* 143. *f.* 1330.
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 143. *f.* 1331. *n.* 1.
Habitat in mari indico.

Fuſus. 45. C. teſta fuſiformi alba transverſim ſtriata.
Martin. Conch. 2. *t.* 52. *f.* 576.
β) *Gualt. teſt. t.* 22. *f.* 2.
Habitat - - - teſta β) *punctorum fuſcorum ordinibus varia.*

coccineus. 46. C. teſta rubra: lineis transverſis nigro punctatis, faſcia ſpiraque albis ſanguineo maculatis.
Knorr Vergn. 5. *t.* 24. *f.* 2.
Habitat - - - β) *faſciis* 2, *cingulisque pluribus articulatis albis.*

laetus. 47. C. teſta ſubcylindrica annulato coſtata rubra obſcurius nebuloſa albo faſciata: ſpira maculata.
Liſt. Conch. t. 760. *f.* 5.
Knorr Vergn. 3. *t.* 6. *f.* 5.
Habitat - - - an ad granulatum ſpectat?

ochroleucus. 48. C. teſta ſubcylindrica flava: faſcia prope baſin oblique ſtriatam alba, ſpira acuminata virgatim maculata.
Martin. Conch. 2. *t.* 52. *f.* 573.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 44. *f.* 12.
Habitat - - - teſta in β) *flavo ſpadiceoque maculata: ſtriis rubro punctatis decuſſantibus varia.*

laevis. 49. C. teſta rufa maculis ſtriisque transverſis fulvis varia: ſpira flavo maculata, baſi oblique ſtriata.
Valent. Abh. t. 8. *f.* 70.
Martin. Conch. 2. *t.* 52. *f.* 572.
Habitat - - -

affinis. 50. C. teſta ex caeruleſcente alba: faſciis quatuor fulveſcente lineatis; punctis liturisve obſcure purpureis intermediis.
Martin. Conch. 2. *t.* 52. *f.* 571.
β) *Valent. Abh. t.* 2. *f.* 11. *p.* 140.
Habitat - - - arauſiaco affinis, ſpira maculata: maculis in β) *virgatis.*

violaceus. 51. C. teſta alba violaceo nebuloſa: faſciis violaceis, radiis dilute fuſcis.
Martin. neueſt. Manigf. 1. *p.* 444. *t.* 2. *f.* 18. 19.
Habitat - - - ſpira pyramidali anfractuum 6.

granulatus. 52. C. teſta ſcabra inermis ſtriis ſulcatis laevibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 560. *n.* 170.*
Rumpf muſ. t. 32. *f.* T. Voluta granulata.
Gualt. teſt. t. 25. *f.* H.
Pet. aquat. t. 15. *f.* 1.
Knorr Vergn. 3. *t.* 6. *f.* 5.
Liſt. Conch. t. 763. *f.* 12? *t.* 760. *f.* 1.
Martin. Conch. 2. *t.* 57. *f.* 632? *t.* 52. *f.* 574. 575.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 48. *f.* 26.
Habitat in Oceano africano, *teſta laetius rubra et magis ſulcata, quam congenerum: faſciis albis, ſtriarumque punctis purpureis.*

polyzonias. 53. C. teſta intus alba, extrinſecus ex fuſco lutea lineis granulorum ſubtiliſſimis aſpera, faſcia ad ſpiram alba, inferius denticulata, altera ad baſin dilutius tincta pluribusque filiformibus.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 7. *f.* 13.
Habitat - - - ſpira complanata: virgis ſpadiceis varia, baſi exterius obſcura, intus violacea; an hujus tribus?

bifaſciatus. 54. C. teſta alba lineis angulatis ſpadiceis faſciisque duabus aurantiis varia: ſpira prominula, baſi lineis aurantiis cincta: maculis teſſellatis intermediis.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 7. *f.* 10.
Habitat - - -

niveus. 55. C. teſta conica nivea: ſpira prominula coronata, apertura ampla.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 7. *f.* 9.
Habitat - - - an hujus tribus?

arauſiacus. 56. C. teſta incoronata laevi: faſciis albidis, anfractuum ſummis canaliculatis.
Rumpf muſ. t. 34. *f.* A. Oranjen Admiraal.
Valent. Abh. t. 12. *f.* 100.
Pet. amb. t. 7. *f.* 7.
Argenv. zoomorph. t. 10. *f.* I.
Seb. muſ 3. *t.* 48. *f.* 7.
Knorr Vergn. 1. *t.* 8. *f.* 3. *et* 5. *t.* 24. *f.* 1.
Spengl. ſelt. Conch. t. 2. *f.* E.
Martin. Conch. 2. *t.* 57. *f.* 636. 637.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 144. A. *f.* l.
Habitat rarus in India, *teſta alba; faſciis* 2-3 *aurantiis lineisque albis: maculis teſſellatis pullis, ſpira maculis oblongis rubris, albis fuſcisque varia.*

Magus. 57. C. teſta ſubcylindrica: faſciis longitudinalibus albo-punctatis. *Muſ. Lud. Ulr* 560. *n.* 171.*
Rumpf muſ t. 32. *f.* Q. Voluta maculoſa.
Bonann. recr. 3. *f.* 362?
muſ. Kirch. 3. *f.* 355.
Gualt. teſt. t. 20. *f.* F?
Argenv. zoomorph. t. 11. *f.* C.
Seb. muſ. 3. *t.* 44. *f.* 27.
Knorr Vergn. 6. *t.* 16. *f.* 5? *et t.* 1. *f.* 3.
Martin. Conch. 2. *t.* 58. *f.* 641.

Habitat

Habitat in India, *teſta alba, lineis punctatis maculisque oblongis ſpadiceis luteis, flavis, fuſcis varia, ſpira acuta maculata.*

ſtriatus. 58. C. teſta ovato-oblonga gibba nebuloſa: ſtriis tenuiſſimis parallelis fuſcis. *Muſ. Lud. Ulr.* 561. *p.* 172.
Rumpf muſ. t. 31. *f.* F. Voluta tigerina.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 6. *f.* 2. Melar.
Liſt. Conch. t. 755. *f.* 7. *et t.* 760. *f.* 6.
Gualt. teſt. t. 26. *f.* D.
Valent. Abh. t. 7. *f.* 60. 61.
Pet. gaz. t. 98. *f.* 9.
Argenv. Conch. t. 13. *f.* C.
Seb. muſ. 3. *t.* 42. *f.* 5-9. *et t.* 47. *f.* 22. 23.
Muſ. Gottwald. t. 12. *f.* 83. a-g.
Knorr Vergn. 1. *t.* 18. *f.* 1. *et* 3. *t.* 12. *f.* 5. *t.* 21. *f.* 1. *et t.* 22. *f.* 4.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 13.
Martin. Conch. 2. *t.* 64. *f.* 714-716.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 141. *f.* 1311.
Habitat ad Africae *littus occidentale frequens, teſta ad* 4 *pollices longa, nivea, ſtriis interdum rubellis aut flaveſcentibus, baſi emarginata, transverſe ſtriata.*

Textile. 59. C. teſta venis reticulatis luteis: maculis luteis fuſcisque. *Muſ. Lud. Ulr.* 561. *n.* 173.*
Argenv. Conch. t. 13. *f.* F. I. Pannus aureus.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 6. *f.* 7. Loman.
Liſt. Conch. t. 788. *f.* 40.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 135.
Rumpf muſ. t. 32. *f.* O. P.
Gualt. teſt. t. 25. *f.* I. AA.
Seb. muſ. 3. *t.* 43. *f.* 6-12. *et t.* 47. *f.* 13-17.
Olear. muſ. t. 31. *f.* 1. 3.
Muſ. Gottwald. t. 13. *f.* 85. a. b. c. *f.* 94. a. b. d-h. *et f.* 95. α. β.
Knorr Vergn. 1. *t.* 18. *f.* 6. *et* 2. *t.* 8. *f.* 3.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 6. *f.* 62.
Martin. Conch. 2. *t.* 54. *f.* 598-600.
Martin. Conch. 2. *t.* 54. *f.* 602.
Chemn. Beſch. berl. naturf. Geſ. 3. *t.* 8. *f.* A.
Conch. 10. *t.* 143. *f.* 1324. 1325.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 143. *f.* 1326. a.
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 143. *f.* 1326. b. c.

Habitat ad Bandam Aſiae, *teſta alba, in γ) perſici florum colore tincta, faſciis tribus aurantiis, in β) faſciis 2 obſcurioribus varia.*

aulicus. 60. C. teſta venis reticulatis faſciisque longitudinalibus fuſcis interruptis. *Muſ Lud. Ulr.* 562. *n.* 174.*
Argenv. Conch. t. 13. *f* D. G. Nigella.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 133.
Rumpf muſ. t. 33. *f.* 3. 4.
Valent. Abb. t. 9. *f.* 75.
Gualt. teſt. t. 25. *f.* V. X. Z.
Seb muſ. 3. *t.* 43. *f.* 1-5. *et t.* 47. *f.* 10-12.
Olear. muſ. t. 31. *f.* 4. 5.
Knorr Vergn. 2. *t.* 1. *f.* 1-3. *et* 3. *t.* 19. *f.* 1.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 25.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 7. *f.* 14.
Favann Conch. 2. *t.* 18. *f.* C⁶. C⁷.
Chemn. Conch. 10. *t.* 143. *f.* 1328.
α) *Martin. Conch.* 2. *t.* 53. *f.* 591. 593. 594.
β) *Martin. Conch.* 2. *t.* 53. *f.* 592. 595. *t.* 54. *f.* 596.
γ) *Martin. Conch.* 2. *t.* 54. *f.* 597.
δ) teſta ex luteo fuſca: maculis reticulatis cordatis perpendicularibus.
ε) *Martin. Conch.* 2. *t.* 54. *f.* 601.
Seb. muſ. 3. *t.* 47. *f.* 3?
ζ) *Knorr Vergn.* 3. *t.* 18 *f.* 2.
Habitat in Aſia, *an ſpecie diſtinctus a textili.*

Thomae. 70. C. teſta laevi alba characteribus punctisque ſeriatis badiis, cingulis tribus maculisque albis varia apice rubicunda, ſpira conica: anfractibus canaliculatis.
Mart. Conch. 2. *t.* 53. *f.* 590.
Chemn. Conch. 10. *t.* 143. *f.* 1331. *n.* 2.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 138. *f.* 1282. 1283.
Habitat in mari indico.

**** *teſta medio ventricoſa, utrinque anguſtata.*

ſinenſis. 61. C. teſta medio ventricoſa flava: ocellis albis, baſi transverſim ſtriata.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 66.
Martin. Conch. 2. *t.* 56. *f.* 615.
Habitat - - -

***** Laxi

***** Laxi *ventricoſi in dorſum disjecti ſuper menſam tinnitantes.*

Spectrum. 62. C. teſta caeruleſcente flava nebuloſa: punctis ſtriisque albo-luteis. *Muſ. Lud. Ulr.* 562. *n.* 175.*
Rumpf muſ. t. 32. *f.* S. Voluta ſpectrorum.
Liſt. Conch. t. 783. *f.* 30.
Valent. Abh. t. 5. *f.* 39.
Gualt. teſt. t. 25. *f.* S.
Seb. muſ. 3. *t.* 47. *f.* 24.
Muſ. Gottwald. t. 14. *f.* 101. f? *t.* 12. *f.* 84. a-d. *et f.* 85. a. d.
Knorr Vergn. 2. *t.* 8. *f.* 4.
Martin. Conch. 2. *t.* 53. *f.* 581-583.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 140. *f.* 1304.
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 144. A. *f.* g. h.
δ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 144. A. *f.* o. p.
ε) *Kaemm. Cab. Rudolſt. p.* 79. *n.* 18. *t.* 6. *f.* 2?
Habitat in Oceano Aſiae auſtrali *rarior, ſpira ſatis acuta.*

bullatus. 63. C. teſta flava albo nebuloſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 563. *n.* 176.*
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 5. *f.* 1. Potan.
Liſt. Conch. t. 741. *f.* 37. *t.* 742. *f.* 38. *t.* 748. *f.* 42. 43. *et t.* 749. *f.* 44. 45.
Gualt. teſt. t. 26. *f.* C.
Argenv. Conch. t. 13. *f.* H.
Seb. muſ. 3. *t.* 42. *f.* 14. 15. *et t.* 43. *f.* 15. 16.
Muſ. Gottwald. t. 10. *f.* 65. a-f. *et t.* 66. a. b.
Knorr Vergn. 5. *t.* 8. *f.* 2. 3. *et t.* 11. *f.* 4.
Regenſ. Conch. 2. *t.* 11. *f.* 45.
Favann. Conch. 2. *t.* 18. *f.* C*.
Martini Conch. 2. *t.* 65. *f.* 725-732.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 4. *f.* 1.
n. Litterat. 3. *p.* 245. *t.* 1. *f.* 10. 11.
Chemn. Conch. 10. *t.* 142. *f.* 1315. 1316.
Habitat - - - teſta tenui, nunc unicolore, frequentius maculata, nebuloſa, faſciata, nunc magis nunc minus ventricoſa, apertura utplurimum ampla, caeruleſcente, ſpira nunc plana, nunc acuta.

Tulipa. 64. C. teſta oblonga gibba laevi: apertura dehiſcente.
Argenv. Conch. t. 13. *f.* B. Tulipa.
Liſt. Conch. t. 764. *f.* 13.
Bonann. muſ. Kircher 3. *f.* 411.
Rumpf muſ. t. 34. *f.* K.
Valent. Abh. t. 10. *f.* 89.

Seb. muſ. 3. *t.* 42. *f.* 16-21. *t.* 43. *f.* 20. 21. 22. 36?
Knorr Vergn. 3. *t.* 11. *f.* 4. *et* 5. *t.* 20. *f.* 1. 2.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 20.
Martini Conch. 2. *t.* 64. 65. *f.* 718-721.
Habitat in India, Africa *et meridionali* America, *geographo affinis, at teſta non coronata, alba hinc inde caeruleſcente fuſco, luteo rubroque nebuloſa, lineisque ſpadiceis interruptis picta, apertura caeruleſcente, baſi obſolete oblique ſtriata, ſpira acuta, laevi, maculata, ſubtiliſſime transverſim ſtriata.*

Geographus. 65. C. teſta oblonga gibba coronata, apertura dehiſcente.
Rumpf muſ. t. 31. *f.* G. Nubecula.
Argenv. Conch. t. 13. *f.* A. Textile ſericum.
Klein oſtr. t. 5. *f.* 90. Nubecula, tulipa gallorum.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 6. *f.* 8. Salar.
Liſt. Conch. t. 747. *f.* 41.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 319.
Gualt. teſt. t. 26. *f.* E.
Pet. gaz. t. 98. *f.* 8.
Seb. muſ. t. 42. *f.* 1. 4.
Knorr Vergn. 3. *t.* 21. *f.* 2. *et* 6. *t.* 17. *f.* 3.
Muſ. Gottwald. t. 12. *f.* 85. 1.
Martini Conch. 2. *t.* 64. *f.* 717.
Habitat rarior in Oceano indico *et* africano, *teſta ſubcylindrica ad baſin rugoſam paulo anguſtiore, pellucida, alba, fuſco maculata nebuloſaque, apertura alba, ſpira interdum roſea.*

Nubecula. 66. C. teſta alba aurantio nebuloſa et maculata: punctis ſparſis albis, ſpira prominente acuta.
Seb. muſ. 3. *t.* 42. *f.* 14. 15.
Martini Conch. 2. *t.* 56. *f.* 622.
β) *Argenv. Conch. t.* 13. *f.* H.
Habitat - - - -

ſpurius. 67. C. teſta alba: macularum ſpadicearum aut nigrarum irregularium ſeriebus faſciisque punctatis interruptis alternis.
Gualt. teſt. t. 21. *f.* D. F.
Argenv. Conch. t. 12. *f.* C.
Seb. muſ. 3. *t.* 44. *f.* 24. 25. 28. *et t.* 46. *f.* 24-29.
Knorr Vergn. 3. *t.* 18. *f.* 5. *et* 5. *t.* 9. *f.* 6. *et t.* 22. *f.* 3.
Martin. Conch. 2. *t.* 56. *f.* 626-628.
Habitat - - - -

Vexillum. 68. C. teſta fuſca albo obumbrata: faſcia alba interrupta.
Rumpf muſ. t. 31. *f.* S.
Gualt. teſt. t. 20. *f.* M. *et t.* 21. *f.* E..
Seb. muſ. 3. *t.* 44. *f.* 8-11. *et t.* 45. *f.* 16. 17.
Mart. Conch. 2. *t.* 57. *f.* 629.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 144. A. *f.* m. n.
Habitat - - - teſta interdum ſatis magna, faſcia nonnunquam cruciata.

ventricoſus. 71. C. teſta fuſca albo faſciata inferne anguſtata caeruleſcente obumbrata laevi, ſpira conica exſerta. *Kaemm. Cab. Rudolſt. p.* 91. *n.* 46. *t.* 6. *f.* 3. 4.
Habitat - - - -

320. CYPRAEA. *Animal* Limax.

Teſta univalvis, involuta, ſubovata, obtuſa, laevis.

Apertura utrinque effuſa, linearis, utrinque dentata, longitudinalis.

Exanthema. 1. C. teſta ſubturbinata ferruginea maculis pallidis rotundis adſperſa: linea longitudinali ſubramoſa.
Liſt. Conch. t. 698. *f.* 45. *et t.* 699. *f.* 46.
Bonann. recr. 3. *f.* 257.
- - - muſ. Kirch. 3. *f.* 256.
Gualt. teſt. t. 16. *f.* O.
Pet. gaz t. 96. *f.* 6.
Seb. muſ. 3. *t.* 76. *f.* 4. 5. 16. 18.
Muſ. Gottwald. t. 3. *f.* 14? *et t.* 14. *f.* a. b. c. d. e. f.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 6. *f.* 63. *et t.* 10. *f.* 38.
Martin. Conch. 1. *t.* 28. *f.* 289. *t.* 29. *f.* 298-300.
β) *Liſt. Conch. t.* 697. *f.* 44.
Chemn. Conch. 10. *t.* 145. *f.* 1343.
Habitat in Oceano americano, atlantico, *mappae affinis, teſta ſubtus pallida immaculata, dentibus aperturae fuſcis, ſupra oculis guttisve pallidis, nunc majoribus, nunc minoribus, detrita fuſco faſciata aut teſſellata, aut caerulea.*

Mappa. 2. C. teſta ſubturbinata characteribus inſcripta: linea longitudinali ramoſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 565. *n.* 179.

Rumpf

Rumpf muſ. t. 38. *f.* B. Porcellana montoſa.
Argenv. Conch. t. 18. *f.* B. Carte geographique.
Seb. muſ. 3. *t.* 76. *f.* 3. 13.
Pet. gaz. t. 96. *f.* 6.
amb. aq. t. 16. *f.* 2.
Knorr delic. t. B. IV. *f.* 5.
Knorr Vergn. 1. *t.* 26. *f.* 3.
Martin. Conch. 1. *t.* 25. *f.* 245. 246.
Habitat in Oceano indico *et* africano, *rarior teſta breviore, ventricoſa ad latera laevi, pallida immaculata ab exanthemate diſcernenda; teſta ſupra ex fuſco lutea, hinc inde ocellis albis varia, ſubtus laevi ſubincarnata: maculis dilute fuſcis, aperturae dentibus flavis.*

arabica. 3. C. teſta ſubturbinata characteribus inſcripta: macula longitudinali ſimplici. *Muſ. Lud. Ulr.* 566. *n.* 180.*
Rumpf muſ. t. 38. *f.* M. Porcellana literata ſ. arabica.
Barrel. rar. t. 1325. *f.* 20.
Liſt. Conch. t. 658. *f.* 3.
Gualt. teſt. t. 16. *f.* V.
Lochn. muſ. Besler. t. 21. *f.* 8.
Muſ. Gottwald. t. 2. *f.* 7. a-d. *et f.* 8. b.
Knorr Vergn. 3. *t.* 2. *f.* 2. *et t.* 12. *f.* 2. *et* 6. *t.* 20. *f.* 2.
Martin. Conch. 1. *t.* 31. *f.* 328-330.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 3. *f.* 5.
β) *Liſt. Conch. t.* 659. *f.* 3. a.
Bonann. recr. 3. *f.* 260.
Bonann. muſ. Kirch. 3. *f.* 259.
Argenv. zoomorph. t. 11. *f.* 1.
Muſ. Gottwald. t. 2. *f.* 8. a.
Knorr Vergn. 2. *t.* 16. *f.* 1.
Martin. Conch. 1. *t.* 31. *f.* 331.
γ) *Martin. Conch.* 1. *t.* 29. *f.* 304.
Habitat in India, *teſta ad* 3 *pollices longa, ſupra albida aut caeruleſcente, ad latera incraſſata fuſco aut atro maculata, intus violacea, aperturae labiis planis ex rubello cinereis; detrita teſta nunc caeruleſcente fuſco faſciata, nunc badia hinc inde albido nebuloſa, nunc dilutius tincta: maculis virgatis lineisque angularibus obſcurioribus, nunc fuſca violaceo miſta, nunc ex caeruleſcente rubella caeruleo miſta, nunc alba caeruleo obumbrata.*

Argus. 4. C. teſta ſubturbinata ſubcylindrica adſperſa ocellis, ſubtus maculis quatuor fuſcis. *Muſ. Lud. Ulr.* 567. *n.* 181.*

Rumpf

Rumpf muſ. t. 38. *f.* D. Argus.
Argenv. Conch. t. 18. *f.* D. Argus magnus.
Liſt. Conch. t. 705. *f.* 54.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 263.
Barrel. rar. t. 1325. *f.* 25.
Pet. gaz. t. 97. *f.* 6.
Valenti Abh. t. 10. *f.* 86.
Gualt. teſt. t. 16. *f.* T.
Klein oſtr. t. 6. *f.* 101.
Leſſer teſtaceoth. f. 28.
Knorr Vergn. 3. *t.* 11. *f.* 5.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 5. *f.* 57.
Martin. Conch. 1. *t.* 28. *f.* 285. 286.
β) *Favann. Cat. raiſ. t.* 2.
Chemn. Conch. 10. *t.* 145. *f.* 1344. 1345.
Habitat in Oceano indico *et* atlantico, *teſta ad* 4 *pollices longa, anguſta, ſupra griſea aut flaveſcente: faſciis tribus fuſcis, ocellis rarius concatenatis, maculis ſubtus ſiniſtris majoribus, labiis ſtramineis, dentibus fuſcis.*

teſtudinaria. 5. C. teſta obtuſa ſubcylindrica: extremitatibus depreſſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 567. *n.* 182.*
Rumpf muſ. t. 38. *f.* C. Teſtudinaria.
Pet. amb. aq. t. 8. *f.* 7.
Liſt. Conch. t. 689. *f.* 36.
Knorr Vergn. 4. *t.* 27. *f.* 2.
Martin. Conch. 1. *t.* 27. *f.* 271. 272.
β) *Liſt. Conch. t.* 748. *f.* 42. 43. Larva?
Habitat in ſinu perſico *et* Oceano indico, *teſta, quam congenerum omnium, majore, exalbida, pullo nebuloſa, maculis hinc inde magnis nigris qaaſi farina conſperſis interdum quoque albis.*

ſtercoraria. 6. C. teſta ſubturbinata gibba livido teſtaceoque maculata utrinque marginata ſubtus plana.
Liſt. Conch. t. 687. *f.* 34?
Gualt. teſt. t. 15. *f.* T?
Columm. aq. t. 69. *f.* 1. 2.
Pet. gaz. t. 96. *f.* 7. 8.
Barrel. ic. t. 1321. *f.* 23. *et t.* 1322. *f.* 4.
Muſ. Gottwald. t. 3. *f.* 10. a. b.
Knorr Vergn. 4. *t.* 13. *f.* 1.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 5. *f.* 1. A.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 99. *t.* 1. *f.* 5.

β) *Gualt.*

β) *Gualt. teſt. t.* 13. *f.* L?
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 144. *f.* 1332.
δ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 144. *f.* 1333.
Habitat frequens ad Guineam, *teſta ſubovata undato glauca, anterius juxta ſpiram macula fuſca, poſterius depreſſo marginata deflexa, labio interiore poſterius valde retuſo, apertura anterius valde gibba, dentibus albis, ſulcis intermediis fuſcis; teſta ſub epidermide nunc ex vireſcente caerulea hinc inde maculata, nunc faſciis translucentibus ornata, nunc maculis fuſcis faſciisque caerulea varia, nunc vireſcente: faſciis 5-6 fuſcis aut faſciis 2 rectis, 2 undulatis, aut altero latere livida, altero vireſcente, aut nigra: maculis 2 albis, aut caerulea maculis hinc inde rubellis, aut dilute caerulea rubedine translucente varia.*

Carneola. 7. C. teſta ſubturbinata pallida: faſciis incarnatis, ore violaceo. *Muſ. Lud. Ulr.* 568. *n.* 183.*
Rumpf muſ. t. 38. *f.* K. Carneola.
Pet. gaz. t. 30. *f.* 8.
Liſt. Conch. t. 665. *f.* 9?
Gualt. teſt. t. 13. *f.* H.
Argenv. Conch. t. 18. *f.* O.
Muſ. Gottwald. t. 5. *f.* 16. a? b?
Knorr Vergn. 6. *t.* 17. *f.* 4.
v. Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 8. *f.* 2.
Martyn univ. Conch. 1. *t.* 14.
Martin. Conch. 1. *t.* 28. *f.* 287. 288.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 76. *f.* 23?
Habitat in Oceano Aſiae auſtrali, *teſta tenui, anguſta,* 2½ *pollices longa, intus ſubtusque alba, exterius et ſupra interdum cinerea: faſciis fuſcis.*

Zebra. 8. C. teſta turbinata cinerea: faſciis fuſcis.
Liſt. Conch. t. 669. *f.* 15.
Bonann. recr. 3. *f.* 266.
muſ. Kirch. 3. *f.* 265.
Argenv. Conch. t. 18. *f.* G.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 101. *t.* 1. *f.* 6.
Habitat rarior in India, *carneolae affinis, at teſta duplo majore, ſpira magis prominente, ſubtus ocellis obſoletis dentibusque aperturae fuſcis diſtincta.*

Talpa. 9. C. teſta ſubturbinata ſubcylindrica teſtacea: faſciis pallidis, ſubtus incraſſata fuſca. *Muſ. Lud. Ulr.* 568. *n.* 184.*
Argenv.

Argenv. Conch. t. 18. *f.* H. Talpa.
Rumpf muſ. t. 38. *f.* I. Talpa.
Pet. amb. aq. t. 16. *f.* 1.
Valent. Abb. t. 2. *f.* 13?
Barrel. rar. t. 1325. *f.* 19.
Liſt. Conch. t. 668. *f.* 14.
Gualt. teſt. t. 16. *f.* N.
Muſ. Gottwald. t. 6. *f.* 23. a?
Knorr Vergn. 1. *t.* 27. *f.* 2. 3.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 10. *f.* 37.
Martin. Conch. 1. *t.* 27. *f.* 273. 274.
Habitat in India, *teſta ad 3 pollices longa nitidiſſima, ſupra nunc hepatica, nunc cinerea, nunc albida, frequentiſſime ex fuſco lutea: faſciis 3 dilutioribus, intus alba, dentibus infra fuſcis: interſtitiis canis.*

amethyſtea. 10. C. teſta ſubturbinata: lateribus gibbis corticatis, dorſo violaceo. *Muſ. Lud. Ulr.* 569. *n.* 185.*
Rumpf muſ. t. 39. *f.* Q. Achatina.
Pet. gaz. t. 32. *f.* 10.
Liſt. Conch. t. 662. *f.* 6.
Seb. muſ. 3. *t.* 76. *f.* 32.
Muſ. Gottwald. t. 3. *f.* 13. a. b. *t.* 5. *f.* 18. c. *et t.* 7. *f.* 33. h.
Knorr Vergn. 5. *t.* 28. *f.* 5.
Martin. Conch. 1. *t.* 25. *f.* 247-249.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 76. *f.* 24?
Habitat in Madagaſcar, *teſta tenui, faſciis ſupra 4 fuſceſcentibus nebuloſis, ad alterutrum latus characteribus exornata, intus caerulea, ampliore, quam in Zebra, ſpiraque minus prominente.*

lurida. 11. C. teſta ſubturbinata lurida ſubfaſciata: extremitatibus luteis nigro bimaculatis.
Argenv. Conch. t. 18. *f.* C. Souris.
Liſt. Conch. t. 671. *f.* 17. *et t.* 673. *f.* 19.
Bonann. recr. 3. *f.* 251.
muſ. Kircher. 3. *f.* 250.
Gualt. teſt. t. 13. *f.* E. I.
Muſ. Gottwald. t. 5. *f.* 16. c.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 5. *f.* 1. D.
Martin. Conch. 1. *t.* 30. *f.* 315.
Habitat in mari mediterraneo, americano, *frequentius in* atlantico *et* aethiopico, *teſta ad 2 pollices longa, elongata anguſta, ſubtus alba, ſupra nunc murina obſcurius faſciata,*

nunc

nunc vireſcente aut rubella: faſciis caeruleſcentibus, nunc ſubfuſca: faſciis rubellis, et anfractuum margine interdum nigro, nunc dilutius fuſca: faſciis exalbidis, nunc badia: faſciis obſoletis, aut caeruleſcentibus, nunc ex fuſco lutea, nunc lata hinc inde albo nebuloſa, nunc ſpadicea: faſcia flava, alteraque alba.

Venelli. 12. C. teſta ſubturbinata maculata punctis luteſcentibus; extremitatibus fuſco maculatis, fauce rufa. *Muſ. Lud. Ulr.* 569. *n.* 186.*
Pet. gaz. t. 95. *f.* 13.
Habitat - - - -

Iota. 13. C. teſta ſubturbinata alba: denticulis ſubulatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 570. n. 187.*
Bonann. recr. 3. *f.* 245.
muſ. Kircher. 3. *f.* 244.
Muſ Gottwald. t. 5. *f.* 20. a. b. c.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. *f.* 4. 5.
Martin. Conch. 1. *t.* 30. *f.* 322.
β) *Gualt. teſt. t.* 15. *f.* C?
Habitat in mari ſiculo, *teſta lactea nitidiſſima, translucente inter dentes ſiniſtri labii rubore.*

fragilis. 14. C. teſta turbinata ovata glauca teſtaceo-undata ſubfaſciata. *Muſ. Lud. Ulr.* 570. *n.* 188.*
Rondel. aq. 2. *p.* 102.
Gualt. teſt. t. 16. *f.* Q.
Habitat in mari mediterraneo, *teſtae ſtructura arabicae, at magis tenui undis longitudinalibus faſciisque pallidis, ab amethyſtea colore potius in cinereum vergente, diſcernenda.*

guttata. 15. C. teſta tenui gibba fulva albo-guttata: linea media horizontali, ſubtus alba: dentibus flavis.
Liſt. Conch. t. 676. *f.* 23.
Gualt teſt. t. 16. *f.* I.
Martin. Conch. 1. *t.* 25. *f.* 252. 253.
Habitat - - - -

cinerea. 16. C. teſta tenui ventricoſa ex rubello cinerea: faſciis dilutioribus, ore albo.
Liſt. Conch. t. 667. *f.* 11. *t.* 668. *f.* 13. a. b. *et t.* 670. *f.* 16.
Gualt. teſt. t. 16. *f.* H. L. M.
Martin. Conch. 1. *t.* 25. *f.* 254. 255.
Habitat - - - - *teſta brevi, faſcia* 1-4.

17. C.

plumbea. 17. C. teſta ſubturbinata tenui; dorſo plumbeo; faſciis quatuor caeruleo fuſcoque variis fuſceſcente undulatis ad marginem caeruleo fuſcoque lineatis.
Martin. Conch. 1. *t.* 26. *f.* 256.
Habitat rarior ad Guineam, *exanthemati affinis.*

oculata. 18. C. teſta ſubturbinata pulla albo ocellata: dorſo faſciis tribus pallidioribus.
Mant. 2. *p.* 548. Cypraea Cervus?
Liſt. Conch. t. 697. *f.* 44.
Bonann. recr. 3. *f.* 267.
muſ. Kircher. 3. *f.* 266.
Knorr Vergn. 1. *t.* 5. *f.* 3. 4.
Martin. Conch. 1. *t.* 26. *f.* 257. 258.
β) *Valent. Abh. t.* 9. *f.* 83.
γ) *Seb. muſ.* 3. t. 76. *f.* 20.
Habitat in Oceano americano, *teſta ſatis grandi, coffeae colore tincta.*

Hiſtrio. 120. C. teſta ovata ſubturbinata ſublivido ocellata, ſubtus plana alba, ad latera incraſſata atra fuſco maculata, linea dorſali livida, fauce violacea.
Chemn. Conch. 10. *p.* 110. *t.* 145. *f.* 1346. 1347.
Liſt. Conch. t. 659. *f.* 3a.
Knorr Vergn. 2. *t.* 16. *f.* 1.
Martyn Conchol. t. 15.
Habitat in mari indico.

Aurantium. 121. C. teſta ſubturbinata aurantia margine alba immaculata, fauce rutila. *Martyn univ. Conchol.* 2. *t.* 59.
Habitat ad inſulas amicas.

ferruginoſa. 19. C. teſta tenui elongata flaveſcente aut caeruleſcente: maculis ferrugineis, intus caerulea.
Martin. Conch. 1. *t.* 26. *f.* 260-262.
Habitat - - - teſta detrita caerulea.

livida. 20. C. teſta tenui elongata unicolore ſtraminea, lutea aut rubella, ſubtus fuſco punctata, dentibus ſubulatis.
Liſt. Conch. t. 656. *f.* 1.
Bonann. muſ. Kirch. 3. *f.* 405.
Habitat - - - -

gibba. 21. C. teſta tenui gibba: dorſo nebuloſo transverſim faſciato.
Liſt. Conch. t. 663. *f.* 7.
Habitat - - - amethyſteae affinis.

turbinata. 22. C. teſta turbinata ovata glauca: maculis angulatis pallidis.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. *f.* 6.
β) *Liſt. Conch. t.* 675. *f.* 22.
Habitat - - - *fragili affinis*, β) *teſta fuſca bifaſciata.*

venerea. 23. C. teſta oblonga fuſca: maculis aureis virgatis, intus caerulea.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 262.
Habitat - - - *bullis affinis.*

purpuraſcens. 24. C. teſta oblonga purpuraſcente: ſubtus linea alba cincta.
Gualt. teſt. t. 16. *f.* A.
β) *Gualt. teſt. t.* 16. *f.* B.
Habitat - - - -

albida. 25. C. teſta oblonga albida: labiorum fine fulvo-maculato.
Gualt. teſt. t. 16. *f.* C.
Habitat - - - -

rufeſcens. 26. C. teſta oblonga ex fuſco rufeſcente, ſubtus albida.
Gualt. teſt. t. 16. *f.* D.
Habitat - - - *teſta* $1\frac{1}{4}$ *pollicis longa.*

translucens. 27. C. teſta cylindrica cinerea: faſciis tranſlucentibus.
Gualt. teſt. t. 16. *f.* G.
Habitat - - - -

punctulata. 28. C. teſta cylindrica fragili alba: faſciis punctorum rubellorum tranſverſis.
Gualt. teſt. t. 16. *f.* P.
β) *Muſ. Gottwald. t.* 6. *f.* 23. c.
Habitat - - - -

tigrina. 29. C. teſta obtuſa ovata ſubturbinata; linea longitudinali teſtacea.

Seb.

An diſtinctae hujus primae tribus ſpecies ſunt cypraeae *a* Seba *muſ.* 3. *t.* 76. *f.* 22. 25-29. 31 *a* Liſtero *Conch. t.* 656. *f.* 1. *a* Bonanni *muſ. Kirch.* 3. *f.* 405. *an diſtinctae ſpecies in muſ.* Gottwald. *t.* 4. *f.* 14. g. *t.* 5. *f.* 16 d. *t.* 7. *f.* 37. b. d. *f.* 17. a-e. *f.* 18. g. h. *f.* 19. d. e *f.* k. *f.* 20. d. *f.* 21. a. b. *f.* 22. d. e h. *t.* 6 *f.* 23. b. c. *f.* 24 a. b. *t.* 7. *f.* 32. b. f. *f.* 33. m. *f.* 35. a-c. *f.* 38. *f.* 39 *f.* 40. b. e. *et f.* 41. a. b. *delineatae? cui tribui accenſendae ſunt ſpecies ab* Argenville *conchyl. t.* 18 *f.* 2. *a* Gualtiero *teſt. t.* 13. *f.* G. *t.* 15. *f.* D. F. G. Q. V. X. Z. *a* Liſtero *t.* 710 *f.* 62. *et t.* 685. *f.* 32. *et a* Knorr *Vergn.* 4. *t.* 9. *f.* 6. *depictae? An propriam conſtituit tribum cypraea oblonga alba teſt. t.* 13. *f.* C. *a* Gualtiero *adumbrata?* Cypraeae *jam ex mari extractae nitore et colorum elegantia utplurimum placent, detritae ſaepe, aliisque artibus nativa varietate aucta in muſeis aſſervatae, et in catalogis memoratae.*

Seb. muſ. 3. *t.* 76. *f.* 12.
Habitat - - - *C. tigridi affinis, at ſpira manifeſta guttisque longe rarioribus diſtincta.*

dubia. 30. C. teſta oblonga ferruginea: faſciis dilutioribus.
Seb. muſ. 3. *t.* 76. *f.* 15.
Habitat - - - *C. Exanthemati affinis.*

trifaſciata. 31. C. teſta turbinata tenui ex caeruleſcente fuſca: utroque fine faſciisque tribus flaveſcentibus fuſco variis.
Knorr Vergn. 6. *t.* 18. *f.* 2.
Habitat - - - *pretioſa, rara.*

conſpurcata. 32. C. teſta turbinata ex caeruleſcente alba fuſco guttata nebuloſaque.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. *f.* 1. Cypraea ſtercoraria.
Habitat - - - *ſtercorariae affinis.*

bifaſciata. 33. C. teſta oblonga purpuraſcente obumbrata: faſcia ſtraminea alteraque anguſtiore alba, limboque fuſco.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. *f.* 3. Cypraea Zebra.
Habitat - - - *teſta* 4 *fere pollices longa.*

cylindrica. 34. C. teſta cylindrica ſupra dilute amethyſtina ad latera fuſceſcenti maculata; ad utrumque finem maculis duabus fuſcis.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. *f.* 10.
Habitat rarior - - - *labiis albis, faſciis dorſi interdum* 3 *ſubfuſcis.*

teres. 35. C. teſta cylindrica lactea altero latere limbata liturisque anguſtis luteis rarioribus varia: dorſo faſciis undatis tribus fuſceſcentibus.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 161. *t.* 1. *f.* 7.
Habitat - - - -

ovata. 36. C. teſta ovata depreſſiuſcula altero latere ſublimbata: dorſo albido confertim ex luteo fuſco punctato et undulato: faſciis tribus obſcurioribus obſoletis.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 165. *n.* 120.
Habitat - - - *teſta tenuiſſima fragili, anguſta, ſubtus et ad latera alba,* 1½ *pollices longa,* ¾ *lata, lineis* 2 *infra ſpiram fuſcis, dentibus alterius labii nullis, alterius ſubulatis.*

minuta. 37. C. teſta oblonga unicolore perſici florum colore tincta ſubtus albo punctulata: limbo alterius lateris dentibusque labii albis, utroque fine ſupra flavo, ſpirae apice nigro.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 165. *n.* 121.
Habitat - - - -

ſanguinolenta. 38. C. teſta tenui oblonga fuſco-faſciata, ad latera ſanguineo-punctata.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 234.
Muſ. Gottwald. t. 4. *f.* 14. g. 3. *et t.* 6. *f.* 23. d.
Martin. Conch. 1. *t.* 26. *f.* 265. 266.
Habitat - - - -

faſciata. 116. C. teſta turbinata glauca marginata ſupra gibba: faſciis fuſceſcentibus transverſis, fauce glauca. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 100. *t.* 144. *f.* 1334.
Habitat ad Guineae littora.

Regina. 117. C. teſta gibba ex glauco fuſca, maculis trigonis teſtaceis albidisque faſciisque tribus transverſis picta, fauce nigro-glauca. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 101. *t.* 144. *f.* 1335. 1336.
Seb. muſ. 3. *t.* 76. *ſer.* 5. *n.* 3.
Knorr Vergn. 6. *t.* 18. *f.* 2. *t.* 27. *f.* 6.
Mart. Conch. 1. *t.* 22. *f.* 207. 208.
Habitat - - - -

undulata. 118. C. teſta turbinata fuſceſcente undulata ochroleuco-nebuloſa: faſciis ſaturatioribus. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 102. *t.* 144. *f.* 1337.
Habitat rara ad inſulam S. Mauritii.

** *obtuſae absque ſpira manifeſta.*

Caput ſerpentis. 39. C. teſta triquetro-gibba poſterius obtuſiuſcula. *Muſ. Lud. Ulr.* 571. *n.* 189.*
Liſt. Conch. t. 702. *f.* 50. Concha veneris maculis quaſi reticulatis.
Rumpf muſ. t. 38. *f.* F. Caput ſerpentis minus.
Bonann. recr. 3. *f.* 258.
muſ. Kircher. 3. *f.* 257.
Rondel. aq. 2. *p.* 103. *f.* 3.
Pet. gaz. t. 96. *f.* 9.
amb. aq. t. 12. *f.* 7.
Gualt. teſt. t. 15. *f.* I. O.
Muſ. Gottwald. t. 6. *f.* 31. *f.* 31. a. d. *et f.* 32. a.

Adanſ.

Adanſ. Seneg. 1. *t.* 5. *f.* G.
Knorr Vergn. 4. *t.* 9. *f.* 3.
Martin. Conch. 1. *t.* 30. *f.* 316.
Habitat frequens ad inſulam Mauritii, Lari*que et* Nuſſatello, *teſta ad* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, fuſca, albo maculata, ſubtus alba, intus violacea.*

Reticulum. 40. C. teſta ſubrotunda gibba fuſca: ocellis in reticulum confluentibus, lineaque dorſi media horizontali albis, ſubtus alba.
Liſt. Conch. t. 701. *f.* 49.
Martin. Conch. 1. *t.* 26. *f.* 259.
β) *Liſt. Conch. t.* 704. *f.* 53.
Habitat - - - capiti ſerpentis affinis.

mauritiana. 41. C. teſta triquetro-gibba poſterius depreſſo acuta, ſubtus nigra. *Muſ. Lud. Ulr.* 571. *n.* 190.*
Rumpf muſ. t. 38. *f.* E. Caput ſerpentis majus.
Valent. Abb. t. 4. *f.* 31.
Pet. gaz. t. 96. *f.* 8.
Liſt. Conch. t. 703. *f.* 52.
Bonan. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 261.
Gualt. teſt. t. 15. *f.* S.
Seb. muſ. 3. *t.* 76. *f.* 19.
Muſ. Gottwald. t. 6. *f.* 29. a. b. *f.* 30. a. b. *t.* 7. *f.* 34?
Knorr Vergn. 1. *t.* 13. *f.* 1. 2. 2. *t.* 27. *f.* 5.
Martin. Conch. 1. *t.* 30. *f.* 317-319.
Habitat ad inſulam S. Mauritii, Javam *et* Nuſſatello, *teſta ſatis magna, fuſca maculata.*

Vitellus. 42. C. teſta livida: maculis albis. *Muſ. Lud. Ulr.* 572. *n.* 191.*
Rumpf muſ. p. 115. *t.* 38. *f.* L. Porcellana ſalita.
Pet. gaz. t. 80. *f.* 2.
Liſt. Conch. t. 692. 693. *f.* 39. 40.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 254.
Gualt. teſt. t. 13. *f.* T. V.
Muſ. Gottwald. t. 2. *f.* 9. a. d.
Knorr Vergn. 6. *t.* 20. *f.* 3.
Martin. Conch. 1. *t.* 23. *f.* 228. 229.
Habitat in Oceano indico, *teſta ad* $2\frac{1}{2}$ *pollices longa ſubvitellina, faſciis* 3 *obſoletis translucentibus, maculis rotundis, intus caerulea, ad latera cinereo punctata maculataque.*

Mus. 43. C. teſta retuſa gibba cinerea: faſcia longitudinali fuſca, denticulis nigricantibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 572. *n.* 192.*

 Liſt.

Liſt. Conch. t. 657. *f.* 2.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* S.
Argenv. Conch. t. 18. *f.* E.
Seb muſ. 3 *t.* 76. *f.* 33 34.
Knorr Vergn. 3. *t.* 12. *f.* 3.
Martin. Conch. 1. *t.* 23. *f.* 222. 223.
Habitat in mari mediterraneo *et* americano, *teſta ſolida, vix gibba, ad latera ſubtusque alba, dorſi maculis dilute fuſcis.*

Tigris. 44. C. teſta ovata poſterius obtuſa anterius rotundata: linea longitudinali teſtacea. *Muſ. Lud. Ulr.* 573. *n.* 193.*
Rumpf muſ. t. 38. *f.* A. Porcellana guttata.
Pet. gaz. t. 96. *f.* 17.
Barrel. rar. t. 1325. *f.* 23. *et. t.* 1326. *f.* 4.
Liſt. Conch. t. 681. 682. *f.* 28. 29.
Bonann. recr. 3. *f.* 231. 232. 256. 264. 265.
muſ. Kircher. 3. *f.* 231. 232. 255. 264. 265.
Valent. Abh. t. 1. *f.* 3. *et t.* 3. *f.* 29.
Gualt. teſt. t. 14. *f.* G. H. I. L.
Argenv. Conch. t. 18. *f.* F.
Seb. muſ. 3. *t.* 76. *f.* 7. 9. 14.
Olear. muſ. t. 30. *f.* 3.
Bytem. app. t. 12. *f.* 55. a.
Muſ. Gottwald. t. 1. *f.* a. b. *f.* 2. a. b. *f.* 3. a. *f.* 4. *t.* 1. *f.* C. *t.* 2. *f.* 6. a. c. d.
Knorr Vergn. 1. *t.* 26. *f.* 4. *et* 6. *t.* 21. *f.* 4. 5.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. *f.* 7.
Martin. Conch. 1. *t.* 24. *f.* 232-236.
Habitat frequens in Oceano indico *et* mari adriatico, *teſta ad* 4½ *pollices longa, et* 2½ *alta albida, flavicante aut caeruleſcente, guttis numeroſis ſaepius confluentibus varia, ad latera ſubtusque alba, linea dorſi obliqua, crebro undulata, Cairi ad laevigandos pannos adhibita.*

flammea. 45. C. teſta ovata poſterius obtuſa anterius rotundata maculis flavis undatis varia.
Valent. Abh. t. 4. *f.* 30.
Habitat rariſſima - - - *tigridi proxime affinis.*

olivacea. 46. C. teſta ovata olivacea flavo nebuloſa fuſcoque maculata, ſubtus plana dilute fuſca, intus caeruleſcente, labii denticulis albis.
Martin. Conch. 1. *t.* 31. *f.* 332.
Habitat - - - *trigridi affinis, at teſta minore, mediae magnitudinis.*

47. C.

feminea. 47. C. teſta ovata tenuiſſima alba guttis ex viridi flavis ſeriatis varia, intus violacea.
Liſt. Conch. t. 672. *f.* 18.
Gualt. teſt. t. 16 *f.* S.
Seb. muſ. 3. *t.* 76, *f.* 1. 2. 8.
Muſ. Gottwald. t. 3. *f.* 11. a. b. *et f.* 12.
Habitat - - - tigridi affinis.

Lynx. 48. C. teſta oblongo ovata, punctis fuſcis lineaque flaveſcente, poſterius acutiuſcula: ore rufo. *Muſ. Lud. Ulr.* 573. *n.* 194.*
Liſt. Conch. t. 683. *f.* 30.
Rumpf muſ. t. 38. *f.* N.
Pet. gaz. t. 97. *f.* 17.
Gualt. teſt. t. 13. *f.* Z. *et t.* 14. *f.* B. C. D.
Seb. muſ. 3. *t.* 55. *ic. nonn. ad nr.* 20.
Muſ. Gottwald. t. 1. *f.* 5. *f* e. *t.* 5. *f.* 18. a. b. c.
Knorr Vergn. 4. *t.* 9. *f.* 6. *et* 6. *t.* 23. *f.* 6.
Murray teſtac. t. 1. *f.* 10.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. *f.* 8. 9.
Martin. Conch. 1. *t.* 23. *f.* 230. 231.
β) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 23. *f.* 7?
Habitat ad inſulam Madagaſcar, S. Mauritii, *et in* Oceano indico, *teſta vix 2 pollices longa albida, caeruleſcente aut flava, ad latera ſubtusque alba, labiis inter dentes rufis.*

Iſabella. 49. C. teſta ſubcylindrica: extremitatibus luteis. *Muſ. Lud. Ulr.* 574. *n.* 195.*
Rumpf muſ. t. 39. *f.* G. Iſabella.
Pet. amb. aq. 16 *f.* 16.
gaz. t. 97. *f.* 16
Liſt. Conch. t. 660. *f.* 4.
Argenv. Conch. t. 18. *f.* P.
Muſ. Gottwald. t. 7. *f.* 36.
Knorr Vergn. 4. *t.* 9. *f.* 5.
Martin. Conch. 1. *t.* 27. *f.* 275.
Habitat ad inſulam S. Mauritii *et* Madagaſcar, *teſta vix* 1½ *pollices longa anguſta, alba vel griſea nigroque punctata, interdum faſciata, labiorum denticulis albis.*

ambigua. 50. C. teſta pyriformi obſcura dilutius nebuloſa maculataque.
Seb. muſ. 3. *t.* 76. *f.* 30.
Habitat - - - an diſtincta ſpecies?

Scurra. 122. C. teſta ovato oblonga ſubtus plana luteſcente: guttis vireſcentibus lividisve confluentibus, ad latera punctis fuſcis

cis ſparſis varia. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 103. *t.* 144. *f.* 1338. a. b.
Mart. Conch. 1. *t.* 27. *f.* 276. 277.
Habitat in mari indico, *an eadem cum indica?*

*** Umbilicatae.

Onyx. 51. C. teſta ſubtus fuſca ſupra albida. *Muſ. Lud. Ulr.* 574 *n.* 196.*
Rumpf muſ. t. 38. *f.* G. Porcellana caerulea.
Bonann. recr. 3. *f.* 255.
muſ. Kircher. 3. *f.* 254.
Gualt. teſt. t. 15. *f.* N.
β) Chemn. Conch. 10. *p.* 106. *t.* 145. *f.* 1341.
Liſt. Conch. t. 657. *f.* 2.
Habitat in Aſia, *teſta pollicis magnitudine, ſupra ochroleuca, ceterum capiti ſerpentis ſimilis, an mutata? an hujus tribus?*

clandeſtina. 52. C. teſta lineis transverſis ſubtiliſſimis flaveſcentibus paſſim concurrentibus.
Habitat in India, *teſta laevi, livida, magnitudine c. aſelli, ſubtus alba immaculata, ſupra faſcia una alterave pallida obſoleta notata, ſtriis luteis oculo nudo vix conſpicuis.* Zoega.

ſuccincta. 53. C. labio interiori utraque extremitate rotundato. *Muſ. Lud. Ulr.* 575. *n.* 197.*
Habitat - - -

Ziczac. 54. C. teſta ſubtus lutea punctis fuſcis: extremitatibus maculis duabus fuſcis. *Muſ. Lud. Ulr.* 575. *n.* 198.*
Liſt. Conch. t. 661. *f.* 5. Concha venerea undatim depicta.
Pet. gaz. t. 12. *f.* 7.
Argenv. Conch. t. 18. *f.* N. R.
Seb. muſ. 3. *t.* 55. *n.* 19. *f.* 2. 3. 11.
Muſ. Gottwald. t. 5. *f.* 18. i. k.
Martin. Conch. 1. *t.* 23. *f.* 224-227.
Habitat - - - *teſta ſupra dilute incarnata, faſciis 3 albis obſoletis lineisque angulatis rubellis vel flavicantibus varia, ſubtus lutea nigro maculata; interdum pulla faſciis 2 albis fuſco undulatis, ſubtus alba, aut alba lineis longitudinalibus muſtelinis undulatis, ſubtus lutea fuſco punctata, aut cana, lineis angulatis paulo obſcurioribus confertis, ſubtus tota nivea.*

Hirundo. 55. C. teſta ſupra caeruleſcente: extremitatibus maculis duabus fuſcis. *Muſ. Lud. Ulr.* 576. *n.* 199.*
Liſt. Conch. t. 674. *f.* 20. 21.
Pet. gaz. t. 30. *f.* 3.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 235.
Seb. muſ. 3. *t.* 55. *n.* 19. *f.* 8. 9.
Muſ. Gottwald. t. 6. *f.* 25. *n.* b. c.
Knorr Vergn. 4. *t.* 25. *f.* 4.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. *f.* 11.
Martin. Conch. 1. *t.* 28. *f.* 282.
Habitat ad inſulas Maldivas, *c. aſello affinis, teſta anguſta elongata, ſubtus alba, ad marginem punctata, ſupra ſaepius fuſco punctata, aut maculata: faſciis* 2 *transverſis albis.*

Aſellus. 56. C. teſta alba: faſciis tribus fuſcis. *Muſ. Lud. Ulr.* 577. *n.* 200.*
Rumpf muſ. t. 39. *f.* M. Aſellus.
Argenv. Conch. t. 18. *f.* T. Aſellus.
Liſt. Conch. t. 666. *f.* 10.
Pet. gaz. t. 97. *f.* 11.
amb. aq. t. 16. *f.* 18.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 236.
Barrel. rar. t. 1326. *f.* 27.
Gualt. teſt. t. 15. *f.* M. CC. DD.
Muſ. Gottwald. t. 6. *f.* 26. a. b. c.
Bytem. app. t. 12. *f.* 56. 58.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 5. *f.* H.
Knorr Vergn. 4. *t.* 25. *f.* 3.
Martin. Conch. 1. *t.* 27. *f.* 280. 281.
Habitat frequens ad inſulas Maldivas, *teſta oblonga, minuta, faſciis flavo marginatis, interdum rubellis.*

erronea. 57. C. teſtae maculá teſtacea aequali. *Muſ. Lud. Ulr.* 577. *n.* 202.
Habitat - - - macula ſolitaria a ſtolida diſtincta.

Urſellus. 58. C. teſta oblonga alba, ſupra laevi fuſco varia: punctis ad umbilicum duobus fuſcis.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* O.
Gualt. teſt. t. 15. *f.* L.
Martin. Conch. 1. *t.* 24. *f.* 241.
Habitat rarior - - - teſta minuta.

Pyrum. 59. C. teſta dilute fuſca: faſciis dilutioribus maculisque ochroleucis, ſubtus et ad latera fulva, intus caerulea.

 Gualt.

Gualt. teſt. t. 14. f. E.
Martin. Conch. 1. *t.* 26. *f.* 267. 268.
β) *Liſt. Conch. t.* 667. *f.* 12?
γ) *Muſ. Gottwald. t.* 7. *f.* 33. i. k?
Habitat - - - labii dentibus albis.

maculoſa. 60. C. teſta anguſta elongata ſupra maculis carneis, pallidis fulvis glaucisque varia, ad latera ſpadicea.
Bonann. recr. 3. *f.* 259.
muſ. Kircher. 3. *f.* 258.
Habitat - - -

pulla. 61. C. teſta tenui ad latera pulla, ſupra alba aut dilute fuſca, faſciis transverſis lineave horizontali dilutiori notata.
Martin. Conch. 1. *t.* 26. *f.* 269. 270.
Habitat rarior - - -

indica. 62. C. teſta cylindrica ſupra characteribus, ocellis lineaque horizontali dilutiore notata, ad latera rubella atro guttata, labii denticulis fuſcis.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* H.
Habitat rarior in India, *arabicae affinis, inter primam tertiamque tribum quaſi media, lateribus perſici florum colore tinctis.*

Ovum. 65. C. teſta oblonga tenui olivacea: maculis ferrugineis ſparſis, ſubtus alba.
Muſ. Gottwald. t. 5. *f.* 19. g. h. i. *et f.* 22. b.
Martin. Conch. 1. *t.* 27. *f.* 278. 279.
Habitat - - - teſta anguſta, detrita faſciis ſupra 3 *caeruleſcentibus, denticulorum in labiis interſtitiis ſubfuſcis.*

felina. 66. C. teſta oblonga anguſta plumbea: punctis maculisque ferrugineis, faſciisque dilutioribus: maculis ad utrumque finem duabus fuſcis.
Liſt. Conch. t. 680. *f.* 27.
Seb. muſ. 3. *t.* 55. *f.* 19. *n.* 7.
Martin. Conch. 1. *t.* 28. *f.* 283. 284.
Habitat - - - inter c. hirundinem et aſellum media, teſta detrita ſupra caeruleſcente.

atomaria. 67. C. teſta oblonga nivea fuſco punctato ad utrumque finem obſcuro biguttata.
Martin. Conch. 1. *t.* 28. *f.* 290. 291.
Habitat - - teſta ½ circiter pollicem longa.

nebuloſa. 68. C. teſta oblonga gibba fuſca ſpadiceo maculoſa.
Liſt Conch. t. 688. f. 35.
Habitat - - - olivaceae affinis.

ochroleuca. 69. C. teſta tenui ochroleuca; maculis dilutioribus.
Bonann. recr. 3. f. 244.
muſ. Kircher. 3. f. 243.
Habitat - - -

ſtellata. 70. C. teſta tenui cinerea fuſco punctata: ſtriis transverſis elevatis.
Bonann. recr. 3. f. 248.
muſ. Kircher. 3. f. 247.
Habitat - - -

ſubflava. 71. C. teſta oblongiuſcula gibba laevi ſubflava.
Gualt. teſt. t. 13. f. D.
Habitat - - - an diſtincta vere ſpecies?

leucogaſter. 72. C. teſta oblonga purpurea ſubtus alba.
Gualt. teſt. t. 13. f. F.
Habitat - - - an vere diſtincta ſpecies?

varioloſa. 73. C. teſta oblonga obſcura: faſciis dorſi duabus maculisque albidis.
Gualt. teſt. t. 13. f. M.
β) *Gualt. teſt. t. 13. f. N. O.*
γ) *Gualt. teſt. t. 13. f. P.*
δ) *Gualt. teſt. t. 13. f. Q.*
ε) *Gualt. teſt. t. 13. f. TT.*
Habitat - - -

fulva. 74. C. teſta ſolida oblonga fulva: maculis fuſcis ſeriatis faſciisque duabus obſcuris, ad latera ſubtusque crocea.
Gualt. teſt. t. 13. f. S.
Habitat - - -

leucoſtoma. 75. C. teſta oblonga gibba fuſco caeruleoque nebuloſa ad latera nigro-maculata, ore albo.
Gualt. teſt. t. 14. f. A.
Habitat - - -

lineata. 76. C. teſta ovata ſupra lineata: limbo maculato.
Muſ. Gottwald. t. 2. f. 7. f.
β) *Muſ. Gottwald. t. 4. f. 14. g. 1.*
Habitat - - -

cancellata. 77. C. teſta ovata gibba cancellatim maculata: lineâ ſupra horizontali.
Muſ. Gottwald. t. 5. *f.* 18. l. m. n. *et f.* 19. a. b. c. *t.* 6. *f.* 31. b. c.
Habitat - - - -

lutea. 78. C. teſta fuſceſcente: faſciis duabus albis, ſubtus lutea fuſco punctata. *Gronov. zooph. t.* 19. *f.* 17.
Habitat - - - *teſta oblonga, anguſta.*

badia. 79. C. teſta oblonga gibba ſupra badia: punctis fuſcis albisque.
Bytem. appar. t. 12. *f.* 57.
Habitat - - -.

punctata. 115. C. teſta ovata alba: punctis teſtaceis. *Mant.* 2. *p.* 548.
Habitat - - - *teſta vix marginata, magnitudine C.* Ziczac, *ore albo.*

zonaria. 119. C. teſta ovata laeviuſcula luteſcente: faſciis quatuor lunulis fuſcis notatis. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 107. *t.* 141. *f.* 1342.
Habitat rariſſima ad Guineae *littora.*

conoidea. 121. C. labro intus dentato: tuberculorum ordinibus tribus, labio edentulo. *Scop. del. inſ.* 2. *p.* 78. *t.* 24. *f.* 3.

**** *marginatae.*

cribraria. 80. C. teſta umbilicata lutea: punctis rotundis albis. *Muſ. Lud. Ulr.* 577. *n.* 201.*
Argenv. Conch. t. 18. *f.* X. Argus minor.
Pet. gaz. t. 80. *f.* K. *t.* 8. *f.* 3?
Liſt. Conch. t. 695. *f.* 42.
Muſ. Gottwald. t. 2. *f.* 7. e? *f.* 9. g.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 74.
Martin. Conch. 1. *t.* 31. *f.* 336.
Habitat - - - *teſta oblonga, anguſta, ovi paſſerini magnitudine, ocellata, ſubtus tota alba, inter denticulos labii interdum flavo maculata.*

Moneta. 81. C. teſta marginato nodoſa albida. *Muſ. Lud. Ulr.* 578. *n.* 203.*
Argenv. Conch. t. 18. *f.* K. Moneta Congo.
Liſt. Conch. t. 709. *f.* 59. Moneta nigritarum.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* C. Thoracium vulgare ſ. cauricum.
Pet. gaz. t. 97. *f.* 8. Concha veneris africana ſ. Moneta nigritarum.

Pet. amb. aq. t. 16. *f.* 14.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 233.
Barrel. rar. t. 1326. *f.* 26.
Gualt. teſt. t. 14. *f.* 3-5.
Leſſer teſtaceoth. f. 26.
Muſ. Gottwald. t. 7. *f.* 42. a-g.
Bytem. app. t. 12. *f.* 59.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 11.
Knorr Vergn. 4. *t.* 24. *f.* 4.
Martin. Conch. 1. *t.* 31. *f.* 337-340.
Habitat frequens in mari mediterraneo, atlantico, aethiopico, indico, *inprimis in inſulis* Maldivis *a feminis lecta ſub aqua per tres dies a plenilunio vel ante novilunium, unde transportatur navibus in Bengalam, Siam, Americam, inſulasque illi obverſas, nigritis loco monetae inſerviens.*

Annulus. 82. C. teſtae dorſo annulo flavo circumdato. *Muſ. Lud. Ulr.* 578. *n.* 204.*
Rumpf muſ. t. 39. *f.* D. Thoracium quadratum.
Pet. gaz. t. 6. *f.* 8.
Rondel. teſt. 2. *p.* 103. *f.* 4.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 240. 241.
Gualt. teſt. t. 14. *f.* 1. 2.
Muſ. Gottwald. t. 7. *f.* 33. *f.* g. *f.* 40. c?
Knorr Vergn. 4. *t.* 9. *f.* 4. *et t.* 16. *f.* 4.
Martin. Conch. 1. *t.* 24. *f.* 239. 240.
Habitat ad Amboinam *et* Alexandriae *frequens, teſta ochroleuca, intus caerulea, ſubtus planiuſcula.*

caurica. 83. C. teſta margine gibbo inaequali albido fuſco-punctato, dorſo nebulato-teſtaceo.
Liſt. Conch. t. 677. *f.* 24. *et t.* 678. *f.* 25.
Rumpf muſ. t. 38. *f.* P.
Gualt. teſt. t. 15. *f.* AA.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 13.
Martin. Conch. 1. *t.* 29. *f.* 301. 302.
β) *Rumpf muſ. t.* 38. *f.* O.
γ) *Martin. Conch.* 1. *t.* 29. *f.* 303.
Habitat in Oceano indico, *teſta ſolida ſubtus flaveſcente vel alba, faſciis* 4 *obſoletis fuſcis.*

eroſa. 84. C. teſta deroſo-marginata flava albo punctata: lateribus macula ſubfuſca. *Muſ. Lud. Ulr.* 578. *n.* 205.*
Rumpf

Rumpf muſ. t. 39. *f.* A. Thoracium oculatum.
Pet. gaz. t. 97. *f.* 19.
Liſt. Conch. t. 690. *f.* 37.
Gualt. teſt. t. 15. *f.* H.
Muſ. Gottwald. t. 7. *f.* 37. a-c. *f.* 40. a? d?
Knorr Vergn. 6. *t.* 20. *f.* 4.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t 8. *f.* 13.
Martin. Conch. 1. *t.* 30. *f.* 320. 321.
Habitat ſatis frequens ad inſulas S. Mauritii *et* Aſcenſionis, *teſta ad* 1¾ *pollicis longa ſupra convexa, interdum ſubfuſca aut vireſcente albo punctata, nonnunquam ſubfuſco maculata: linea media vireſcente ſubobliqua, ſubtus et ad latera alba.*

derosa. 85. C. teſta deroſo-marginata carnea: dorſo cineraſcente rufo punctato: lateribus punctis fuſcis. *Gronov. zooph. t.* 18. *f.* 10.
Habitat in mari mediterraneo, *eroſae affinis, teſta ſupra faſciis* 3 *obſoletis, ſubtus laevi rufeſcente.*

flaveola. 86. C. teſta deroſo-marginata flaveſcente albo-punctata: lateribus punctis fuſcis obſoletis ſubſparſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 581. *n.* 209.*
Habitat - - - punctis vel ocellis albis hinc inde in ſtrias confluentibus; eroſae proxime affinis, an vere diſtincta?

ſpurca. 87. C. teſta ſubmarginata luteſcente luteo irrorata: lateribus fuſco punctatis.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta ovata, laevi, interdum livida, immaculata diaphana, edentula, margine ſupra crenulato, fuſco, labio interiori poſterius apice reflexo.*

oblonga. 88. C. teſta oblongo-ovata ſupra caeruleſcente fuſco punctata maculataque, ſubtus et ad latera alba.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. *f.* 14.
Habitat - - - ſpira manifeſta, an hujus tribus?

ſtolida. 89. C. teſta cinerea teſtaceo quadrato variegata. *Muſ. Lud. Ulr.* 580. *n* 207.*
Rumpf muſ. t. 39. *f.* E.
Argenv. Conch. t. 18. *f.* Y.
Seb. muſ. 3. *t.* 55. *n.* 19. *f.* 12. 14.
Muſ. Gottwald. t. 5. *f.* 22. a. c. *t.* 6. *f.* 28?
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. *f.* 12? 15?
Martin. Conch. 1. *t.* 28. *f.* 292. 293.

β) Bon-

β) *Bonann. recr. et muſ. Kircher.* 3. *f.* 237.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* F.
Muſ. Gottwald. t. 6. *f.* 27.
Martin. Conch. 1. *t.* 28. *f.* 294. 295.
γ) *Gualt. teſt. t.* 16. *f.* E?
δ) *Martin. Conch.* 1. *t.* 28. *f.* 296. 297?
ε) *Liſt. Conch. t.* 679. *f.* 26?
Habitat ad Amboinam, *teſta* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, ſubtus et ad latera alba.*

helvola. 90. C. teſta triquetro-gibba albo-punctata poſterius eroſa ſubtus flava immaculata. *Muſ. Lud. Ulr.* 579. *n.* 206.
Liſt. Conch. t. 691. *f.* 38.
Bonann. recr. 3. *f.* 247.
muſ. Kircher. 3. *f.* 246.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* B.
Gualt. teſt. t. 15. *f.* BB.
Leſſer teſtaceoth. f. 27.
Martin. Conch. 1. *t.* 30. *f.* 326. 327.
Habitat in Oceano indico, *teſta flava; ſupra nunc albo punctata vel ocellata, nunc inter maculas albas vel caeruleſcentes ſtellulis ſpadiceis notata.*

ocellata. 91. C. teſta ſubmarginata lutea: ocellis nigris. *Muſ. Lud. Ulr.* 580. *n.* 208.
Liſt. Conch. t. 696. *f.* 43.
Bonann. recr. 3. *f.* 359.
muſ. Kirch. 3. *f.* 352.
Pet. gaz. t. 9. *f.* 7.
Muſ. Gottwald. t. 7. *f.* 32. c. d. e?
Martin. Conch. 1. *t.* 31. *f.* 333. 334.
Habitat rarior - - - teſta $\frac{1}{2}$ *pollicem longa, margine albo fuſco-punctato, dentibus labii albis.*

poraria. 92. C. teſta ſubviolacea albo-punctata. *Muſ. Lud. Ulr.* 581. *n.* 210.*
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. *f.* 16?
Martin. Conch. 1. *t.* 30. *f.* 324. 325.
β) *Liſt. Conch. t.* 694. *f.* 41.
Seb. muſ. 3. *t.* 55. *f.* 19. *n.* 5.
Muſ. Gottwald. t. 7. *f.* 33. b. c.
Martin. Conch. 1. *t.* 24. *f.* 237. 238.
Habitat - - - teſta puſilla, ſupra interdum livida, lutea, aut ſubfuſca.

93. C.

Pediculus. 93. C. teſta transverſim ſulcata. *Muſ. Lud. Ulr.* 582. *n.* 211.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 5. *f.* 3. Bitou.
Argenv. Conch. t. 18. *f.* L. Pediculus.
zoomorph. t. 3. *f.* I. K.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* P. Pediculus.
Liſt. anim. angl. p. 168. *t.* 3. *f.* 17. Concha veneris exigua alba ſtriata.
Liſt. Conch. t. 706. 707. *f.* 56. 57.
Pet. amb. aq. t. 16. *f.* 22.
Barrel. rar. t. 1326. *f.* 28.
Ginann. adr. 2. *t.* 13. *f.* 109.
Gualt. teſt. t. 14. *f.* O. P. *t.* 15. *f.* P. R.
Seb. muſ. 3. *t.* 55. *f.* 22.
Muſ. Gottwald. t. 5. *f.* 21. c. *et t.* 8. *f.* 45. a-h.
Knorr Vergn. 6. *t.* 17. *f.* 6.
Martin. Conch. 1. *t.* 29. *f.* 309-311.
β) *Liſt. Conch. t.* 706. *f.* 55.
Bonann. recr. 3. *f.* 239. 250.
muſ. Kirch. 3. *f.* 239. 248.
Martin. Conch. 1. *t.* 29. *f.* 306-308.
Habitat in Oceano Europae ſeptentrionali, americano, indico, mari mediterraneo, *frequens, teſta minuta, ovata, aliarum nunc albarum, nunc rubellarum, nunc roſearum, nunc maculatarum, nunc immaculatarum dorſo longitudinaliter ſulcato, aliarum rubellarum aut ſubfuſcarum non raro maculis rufeſcentibus ſubfuſcis aut cinereis variarum ſulcò longitudinali nullo.*

coſtata. 94. C. teſta dilute carnea: dorſo ſtriis elevatis ſubtiliſſimis transverſis aſpero.
Knorr Vergn. 6. *t.* 15. *f.* 7.
Habitat - - - c. pediculo affinis, at teſta magis elongata, ½ *pollicem ſuperante.*

Nucleus. 95. C. teſta utrinque marginata ſubroſtrata rugoſa, ſupra punctata tuberculis. *Muſ. Lud. Ulr.* 582. *n.* 212.*
Argenv. Conch. t. 18. *f.* V. Variolae.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* I. Nux avellana granulata.
Pet. amb. aq. t. 16. *f.* 11.
gaz. t. 97. *f.* 12.
Liſt. Conch. t. 708. *f.* 58.
Gualt. teſt. t. 14. *f.* Q. R. S.
Muſ. Gottwald. t. 8. *f.* 44. a, b.
Knorr Vergn. 4. *t.* 17. *f.* 7.

Regenſ.

Regenſ. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 78.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. *f.* 17.
Martin. Conch. 1. *t.* 29. *f.* 312.
Habitat frequens ad inſulam Nuſſatello, *rarior ad* littora Hiloe, *teſta oblonga alba, cinerea aut chalybea, ad pollicem usque longa, lateribus transverſim ſulcatis, labiorum dentibus acutis.*

madagaſcarienſis. 96. C. teſta albida utrinque roſtrata: dorſo tuberculato; ſtriis transverſis undulatis.
Liſt. Conch. t. 710. *f.* 61.
β) *Muſ. Gottwald. t.* 8. *f.* 44. c. d.
Habitat ad Madagaſcar, *c. nucleo affinis, at teſta latiori.*

ſtaphylaea. 97. C. teſta ſubroſtrata: punctis elevatis ſine ſtriis, extremitatibus luteis. *Muſ. Lud. Ulr.* 583. *n.* 213.*
Argenv. Conch. t. 18. *f.* S. Porcellio.
Muſ. Gottwald. t. 7. *f.* 33. d? e?
Knorr Vergn. 4. *t.* 16. *f.* 2.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. *f.* 18.
Martin. Conch. 1. *t.* 29. *f.* 313. 314.
Habitat - - - teſta in ſpadiceum vergente, tuberculis minoribus, quam in c. nucleo, labiorum dentibus reflexis.

Cicercula. 98. C. teſta utrinque roſtrata adſperſa punctis elevatis.
Liſt. Conch. t. 710. *f.* 60.
Bonann. recr. 3. *f.* 243.
muſ. Kircher. 3. *f.* 242.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* K.
Gualt. teſt. t. 14. *f.* T.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. *f.* 19.
Martin. Conch. 1. *t.* 24. *f.* 243. 244.
Habitat in mari mediterraneo *et* indico, *teſta alba vel albida: dorſo convexo.*

Globulus. 99. C. teſta utrinque roſtrata laevi. *Muſ. Lud. Ulr.* 583. *n.* 214.*
Rumpf muſ. t. 39. *f.* L. N. Globulus.
Gualt. teſt. t. 14. *f.* M.
Muſ. Gottwald. t. 8. *f.* 44. e. f.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 12.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. *f.* 20.
Martin. Conch. 1. *t.* 24. *f.* 242.
Knorr Vergn. 6. *t.* 21. *f.* 7.

 Chemn.

Chemn. Conch. 10. *t.* 145. *f.* 1349. 1350.
β) *Gualt. teſt. t.* 14. *f.* N.
Habitat in Aſia, *potiſſimum ad* Amboinam, *teſta globoſa alba, vel flava, rarius fuſco aut ſanguineo punctata.*

affinis. 100. C. teſta oblonga ſubroſtrata laevi flava: anterius utrinque ocellata.
Knorr Vergn. 6. *t.* 21. *f.* 7.
Habitat - - - *c. globulo affinis, at magis oblonga.*

ſqualina. 101. C. teſta tenui oblonga alba: punctis maculisque ferrugineis.
Liſt. Conch. t. 684. *f.* 31. *et t.* 686. *f.* 33.
Gualt. teſt. t. 16. *f.* I.
Muſ. Gottwald. t. 5. *f.* 18. d. e. f.
Martin. Conch. 1. *t.* 25. *f.* 250. 251.
β) *Muſ. Gottwald. t.* 7. *f.* 33. a. 33. b.
Habitat - - - *teſta tenui, maculis interdum confluentibus, margine fuſco maculato, dorſi linea nonnunquam horizontali albida.*

fimbriata. 102. C. teſta alba vel griſea: maculis faſciisque transverſis ferrugineis obſoletis, oris labiis violaceo maculatis.
Martin. Conch. 1. *t.* 26. *f.* 263. 264.
Habitat - - - *teſta detrita rubra.*

cruenta. 103. C. teſta gibba ſupra caeruleſcente rufo punctata ad latera ſubtusque alba; labiis citrinis.
Gualt. teſt. t. 15. *f.* E.
Habitat - - -

reticulata. 104. C. teſta reticulata, margine maculis virgatis vario.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* R.
Habitat - - -

rubiginoſa. 105. C. teſta oblonga alba, intus violacea dorſi litura ferruginea, utroque fine luteo bimaculato, labiorum dentibus flaveſcentibus.
Martin. Conch. 1. *t.* 29. *f.* 305.
Habitat - - -

miliaris. 106. C. teſta tenui brevi ex flavicante viridi lacteo-ocellata: linea laterali horizontali.
Liſt. Conch. t. 700. *f.* 47. *et t.* 701. *f.* 48.
Martin. Conch. 1. *t.* 30. *f.* 323.
Habitat - - - *eroſae affinis.*

acicularis. 107. C. teſta ſolida ſupra flaveſcente fuſco punctata: linea horizontali pallida, ſubtus lactea, punctis ad marginem impreſſis.
Martin. Conch. 1. *t.* 31. *f.* 335.
Habitat - - - *teſta pollicem circiter longa.*

craſſa. 108. C. teſta craſſa ſubflava: faſciis tribus albidis, ore caeruleſcente.
Liſt. Conch. t. 664. *f.* 8.
Habitat - - - *carneolae affinis, teſta ultra* 4 *pollices longa.*

vinoſa. 109. C. teſta ſupra ex albo vinoſa: ocellis purpuraſcentibus circulo nigro cinctis lineaque horizontali alba, intus caerulea.
Bonann. recr. 3. *f.* 253.
muſ. Kirch. 3. *f.* 252.
Habitat in mari mediterraneo, *teſtae margine niveo.*

anguſtata. 110. C. teſta anguſtata fuſca: maculis ad latus rufeſcentibus.
Gualt. teſt. t. 13. *f.* QQ.
Habitat - - -

ſimilis. 111. C. teſta oblonga gibba flavicante albo punctata: macula ad marginem nigricante.
Gualt. teſt. t. 13. *f.* R.
Habitat - - - *eroſae affinis.*

ſtriata. 112. C. teſta convexa ex albo caerulea fuſco punctata ſubtus flava altero latere ſtriata.
Gualt. teſt. t. 14. *f.* F.
Habitat - - - *teſta mediae magnitudinis.*

chinenſis. 113. C. teſta oblonga ſolida variegata: labiis aurantiis.
Argenv. Conch. t. 18. *f.* Z.
Habitat - - -

puſilla. 114. C. teſta caeruleſcente fuſco maculata trifaſciata.
Argen. Conch. t. 18. *f.* 1.
Habitat - - -

321. BULLA. *Animal* Limax.

Teſta univalvis, convoluta, inermis.
Apertura ſubcoarctata, oblonga, longitudinalis, baſi integerrima.
Columella obliqua, laevis.

Ovum. 1. B. teſta ovata obtuſe ſubbiroſtri: labro dentato. *Muſ. Lud. Ulr.* 584. *n.* 218.*
Argenv. Conch. t. 18. *f.* A. Ovum.
Rumpf muſ. t. 38. *f.* Q. Ovum.
Valent. Abh. t. 4. *f.* 32.
Pet. amb. t. 8. *f.* 9.
gazoph. t. 97. *f.* 7.
Liſt. Conch. t. 711. *f.* 65.
Bonann. recr. 3. *f.* 252.
muſ. Kirch. 3. *f.* 251.
Gualt. teſt. t. 15. *f.* A. B.
Seb. muſ. 3. *t.* 76. *f.* 6. 10. 11.
Muſ. Gottwald. t. 7. *f.* 43. a. b. c.
Leſſer teſtaceoth. f. 22.
Knorr Vergn. 6. *t.* 33. *f.* 1.
Martin. Conch. 1. *t.* 22. *f.* 205. 206.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 3. *f.* 7.
β) Crumpled Cowry. *Martyn univ. Conchol.* 2. *t.* 60.
Habitat frequens ad Amboinam, *β) ad* inſulas amicas *media inter cypraeas et bullas, teſta laevi ad 4 pollices longa, nivea, ore luteo.*

Volva. 2. B. teſta biroſtri: roſtris elongatis ſtriatis acutis. *Muſ. Lud. Ulr.* 584. *n.* 216.*
Argenv. Conch. t. 18. *f.* I. Radius textoris.
Liſt. Conch. t. 711. *f.* 63.
Bonann. muſ. Kircher. 3. *f.* 390.
Seb. muſ. 3. *t.* 55. *f.* 13-16.
Leſſer teſtaceoth. f. 23.
Knorr Vergn. 5. *t.* 1. *f.* 2. 3. *et* 6. *t.* 32. *f.* 1.
Spengl. ſelt. Conch. t. 1. *f.* C.
Martin. Conch. 1. *t.* 23. *f.* 217. a. b. *et f.* 218.
Habitat rariſſima ad Jamaicam, *teſta tenui ſubglobosa, transverſim ſtriata, alba, adultiore ex flaveſcente cinerea, roſtris rarius ſubcurvatis.*

biroſtris. 3. B. teſta biroſtri: margine exterius craſſato, roſtris elongatis laevibus.

Liſt. Conch. t. 711. *f.* 66.

Knorr Vergn. 6. *t.* 20. *f.* 5.

Habitat rara ad Javam, *volvae ſimilis, at teſta minore, fabae magnitudine, anguſtiore, laevi, ex incarnato albida, roſtris aequalibus, ventris fere longitudine, oblique truncatis: altero parum adſcendente, rima ſubaequali verſus roſtrum adſcendente latiori.*

Spelta. 4. B. teſta oblonga utrinque obtuſiuſcula aequali, labro arcuato: margine intus incraſſato.

Liſt. Conch. t. 712. *f.* 68.

Gualt. teſt. t. 15. *f.* 4.

Pet. gaz. t. 66. *f.* 1. 3.

Ginann. adr. 2. *t.* 13. *f.* 95.

Barrel. ic. 31. 32. 35.

Martin. Conch. 1. *t.* 23. *f.* 215. 216.

Habitat rara in mari mediterraneo *et* adriatico, *teſta alba, laevi, ſemine tritici duplo majore, vix biroſtri, at magis patula, ſpira externa nulla, apertura longitudinali lunata cum denticulo obſoleto ad apicem columellae.*

verrucoſa. 5. B. teſta transverſe angulata ovata utrinque puncto oſſeo. *Muſ. Lud. Ulr.* 585. *n.* 217.*

Rumpf muſ. t. 38. *f.* H. Jambos alba.

Petiv. amb. aq. t. 16. *f.* 22. 23. Gibba.

gaz. t. 99. *f.* 2.

Liſt. Conch. t. 712. *f.* 67.

Gualt. teſt. t. 16. *f.* F.

Argenv. Conch. t. 18. *f.* M.

Seb. muſ. 3. *t.* 55. *f.* 17.

Leſſer teſtaceoth. f. 24.

Knorr Vergn. 4. *t.* 26. *f.* 7.

Martin. Conch. 1. *t.* 23. *f.* 220. 221.

Habitat rara in India, *cypraeis affinis, teſta tota alba utroque fine rubeſcente, raro ultra pollicem longa, ovali.*

gibboſa. 6. B. teſta angulata: cingulo elevato. *Muſ. Lud. Ulr.* 585. *n.* 218.*

Columm. purp. p. 29. *t.* 30. *f.* 5.

Liſt. Conch. t. 711. *f.* 64.

Pet. gaz. t. 15. *f.* 5.

Bonann. recr. 3. *f.* 249. 339.

muſ. Kirch. 3. *f.* 249. 338. 339.

Argenv. Conch. t. 18. *f.* Q.
Seb. muſ. 3. *t.* 55. *f.* 18.
Muſ. Gottwald. t. 8. *f.* 46. a.
Leſſer teſtaceoth. f. 25.
Knorr Vergn. 1. *t.* 14. *f.* 3. 4. *et* 6. *t.* 32. *f.* 4.
Martin. Conch. 1. *t.* 22. *f.* 211-214.
Habitat frequens ad Braſiliam, *teſta elongata anguſta alba, aut aurorae colore tincta ſupra alba: apertura recta, ventre longiori.*

Naucum. 7. B. teſta rotundata pellucida transverſim ſubſtriata utrinque umbilicata. *Muſ. Lud. Ulr.* 586. *n.* 219.*
Rumpf muſ. t. 27. *f.* H. Bulla.
Liſt. Conch. t. 714. *f.* 73.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 4.
Gualt. teſt. t. 13. *f.* GG.
Argenv. Conch. t. 17. *f.* Q.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 45.
Knorr Vergn. 6. *t.* 38. *f.* 2. 3.
Martin. Conch. 1. *t.* 22. *f.* 200. 201.
Habitat in Oceano africano *et* indico, *teſta vix ultra pollicem longa, tenui, dorſi medio interdum glaberrimo.*

aperta. 8. B. teſta ſubrotunda pellucida transverſim ſubſtriata tota hiante.
Gualt. teſt. t. 13. *f.* EE.
Martin. Conch. 1. *p.* 266. *vign.* 13. *f.* 3.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 172. *t.* 1. *f.* 8. a. b.
Brit. zool. 4. *t.* 70. *f.* 85. A.
da Coſta brit. zool. t. 2. *f.* 3.
Favann. Conch. t. 27. *f.* F[1].
Chemn. Conch. 10. *t.* 146. *f.* 1354. 1355.
Habitat rara ad caput bonae ſpei, *nauco affinis, at teſta tota hiante vix umbilicata, potius inflexa, quam involuta, ſtriis ſemilunaribus utrinque conſpicuis diſcernenda.* Spengler.

Hydatis. 9. B. teſta rotundata pellucida longitudinaliter ſubſtriata: vertice umbilicato.
Gualt. teſt. t. 13. *f.* DD.
Chemn. Conch. 9. *t.* 118. *f.* 1019.
Habitat rara in mari mediterraneo, *piſi minoris ſaepe magnitudine, apertae affinis.*

Ampulla. 10. B. teſta rotundata opaca: vertice umbilicato. *Muſ. Lud. Ulr.* 586. *n.* 220.*

Rumpf

Rumpf muſ. t. 27. *f.* G. Bulla.
Pet. gaz. t. 50. *f.* 13. *et t.* 99. *f.* 14.
Columm. aq. t. 69. *f.* 3.
Grew muſ. t. 9. *f.* 7. 8.
Barrel. rar. t. 1326. *f.* 37.
Liſt. Conch. t. 713. *f.* 69. *t.* 715. *f.* 74. *et t.* 1056. *f.* 8.
Gualt. teſt. t. 12. *f.* E.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 34-44.
Muſ. Gottwald. t. 8. *f.* 55. a. b. *et f.* 63. f.
Leſſer teſtaceoth. f. 31.
Knorr Vergn. 2. *t.* 8. *f.* 1. 5. *t.* 17. *f.* 6. *et* 6. *t.* 21. *f.* 2.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 5. *f.* 58. *et t.* 8. *f.* 21.
Martin. Conch. 1. *t.* 21. *f.* 188-193.
β) *Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 1. *f.* 2. Goſſon.
Liſt. Conch. t. 714. *f.* 72.
Bonann. recr. 3. *f.* 3. b.
Gualt. teſt. t. 12. *f.* F-I.
Muſ. Gottwald. t. 8. *f.* 54. a. b. *f.* 55. c. d. *f.* 56. a. b. c. *f.* 57. a. b. *f.* 58. 59. 61. *f.* 63. a-e.
Murray teſtaceoth. t. 1. *f.* 9.
Martin. Conch. 1. *t.* 22. *f.* 202-204.
Habitat frequens in Oceano indico, aethiopico, americano, *teſta ſolidiore ſubpellucida, ad* 3 *pollices longa alba, cinereo, atro, rufeſcente, rubro, caeruleſcente maculata nebuloſaque,* β) *magis oblonga, tota opaca, vix ultra* 1½ *pollicem longa,* γ) *lineis cinereis atrisque transverſis picta.*

lignaria. 11. B. teſta obovata oblongiuſcula transverſe ſtriata: vertice ſubumbilicato.
Liſt. Conch. t. 714. *f.* 71.
Bonann. muſ. Kirch. 3. *f.* 406.
Knorr Vergn. 6. *t.* 37. *f.* 4. 5.
Spengl. ſelt. Conch. t. 3. *f.* H.
Martin. Conch. 1. *t.* 21. *f.* 194. 195.
Habitat in mari ſiculo *et* adriatico, *teſta ampullae fere ſtatura, rarius* 3 *pollices longa, ligni fere colore, intus alba, tenui, columella flexuoſa, ut oculo ad verticem usque pateat.*

Phyſis. 12. B. teſta rotundata glaberrima pellucida lineis criſpata: ſpira retuſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 587. *n.* 221.*
Liſt. Conch. t. 715. *f.* 75.
Bonann. muſ. Kirch. 3. *f.* 403.
Valent. Abh. t. 2. *f.* 19.
Gualt. teſt. t. 13. *f.* FF.

Argenv. Conch. t. 17. f. I.
Klein oſtr. t. 5. f. 98.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 46-50.
Martin. Conch. 1. *t.* 21. *f.* 196-198. *vign.* 14. *p.* 274. *f.* 3. 6.
β) *Kaemm. Cab. Rudolſt. p.* 115. *n.* 1. *t.* 9. *f.* 5.
γ) Stripad Bulla. *Martyn univ. Conch.* 1. *t.* 11.
Habitat rarior in India, γ) *in* Oceano auſtrali, *teſta tenuiſſima, lineis rarius faſciis ſpadiceis aut nigricantibus, interjectis interdum punctis.*

Ampluſtra. 13. B. teſta ſubrotunda: ſpira elevata obtuſa, faſciis incarnatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 587. *n.* 222.*
Chemn. Conch. 10. *t.* 146. *f.* 1350. 1351.
Habitat in Aſia, *teſta alba.*

Ficus. 14. B. teſta obovato-clavata reticulato-ſtriata: cauda exſerta, ſpira obliterata.
Muſ. Lud. Ulr. 637. *n.* 314. Murex Ficus.
Rumpf muſ. t. 27. *f.* K. Ficus.
Pet. amb. aq. t. 6. *f.* 9.
Liſt. Conch. t. 750. *f.* 46. *et t.* 751. *f.* 46. a.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 15.
Gualt. teſt. t. 26. *f.* I. M.
Argenv. Conch. t. 17. *f.* O.
Klein oſtr. t. 5. *f.* 93.
Seb. muſ. 3. *t.* 68. *f.* 1-6.
Muſ. Gottwald. t. 10. *f.* 70. *f.* 70. a. b.
Leſſer teſtaceoth. f. 53.
Knorr delic. t. B. II. *f.* 7.
Vergn. 1. *t.* 19. *f.* 4. 3. *t.* 23. *f.* 1. *et* 6. *t.* 27. *f.* 7.
Martin. Conch. 3. *t.* 66. *f.* 733-735.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 2. *f.* 5.
β) *Liſt. Conch. t.* 877. *f.* 1.
Mart. Conch. 3. *t.* 66. *f.* 736. 737.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 68. *f.* 19. 20.
δ) *Liſt. Conch. t.* 816. *f.* 27.
Klein oſtr. t. 4. *f.* 79. b.
ε) *Schroet. Einl. in Verſt.* 4. *t.* 10. *f.* 8.
Habitat in Oceano indico *et* americano, *teſta ad* 3 *pollices longa, cancellatim ſtriata exalbida, maculata, lineata aut punctata, intus alba vel caeruleſcente, apertura ampla, ſemilunari inciſura, cauda intus cava.*

Rapa. 15. B. teſta rotundata turbinata ſubſtriata: cauda curva, ſpira exquiſita.

Muſ.

Muſ. Lud. Ulr. 638. *n.* 315. Murex Rapa.
Argenv. Conch. t. 17. *f.* K. Rapa.
Rumpf muſ. t. 27. *f.* F. Rapa.
Valent. Abh. t. 9. *f.* 82.
Pet. amb. aq. t. 9. *f.* 8.
Gualt. teſt. t. 26. *f.* H.
Klein oſtr. t. 4. *f.* 80.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 13-24. *et t.* 68. *f.* 7. 8.
Knorr delic. t. B. II. *f.* 8.
Vergn. I. *t.* 19. *f.* 5.
Martin. Conch. 3. *t.* 68. *f.* 747-649.
Schroet. Journ. 5. *f.* 1.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 146. *f.* 1364-1366.
Habitat in Oceano indico, *cauda ſua cum ficu ad murices accedens, teſta 2-3 pollices longa, alba aut ſubvireſcente, adultiori evidenter ſtriata.*

canaliculata. 16. B. teſta cylindrica: ſpirae anfractibus canaliculatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 588. *n.* 224.*
Habitat - - - - teſta teſtacea pallido nebuloſa.

conoidea. 17. B. teſta oblongo-turbinata laevi baſi ſubſtriata: ſuturis crenulatis.
Habitat - - - - teſta ochroleuca, glandis magnitudine; baſi emarginata, labio obtuſo, columellae plicis 5-6, ſpira conica teſta dimidio breviore: anfractibus tenuibus imbricatis, ad marginem punctis quaſi crenulatis.

fontinalis. 18. B. teſta ovata pellucida contraria: ſpira obſoleta, apertura ovato-oblonga. *Fn. ſuec.* 2160.* *It. wgoth.* 49.
Müller verm. aq. et terr. 2. *p.* 167. Planorbis teſta fragili ſiniſtrorſa: vertice obtuſo, apertura ovata.
Müller Naturf. 15. *p.* 1. &c. *t.* 1. *f.* 1-12.
Liſt. Conch. t. 134. *f.* 34.
anim. angl. t. 2. *f.* 25.
Gualt. teſt. t. 5. *f.* CC.
Martin. berl. Magaz. 4. *t.* 11. *f.* 61.
Geoffr. coq. p. 103. *n.* 10.
Schroet. Fluſconch. t. 6. *f.* 16. a. b.
Chemn. Conch. 9. *t.* 103. *f.* 177. 178.
β) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 103. *f.* 879. 880.
Habitat frequentiſſima in Danubii *littore*, Galliae, Angliae, Scandinaviae *fontibus, lacubus, rivis, rarior in aliis* Germaniae *partibus, teſta tenera,* ¼ *pollicem longa, fragili, niti-*

nitidiſſima, flavicante, interdum alba: ſpirae anfractibus 3; extimo ventricoſo, incola albo griſeove; pallio laciniato.

hypnorum. 19. B. teſta ovata pellucida contraria: ſpira prominente, apertura ovato-lanceolata. *Fn. ſuec.* 2159.*
Chemn. Conch. 9. *t.* 103. *f.* 882. 883. a. b. c.
Habitat in Europae muſcis humentibus, *nonne varietas b. fontinalis?*

turrita. 20. B. teſta nitida: ſpira acuminata, apertura oblonga.
Müll. verm. fluv. et terr. 2. *p.* 169. *n.* 354. Planorbis turritus.
Habitat in Saxonia, Danubio, Daniae foſſis campeſtribus *et* aquaticis, *teſta* ½-6 *lineas longa ovata-oblonga contraria pellucida fulva, dum limacem nigerrimum (juniorem griſeum) tentaculorum tamen apice albo, continet, nigra, ſpirae anfractibus teretibus* 3-6.

gelatinoſa. 21. B. teſta fragiliſſima ſiniſtrorſa: ſpira depreſſa, apertura caudata.
Müll. verm. fluv. et terr. 2. *p.* 170. *n.* 355. Planorbis gelatinus.
Habitat rariſſima in Daniae rivis, *teſta* 2½ *lineas longa, ventricoſa, fulva, diaphana, tenerrima, pluma leviore; ſpira lata; anfractibus, praeter extimum, obſoletis: limace inhabitante griſeo, teſta triplo majore, quam pallio craſſo gelatinoſo involvit.*

Terebellum. 22. B. teſta cylindrica: ſpira ſubulata baſi truncata. *Muſ. Lud. Ulr.* 564. *n.* 178.*
Rumpf muſ. t. 30. *f.* S. Terebellum.
Pet. amb. aq. t. 13. *f.* 24.
Liſt. Conch. t. 736. *f.* 30. 31.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 57.
Gualt. teſt. t. 23. *f.* O.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* G.
Klein oſtr. t. 2. *f.* 48. 49.
Muſ. Gottwald. t. 43. *f.* 53. a. b.
Leſſer teſtaceoth. f. 33.
Knorr Vergn. 2. *t.* 4. *f.* 4. 5.
Martin. Conch. 2. *t.* 51. *f.* 568. 569.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 2. *f.* 3.
β) *Liſt. Conch. t.* 737. *f.* 32.

Petiv

Petiv. amb. t. 13. *f.* 24.
Chemn. Conch. 10. *t.* 146. *t.* 1362. 1363.
Habitat in Oceano indico, *inter conos et bullas media, diſtincti forſan generis, teſta anguſta, ultra* 2 *pollices longa, interdum transverſe ſtriata, alba, frequentius luteo maculata, punctata aut nebuloſa, rarius quadrifaſciata.*

Cypraea. 23. B. teſta ovata: ſpira obliterata; apice prominulo, apertura poſterius magis dilatata, columella torta.
Knorr Vergn. 6. *t.* 4. *f.* 5? *et t.* 27. *f.* 6?
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 9. *f.* 2?
Habitat in mari mediterraneo, *teſta magnitudine glandis et ultra, an vere larva cypraeae ſpurcae? an cono bullato affinis?*

virginea. 24. B. teſta ſubturrita erecta, columella truncata ſanguinea.
Muſ. Lud. Ulr. 612. *n.* 267. Buccinum virgineum.
Müll. verm. fluv. et terr. 2. *p.* 143. *n.* 333. Buccinum teſta conico acuminata glabra: faſciis anguſtis diverſicoloribus, apertura purpurea.
Liſt. Conch. t. 844. *f.* 72.
Gualt. teſt. t. 45. *f.* D.
Petiv. gaz. t. 22. *f.* 11.
Argenv. zoomorph. t. 10. *f.* G.
Spengl. ſelt. Conch. t. 1. *f.* G.
Schroet. Flusconch. t. 8. *f.* 3. 4.
inn. Bau Conch. t. 5. *f.* 7.
Knorr Vergn. 6. *t.* 28. *f.* 4.
Favann. Conch. t. 65. *f.* G1.
Chemn. Conch. 9. *t.* 117. *f.* 1000-1003.
α) caeruleſcens, faſciis quinque.
Liſt. Conch. t. 15. *f.* 10.
Klein oſtr. t. 17. *f.* 116.
Pet. gaz. t. 151. *f.* 1.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* N.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 66.
β) candida, faſciis octo.
Gualt. teſt. t. 6. *f.* A.
γ) candida, faſciis ſeptem.
Seb. muſ. 3. *t.* 40. *f.* 38.
Knorr Vergn. 1. *t.* 30. *f.* 7.
δ) anfractibus contrariis.
Chemn. Conch. 10. *t.* 173. *f.* 1682. 1673.
Habitat in Aſiae *fluviis, rarior, teſta turbinis inſtar contorta,*

ta, laevi, nitida, alba; faſciis rubris, viridibus flavis, nigris fuſcisque varia, ventricoſa, apertura fere ſemilunari, ſpirae anfractibus 8 ſenſim decreſcentibus.

faſciata. 25. B. teſta conico-acuminata: faſciis maculisque undulatis transverſis, apertura alba.

Müll. verm. fluv. et terr. 2. *p.* 145. *n.* 334. Buccinum faſciatum.
Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 64-66. 69-74.
Knorr Vergn. 5. *t.* 25. *f.* 4.
Favann. Conch. t. 65. *f.* G². G³. G⁵. G⁶.
Chemn. Conch. 9. *t.* 117. *f.* 1004-1006.

α) alba, faſciis caeruleis.
Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 62. 63.
Argenv. Conch. 1. *app. t.* 1. *f.* G.
Martin. Berl. Mag. 3. *p.* 125. *t.* 5. *f.* 52.

β) alba, faſciis fuſcis.
Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 67.
Gualt. teſt. t. 6. *f.* D.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* M.

γ) alba, faſciis variegatis.
Liſt. Conch. t. 12. *f.* 7.
Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 68.
Gualt. teſt. t. 6. *f.* C.
Klein oſtr. t. 2. *f.* 43.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 10. *f.* 46.

δ) faſciis tribus fulva, violacea et aurea.
Bonann. recr. 3. *f.* 379.
muſ. Kircher. 3. *f.* 366.

ε) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 117. *f.* 1007. 1008.

Habitat in America *auſtrali et* India, *virgineae affinis, et teſta craſſiuſcula, magis elongata, ad* 27 *lineas longa, minus laevi et nitida, faſciis non translucentibus, columella integra facile diſcernenda.*

ſtrigata. 26. B. teſta conico-acuminata glabra: ſtrigis undulatis fulvis, columella recta reflexa.

Müll. verm. fluv. et terr. 2. *p.* 148. *n.* 336. Buccinum ſtrigatum.
Habitat - - - *teſta alba, ultra* 2 *pollices longa, apertura pallide caeruleſcente, columella perforata: ſpirae anfractibus* 8.

ſtriatula. 27. B. teſta conica alba ſtriata, columella recta reflexa.

Müll. verm. fluv. et terr. 2. *p.* 147. *n.* 335. Buccinum ſtriatulum.

Habitat

Habitat - - - ſtrigatae proxime affinis, at teſta minore, vix 22 lineas longa, ſtrigis nullis ſpectabili diſtincta.

exarata. 28. B. teſta oblonga acuminata alba ſulcata: apertura repanda.
Müll. verm fluv. et terr. 2. *p.* 148. *n.* 337. Buccinum exaratum.
Chemn. Conch. 9. *t.* 120. *f.* 1031. 1032.
Habitat rariſſima - - - teſta fragili, pellucida, columella recta imperforata, ſpirae anfractibus 6-7.

bifaſciata. 29. B. teſta ſubturrita erecta alba: faſciis ad aperturam duabus latis rubellis.
Liſt. Conch. t. 16. *f.* 11.
Habitat terreſtris - - - an diſtincta ſpecies?

ambigua. 30. B. teſta ſubturrita compreſſiuſcula ſubincarnata: faſciis duabus remotis; altera latiore fuſca, altera caerulea.
Knorr Vergn. 6. *t.* 28. *f.* 4.
Habitat - - - an hujus generis?

Zebra. 31. B. teſta ovato acuminata: faſciis longitudinalibus fuſcis, columella inflexa integra.
Müll. verm fluv. et terr. 2. *p.* 138. *n.* 331. Buccinum Zebra.
Liſt. Conch. t. 9. *f.* 4. *t.* 10. *f.* 5. *t.* 11. *f.* 6. *t.* 578. *f.* 33. *et t.* 580. *f.* 3. 4.
Pet. gazoph. t. 44. *f.* 7.
Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 50. 51. 54. 55. *et t.* 71. *f.* 4. 5.
Argenv. zoom. t. 11. *f.* L.
Klein oſtr. p. 34. §. 89. s. *et* 90. c.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 10. *f.* 1.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 5. *f.* 6.
β) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 12. *f.* 2.
γ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 103. *f.* 875. 876.
δ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 118. *f.* 1015. 1016.
Favann. Conch. t. 65. *f.* M³.
Chemn. Conch. 9. *t.* 118. *f.* 1014.
Habitat ad caput bonae ſpei, *et* Tranquebariae, *terreſtris, achatinae affinis, et cum ea bullas helicibus jungens, at teſta minore, ad* 27 *lineas longa, magis ventricoſa, alba, lineis confertis undulatis varia.*

achatina. 32. B. teſta ovata: apertura obovata apiceque ſanguineis, columella truncata. *Muſ. Lud. Ulr.* 589. *n.* 225.*
Column. aq. c. 8. *t.* 16. Buccinum exoticum.

Müll.

Müll. verm. fluv. et terr. 2. *p.* 140. *n.* 132. Buccinum teſta ovato-oblonga, faſciis longitudinalibus rufo fuſcis, axi truncato canaliculato.
Liſt. Conch. t. 579. *f.* 34.
Bonann. recr. 3. *f.* 192.
Seb. muſ. 3. *t.* 71. *f.* 1-3.
Klein oſtr. p. 47. *t.* 3. *f.* 60.
Knorr delic. t. B. V. *f.* 1.
Vergn. 3. *t.* 3. *f.* 1. *et* 4. *t.* 24. *f.* 1. *et* 5. *t.* 12. *f.* 2.
Schroet. Flusconch. t. 6. *f.* 1.
β) alba, apice flavo.
Gualt. teſt. t. 45. *f.* B.
Bonann. muſ. Kircher. 3. *f.* 190.
Argenv. Conch. 1. *t.* 10. *f.* E.
Seb. muſ. 3. *t.* 71. *f.* 7-10.
Muſ. Gottwald. t. 33. *f.* 220.
Chemn. Conch. 9. *t.* 118. *f.* 1012. 1013.
γ) fulva vel candida, columella ſanguinea.
δ) alba: faſciis crebris, columella pallida.
Argenv. Conch. 1. *app. t.* 2. *f.* L.
Habitat in Oceano americano, *teſta ad* 8 *pollices longa, ſub epidermide fuſca exalbida, maculis oblongis longitudinalibus undatis fuſcis, ſpadiceis, vel caeruleſcentibus varia.*

hyalina. 33. B. teſta oblonga cornea: ſpira retuſa.
Muſ. Gottwald. t. 8. *f.* 20?
Martin. Conch. 1. *t.* 21. *f.* 199.
Habitat - - - phyſi affinis, teſta tenui, vix ½ pollicem longa.

ovata. 34. B. teſta ſubovata obtuſe ſubbiroſtri dorſo ſtriata medio gibboſa ſpadicea: maculis faſciisque albis intus violacea.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 262.
Martin. Conch. 1. *t.* 22. *f.* 207. 208.
Habitat rarior - - - B. ovo affinis, at teſta leviore magis oblonga, labroque minus dentato diſtincta.

ferruginoſa. 35. B. teſta ſubovata aequabili griſea dilute, fuſco undulata: maculis ferrugineis faſciisque duabus albis.
Martin. Conch. 1. *t.* 22. *f.* 209.

β) *Muſ.*

An ſui generis cochlea, quam Schroeter *n. Litterat.* 2. *p.* 221. *f.* NN. *ovi nomine deſcribit?*

β) *Muſ. Gottwald. t. 8. f. 53?*
γ) *Knorr Vergn. 5. t. 28. f. 1.*
Habitat - - - ovatae affinis, teſta 1½ *pollicem longa.*

Velum. 36. B. teſta tenuiſſima utrinque umbilicata alba lineis capillaribus fuſcis varia: faſcia nivea utrinque fuſco marginata.
Martin. neueſt. Mannigf. 1. *p.* 409. *t.* 1. *f.* 10. *f.* 11.
Chemn. Conch. 10. *t.* 146. *f.* 1348. 1349.
β) *v. Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. t.* 9. *f.* 1.
Habitat - - - teſta ultra pollicem longa.

Veſica. 37. B. teſta ovato oblonga cinereo varia intus lactea ſolida pellucida, apertura ampla, dorſo biſulcato.
Bonann. recr. 3. *f.* 332.
muſ. Kirch. 3. *f.* 330.
Klein oſtr. t. 5. *f.* 96.
Habitat ad Braſiliam, *ampullae affinis.*

cylindrica. 38. B. teſta cylindrica laevi alba tenuiſſima.
Gualt. teſt. t. 15. *f.* 1.
Favann. Conch. t. 27. *f.* F[5].
Helbl. boehm. Abh. 4. *t.* 2. *f.* 30. 31.
Chemn. Conch. 10. *t.* 146. *f.* 1356. 1357.
β) *Gualt. teſt. t.* 15. *f.* 2.
Habitat - - - hyalinae affinis, teſta minuta.

Oliva. 39. B. teſta cylindrica: apertura ſuborbiculari infra dilatata.
Liſt. Conch. t. 714. *f.* 70. b. c.
Klein oſtr. t. 5. *f.* 99. a. b.
Habitat - - - ſpira non conſpicua.

Voluta. 40. B. teſta laevi cylindrica olivacea; apertura effuſa, columella inflexa truncata. *Chemn. Conch.* 9. 117. *f.* 1009. 1010.
Habitat rarior - - - ſpirae anfractibus 7.

dominicenſis. 41. B. teſta ſubcylindrica turrita rufeſcente longitudinaliter ſtriata maculata: ſuturis crenulatis, columella ſinuata truncata. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 117. *f.* 1011.
Habitat in inſula S. Dominici, *teſta longitudinaliter ſulcata, anguſta, ad ſuturas granulata, anfractibus extimis fuſcis.*

purpurea. 42. B. teſta ventricoſa rugoſa longitudinaliter ſtrigoſa intus purpurea; columella truncata, apertura ovata labro acuto: limbo intus nigerrimo. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 118. *f.* 1017. 1018.

Knorr

Knorr Vergn. 4. *t.* 14. *f.* 1.
Habitat in Africae campis, *oryza conſitis.*

ſpreta. 43. B. teſta ovata tenui fuſca ſcabra.
Knorr Vergn. 2. *t.* 5. *f.* 5.
Habitat rara - - -

ſolida. 44. B. teſta ſolida rubra violaceo varia; margine rubro, ſpira prominula.
Knorr Vergn. 6. *t.* 21. *f.* 2.
Habitat - - - *ampullae affinis.*

Stercus pulicum. 45. B. teſta ventricoſa glabra cornea cinnamomea quinquefariam punctata, columella ſinuata, labro acuto. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 120. *f.* 1026. 1027.
Favann. cat. t. 2. *f.* 129.
Habitat - - - *teſta tenuiſſima ovata.*

Scabra. 46. B. teſta ovata ſcabra dorſo ſubcarinata decuſſatim ſtriata alba, alba roſeo-lineata, columella ſinuoſa reflexa. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 118. *t.* 146. *f.* 1352. 1353.
Habitat rariſſima in Java.

Akera. 47. B. teſta ovata pellucida: vertice truncato canaliculato. *Müll. zool. dan.* 2. *p.* 88. *t.* 71. *f.* 1-5. *prodr. n.* 2921.
Chemn. Conch. 10. *t.* 146. *f.* 1358. *n.* 1-3.
Habitat in mari norwegico, *teſta* 6 *lineas longa.*

ſoluta. 48. B. teſta cylindrica cornea transverſim ſtriata: vertice retuſo, anfractibus marginatis canaliculatis. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 113. *t.* 146. *f.* 1359-1361.
Habitat in Zeylon.

truncata. 49. B. teſta hyalina tenui oblonga: columella incurva truncata. *Kaemmer. Cab. Rudolſt. p.* 128. *t.* 10. *f.* 5.
Habitat - - - *teſta ultra* 2 *pollices longa.*

carnea. 50. B. teſta ovata incarnata gibba: labro arcuato incraſſato intus dentato. *Poiret voyag. en Barbar.* 2. *p.* 21.
Habitat frequens ad Africae *littora.*

322. VOLUTA. *Animal* Limax.
Teſta unilocularis, ſpiralis.
Apertura ecaudata, ſubeffuſa.
Columella plicata: labio umbilicove (utplurimum) nullo.

* *apertura integra.*

Auris Midae. 1. V. teſta coarctata ovali oblonga: ſpira rugoſa, columella bidentata. *Muſ. Lud. Ulr.* 589. *n.* 226.*
Müll. verm. fluv. et terr. 2. *p.* 110. *n.* 311. Helix teſta fuſiformi granulata: apertura lanceolata, labro ad axin bidentato.
Rumpf muſ. t. 33. *f.* H. H. Auris midae.
Argenv. Conch. t. 10. *f.* G. Auricula Midae.
Liſt. Conch. t. 1058. *f.* 6.
Gualt. teſt. t. 55. *f.* G.
Pet. aq. amb. t. 8. *f.* 2.
Klein oſtr. t. 7. *f.* 122.
Seb. muſ. 3. *t.* 71. *f.* 6. 21. 22.
Knorr Vergn. 6. *t.* 25. *f.* 1.
Martin. Conch. 2. *t.* 43. *f.* 436-438.
Spengl. ſelt. Conch. t. 1. *f.* L.
β) *Liſt. Conch. t.* 577. *f.* 32. b.
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 149. *f.* 1395. 1396.
Habitat rarior in Indiae, *potiſſimum* Ceram, *paludibus ſilvaticis fluviisque uliginoſis, helices bullis jungens, teſta nonnunquam ultra 4 pollices longa fuſca, ſolida, rugoſa, vel ſtriata, ſpira magna: anfractibus 6-9 ſingulis faſcia granulata terminatis, extremis cancellatis, aperture longa, infra ampliore.*

flammea. 2. V. teſta ovali oblonga: apertura ampla, columella unidentata.
Liſt. Conch. t. 814. *f.* 24.
Martin. Conch. 2. *t.* 43. *f.* 439.
β) *Liſt. Conch. t.* 827. *f.* 49. c.
γ) *Liſt. Conch. t.* 834. *f.* 60.
δ) *Liſt Conch. t.* 834. *f.* 61.
Habitat - - - teſta magis ventricoſa et breviore, quam in aure Midae, alba: maculis virgatis perpendicularibus undatis rubris, columella flavo marginata.

ſulcata. 3. V. teſta coarctata ovali-oblonga ſulcata alba flavo-punctata, columella biplicata.
Martin. Conch. 2. *t.* 43. *f.* 440. 441.
Habitat - - - auri Midae proxime affinis, at teſta longe minori, vix $\frac{3}{4}$ pollicis longa, ſulco inter utramque columellae plicam profundo.

bifaſciata. 4. V. teſta tenui transverſim ſtriata incarnata: faſciis duabus albis, columella unidentata.
Liſt. Conch. t. 835. *f.* 58.
Martin. Conch. 2. *t.* 43. *f.* 442. 443.
Habitat - - - teſta vix pollicem longa: apertura longa, anguſta.

flava. 5. V. teſta ſuperius coarctata flava, labro crenulato, columella biplicata.
Martin. Conch. 2. *t.* 43. *f.* 444.
Habitat - - - teſta 4½ *lineas longa, rarius ſpadicea faſciaque obſoleta obſcura, columellaque alba tridentata, ſpirae anfractibus* 7 *planis.*

minuta. 6. V. teſta ovali oblonga faſciata, columella triplicata.
Liſt. Conch. t. 834. *f.* 59.
Martin. Conch. 3. *t.* 43. *f.* 445.
Habitat - - - teſta nunc fuſca: faſciis 2-6 *albis, nunc alba: faſciis* 4, *alternatim luteis et coffeae colore tinctis, labroque tricoſtato.*

puſilla. 7. V. teſta tenui fuſca: ſpirae anfractibus cancellatis, columella tridentata.
Gualt. teſt. t. 55. *f.* F.
Martin. Conch. 2. *t.* 43. *f.* 446.
Habitat - - - - auri Midae proxime affinis, at teſta minima.

glabra. 8. V. teſta oblongo-ovali glabra: labro reflexo ſulcato, columella unidentata.
Martin. Conch. 2. *t.* 43. *f.* 447. 448.
Habitat - - - teſta ultra 1½ *pollicem longa magis ventricoſa, quam in aure Midae, apertura quoque ſuperius magis coarctata, colore albo: maculis perpendicularibus undatis flavicantibus aut ſpadiceis vario.*

Auris Sileni. 9. V. teſta ovali gibba umbilicata: columellae plica unica, craſſa flexuoſa. *v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 9. *f.* 3. 4. *muſ. Caeſ. Vindob. ind.* 1. *p.* 197.

Habitat

Habitat - - - teſta glabra ultra 2 pollices longa ventricoſa brevi, fuſca: ſtriis longitudinalibus undulatis ſpadiceis, apertura ovata, ſpira obtuſa.

Auris Judae. 10. V. teſta coarctata oblonga: ſpira laevi, columella tridentata. *Muſ. Lud. Ulr.* 590. *n.* 226.*
Müll. verm. fluv. et terr. 2. *p.* 109. *n.* 310. Helix teſta cylindrica ſubgranulata, apertura lanceolata, labro ad axin tridentato.
Liſt. Conch. t. 32. *f.* 30.
Bonann. muſ. Kircher. 3. *f.* 412.
Martin. Conch. 2. *t.* 44. *f.* 449-451.
Schroet. Flusconch. t. 9. *f.* 10.
Einl. in Conch. 1. *p.* 197. *t.* 1. *f.* 9.
β) *Gronov. zooph. t.* 18. *f.* 12. Voluta Auris Judae.
Liſt. Conch. t. 1058. *f.* 9.
Habitat rarior in Indiae paludibus, *auri Midae affinis, at teſta minore, anguſtiore, magis oblonga, fuſca aut alba maculis undatis fuſcis varia, ſpirae anfractibus* 6, *primo et extremis ſubtiliſſime cancellatis.*

Auris Malchi. 11. V. teſta fuſiformi granulata: apertura ovata, columella exciſa patentiſſima.
Müll. verm. fluv. et terr. 2. *p.* 112. *n.* 312. Helix Auris Malchi.
Chemn. Conch. 9. *t.* 121. *f.* 1037. 1038.
β) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 121. *f.* 1039. 1040.
γ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 121. *f.* 1041.
Habitat β) in nova Caledonia, *teſta 29 lineas longa, ſub epidermide ſqualide fuſca, alba: ſpirae anfractibus ſex medio convexis coſtatis, apertura candida; an hujus generis?*

tornatilis. 12. V. teſta coarctata ovata ſubſtriata: ſpira elevata acutiuscula, columella uniplicata.
Liſt. Conch. t. 835. *f.* 58.
Knorr Vergn. 6. *t.* 19. *f.* 4.
Martin. Conch. 3. *t.* 43. *f.* 442. 443.
Schroet. n. Litterat. 3. *t.* 2. *f.* 12. 13.
β) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 19. *f.* 4?
Habitat - - - teſta rubicunda: faſciis albis.

ſolidula. 13. V. teſta coarctata oblongo-ovata opaca ſtriata: ſpira elevata acutiuſcula, columella ſubplicata. *Muſ. Lud. Ulr.* 590. *n.* 228.*
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 143?

Klein oſtr. t. 3. *f.* 72?
Schroet. n. Litterat. 3. *t.* 2. *f.* 14. 15.
Kaemm. Cab. Rudolſt. t. 8. *f.* 3.
Chemn. Conch. 10. *t.* 149. *f.* 1405.
Martin. Conch. 3. *t.* 43. *f.* 440. 441.
Habitat - - - teſta albo griſeoque longitudinaliter lineata.

livida. 14. V. teſta coarctata ovato-cylindrica: ſpira ſubelevata obtuſiuſcula, columella quinqueplicata. *Muſ. Lud. Ulr.* 591. *n.* 229.*
Gualt. teſt. t. 25. *f.* B?
β) *Gualt. teſt. t.* 25. *f.* C.
Habitat rarior in Africa, *ad cylindroideas accedens, teſta tamen magis ventricoſa, vix ultra pollicem longa livida: faſciis transverſis pallidis obſoletis diſtincta.*

Coffea. 15. V. teſta coarctata laevi: ſpira obtuſa, apertura utrinque dentata.
Liſt. Conch. t. 834. *f.* 59.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 255.
Favann. Conch. t. 65. *f.* 47.
Chemn. Conch. 9. *t.* 121. *f.* 1043. 1044.
Martin. Conch. 2. *t.* 43. *f.* 445.
Habitat - - - ſtructura ad conos accedens, at apertura poſterius coarctata, teſta lurido-livida.

** Cylindroideae, *ſ. ſubcylindricae emarginatae.*

porphyria. 16. V. teſta laevi: ſpira baſi obliterata, labro medio retuſo, columella oblique ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 592. *n.* 230.*
Argenv. Conch. t. 13. *f.* K. Porphyria.
Bonan. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 142.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* 1.
Gualt. teſt. t. 24. *f.* P.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* E.
Muſ. Gottwald. t. 42. *f.* 19. a.
Knorr delic. t. B. IV. *f.* 4.
Vergn. I. *t.* 15. *f.* I.
Regenſ. Conch. I. *t.* 2. *f.* 15.
Martin. Conch. 2. *t.* 47. *f.* 485. 486. 498.
β) *Liſt. Conch. t.* 727. *f.* 14.
Gualt. teſt. t. 24. *f.* N. O.
Argenv. Conch. t. 13. *f.* N.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* A-D.
Muſ. Gottwald. t. 42. *f.* 22. a. b. c.

Knorr

Knorr Vergn. 2. *t.* 12. *f.* 1. 2. *et* 3. *t.* 2. *f.* 3.
Martin. Conch. 2. *t.* 45. *f.* 476. 477.
γ) *Martin. Conch.* 2. *t.* 48. *f.* 519?
δ) *Liſt. Conch. t.* 724. *f.* 11?
Habitat in Braſilia, *olivae proxime affinis, at teſta quadruplo longiore, 5 quippe pollices longa, rubella, lineis angularibus plurimis fuſcis varia, labro intus ſordide flavo transverſim ſtriato, columella ſubfuſca: plicis albis.*

Oliva. 17. V. teſta laevi: ſpirae baſi reflexa, culumella oblique ſtriata.
Muſ. Lud. Ulr. 593. *n.* 231.*
α) *Rumpf. muſ. t.* 39. *f.* 2. Cylinder.
Liſt. Conch. t. 739. *f.* 27.
Gualt. teſt. t. 23. *f.* B.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* L.
Muſ. Gottwald. t. 43. *f.* 49. 40. a.
Knorr Vergn. 5. *t.* 28. *f.* 6.
Martin. Conch. 2. *t.* 45. *f.* 472. 473.
Chemn. Conch. 10. *t.* 147. *f.* 1367-1382.
β) *Martin. Conch.* 2. *t.* 47. *f.* 502.
γ) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 27. *f.* 4.
δ) *Knorr Vergn.* 3. *t.* 17. *f.* 3.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 2.
Marttni Conch. 2. *t.* 45. *f.* 474.
ε) *Liſt. Conch. t.* 718. *f.* 2.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* K.
Knorr Vergn. 1. *t.* 15. *f.* 7. *et* 5. *t.* 27. *f.* 5.
Martin. Conch. 2. *t.* 47. *f.* 501.
ζ) *Liſt. Conch. t.* 740. *f.* 29.
Martin. Conch. 2. *t.* 45. *f.* 475. *et t.* 47. *f.* 507. 508.
η) *Martin. Conch.* 2. *t.* 46. *f.* 496.
ϑ) *Liſt. Conch. t.* 728. *f.* 15.
Gualt. teſt. t. 24. *f.* M.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* O.
Muſ. Gottwald. t. 42. *f.* 19. b. c. *t.* 43. *f.* 25. a. b. d. *f.* 26. 27. 31. 31. a.
Martin. Conch. 2. *t.* 45. *f.* 478. 479.
ι) *Martin. Conch.* 2. *t.* 46. *f.* 497.
κ) *Liſt. Conch. t.* 739. *f.* 28.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* 3.
Martin. Conch. 2. *t.* 48. *f.* 512. 513.
λ) *Valent. Abh. t.* 8. *f.* 69.
μ) *Gualt. teſt. t.* 23. *f.* G.
ν) *Gualt. teſt. t.* 23. *f.* P.

 ξ) *Gualt.*

ξ) *Gualt. teſt. t.* 23. *f.* PP.
ο) *Gualt. teſt. t.* 23. *f.* QQ.
π) *Martini Conch.* 2. *t.* 48. *f.* 509. 510.
ρ) *Liſt. Conch. t.* 735. *f.* 25.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* 4.
Valent. Abh. t. 8. *f.* 68.
Klein oſtr. t. 5. *f.* 91. a. b.
Argenv. Conch. t. 13. *f.* S.
Muſ. Gottwald. t. 43. *f.* 37. b. c. d. *f.* 34.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* M. *et* a.
Knorr Vergn. 5. *t.* 19. *f.* 1. *et t.* 26. *f.* 4.
Martin. Conch. 2. *t.* 45. *f.* 480. 481. *t.* 47. *f.* 503. 504. *et t.* 51. *f.* 563.
σ) *Martini Conch.* 2. *t.* 47. *f.* 499. 500.
τ) *Argenv. zoomorph. t.* 11. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* R.
Muſ. Gottwald. t. 42. *f.* 6. a. *f.* 7. a. b. *f.* 15. d. e.
Knorr Vergn. 5. *t.* 26. *f.* 3.
Martin. Conch. 2. *t.* 48. *f.* 517.
υ) *Knorr Vergn.* 3. *t.* 2. *f.* 4.
φ) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 23. *f.* 5.
χ) *Muſ. Gottwald. t.* 43. *f.* 30. b. *f.* 35. a. b.
ψ) *Muſ. Gottwald. t.* 37. *f.* d.
ω) *Muſ. Gottwald. t.* 43. *f.* 41. b.
αα) *Muſ. Gottwald. t.* 43. *f.* 42. b.
ββ) *Argenv. Conch. t.* 13. *f.* R.
Martini Conch. 2. *t.* 49. *f.* 531.
γγ) *Liſt. Conch. t.* 732. *f.* 21. *et t.* 734. *f.* 23. 24.
Gualt. teſt. t. 23. *f.* M. N.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* Y
Muſ. Gottwald. t. 42. *f.* 1. d. 2. a. 13. a-d.

Martin.

Infinita olivae variatio, et maxima nonnullarum varietatum cum iſpidula affinitas dubios relinquit, an diſtinctae ſint varietates, et utri ſpeciei adjungendae olivae et volutae a Martini *Conch.* 2. *t.* 99. *f.* 6. 7. *a* Liſtero *Conch. t.* 718. *f.* 2. a. *t.* 725. *f.* 12. *t.* 728. *f.* 16. *t.* 730. *f.* 18. *t.* 738. *f.* 33. *t.* 746. *f.* 40. *et t.* 813. *f.* 23. a. *a* Gualtieri *teſt. t.* 23. *f.* R. S. SS. V. *et t.* 24. *f.* B. C. D. E. F. H. I. L. *ab* Argenville *Conch. t.* 13. *f.* L. *a* Seba *muſ.* 3. *t.* 53. *f.* F. S. T. V. b. c. d. h. m. *a* Byteneiſter *appar. t.* 12. *f.* 62. *Muſ.* Gottwaldian. *t.* 42. *f.* 5. a. b. 8. 11. 12. 14. d. 15. *f.* 16. a. d. e. *f.* 18. b. c. *f.* 20. a. b. *t.* 43. *f.* 28. a. b. c. *f.* 29. a. b. e. *f.* 30. a. b. c. d. *f.* 32. *f.* 33. *f.* 35. a. b. c. d. h. k. *f.* 38. *f.* 40. d. *f.* 43. a. *f.* 44. a. *f.* 45. a. b. *f.* 46. 47. 48. 50. *a* Knorrio *Vergn.* 1. *t.* 15. *f.* 7. *et* 6. *t.* 34. *f.* 4. 5. *et a* Schroetero *Einl. in Verſt.* 4. *t.* 7. *f.* 3. 4. *delineatae; an diſtincta hujus tribus ſpecies foſſilis ab* Argenville *Conch. t.* 29. *f.* 9. a. *adumbrata?*

Martin. Conch. 2. *t.* 46. *f.* 487. 488.
δδ) *Martin. Conch.* 2. *t.* 46. *f.* 489.
εε) *Martin. Conch.* 2. *t.* 46. *f.* 490.
ζζ) *Liſt. Conch. t.* 739. *f.* 26.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* H. I.
Martin. Conch. 2. *t.* 48. *f.* 511. 511. a.
ηη) *Argenv. Conch. t.* 13. *f.* O.
Martin. Conch. 2. *t.* 48. *f.* 514.
ϑϑ) *Martin. Conch.* 2. *t.* 51. *f.* 559.
ιι) *Martin. Conch.* 2. *t.* 51. *f.* 562.
κκ) *Liſt. Conch. t.* 719. *f.* 3. *et t.* 731. *f.* 10.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* 5.
Gualt. teſt. t. 23. *f.* F. T.
Seba muſ. 3. *t.* 53. *f.* F?
Martin. Conch. 2. *t.* 48. *f.* 515. 516. 518. 521.
λλ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 53. *f.* G.
Habitat infinita coloris et picturae varietate in mari indico.

annulata. 18. V. teſta laevi alba; dorſi annulo carinato.
Liſt. Conch. t. 717. *f.* 1.
Martin. Conch. 2. *t.* 51. *f.* 564.
β) *Martin. neueſt. Mannigfalt.* 1. *p.* 446. *t.* 2. *f.* 21?
Habitat - - - β) rufeſcente undulata.

Utriculus. 19. V. teſta elongata laevi: ſpira prominula.
Liſt. Conch. t. 723. *f.* 10. *t.* 730. *f.* 19?
Gualt. teſt. t. 24. *f.* G.
Argenv. Conch. t. 13. *f.* M.
Knorr Vergn. 2. *t.* 12. *f.* 4. 5.
Martin. Conch. 2. *t.* 49. *et* 50. *f.* 539-542.
β) *Muſ. Gottwald. t.* 42. *f.* 9. 10. 14. a. b. c. 15. a. b.
Martin. Conch. 2. *t.* 48. *f.* 520.
γ) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 4. *f.* 4.
Martin. Conch. 2. *t.* 51. *f.* 565. 566.
δ) *Liſt. Conch. t.* 733. *f.* 22.
Martin. Conch. 2. *t.* 50. *f.* 543. 544.
ε) *Liſt. Conch. t.* 725. *f.* 13.
Muſ. Gottwald. t. 25. *f.* 173. b.
Martin. Conch. 2. *t.* 50. *f.* 545-547.
ζ) *Martin. Conch.* 2. *t.* 50. *f.* 548.
η) *Liſt. Conch. t.* 722. *f.* 9.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 141.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* 9.
Gualt. teſt. t. 23. *f.* RR. *et t.* 24. *f.* A.

 Seb.

Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* P. Q.
Muſ. Gottwald. t. 42. *f.* 2. b. c. *et f.* 4. *et t.* 43. *f.* 51. a. b. c. *f.* h. i. m.
Knorr Vergn. 3. *t.* 17. *f.* 2. *et* 5. *t.* 18. *f.* 1. 2.
Martin. Conch. 2. *t.* 50. *f.* 549-554.
Habitat in Oceano indico *et* aethiopico, *coloris et picturae varietate numeroſa, forma magis elongata ab oliva diſcernenda.*

hiatula. 20. V. teſta tenui: dorſo cinereo maculoſo ſubtus calloſo, apertura ampla, columella ad baſin dentata.
Liſt. Conch. t. 729. *f.* 17.
Martin. Conch. 2. *t.* 50. *f.* 555.
Habitat in mari hiſpanico, *utriculo affinis, ore caeruleo aut fuſco, rarius albo, dorſi callo albo aut flavicante.*

jaſpidea. 21. V. teſta alba vireſcente fuſco violaceoque punctata: ſpira prominente; anfractibus baſi faſcia maculoſa.
Liſt. Conch. t. 726. *f.* 13. a.
Martin. Conch. 2. *t.* 50. *f.* 556.
Habitat in mari hiſpanico, *teſta vix pollicem longa, ſpira magis prominente, quam in congeneribus.*

nivea. 22. V. teſta nivea elongata laevi faſciata.
Martin. Conch. 2. *t.* 50. *f.* 558.
β) *Martin. Conch.* 2. *t.* 50. *f.* 557.
Habitat in mari hiſpanico, *anfractuum primo ſubfuſco aut rubello: faſciis 2 albis, β) faſciis 2 caeruleis nebuloſis per totam teſtae ſuperficiem diſperſis; an vere diſtincta ab Utriculo et Oliva?*

Iſpidula. 23. V. teſta laevi: ſpira prominente; margine unico, columella oblique ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 594. *n.* 232.*
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 4. *f.* 7. Agaron?
Bonann. recr. 3. *f.* 369.
muſ. Kirch. 3. *f.* 363.
Barr. ic. t. 1322. *f.* 17.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* 7. 8.
Petiv. gaz. t. 59. *f.* 8.
Gualt. teſt. t. 23. *f.* C. D. E.
Argenv. Conch. t. 13. *f.* Q.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* X.
Muſ. Gottwald. t. 42. *f.* 1. a. b. c. *f.* 3. a. b. c. *f.* 6. b. c. d. *et f.* 7. a. *et t.* 43. *f.* 37. c. *f.* 40. b. c. e. f. *f.* 41. a. *f.* 42. a. *f.* 43. c. *f.* 44. b. *et f.* 45. d. f.

Knorr Vergn. 3. *t.* 19. *f.* 3.
Martin. Conch. 2. *t.* 49. *f.* 522-530. *et f.* 532-538.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 53. *f.* g.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 53. *f.* i.
δ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 53. *f.* k.
ε) *Liſt. Conch. t.* 720. *f.* 4. 5.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* 6.
Gualt. teſt. t. 23. *f.* H. I. L. Q.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* W.
Muſ. Gottwald. t. 42. *f.* 5. c. *et? t.* 43. *f.* 36.
Knorr Vergn. 2. *t.* 10. *f.* 6. 7.
Martin. Conch. 2. *t.* 46. *f.* 491. 492.
ζ) *Liſt. Conch. t.* 721. *f.* 6. 7.
Muſ. Gottwald. t. 42. *f.* 5. d. *et f.* 15. h.
Martin. Conch. 2. *t.* 46. *f.* 493. 494.
Habitat varietate numeroſa in India, *teſta pollicem*, ε) 2 *longa, anguſta, alba aliter atque aliter picta, intus obſcuriore aut fuſca.*

Carneolus. 24. V. teſta aurantia: faſciis caeruleis, ſpira complanata et apertura albis.
Martin. Conch. 2. *t.* 46. *f.* 495.
Habitat - - -

*** Ovatae, *ſ. obovatae, effuſae, emarginatae.*

Dactylus. 25. V. teſta laevi decuſſatim ſtriata obtuſa columella ſexplicata.
Liſt. Conch. t. 813. *f.* 23.
Gualt. teſt. t. 28. *f.* P.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* S.
Favann. Conch. t. 15. *f.* F².
Chemn. Conch. 10. *t.* 150. *f.* 1411. 1412.
β) *Gualt. teſt. t.* 28. *f.* O.
Habitat rara in India, *teſta* 1½ *pollicem longa ex albido et incarnato varia: labio vix crenato.*

miliaria. 26. V. teſta ſubemarginata alba: ſpira obliterata flaveola, columella oblique ſtriata.
Habitat frequens in mari mediterraneo, *monili affinis, at minor, brevior, magis ventricoſa, glaberrima, ſpirae lineola flava, interdum tota mellea.*

Monilis. 27. V. teſta integra alba: ſpira obliterata alba, columella oblique ſtriata.
Muſ. Gottwald. t 8. *f.* 46. c.

 Martin.

Martin. Conch. 2. *t.* 42. *f.* 426.

β) *Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 5. *f.* 4. Stipon.

Martin. Conch. 2. *t.* 42. *f.* 428.

Habitat in Sina, *ad armillas, monilia, coronas adhibita,* β) *in* Senegalia Africae, *teſta vix* ½ *pollicem,* β) 2½ *lineas longa, labro prominente, apertura ampla, columellae plicis* 4-5; β) 8-10 *tenuiſſimis.*

exilis. 28. V. teſta obovata integra flavicante: faſciis duabus fuſcis, ſpira prominente, columella oblique ſtriata.

Martin. Conch. 2. *t.* 42. *f.* 427.

β) *Schroet. Einl. in Conch.* 1. *p.* 303. *t.* 1. *f.* 18.

Habitat - - - *teſta minuta,* β) *alba nitida: faſcia lutea.*

Perſicula. 29. V. teſta laevi: ſpira retuſo-umbilicata, columella ſeptemplicata, labro marginato crenato.

α) teſta rubro punctata.

Liſt. Conch. t. 803. *f.* 10.

Pet. gaz. t. 8. *f.* 2.

Barrel. ic. t. 1326. *n.* 33.

Bonann. recr. 3. *f.* 246.

muſ. Kirch. 3. *f.* 245.

Gualt. teſt. t. 28. *f.* C. D. E.

Muſ. Gottwald. t. 8. *f.* 48. a. b. *f.* 49. a. b. c. d. *f.* 51. b.

Martin. Conch. 2. *t.* 42. *f.* 421.

β) teſta rubro-lineata.

Adanſ. Seneg. 1. *t.* 4. *f.* 4. Bobi.

Liſt. Conch. t. 803. *f.* 9.

Pet. gaz. t. 8. *f.* 10.

Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 238. *male.*

Gualt. teſt. t. 28. *f.* B.

Muſ. Gottwald. t. 8. *f.* 48. a. b. *f.* 49. a. b. c. d. *f.* 51. b.

Knorr Vergn. 6. *t.* 21. *f.* 6.

Martin. Conch. 2. *t.* 42. *f.* 419. 420.

γ) teſta rubella albo maculata, aut unicolore alba, vel caeruleſcente.

Muſ. Gottwald. t. 8. *f.* 46. b. 47. 51. a. 62. a. b. c.

Martin. Conch. 2. *t.* 42. *f.* 416-418.

δ) teſta nigro-faſciata, ſpira ſubprominula.

Valent. Abb. t. 9. *f.* 78.

Habitat in mari africano, *et ad* Senegaliam, *teſta vix ultra pollicem longa.*

pallida. 30. V. teſta integra oblongo-ovata: ſpira elevata, columella quadriplicata. *Muſ. Lud. Ulr.* 588. *n.* 223.*

Adanſ.

Adanſ. Seneg. 1. *t.* 5. *f.* 2. Falier, *et f.* 3. Simeri.
Liſt. Conch. t. 714. *f.* 70.
Schroet. Einl. in. Conch. 1. *p.* 211. *t.* 1. *f.* 10. a. b.
Habitat in Oceano africano, *glabellae affinis, at teſtae ventre ſuperne aequali diſtincta, teſta elongata anguſta, vix* ½ *pollicem longa, exalbida vel cerea, interdum pellucida.*

Faba. 31. V. teſta ſubemarginata laevi ſubplicata: ſpira prominente, columella quadriplicata, labro marginato crenulato.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 4. *f.* 2. Narel.
Gualt. teſt. t. 28. *f.* Q.
Muſ. Gottwald. t. 25. *f.* 170. a-d.
Knorr Vergn. 4. *t.* 17. *f.* 6.
Martin. Conch. 2. *t.* 42. *f.* 432. 433.
Habitat paulo rarior in Oceano africano, *teſta ad pollicem usque longa, anguſta, elongata, nitida, cana, ſeriatim nigro punctata.*

glabella. 32. V. teſta integerrima laevi: ſpira laevigata, columella quadriplicata, labro gibbo marginato denticulato. *Muſ. Lud. Ulr.* 574. *n.* 233.*
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 4. *f.* 1. Porcelaine.
Liſt. Conch. t. 818. *f.* 29-32.
Gualt. teſtac. t. 28. *f.* A. L.
Klein oſtrac. t. 5. *f.* 92.
Muſ. Gottwald. t. 25. *f.* 169. a-h. *f.* 170. c. 171. a. b. 172. a-d. 173. a.
Knorr Vergn. 4. *t.* 21. *f.* 2. 3. *et* 5. *t.* 23. *f.* 3.
Martin. neueſt. Manigf. 4. *p.* 425. *t.* 3. *f.* 25-28.
Conch. 2. *t.* 42. *f.* 429-431. 434. 435.
β) teſta ochroleuca atro punctata.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 49.
γ) teſta anguſtiore badia, labro non marginato, columella triplicata.
Bonann. recr. 3. *f.* 326.
muſ. Kirch. 2. *f.* 101.
δ) teſta alba flavis lineis picta.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* 36.
ε) teſta alba purpureo nebuloſa, ſpirae anfractibus marginatis.
Gronov. zooph. p. 298. *n.* 1318. *t.* 19. *f.* 13. 14. Voluta Pyrum.
ζ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 104. *f.* 890. 891.
η) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 150. *f.* 1422.
θ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 150. *f.* 1423. 1424.

Habitat

Habitat in Oceano africano *et* americano, *teſta* 1-2 *pollices longa, aut unicolore alba, cinerea, vel ſubfuſca, aut ſtriata, undulata, maculis virgatis, ocellis albis, lineisve angulatis picta, ſpirae anfractibus* 5-6.

Prunum. 33. V. teſta integerrima laevi: ſpira laevigata, columella quadriplicata, labro aequali mutico.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 4. *f.* 3. Egouen.
Liſt. Conch. t. 817. *f.* 28.
Martin. Conch. 2. *t.* 42. *f.* 422. 423.
Habitat frequens ad Goream, *teſta ad* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, caerulea, caeruleſcente, vel ex vireſcenti cana.*

reticulata. 34. V. teſta decuſſatim ſubſulcata: labro interne ſtriato, columella ſubperforata.
Liſt. Conch. t. 830. *f.* 52-54.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 52.
Argenv. Conch. t. 17. *f.* M.
Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 53. 55.
Muſ. Gottwald. t. 25. *f.* 165. a. b.
Knorr Vergn. 5. *t.* 18. *f.* 7?
Martin. Conch. 3. *t.* 121. *f.* 1107. 1108. 1109?
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 49. *f.* 56?
Habitat in Oceano americano *et ad* Guineam, *teſta ad* 2 *pollices longa, pruni magnitudine albo luteoque varia, aut fuſca, albo faſciata, rarius tota fuſca, aut alba, inflata: ſulcis obſoletis in ſectionis angulo in tubercula elevatis, apertura alba, labro transverſim ſulcato, columella plicis aliquot geminatis exarata; cauda brevi.*

mercatoria. 35. V. teſta ſtriata: ſpira obtuſata, columella retuſa dentata, labro gibbo denticulato.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 9. *f.* 29. Staron.
Liſt. Conch. t. 824. *f.* 43.
Pet. gaz. t. 9. *f.* 4.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 36.
Gualt. teſt. t. 43. *f.* I. L.
Muſ. Gottwald. t. 16. *f.* 120. b-d. e.
Knorr Vergn. 4. *t.* 12. *f.* 5. *et* 6. *t.* 18. *f.* 3.
Martin. Conch. 2. *t.* 44. *f.* 452-458.
β) *Liſt. Conch. t.* 827. *f.* 49. E.
γ) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 16. *f.* 6.
δ) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 16. *f.* 7.
ε) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 17. *f.* 9?

Habitat

Habitat in mari mediterraneo, aethiopico, americano, indico, *ruſticae affinis, teſta ¾ pollicis circiter longa, aut unicolore alba vel flava, aut aliter aliterve maculata, nebuloſa vel ſtriata, interdum faſciata, ſolida, brevi: ſtriis transverſis elevatis noduloſis.*

ruſtica. 36. V. teſta laeviuſcula: ſpira prominente, columella retuſa denticulata, labro gibbo denticulato.

Adanſ. Seneg. 1. *t.* 9. *f.* 28. Siger.
Liſt Conch. t. 824. *f.* 44. *t.* 825. *f.* 46. *t.* 826. *f.* 49.
Gualt. teſt. t. 43. *f.* E. G. H.
Bytem. app. t. 11. *f.* 41. c.
Knorr Vergn. 6. *t.* 18. *f.* 4.
Martin. Conch. 2. *t.* 44. *f.* 469-471.
β) *Liſt. Conch. t.* 827. *f.* 49. a.
Gualt. teſt. t. 43. *f.* C.
Martin. Conch. 2. *t.* 44. *f.* 462.
γ) *Liſt. Conch. t.* 826. *f.* 48.
Gualt. teſt. t. 43. *f.* D.
Martin. Conch. 2. *t.* 44. *f.* 465. 466.
δ) *Martin. Conch.* 2. *t.* 44. *f.* 459.
ε) *Martin. Conch.* 2. *t.* 44. *f.* 463.
ζ) *Martin. Conch.* 2. *t.* 44. *f.* 467.
η) *Martin. Conch.* 2. *t.* 44. *f.* 468.
ϑ) *Liſt. Conch. t.* 825. *f.* 45.
ι) *Liſt. Conch. t.* 827. *f.* 49. b.

Habitat numeroſa coloris, picturae, magnitudinis varietate in mari mediterraneo, aethiopico, americano, *ſtriis teſtae nullis a ruſtica diſcernenda, teſta nunc unicolore rubra vel flava, nunc alba fuſco, ſpadiceo, luteove maculata, ſtriata, nebuloſa.*

paupercula. 37. V. teſta integra laeviuſcula baſi ſtriata: ſpira prominula, columella quadriplicata, labro obtuſato.

Liſt. Conch. t. 819. *f.* 35.
Gualt. teſt. t. 54. *f.* L.
Knorr Vergn. 4. *t.* 26. *f.* 5.
Martin. Conch. 4. *t.* 149. *f.* 1386. 1387.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 217. *t.* 1. *f.* 11.
β) *Gualt. teſt. t.* 43. *f.* O.
γ) *Gualt. teſt. t.* 43. *f.* F?
δ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 150. *f.* 1417. 1418.

Habitat rarior in mari mediterraneo *et* indico, *teſta ſolida ex ferrugineo nigra: lineis albis longitudinalibus.*

mendicaria. 38. V. teſta ſubſtriata: ſpira ſubgranulata, columella laevi, labro gibbo denticulato.

Liſt. Conch. t. 826. *f.* 47.
Pet. gaz. t. 11. *f.* 5.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 50.
Gualt. teſt. t. 52. *f.* E.
Knorr Vergn. 4. *t.* 16. *f.* 3.
Martin. Conch. 2. *t.* 44. *f.* 460. 461.

Habitat in mari mediterraneo *et* indico, *teſta atra obſolete ſcabra, magnitudine ſeminis phaſeoli ventris anfractibus faſciis* 3 *flavis, ſpira linea unica adſcendente: anfractibus ſubnodoſis.*

cancellata. 39. V. teſta integra plicata decuſſatim reticulata, columella triplicata ſubumbilicata productiuſcula

Syſt. nat. X. 1. *p.* 751. *n.* 473. Murex ſcabriuſculus.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 8. *f.* 16. Bivat.
Gualt. teſt. t. 48. *f.* B. C. D. E.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 9. *f.* 7. 8.
Knorr Vergn. 4. *t.* 5. *f.* 5.

Habitat in Oceano africano, *et ad* Senegaliam, *murici ſenticoſo affinis, ſed brevior, teſta ultra pollicem nonnunquam longa, rugis longitudinalibus ſtrias transverſas elevatas acutas decuſſantibus ſcabra, alba: dorſi faſciis* 2 *ferrugineis, ſpira acuta, columella breviter caudata.*

elegans. 40. V. teſta laevi alba caeruleo faſciata: apertura flava, ſpira ſubobliterata, columella ſexdentata.

Liſt. Conch. t. 803. *f.* 11?
Bonann. muſ. Kircher. 3. *f.* 269.
Martin. Conch. 2. *t.* 42. *f.* 424. 425.

Habitat - - - *teſta vix pollicem longa.*

Ovum. 41. V. teſta laevi vireſcenti-alba multifaſciata: labro inflexo, columella quadriplicata.

Knorr Vergn. 4. *t.* 23. *f.* 5. *et t.* 27. *f.* 1.

Habitat - - - *eleganti affinis, at teſta majore ad* $2\frac{3}{4}$ *pollices usque longa.*

42. V.

Huic tertiae volutarum tribui accenſendae videntur, an diſtinctae ſpecies? volutae a Liſtero *Conch. t.* 822. b. *f.* 41. b. *t.* 823. *f.* 42. *t.* 832. *f.* 56. *a* Bonanni *muſ. Kircher.* 3. *f.* 395. *depictae: Quartae autem volutae a* Liſtero *Conch. t.* 577. *f.* 32. a. *t.* 814. *f.* 23. b. *t.* 821. *f.* 39. *t.* 828. *f.* 50. *a* Seba *muſ.* 3. *t.* 49. *f.* 9. 10. 13. 14. 17-20. 25-32. 35-39. 42. 44. *delineatae.*

margina-ta. 42. V. ſpira obſoleta, lateribus incraſſato-marginatis, columella quadriplicata. *v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 9. *f.* 5-6.
Favann. Conch. t. 29. *f.* E.
Chemn. Conch. 10. *t.* 150. *f.* 1421.
Habitat - - - *teſta nivea laevi, rarius rubella, aut flava faſciisque* 3 *obſcurioribus picta; apertura lanceolata.*

nucea. 43. V. teſta ſubſtriata glabra: ſpira prominula obtuſata laevi, columella quinqueplicata. *Gronov. zooph. t.* 18. *f.* 11.
Habitat - - - *teſta alba productiore tumidula obſolete longitudinaliter ſtriata, ſpirae anfractibus* 5.

Porcellana. 139. V. teſta ovata alba ſeriatim rufeſcente punctata: ſpira obtuſa baſi emarginata, columella quinqueplicata, labro gibbo denticulato. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 164. *t.* 150. *f.* 1419. 1420.
Habitat in Oceano indico.

Conus. 140. V. teſta conica alba: baſi ſulcis transverſis excavato-punctatis, anfractibus crenatis, columella ſexplicata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 163. *t.* 150. *f.* 1415. 1416.
Habitat - - -

**** Fuſiformes.

Tringa. 44. V. teſta integriuſcula oblonga laevi: ſpira prominente detrita, columella triplicata, labro introrſum ſubdentato.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 9. *f.* 27. Bigni.
Gualt. teſt. t. 43. *f.* B.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 220. *t.* 1. *f.* 12.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta nitida, luteo alboque nebuloſa vix pollicem longa, ſpirae mucrone ſaepius detrito, columellae plicis tenuiſſimis, labro exterius minime marginato, in medio vere introrſum gibbo, minus tamen quam in praecedentibus.*

Cornicula. 46. V. teſta ſubemarginata oblonga laevi cornea: ſpira longiuſcula, columella quadriplicata, labro aequali mutico.
Gualt. teſt. t. 43. *f.* N?
Schroet. inn. Bau Conch. t. 4. *f.* 2.
Einl. in Conch. 1. *p.* 221. *t.* 1. *f.* 13.
Habitat in mari mediterraneo *et* aethiopico, *tringae affinis, at ſpira magis elongata, labro minime dentato aut incraſſato, teſta utplurimum laevi, rarius ſubtiliſſime transverſim*

verſim ſtriata, atra, ex ochraceo rufeſcente, ex flavicante fuſca, maculis virgatis undatis varia, aut cornu pellucidata et pictura aemulante faſciis interdum 2 exalbidis.

Virgo. 47. V. teſta integra turrita plicata transverſeque ſtriata: columella triplicata perforata.
Habitat - - - teſta pollicis longitudine ſulcis circiter 12 *exarata, baſi reticulata: ſpirae anfractibus linea ſanguinea diſtinctis* 10 *bifaſciatis; faſcia inferiore alba, ſuperiore lutea, cauda ſtrombi fere inſtar producta.* Spengler.

ſcabricula. 48. V. teſta emarginata ſtriata transverſim rugoſa, columella quadriplicata perforata, labro crenulato.
Syſt. nat. X. 1. *p.* 740. *n.* 412. Buccinum ſcabriuſculum.
Rumpf muſ. t. 29. *f.* T.
Gualt. teſt. t. 53. *f.* D. H?
Martin. Conch. 4. *t.* 149. *f.* 1388. 1389. 1391?
Habitat frequens in India, *teſta aſpera alba: rugis fuſcis, rarius cinerea: rugis albis, ad* 2 *pollices longa.*

ruffina. 49. V. teſta integriuſcula transverſim rugoſa: columella quadriplicata, labro crenulato.
Gualt. teſt. t. 54. *f.* G?
Habitat in India, *ſcabriculae ſimilis, at teſta anguſtiore, longiore, paſſim incarnato-maculata, cauda absque umbilico integra, labro recurvo tuberculis rotundatis crenulato.*

nubila. 143. V. teſta integriuſcula laevi luteſcente rubro nebuloſa transverſim ſtriata: labro crenulato, columella quadriplicata.
Mart. univ. Conchol. 1. *t.* 23.
Habitat in Oceano auſtrali *ad* inſulas amicas.

Sanguiſuga. 50. V. teſta emarginata longitudinaliter ſulcata transverſe ſtriata: columella quadriplicata, labro laevi.
Rumpf muſ. t. 29. *f.* V. Turricula granulata.
Liſt. Conch. t. 821. *f.* 38.
Pet. gaz. t. 4. *f.* 5.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 78.
Gualt. teſt. t. 53. *f.* F.
Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 11. 12. 15. 16.
Knorr Vergn. 4. *t.* 11. *f.* 4.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 5.
Martin. Conch. 4. *t.* 148. *f.* 1367. 1368. 1373. 1374.
β) *Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 9. *f.* 35? Genot.

Habitat

Habitat rarior in mari mediterraneo *et* indico, *teſta* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, in confluxu ſulcorum cum ſtriis noduloſ., ſulcis rubris aut faſciis tenuibus alternatim albis fuſcisque pictis: ſpira acuta: anfractibus faſcia utplurimum duplici ex punctis ſanguineis conflata exornatis.*

caffra. 51. V. teſta emarginata tereti laevi: ſpirae anfractibus plicato-ſtriatis, columella ſubquadriplicata. *Muſ. Lud. Ulr.* 595. *n.* 234.*

Gualt. teſt. t. 53. *f.* E.

Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 21. 22. 41.

Knorr Vergn. 5. *t.* 19. *f.* 4.

Martin. Conch. 4. *t.* 148. *f.* 1369. 1370.

β) *Bonann. recr. et muſ. Kirch.* 3. *f.* 74.

γ) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 19. *f.* 5.

Habitat rarior in mari aſiatico, *teſta* $2\frac{1}{2}$ *pollices longa, acuta, atra, violacea, vel flava albido-faſciata, obſoletius vel evidentius plicata.*

Morio. 52. V. teſta ſubemarginata tereti laevi, columella triplicata.

Habitat - - - caffrae ſimillima, at teſta duplo craſſiore, fuſca: ventre ſubtus linea alba unica cincto, ſpira non ſtriata, columellae plicis tantum 3, iisque parvis diſtincta. Spengler.

Acus. 53. V. teſta turrita punctorum rubrorum ſeriebus transverſis picta: ſpira acuminata laevi.

Martin. Conch. 4. *t.* 157. *f.* 1493. 1494.

Habitat - - - teſta vix pollicem longa alba, vel ex luteo fuſca.

Vulpecula. 54. V. teſta emarginata ſubangulata inermi transverſim ſtriata: columella quadriplicata, fauce ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 595. *n.* 235.*

Rumpf muſ. t. 29. *f.* R. Turricula.

Pet. gaz. t. 56. *f.* 1.

Gualt. teſt. t. 54. *f.* B. C.

Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 33. 34.

Knorr Vergn. 3. *t.* 15. *f.* 2. *et* 5. *t.* 16. *f.* 3.

Martin. Conch. 4. *t.* 148. *f.* 1366.

β) Checkered Mitre. *Martyn univ. Conch.* 1. *t.* 19.

Habitat in India, *teſta vix* 2 *pollices longa anguſta, elongata, coſtata, rufa vel flava: faſciis interdum obſcurioribus, labro fuſco maculato, columella alba: media macula fuſca.*

plicaria. 55. V. teſta emarginata angulata: angulis anterioribus ſubſpinoſis, columella quadriplicata, labro laevi. *Muſ. Lud. Ulr.* 596. *n.* 236.*
Rumpf muſ. t. 29. *f.* S. Turricula plicata.
Liſt. Conch. t. 820. *f.* 37.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 64. 65.
Gualt. teſt. t. 54. *f.* D. E. F.
Argenv. Conch. t. 9. *f.* Q.
Klein oſtrac. t. 5. *f.* 87.
Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 23. 24.
Knorr Vergn. 1. *t.* 15. *f.* 5. 6. 3. *t.* 27. *f.* 4. *et* 6. *t.* 12. *f.* 5.
Martin. Conch. 4. *t.* 148. *f.* 1362-1365.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 151. *f.* 1444. 1445.
Habitat in Oceano indico, *teſta ultra 2 pollices longa nunc craſſiori nunc tenuiori, anguſta, elongata, acuminata, transverſim ſtriata, intus caerulea albo faſciata, aut alba faſciis alterius coloris picta, extrinſecus alba, faſciis ſtriisque circularibus rubris, violaceis, cinereis aut viridibus picta, apice utroque rubro, caeruleo, aut cinereo.*

bullata. 129. V. teſta cylindrica glaberrima rufeſcente: cingulis ſublividis, ſpira obtuſa, columella infra quadriplicata, apertura effuſa. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 159. *t.* 150. *f.* 1409. 1410.
Mart. Conch. 2. *t.* 42. *f.* 424. 425.
Liſt. Conch. t. 803. *f.* 11?
Knorr Vergn. 4. *t.* 23. *f.* 1. *et t.* 27. *f.* 1.
Bonann. muſ. Kirch. 3. *f.* 269.
Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. p. 218. *ind. p.* 206.
Habitat in Oceano indico.

crenulata. 130. V. teſta cylindrica decuſſatim ſtriata impreſſo punctata alba luteſcente nebuloſa: labro anfractibusque margine crenulatis nodulolis, columella octoplicata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 162. *t.* 150. *f.* 1413. 1414.
Habitat in Oceano indico.

ſcutulata. 131. V. teſta turrita atra albo maculata transverſim ſtriata: anfractu primo ſubventricoſo, columella quadriplicata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 168. *t.* 151. *f.* 1428. 1429.
Habitat in Oceano indico.

nigra. 132. V. teſta turrita emarginata nigricante: anfractibus planiuſculis, columella quadriplicata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 168. *t.* 151. *f.* 1430. 1431.
Habitat ad Guineae, Indiae, Groenlandiae *littora.*

ſubdiviſa. 133. V. teſta turrita emarginata longitudinaliter coſtata plicata ſubtiliſſime transverſim ſtriata, columella triplicata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 171. *t.* 151. *f.* 1434.-1437.
Habitat in Oceano indico.

cruentata. 134. V. teſta turrita emarginata faſciata transverſim ſtriata: coſtis longitudinalibus nodoſis ſanguineo-maculatis, columella triplicata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 171. *t.* 151. *f.* 1438. 1439.
Habitat in Oceano indico.

exaſperata. 135. V. teſta turrita emarginata granuloſa, decuſſatim ſtriata, longitudinaliter coſtata fuſceſcenti faſciata; columella quinqueplicata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 172. *t.* 151. *f.* 1440. 1441.
β) *Mart. univ. Conchol.* 1. *t.* 21.
Habitat in Oceano indico.

granoſa. 136. V. teſta turrita emarginata transverſim ſtriata longitudinaliter ſulcata, elevato punctata rubeſcente lineata apice baſique nigricante, columella triplicata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 173. *t.* 151. *f.* 1442. 1443.
Habitat in Oceano indico.

caſta. 137. V. teſta turrita laevi brunnea albo faſciata: columella ſexplicata baſi emarginata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 174. *vign.* 20. *f.* C. D.
Martyn. Conchol. 1. *f.* 20.
Habitat ad Amboinae *littus ſeptentrionale.*

leucozonias. 56. V. teſta turrita ſpadicea: faſciis flexuoſis albis, columellae plicis obſoletis.
Martin. Conch. 4. *t.* 148. *f.* 1371. 1372.
Walch Naturf. 4. *t.* 1. *f.* 3. 4.
Habitat - - - *teſta* 2 *pollices longa.*

maculoſa. 57. V. teſta turrita alba: faſciis fuſcis reticulatis et maculatis.
Martin. Conch. 4. *t.* 149. *f.* 1377.
Habitat - - - *teſta pollicem circiter longa.*

noduloſa. 58. V. teſta turrita fuſca cancellata: ſectionum angulis noduloſis albo obumbratis, columella quadriplicata.
Gualt. teſt. t. 52. *f.* F. G.
Martin. Conch. 4. *t.* 149. *f.* 1385.
β) *Martin. Conch.* 4. *t.* 149. *f.* 1390.
Habitat - - -

ſpadicea. 59. V. teſta turrita ſpadicea luteo nebuloſa maculataque: ſpirae anfractibus octo longitudinaliter plicatis et transverſe ſtriatis, columella quinqueplicata.
Martin. Conch. 4. *t.* 150. *f.* 1392.
Habitat - - -

aurantia. 60. V. teſta turrita aurantia: ſpirae anfractibus quatuor primis faſcia alba, labro denticulato, columella quadriplicata.
Martin. Conch. 4. *t.* 150. *f.* 1393. 1394.
Habitat - - -

decuſſata. 61. V. teſta flava turrita decuſſatim ſtriata: ſtriis longitudinalibus undulatis, columella ſubquadriplicata.
Martin. Conch. 4. *t.* 150. *f.* 1395.
Habitat - - -

polygona. 62. V. teſta turrita punctata: anfractibus longitudinaliter coſtatis et transverſim ſubtiliter ſtriatis: primis tribus angulatis, labro ſulcato, columella ſubumbilicata ſubquinqueplicata.
Martin. Conch. 4. *t.* 150. *f.* 1401. 1402.
Habitat - - - *teſta valde elongata et anguſta alba fuſca nigroque obumbrata, ſpirae anfractibus* 10.

acuminata. 63. V. teſta turrita cancellata: cauda brevi cancellata, columella quadriplicata.
Martin. Conch. 4. *t.* 150. *f.* 1403. 1404.
Habitat Tranquebariae, *teſta valde elongata lutea vel violacea: faſcia nonnunquam alba: apice ſpirae valde acuto.*

biplicata. 64. V. teſta turrita laevi alba maculis flavis punctisque nigris varia, labro acuto, columella biplicata.
Martin. Conch. 4. *t.* 149. *f.* 1375.
Habitat - - -

Turricula. 65. V. teſta turrita: columella biplicata, anfractibus turgidiuſculis faſcia punctorum nigrorum pictis; anfractu primo duplici.
Martin. Conch. 4. *t.* 149. *f.* 1376.
Habitat - - -

lineata. 66. V. teſta turrita: lineis perpendicularibus nigris faſciam albam decuſſantibus, columella ſubtriplicata.
Martin. Conch. 4. *t.* 149. *f.* 1378. 1379.
Habitat - - - *minuta.*

diſcors. 67. V. teſta turrita infra fuſca albo-punctata ſupra alba maculis perpendicularibus virgatis undatis flavis varia.
Martin. Conch. 4. *t.* 150. *f.* 1400.
β) Martin. Conch. 4. *t.* 150. *f.* 1405.
Habitat - - - teſta minuta, ſubtus ventricoſa; β) magis acuminata, cana: ſtriis ferrugineis longitudinalibus.

ſtriata. 68. V. teſta turrita ſubtiliter transverſim ſtriata obſcura rubro punctata: faſciis duabus dilutioribus.
Martin. Conch. 4. *t.* 150. *f.* 1406.
Habitat - - - minuta.

ſulcata. 69. V. teſta turrita longitudinaliter ſulcata fuſca: faſcia transverſa alba noduloſa, columella quadridentata.
Martin. Conch. 4. *t.* 150. *f.* 1407.
Habitat - - -

laevigata. 70. V. teſta turrita laevi fuſca: aperturae limbo ſpiraeque faſcia dilutioribus.
Martin. Conch. 4. *t.* 150. *f.* 1408.
Habitat - - - teſta anguſta, parva.

ocellata. 71. V. teſta turrita ſpadicea: ocellis albis.
Martin. Conch. 4. *t.* 150. *f.* 1409.
Habitat - - - laevigata anguſtior, minuta.

naſuta. 72. V. teſta turrita rubra: punctis nigris ſeriatis, labro prominente, cauda reflexa.
Martin. Conch. 4. *t.* 150. *f.* 1410.
Habitat - - -

marmorea. 73. V. teſta turrita albo fuſcoque varia, labro inflexo.
Martin. Conch. 4. *t.* 150. *f.* 1411.
Habitat - - -

barbadenſis. 74. V. teſta turrita rufeſcente ſubtiliter transverſim ſtriata: apertura oblongo-ovali, ſpira obtuſata.
Liſt. Conch. t. 819. *f.* 33.
Habitat in Oceano americano, *teſta vix* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa.*

clathrata. 75. V. teſta turrita cancellata: ſpira obtuſata, labro marginato, cauda reflexa.
Liſt. Conch. t. 819. *f.* 34.
Habitat in Oceano americano.

tricolor. 76. V. teſta turrita gibba flava: anfractibus ſingulis faſcia alba nigro teſſellata, columella triplicata.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 37.
Habitat - - - teſta caudata: ſpirae apice obtuſo.

turrita. 77. V. teſta turrita brunnea lineis undulatis fuſcis varia: plicis horizontalibus obſoletis ſubnodoſis, apertura ſtriata, columella triplicata.
Martin. Conch. 4. *t.* 141. *f.* 1317. 1318.
Liſt. Conch. t. 836. *f.* 62?
Habitat - - - cauda prominula.

ſyracuſana. 78. V. teſta turrita laevi alba: maculis virgatis undatis perpendicularibus ex nigro flavis.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 40.
Habitat in Syracuſano *littore, teſta anguſtiore et magis elongata, quam turritae.*

nitens. 79. V. teſta turrita glaberrima ſpadicea intus alba, columella quadriplicata.
Bonann. recr. 3. *f.* 322.
muſ. Kirch. 3. *f.* 323.
Habitat - - - teſta pauliſper ventricoſa.

citrina. 80. V. teſta turrita citrina, faſciis rufis.
Valent. Abh. 2. *t.* 2. *f.* 12.
Habitat - - - teſta 2½ *pollices longa.*

mucronata. 81. V. teſta turrita dilute fuſca longitudinaliter ſtriata: ſpira perforata, columella perforata quadriplicata.
Gualt. teſt. t. 52. *f.* M.
Habitat - - -

rugoſa. 82. V. teſta turrita ſubventricoſa longitudinaliter rugoſa tranſverſim ſtriata exalbida piceo lineata.
Gualt. teſt. t. 54. *f.* A.
Habitat - - - ſpirae apice acuto coſtato; labro marginato.

ſtrigoſa. 83. V. teſta turrita cinerea rubro ſtriata: ſpira glaberrima; anfractibus tumidiuſculis.
Argenv. Conch. t. 9. *f.* V.
Habitat - - -

84. V.

foſſilis. 84. V. teſta turrita glaberrima, columella quinqueplicata.
Argenv. Conch. t. 29. *f.* 6. b.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis reperta.

leucoſticta. 85. V. teſta turrita tenui glabra fuſca: lineis punctorum alborum cincta.
Knorr Vergn. 2. *t.* 3. *f.* 7.
β) Knitted Mitre. *Mart. univ. Conch.* 1. *t.* 22.
Habitat β) ad inſulas amicas.

Clathrus. 86. V. teſta turrita exalbida cancellata: anfractibus faſcia macularum flavarum.
Knorr Vergn. 3. *t.* 27. *f.* 3.
Habitat - - -

virgata. 87. V. teſta turrita transverſim coſtata, faſcia transverſa maculisque longitudinalibus undatis fuſcis varia.
Knorr Vergn. 4. *t.* 11. *f.* 2.
Habitat - - - teſta craſſa 2 *pollices longa: apertura alba, coſtis ſquamatis.*

leucoſtoma. 88. V. teſta turrita cancellata ſpadiceo alboque varia: maculis undatis fuſcis, apertura ochroleuca.
Knorr Vergn. 4. *t.* 11. *f.* 3.
Habitat - - -

variegata. 89. V. teſta turrita transverſim ſtriata flava: faſcia maculisque fuſcis, pluribusque minoribus albis.
Knorr Vergn. 5. *t.* 18. *f.* 6.
Habitat - - -

filaris. 122. V. teſta emarginata ſubturrita tereti decuſſatim ſtriata ſuccincta filis rubris, columella triplicata. *Mant.* 2. *p.* 548.
Habitat - - - teſta pallida, fuſiformi longitudine extimi pollicis, fauce alba labiis ſimplicibus, anfractibus 3 *quaſi filis rubris moniliformibus, infimo* 12 *cinctis.*

Volva. 126. V. teſta cylindrica albida glabra: ſpira protenſa obtuſa baſi emarginata, apertura effuſa, columella quadriplicata.
Chemn. Conch. 10. *p.* 143. *t.* 148. *f.* 1389. 1390.
Habitat ad Guineae *littus, ultra* 2 *pollices longa teſta.*

Ziervoyelii. 127. V. teſta ovata badia longitudinaliter rugoſa, infra transverſim ſulcata: ſpira obtuſa ad ſuturam crenata, columella quadriplicata, labro denticulato. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 156. *t.* 149. *f.* 1406.
Habitat - - -

Rhinoceros. 128. V. teſta ovato-trigona rugoſa, nodoſa transverſim ſulcata umbilicata: anfractibus muricato-nodoſis, columella triplicata, labro dentato, fauce ſtriata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 157. *t.* 150. *f.* 1407. 1408.
Habitat ad novae Guineae *littora.*

coſtata. 90. V. teſta turrita alba: ſpira ſtriis ſubtiliſſimis transverſis coſtisque rotundatis; anfractu primo faſciis tribus fuſcis, columella quadriplicata.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 302. *t.* 1. *f.* 17.
Habitat - - - *cauda ſupreflexa: ſtriis ſex obliquis.*

ſpuria. 91. V. teſta ovata alba: ſpira fuſco maculata; anfractu primo faſciis ſex fuſcis, cauda emarginata, labro impreſſo, columella ſexplicata.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 302. *t.* 1. *f.* 16.
Habitat - - - *anfractibus punctis nigris ſeriatis pictis.*

pertuſa. 92. V. teſta emarginata ſtriata punctis pertuſis, labro denticulato, columella quinqueplicata. *Muſ. Lud. Ulr.* 596. *n.* 237.*
Liſt. Conch. t. 822. *f.* 40.
Seb. muſ. 3. *t.* 50. *f.* 28. 47-49.
Gualt. teſt. t. 54. *f.* H.
Knorr Vergn. 2. *t.* 3. *f.* 5.
Martin. Conch. 4. *t.* 147. *f.* 1361.
β) *Knorr Vergn.* 2. *t.* 4. *f.* 6.
γ) *Favann. Conch. t.* 31. *f.* D^3.
Chemn. Conch. 10. *t.* 151. *f.* 1432. 1433.
Habitat rarior in India, *teſta 3 pollices longa, anguſta fuſca ſtriis obſcurioribus longitudinalibus et elevatis transverſis, quibus granula planiuſcula inſident.*

Cardinalis. 93. V. teſta emarginata transverſim ſtriata alba; maculis ſpadiceis utplurimum teſſellatis ſeriatis, columella quinqueplicata.
Liſt. Conch. t. 838. *f.* 65.
Gualt. teſt. t. 53. *f.* G. 2.
Seb. muſ. 3. *t.* 50. *f.* 50. 51. *et t.* 51. *f.* 6. 7.
Knorr Vergn. 4. *t.* 28. *f.* 3.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 9. *f.* 11. 12.
Martin. Conch. 4. *t.* 147. *f.* 1358. 1359.
Habitat in Oceano indico, *pertuſae affinis, at teſta magis ventricoſa et obtuſa.*

epiſcopalis. 94. V. teſta emarginata laevi: anfractuum margine integro, labro denticulato, columella quadriplicata. *Muſ. Lud. Ulr.* 598. *n.* 237.*

Rumpf muſ. t. 29. *f.* K. Mitra epiſcopi.
Liſt. Conch. t. 839. *f.* 66.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 120.
Gualt. teſt. t. 53. *f.* G. 1.
Argenv. Conch. t. 9. *f.* C. Mitra.
Seb. muſ. 3. *t.* 51. *f.* 8-19.
Bytem. app. t. 11. *f.* 47.
Knorr delic. t. B. III. *f.* 3.
Knorr Vergn. 1. *t.* 6. *f.* 2.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 3. *f.* 33.
Martin. Conch. 4. *t.* 147. *f.* 1360. 1360ᵃ.

Habitat in India, *inſtrumento venenato, ut perhibent, tangentem et carnes edentem laedens, teſta ab incolis inſulae auſtralis* Tenna *manubrio firmata ſecuris loco adhibita, anguſta,* 5 *pollices longa, ſub epidermide ſordide flava alba maculisque rubris, rarius flavis, utplurimum quadratis, interdum confluentibus varia; ſpirae anfractibus* 2 *primis glabris, reliquis ſubtiliter transverſim ſtriatis.*

papalis. 95. V. teſta emarginata transverſim ſtriata: anfractuum margine labroque denticulatis, columella quadriplicata.

Liſt. Conch. t. 839. *f.* 67. Buccinum dentatum.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 119. Turbo Thiara.
Rumpf muſ. t. 29. *f.* I. Mitra papalis.
Argenv. Conch. t. 9. *f.* E. Thiara.
Gualt. teſt. t. 53. *f.* I. 1.
Seb. muſ. 3. *t.* 51. *f.* 1-5.
Knorr Vergn. 1. *t.* 6. *f.* 1.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 1.
Martin. Conch. 4. *t.* 147. *f.* 1353. 1354.

β) *Liſt. Conch. t.* 840. *f.* 68.
Valent. Abh. t. 5. *f.* 45.
Gualt. teſt. t. 53. *f.* I. 2.
Seb. muſ. 3. *t.* 51. *f.* 37.
Knorr Vergn. 4. *t.* 28. *f.* 2.
Martin. Conch. 4. *t.* 147. *f.* 1355. 1356.

γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 50. *f.* 29. 30?

δ) *Kaemm. Cab. Rudolſt. p.* 145. *n.* 5. *t.* 9. *f.* 8.

Habitat rarior in Oceano indico, *potiſſimum ad* Ceram ex moluccis inſulis, *epiſcopali aequalis et affinis, maculis*

 ſaepius

ſaepius confluentibus, ſpirae anfractibus exterioribus foraminalis pertuſis.

patriarchalis. 138. V. teſta obovata ſolida transverſim ſtriata albida croceo et rufeſcente ſtriata, noduloſo plicata; columella quadriplicata, anfractibus tuberculis coronatis. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 166. *t.* 150. *f.* 1425. 1426.

β) *Chemn. Conch.* 10. *p.* 167. *t.* 150. *f.* 1427.

Habitat in Oceano indico.

√ muſica. 96. V. teſta marginata: anfractibus ſpinis obtuſis, columella octoplicata, labro laevi craſſiſſimo. *Muſ. Lud. Ulr.* 597. *n.* 239.*

Argenv. Conch. t. 14. *f.* F. Papyrus muſica.
Liſt. Conch. t. 805. *f.* 14. *et t.* 806. *f.* 15.
Bonann. recr. 3. *f.* 296-298.
muſ. Kircher. 3. *f.* 297-299.
Gualt. teſt. t. 28. *f.* x. Z. z.
Olear. muſ. t. 30. *f.* 4. 7.
Lochner muſ. Besler t. 21. *f.* 7.
Bytem. app. t. 8. *f.* 48.
Muſ. Gottwald. t. 16. *f.* 115. a. b. c. 117. a. b. c. d. 118. a. b. 119. b-f.
Seb. muſ. 3. *t.* 57. *f.* 7-21-22?
Knorr Vergn. 1. *t.* 23. *f.* 1. 2. *t.* 15. *f.* 4. 5. 3. *t.* 12. *f.* 1. *et* 6. *t.* 23. *f.* 1.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 17.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 3. *f.* 2.
Spengl. ſelt. Conch. t. 2. *f.* G.
Martin. Conch. 3. *t.* 96. *f.* 926-933.

β) *Liſt. Conch. t.* 812. *f.* 21?
γ) *Liſt. Conch. t.* 812. *f.* 22.
δ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 149. *f.* 1403. 1404.
ε) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 149. *f.* 1401. 1402.
Knorr Vergn. 3. *t.* 12. *f.* 1.

Habitat in Oceano americano, *teſta pluribus faſciis transverſis ex lineis fuſcis parallelis, interſitis punctis guttisque conflatis, notas muſicas quodammodo referentibus notata, exalbida, rarius olivacea (faſciis tunc 8 albis punctisque ſpadiceis varia,) nunc magis elongata et fuſiformi, nunc breviore magisque ventricoſa, ſpinis nunc acutioribus et longioribus, nunc brevioribus et magis obtuſis, columellae plicis interdum* 9-12.

Veſpertilio. 97. V. teſta emarginata: anfractibus ſpinis acutis, columella quadriplicata, labio laevi. *Muſ. Lud. Ulr.* 598. *n.* 240.*
Rondel. teſt. 78. Murex caracoides arabica.
Rumpf. muſ. t. 32. *f.* H. Veſpertilio.
Liſt. Conch. t. 807. *f.* 16. *et t.* 808. *f.* 17.
Bonann. recr. 3. *f.* 294. 305.
muſ. Kircher. 3. *f.* 295. 306.
Valent. Abh. t. 1. *f.* 1. *et t.* 7. *f.* 62.
Gualt teſt t. 28. *f.* F. G. I. M. V.
Klein oſtr. t. 5. *f.* 89.
Muſ. Gottwald. t. 17. *f.* 121. a. b. c. *f.* 122. a. b. c. *et f.* 123. a. b.
Seb. muſ. 3. *t.* 57. *f.* 4. 5. *et t.* 67.
Knorr delic. t. B. VI. *f.* 5.
Vergn. 1. *t.* 22. *f.* 3. *et* 2. *t.* 6. *f.* 4.
Martin. Conch. 3. *t.* 97. *et* 98. *f.* 936-940.
β) *Gualt. teſt. t.* 28. *f.* T?
γ) *Valent. Abh. t.* 7. *f.* 63?
Naturf. 19. *t.* 1. *f.* 3. 3a.
δ) *Spengl. ſelt. Conch. t.* 2. *f.* AA.
Martin. Conch. 3. *t.* 97. *f.* 934. 935.
ε) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 104. *f.* 888. 889.
ζ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 149. *f.* 1397. 1398.
η) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 149. *f.* 1399. 1400.
Habitat in mari indico, *teſta 3-6 pollices longa alba, vel luteſcente, vel ſubfulva lineis angularibus maculisque ſpadiceis fuſcisve varia, nunc productiore, nunc magis ventricoſa, ſpinis nunc longioribus et acutioribus, nunc brevioribus et magis obtuſis.*

arabica. 144. V. teſta emarginata: anfractibus tuberculatis characteribus nigris pictis, columella quadriplicata. *Martyn univ. Conch.* 2. *t.* 52.
Habitat ad novam Seelandiam.

hebraea. 98. V. teſta emarginata: anfractibus ſpinis ſubacutis, columella plicis quinque validioribus tribusque obſoletis.
Argenv. Conch. t. 14. *f.* D. Lignum venoſum.
Liſt. Conch. t. 809. *f.* 18.
Bonann. recr. 3. *f.* 293.
muſ. Kircher. 3. *f.* 292.
Gualt. teſt. t. 28. *f.* Z. 1.
Olear. muſ. t. 30. *f.* 5. 6.
Muſ. Gottwald. t. 16. *f.* 115. c. 119. a.

Seb. muſ. 3. *t.* 57. *f.* 1. 2. 3. 6.
Knorr Vergn. 1. *t.* 24. *f.* 1. 2. *et* 6. *t.* 15. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 96. *f.* 924. 925.
Habitat ſat pretioſa in India *et ad* Jamaicam, *teſta ad 6 pollices longa, lineis ſpadiceis tranſverſis, non raro longitudinales, interdum undulatas, decuſſantibus, varia.*

Turbinellus. 99. V. teſta integriuſcula turbinata: ſpinis conicis erectiuſculis; ſuperioribus majoribus, columella quadriplicata.
Muſ. Lud. Ulr. 634. *n.* 307.* Murex Turbinellus.
Rumpf muſ. t. 24. *f.* B. Verrucola ſecunda.
Liſt. Conch. t. 811. *f.* 20.
Bonann. recr. 3. *f.* 373.
muſ. Kircher. 3. *f.* 367.
Gualt. teſt. t. 26. *f.* L.
Argenv. Conch. t. 14. *f.* P.
Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 76. 77. *et t.* 60. *f.* 8.
Muſ. Gottwald. t. 11. *f.* 79. a. b.
Knorr Vergn. 2. *t.* 2. *f.* 3. *et t.* 13. *f.* 2. 3.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 18.
Martin. Conch. 3. *t.* 99. *f.* 944.
Habitat paulo rarior in Oceano indico *ad* Amboinam *et* Nuſſaanam, *teſta brevi 3 circiter pollices longa, alba, extrinſecus fuſco faſciata.*

Capitellum. 100. V. teſta ovata rugoſa nodoſa, columella triplicata.
Muſ. Lud. Ulr. 633. *n.* 306.* Murex Capitellum.
Liſt. Conch. t. 810. *f.* 19.
Bonann. recr. 3. *f.* 270.
muſ. Kirch. 3. *f.* 272.
Gualt. teſt. t. 37. *f.* A.
Argenv. Conch. t. 15. *f.* K.
Knorr Vergn. 6. *t.* 20. *f.* 6. *et t.* 35. *f.* 2.
Martin. Conch. 3. *t.* 99. *f.* 947. 948.
β) *Martin. Conch.* 3. *t.* 99. *f.* 949. 950.
Knorr Vergn. 6. *t.* 35. *f.* 4.
Habitat in Oceano indico *et* americano, *murici trunculo affinis, teſta craſſa, 2¾ pollices longa alba, interdum fuſco faſciata, decuſſatim coſtata.*

ceramica. 101. V. teſta ovata acuta: ſpinis divergentibus, columella ſubquinqueplicata.
Muſ. Lud. Ulr. 634. *n.* 286.* Murex ceramicus.
Rumpf muſ. t. 24. *f.* A. *et t.* 49. *f.* L. Verrucola ceramica.
Liſt. Conch. t. 829. *f.* 51.

Bonann. recr. 3. *f.* 286.
muſ. Kirch. 3. *f.* 287.
Gualt. teſt. t. 55. *f.* D.
Argenv. Conch. t. 15. *f.* E.
Leſſer teſtaceoth. f. 76.
Knorr Vergn. 2. *t.* 2. *f.* 2.
Martin. Conch. 3. *t.* 99. *f.* 943.
β) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 23. *f.* 2. *et* 6. *t.* 20. *f.* 6.
Chemn. Conch. 10. *t.* 148. *f.* 1383. 1384.
Habitat rarior ad Coromandel *et inſulam* Ceram, *turbinello affinis, teſta alba lineis maculisque fuſcis varia, craſſa, ſpinis in anfractibus extimis in tubercula abeuntibus.*

Pyrum. 102. V. teſta obovata ſubcaudata: ſpirae anfractibus ſtriatis; apice producto glaberrimo, columella triplicata.
Liſt. Conch. t. 815. *f.* 25.
Bonann. recr. et muſ. Kircher 3. *f.* 194.
Gualt. teſt. t. 46. *f.* C.
Muſ. Gottwald. t. 33. *f.* 221. a. *f.* 222. b. *et t.* 34. *f.* 221. a.
Knorr Vergn. 6. *f.* 39. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 95. *f.* 916. 917.
β) *Liſt. Conch. t.* 816. *f.* 26.
Rumpf muſ. t. 36. *f.* 7?
Klein. oſtrac. t. 4. *f.* 79a?
Knorr Vergn. 6. *t.* 27. *f.* 2.
Martin. Conch. 3. *t.* 95. *f.* 918. 919.
γ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 104. *f.* 884. 885.
δ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 104. *f.* 886. 887.
Habitat ad Tranquebar *et inſulam* Zeylon, *teſta ultra* 7 *pollices longa, transverſim undulata, pallida, maculis minutis parallelogrammis ſeriatis varia, apice cylindrico, baſi angulato glaberrimo obtuſo, cauda exſerta patula integra.*

lapponica. 103. V. teſta obovata laevi: ſpira acuminata, ventre dilatato.
Rumpf muſ. t. 37. *f.* 3. Murex lapponicus.
Seb. muſ. 3. *t.* 57. *f.* 25. 26.
Knorr Vergn. 6. *t.* 11. *f.* 2.
Martin. Conch. 3. *t.* 89. *f.* 872. 873. *et t.* 95. *f.* 920. 921.
β) *Rumpf muſ. t.* 37. *f.* 4.
γ) *Bonann. muſ. Kirch.* 3. *f.* 395.
Habitat rarior in Oceano indico *et* americano, *teſta ochroleuca fuſco-punctata aut lineata, rarius undulata, columella quinqueplicata.*

Vexillum. 104. V. teſta ventricoſa flavicante aurantio ſtriata: anfractu primo reliquis triplo majore tuberculato.
Rumpf muſ. t. 37. *f.* 2.
Argenv. zoomorph. t. 11. *f.* G.
Knorr Vergn. 5. *t.* 1. *f.* 1.
Spengl: ſelt. Conch. t. 1. *f.* FF.
Martini. Conch. 3. *t.* 120. *f.* 1098.
Favan. Conch. t. 33. *f.* O.[1].
Kaemmer. Rudolſt. Cab. t. 8. *f.* 1. 6.
Chemn. Conch. 10. *vign.* 20. *f.* A. B.
Habitat rariſſima in Oceano indico.

flavicans. 105. V. teſta pyriformi laevi flavicante nebuloſa: ſpira maculis ſpadiceis varia, columella quadriplicata.
Seb. muſ. 3. *t.* 67. *f.* a. b.
Martin. Conch. 3. *t.* 95. *f.* 922. 923.
Habitat rariſſima.

rupeſtris. 106. V. teſta elongata coſtata: coſtis lineas transverſas ſubtiles decuſſantibus, labro marginato, columella multiplicata, ſpirae apice papillari.
Martin. Conch. 3. *t.* 98. *f.* 941. 942.
Habitat - - - teſta ad 4 *fere pollices longa, flaveſcente ſubfuſco undulata.*

Naſſa. 107. V. teſta ventricoſa: ſpira coſtata; coſtis ſtrias transverſas ſubtiles decuſſantibus, labro marginato, columella triplicata umbilicata.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* 42.
Knorr Vergn. 4. *t.* 26. *f.* 6.
Martin. Conch. 4. *t.* 124. 125. *f.* 1172. 1173.
Habitat ad inſulam S. Mauritii *et* Guineam, *teſta ultra pollicem longa ſubfuſca: lineis teneris albis.*

craticulata. 108. V. teſta turrita transverſim ſtriata alba: coſtis longitudinalibus ſpadiceis, labro denticulato ſtriato, columella triplicata.
Liſt. Conch. t. 919. *f.* 13. *et t.* 967. *f.* 22.
Seb. muſ. 3. *t.* 50. *f.* 55. 56. *et t.* 51. *f.* 31. 32.
Knorr Vergn. 2. *t.* 3. *f.* 6.
Martin. Conch. 4. *f.* 1382. 383.
Habitat - - - teſta vix 3 *pollices longa.*

ſpiralis. 109. V. teſta longitudinaliter coſtata transverſim ſubtiliter ſtriata: anfractibus duobus primis ſerie tuberculorum acutorum, columella triplicata.

Rumpf

Rumpf amb. t. 29. *f.* X. Buccinum ſpirale.
Habitat in mari indico, *teſta cinerea, fuſca aut alba, phalangis digiti longitudine, baſi anguſta, emarginata, ſubreflexa.*

magellanica. 110. V. teſta ſubventricoſa ochracea lineis albis, fuſcisque varia, labro ſubalato: ſpirae anfractibus convexis; primo reliquis triplo majore.
Knorr Vergn. 6. *t.* 29. *f.* 1. 2.
Favann. Conch. t. 28. *f.* E.
Chemn. Conch. 10. *t.* 148. *f.* 1383. 1384.
β) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 23. *f.* 2.
Habitat rarior in freto magellanico, *teſta* 4½ *pollices longa: ſpirae anfractibus* 6-7; *in* β) *teſta* 2 *pollices longa magis elongata, in mucronem acutum terminata, ſpirae anfractu primo obſcurius undulato.*

filoſa. 111. V. teſta tenuiſſime reticulato ſtriata: cingulis elevatis transverſis, columella quadriplicata, labro crenato. *v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t.* 9. *f.* 9. 10.
Habitat rarior - - - teſta alba: cingulis 16 *ſpadiceis, quorum* 4 *in ſpira, columella umbilicata.*

fuſcata. 112. V. teſta rudi fuſca laevi; baſi transverſim ſtriata, ſpira obtuſata; anfractu primo ventricoſo faſciis quatuor anguſtis, reliquis faſcia lata alba, columella umbilicata triplicata.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 302. *t.* 1. *f.* 15.
Habitat - - -

***** Ventricoſae, *ſpirae apice papillari.*

aethiopica. 113. V. teſta emarginata: ſpira coronata ſpinis fornicatis, columella quadriplicata. *Muſ. Lud. Ulr.* 598. *n.* 241.*
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *t.* 1. Latina.
Argenv. Conch. t. 17. *f.* F. Corona aethiopica.
Liſt. Conch. t. 797. *f.* 4. *et t.* 801. *f.* 7. b.
Rumpf muſ. t. 31. *f.* A. B.
Gualt. teſt. t. 29. *f.* H. I.
Leſſer teſtaceoth. f. 55.
Seb. muſ. 3. *t.* 64. *f.* 1. 2. 4. *t.* 65. *f.* 1. 2. 4. 10-12. *et t.* 66. *f.* 1-3. 6-10. 15.

Muſ.

---

* *An huic forſan tribui accenſendae cochleae ab* Argenville *zoomorph. t.* 3. *f.* G. *a* Seba *muſ.* 3. *t.* 53. *f.* e. a Byttneiſter *appar. t.* 11. *f.* 41. a. b. *et in* muſeo Gottwaldtiano t. 8. *f.* 52. et 62. d. t. 16. *f.* 120. a. c. et t. 36. *f.* 239. *delineatae?*

Muſ. Gottwald. t. 9. *f.* 64. a. *et f.* 61. b.
Knorr delic. t. B. VI. *f.* 2.
Vergn. 2. *t.* 4. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 73-76. *f.* 777-788.
β) *Liſt. Conch. t.* 798. *f.* 5?
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 148. *f.* 1387. 1388.
Habitat rarior in mari perſico, *ad inſulam* Aſiae Key, *ad* caput bonae ſpei, *teſta ad 7-8 pollices longa flavicante maculata, interdum faſciata, nunc breviore magisque ventricoſa, nunc magis elongata, ſpinis nunc longioribus, nunc brevioribus, nunc latioribus, nunc anguſtioribus, pupilla nonnunquam detrita.*

Cymbium. 114. V. teſta emarginata: ſpirae anfractibus canaliculato marginatis, columella quadriplicata. *Muſ. Lud. Ulr.* 599. *n.* 242.
Columu. purp. 29. *t.* 30. *f.* 3. Cochlea altera magna.
Adanſ. Seneg. t. 3. *f.* 1. Yet.
Liſt. Conch. t. 796. *f.* 3. *et t.* 800. *f.* 7.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 2.
Gualt. teſt. t. 29. *f.* B.
Argenv. Conch. t. 17. *f.* G.
Seb. muſ. 3. *t.* 65. *f.* 5. 6. 8. 9. *et t.* 66. *f.* 5.
Knorr delic. t. B. VI. *f.* 3.
Vergn. 2. *t.* 30. *f.* 1.
Spengl. ſelt. Conch. t. 1. *f.* N.
Martin. Conch. 3. *t.* 70. *f.* 762-765.
Habitat ad Africam, *in* mari hiſpanico *et* americano, *rarior, teſta nunc breviore et latiore, nunc longiore et anguſtiore, laevi, unicolore, nonnunquam maculis fuſcis, interdum undatis varia, labro calloſo.*

Olla. 115. V. teſta emarginata: ſpira laevigata, columella ſubtriplicata. *Muſ. Lud. Ulr.* 599. *n.* 243.*
Aldrov. exſang. 560. Concha perſica.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 3. *f.* 2. Philin.
Columu. aq. t. 69. *f.* 4. 6.
Liſt. Conch. t. 794. *f.* 1.
Bonanu. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 6.
Gualt. teſt. t. 29. *f.* A.
Argenv. zoomorph. t. 11. *f.* H.
Klein oſtr. t. 5. *f.* 97.
Leſſer teſtaceoth. f. 54.
Seb. muſ. 3. *t.* 66. *f.* 13. 14. 16. 18.

Muſ.

Muſ. Gottwald. t. 10. *f.* 68. *et* 68. a. b. c.
Knorr Vergn. 6. *t.* 22. *f.* 2.
Martin. Conch. 3. *t.* 71. *f.* 766
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 245. *t.* 1. *f.* 14.
Habitat ad inſulas Philippinas, *in* mari americano, aethiopico, hiſpanico, *teſta ad* 4 *usque pollices longa, flavicante aut rufeſcente, rarius fuſco varia, latiore, quam in cymbio.*

ampla. 116. V. teſta elongata: apertura ampla, labro acuto, ſpirae anfractibus occultis.
Martin. Conch. 2. *t.* 65. *f.* 722-724.
Habitat - - - *teſta alba aut fuſca* 1½ *pollicem circiter longa.*

Neptuni. 117. V. teſta emarginata ſub epidermide fuſca rufeſcente: labro prominulo, columella quadriplicata.
Liſt. Conch. t. 802. *f.* 8.
Gualt. teſt. t. 27. *f.* AA.
Seb. muſ. 3. *t.* 64. *f.* 3. *t.* 65. *f.* 3. 7. *et t.* 66. *f.* 4.
Martin. Conch. 3. *t.* 71. *f.* 767.
Habitat in ſinu perſico, *teſta ad* 8 *pollices longa et aeque fere lata: ſpirae anfractibus* 4.

Navicula. 118. V. teſta emarginata: labro prominulo, columella ſubquadriplicata.
Liſt. Conch. t. 795. *f.* 2.
Seb. muſ. 3. *t.* 64. *f.* 10. 11. *et t.* 66. *f.* 11. 12. 17.
Knorr Vergn. 5. *t.* 28. *f.* 2.
Martin. Conch. 3. *t.* 71. *f.* 768-771.
Habitat - - - *V.* Neptuni *ſatis affinis, at teſta minore vix ultra* 2 *pollices longa, nunc unicolore ochroleuca, rufeſcente aut ſpadicea, nunc maculata aut marmorata.*

papillaris. 119. V. teſta elongata: apicis papilla elongata.
Seb. muſ. 3. *t.* 64. *f.* 9.
Muſ. Gottwald. t. 10. *f.* 69.
Knorr Vergn. 5. *t.* 28. *f.* 7.
Habitat - - - *papilla interdum obliqua.*

indica. 120. V. teſta elongata flava: faſciis tribus macularum fuſcarum, columella quadriplicata.
Muſ. Gottwald. t. 10. *f.* 64.
Knorr Vergn. 5. *t.* 8. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 72. *f.* 772. 773.
Habitat in mari indico, *teſta anguſta: ſpirae anfractibus* 5.

Scapha. 121. V. teſta rudi nebuloſa: lineis angularibus fuſcis, columella caeruleſcente quadriplicata, labro ſubalato.
Liſt. Conch. t. 799. *f.* 6.
Bonann. recr. et muſ. Kircher 3. *f.* 10.
Gualt. teſt. t. 28. *f.* S.
Seb. muſ. 3. *t.* 64. *f.* 5. 6.
Klein oſtr. t. 5. *f.* 94.
Leſſer teſtaceoth. f. 56.
Martin. Conch. 3. *t.* 72. *f.* 774-776.
Habitat pretioſa ad caput bonae ſpei, *teſta brevi, lata, alba, vel flavicante: apertura ampla, ſpirae anfractibus* 6.

Cymbiola. 123. V. teſta ovata glabra ſubalbida: lineis longitudinalibus ſanguineis: anfractibus noduſis, columella triplicata. *Chemn. Conch.* 10. *t.* 148. *f.* 1385. 1386.
Habitat in Oceano indico, *teſta* 2 *pollices longa.*

Praeputium. 124. V. teſta ſubovata teſtacea: maculis ex rufeſcente badiis, columella quadriplicata baſi emarginata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 143. *t.* 148. *f.* 1391. 1392.
Liſt. Conch. t. 798. *f.* 1.
Seb. muſ. 3. *t.* 66. *f.* 11?
Habitat ad littus Coromandel.

Glans. 125. V. teſta cylindrica luteſcente, columella triplicata emarginata, apertura effuſa patente. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 144. *t.* 148. *f.* 1393. 1394.
Seb. muſ. 3. *t.* 64. *f.* 9-11. *et t.* 66. *f.* 13. 14.
Habitat ad occidentale Africae *littus.*

reticulata. 141. V. teſta alba laevi aureo reticulata emarginata, columella quadriplicata: ſpira conica; anfractu primo cylindrico ventricoſo. *Kaemm. Cab. Rudolſt. p.* 68. *n.* 1. *t.* 5. *f.* 1. 2.
Habitat ad Javam, *teſta ultra* 2 *pollices longa.*

ſpectabilis. 142. V. teſta flavido-fuſceſcente fuſco ſtriata: columella triplicata. *Kaemm. Cab. Rudolſt. p.* 69. *t.* 7. *f.* 1.
Davil. catal. 1. *t.* 8. *f.* S.
Habitat in freto magellanico, *teſta* 5½ *pollices longa.*

323. BUCCINUM. *Animal* Limax.

Teſta univalvis, ſpiralis, gibboſa.

Apertura ovata, deſinens in canaliculum (ſ. retuſam lacunam) dextrum, cauda retuſum.

Labium interius explanatum.

a Ampullacea, *inflata, rotunda, tenuis, ſubdiaphana fragilia.*

Olearium. 1. B. teſta ſubrotunda cincta ſulcis obtuſis lineola elevata interſtinctis: apertura edentula.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 7. *f.* 6. Minjac.
Liſt. Conch. t. 985. *f.* 44.
Pet. gaz. t. 99. *f.* 11.
Rumpf muſ. t. 27. *f.* D.
Gualt. teſt. t. 44. *f.* T.
Klein oſtr. t. 4. *f.* 74.
Muſ. Gottwald. t. 27. *f.* 188. a. c. *et* 189. a. d.
Knorr Vergn. 5. *t.* 12. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 117. *f.* 1076. 1077.
Habitat in mari indico, *teſta vix ultra* 4 *pollices longa, fuſca aut ſubfuſca crebro maculis nebuliſque obſcurioribus varia, ſpirae anfractibus* 5 *inflatis ſulco diſcretis.*

Galea. 2. B. teſta obovata cincta ſulcis anterius geminatis, apertura edentula.
Liſt. Conch. t. 898. *f.* 18.
Bonann. recr. 3. *f.* 183.
muſ. Kircher. 3. *f.* 179.
Gualt. teſt. t. 42. *f.* AA.
Martin. Conch. 3. *t.* 116. *f.* 1070.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 308. *t.* 2. *f.* 1.
β) *Bonann. recr.* 3. *f.* 26.
muſ. Kirch. 3. *f.* 25.
Habitat in mari mediterraneo *et* adriatico, *teſta ochroleuca caput humanum magnitudine interdum aequante, fere globoſa columella umbilicata.*

Perdix. 3. B. teſta ovata inflata ſubſulcata alboque undulata, apertura edentula. *Muſ. Lud. Ulr.* 600. *n.* 244.*
Columu. aq. t. 69. *f.* 5. Caſſida neritoides minor variegata.
Rumpf muſ. t. 27. *f.* C. Cochlea pennata.
Argenv. Conch. t. 17. *f.* A. Perdix.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 7. *f.* 5. Teſan.
Liſt. Conch. t. 984. *f.* 43.
Bonann. recr. 3. *f.* 191.
muſ. Kircher 3. *f.* 189.
Gualt. teſt. t. 51. *f.* F.
Seb. muſ. 3. *t.* 68. *f.* 12. 13. 16.
Muſ. Gottwald. t. 27. *f.* 1. 2.
Knorr Vergn. 3. *t.* 8. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 117. *f.* 1078-1080.
Habitat in mari indico, aethiopico, americano, *teſta ad* 6 *pollices longa lutea albo-pennata, undulata vel undata, coſtis complanatis, columella umbilicata, ſpirae anfractibus* 5-6 *prominentibus convexis, ſulco levi parum interſtinctis.*

Pomum. 4. B. teſta ovata cincta ſulcis obtuſis, apertura dentata. *Muſ. Lud. Ulr.* 600. *n.* 245.*
Rumpf muſ. t. 23. *f.* 4. *et t.* 27. *f.* B. Cochlea ſtriata altera.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 22.
Gualt. teſt. t. 51. *f.* C.
Argenv. Conch. t. 27. *f.* L.
Seb. muſ. 3. *t.* 70. *f.* 3. 4.
Muſ. Gottwald. t. 27. *f.* 184. C.
Knorr Vergn. 6. *t.* 23. *f.* 2.
Martin. Conch. 2. *t.* 36. *f.* 370. 371.
β) *Liſt. Conch. t.* 792. *f.* 45?
Habitat ad Javam Amboinam, Mexico, *teſta* $2\frac{1}{2}$ *pollicem circiter longa, craſſa, alba, flavo vel rufeſcenti maculata, ſpirae anfractu primo coſtis* 12-14 *luteſcentibus inaequali, apice ſummo nitido.*

Dolium. 5. B. teſta ovata cincta ſulcis obtuſis remotis: cauda prominula. *Muſ. Lud. Ulr.* 601. *n.* 246.*
Rond. teſt. 106. Cochlea rugoſa.
Rumpf muſ t. 27. *f.* A. Cochlea ſtriata S. Olearia.
Calceol. muſ. 30. *t.* 41.
Liſt. Conch. t. 899. *f.* 19.
Bonann. recr. 3. *f.* 16. 17. 25.
muſ. Kircher. 3. *f.* 16. 17. 28.
Gualt. teſt. t. 39. *f.* E.

Argenv.

Argenv. Conch. t. 17. *f.* C.
Seb. muſ. 3. *t.* 68. *f.* 9-11. *et t.* 70. *f.* 1. 2. 5.
Muſ. Gottwald. t. 27. *f.* 185. b. *et f.* 188. b.
Knorr Vergn. 3. *t.* 8. *f.* 4.
Martin. Conch. t. 3. *f.* 116-118. *f.* 1072-1075. 1082.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 70. *f.* 6?
Habitat in mari ſiculo, africano, indico, *galeae ſatis aequalis, et perquam affinis, at teſta multo tenuiore, alba, interdum fuſco maculata, columella torta.*

caudatum. 6. B. teſta ovata cincta coſtis rotundatis: cauda prominula.
Knorr Vergn. 5. *t.* 3. *f.* 4.
Martin. Conch. 3. *t.* 118. *f.* 1083.
β?) *Liſt. Conch. t.* 940. *f.* 36.
Klein oſtr. t. 3. *f.* 61.
Knorr Vergn. 6. *t.* 29. *f.* 5.
Habitat - - - *teſta fuſca umbilicata: apertura ampla, labro plicato intus dentato, ſpirae anfractibus 6 brevibus inflatis, in* β) *teſta* $1\frac{3}{4}$ *pollicis longa, tenui, ſtraminea, in coſtis fuſceſcente, ſpirae anfractibus tenuiſſime horizontaliter lineatis.*

niveum. 7. B. teſta nivea coſtata: ſpirae anfractibus extremis vix prominulis.
Knorr Vergn. 6. *t.* 36. *f.* 5.
Habitat - - - *teſta vix dimidium pollicem alta lataque; an diſtincta hujus tribus ſpecies?*

clathratum. 8. B. teſta ovata longitudinaliter rugoſa transverſe plicata: cauda brevi recurva. *v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 9. *f.* 17. 18.
Habitat - - - *teſta dilute cinerea, ſectionum angulis noduloſis, ſpira acuta prominula, labio crenato intus ſulcato; an hujus tribus?*

b Caſſidea caudata, *cauda exſerta brevi reflexa, labro extrorſum inermi.*

echinophorum. 9. B. teſta cingulis quatuor tuberculoſis, cauda prominente.
Muſ. Lud. Ulr. 601. *n.* 247.
Liſt. Conch. t. 1003. *f.* 68.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 18. 19.
Rumpf muſ. t. 27. *f.* 1.
Gualt. teſt. t. 43. *f.* 3.
Argenv. Conch. t. 17. *f.* P.

Argenv. zoomorph. t. 3. *f.* H.
Ginann. adr. 2. *t.* 5. *f.* 43.
Seb. muſ. 3. *t.* 68. *f.* 18.
Muſ. Gottwald. t. 25. *f.* 164. *et t.* 27. *f.* 186.
Knorr Vergn. 1. *t.* 17. *f.* 1.
Martin. Conch. 2. *t.* 41. *f.* 407. 408.
β) *Liſt. Conch. t.* 1011. *f.* 71. e?
γ) *Bonann. recr.* 3. *f.* 160
muſ. Kircher. 3. *f.* 162.
δ) *Liſt. Conch. t.* 1011. *f.* 71. f?
Habitat frequens in mari adriatico *et* mediterraneo, *teſta fuſceſcente intus tuberculisque albis transverſim ſtriata, umbilicata, ſpira pyramidata, cauda elongata in altum flexa, labro nitido laevigato, cingulis nonnunquam* 5.

plicatum. 10. B. teſta anterius ſubplicata decuſſatim ſubſtriata: apertura dentata, cauda recurva.
Argenv. Conch. t. 15. *f.* D? Caſſis.
Liſt. Conch. t. 1002. *f.* 67.
Bonann. recr. 3. *f.* 156.
muſ. Kircher. 3. *f.* 161.
Gualt. teſt. t. 40. *f.* C.
Martin. Conch. 2. *t.* 37. *f.* 379. 380.
β) *Knorr Vergn.* 3. *t.* 28. *f.* 1.
Favann. Conch. t. 25. *f.* D4.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *n.* 1. 2.
Chemn. Conch. 10. *p.* 191. *t.* 153. *f.* 1459. 1460.
γ) *Scop. del. inſ.* 2. *t.* 24. *f.* 1.
Habitat paulo rarior ad Jamaicam, *teſta cinerea aut ruſeſcente ad ſpirae baſin aliquando ſeriatim tuberculata, rarius ſtriis evidentibus longitudinalibus, aut cancellata.*

cornutum. 11. B. teſta turbinata ſcrobiculis punctata coronata: apertura dentata, cauda recurva. *Muſ. Lud. Ulr.* 602. *n.* 249.*
Rond. teſt. 2. 77. Murex triangularis.
Liſt. Conch t. 1006. *f.* 70
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 155.
Rumpf muſ. t. 23. *f.* 1.
Gualt. teſt. t. 40. *f.* D.
Leſſer teſtaceoth. f. 46.
Seb. muſ. 3. *t.* 73. *f.* 7. 8. 17. 18.
Muſ. Gottwald. t. 24. *f.* 159. aa. bb.
Knorr Vergn. 3. *t.* 2. *f.* 1.
Martin. Conch. 2. *t.* 33. *f.* 348. 349.

β) *Liſt.*

β) *Liſt. Conch. t.* 1008. *f.* 71. b.
Rumpf muſ. t. 23. *f.* A.
Martin. Conch. 2. *t.* 35. *f.* 362.
γ) *Liſt. Conch. t.* 1009. *f.* 71. c.
Habitat in India, *teſta ad* 9, β) 12 *pollices longa, alba: maculis rufeſcentibus aut ſpadiceis, interdum undatis.*

rufum. 12. B. teſta decuſſatim ſtriata: cingulis nodoſis interſtinctis linea gemina, apertura dentata, cauda recurva. *Muſ. Lud. Ulr.* 603. *n.* 250.*
Rumpf muſ. t. 23. *f.* B. Caſſida rubra.
Barrel. rar. t. 1325. *f.* 29.
Bonann. recr. 3. *f.* 328. 329.
muſ. Kircher. 3. *f.* 326. 327.
Gualt. teſt. t. 40. *f.* F.
Seb. muſ. 3. *t.* 73. *f.* 3. 4. 9.
Knorr Vergn. 2. *t.* 9. *f.* 2? *et* 4. *t.* 1.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 69.
Martin. Conch. 2. *t.* 32. *f.* 341. *et t.* 33. *f.* 346. 347.
Habitat rarior in mari americano *et* indico, *teſta fuſca rufeſcente alboque varia, apertura coccinea: dentibus longis albis: ſulcis intermediis nigris.*

tuberoſum. 13. B. teſta cingulis duobus tuberculoſis, cauda recurva. *Muſ. Lud. Ulr.* 602. *n.* 249.*
Labat it. 5. *p.* 262.
Liſt. Conch. t. 1004. *f.* 69?
Bonann. recr. 3. *f.* 323.
muſ. Kirch. 3. *f.* 322.
Gualt. teſt. t. 41. *f.* A. A. A.
Seb. muſ. 3. *t.* 73. *f.* 5. 6. 10. 11. 14. 15.
Muſ. Gottwald. t. 23. *f.* 159. a. b.
Knorr Vergn. 3. *t.* 10. *f.* 1. 2.
Martin. Conch. 2. *t.* 34. *f.* 359. *et t.* 38. *f.* 381. 382.
Schroet. inner. Bau Conch. t. 4. *f.* 4.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 73. *f.* 2?
γ) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 18. *f.* 1.
Habitat in Oceano americano, *teſta ad* 10 *pollices longa, rubro aut fuſco maculata et undata, adulta ſubtriangulari, decuſſatim ſtriata: cingulis interdum* 3-4, *aperturae dentibus albis: intermedio nigro.*

flammeum. 14. B. teſta ſubplicata ſubcoronata: apertura dentata, cauda recurva. *Muſ. Lud. Ulr* 603. *n.* 251.*

 Liſt.

Liſt. Conch. t. 1005. *f.* 72.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 156.
Rumpf muſ. t. 23. *f.* 2.
Valent. Abh. t. 11. *f.* 99. 100.
Seb. muſ. 3. *t.* 73. *f.* 19. 20.
Muſ. Gottwald. t. 23. *f.* 160.
Knorr Vergn. 4. *t.* 4. *f.* 1.
Martin. Conch. 2. *t.* 34. *f.* 353. 354.
Spengl. ſelt. Conch. t. 3. *f.* D.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 73. *f.* 16.
γ) *Gronov. zoöph. t.* 19. *f.* 9. Buccinum ſpinoſum.
Habitat in Oceano americano, *teſta* 5 *fere pollices longa, alba, maculis fuſcis undatis varia: apertura maculis* 7 *nigris notata; dentibus validis obtuſis, columella transverſim albo coſtata.*

Teſticulus. 15. B. teſta obovata decuſſatim ſtriata laevigata: ſtriis elevatis longitudinalibus, apertura dentata, cauda recurva. *Muſ. Lud. Ulr.* 604. *n.* 252.*
Liſt. Conch. t. 1001. *f.* 66.
Bonann. recr. 3. *f.* 162.
muſ. Kirch. 3. *f.* 163.
Rumpf muſ. t. 23. *f.* 3.
Valent. Abh. t. 7. *f.* 59.
Gualt. teſt. t. 39. *f.* C.
Seb. muſ. 3. *t.* 72. *f.* 17-21
Muſ. Gottwald. t. 22. *f.* 145-149.
Knorr Vergn. 3. *t.* 8. *f.* 2. *et* 4. *t.* 6. *f.* 1.
Bytem. app. t. 11. *f.* 46.
Martin. Conch. 2. *t.* 37. *f.* 375-376.
β) *Martin. Conch.* 2. *t.* 37. *f.* 377. 378.
Habitat in mari indico et americano, *teſta ad* 4 *pollices longa alba, aut rufeſcente, utplurimum flavo-maculata, labio interiore obliterato, exteriori ochroleuco fuſco-maculato, columellae plicis dentibusve albis.*

decuſſatum. 16. B. teſta decuſſatim ſtriata laevigata: ſquamulis quadratis, apertura dentata, cauda recurva. *Muſ. Lud. Ulr.* 604. *n.* 253.*
Rondel. teſt. 83. *f.* 1. Buccinum parvum.
Liſt. Conch. t. 1000. *f.* 65.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 157.
Gualt. teſt. t 40. *f.* B.
Muſ. Gottwald. t. 23. *f.* 154. b. c. *f.* 156. a. 157. a. b.

Knorr

Knorr Vergn. 2. *t.* 10. *f.* 3. 4.
Martin. Conch. 2. *t.* 35. *f.* 360-361. 367. 368.
Habitat in mari mediterraneo *et* africano, *teſta alba, frequenter fuſco aut teſſellata aut undulata; labio exteriori rugoſo, valido, lato, interius crenato, interiore punctis eminentibus aſpero.*

Areola. 17. B. teſta ſubſtriata maculis quadratis quadrifariam cincta; apertura dentata, cauda recurva. *Muſ. Lud. Ulr.* 605. *n.* 254.*
Rumpf muſ. t. 25. *f.* B. C. 1. 2. 5. Areola.
Adanſ. ſeneg. 1. *t.* 7. *f.* 8. Saburon.
Liſt. Conch. t. 1012. *f.* 76.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 20. 21. 154?
Valent. Abh. t. 9. *f.* 77.
Klein. oſtr. t. 6. *f.* 102? 103.
Gualt. teſt. t. 39. *f.* G. H. *et t.* 40. *f.* E.
Argenv. Conch. t. 15. *f.* I.
Seb. muſ. 3. *t.* 70. *f.* 7-9.
Muſ. Gottwald. t. 22. *f.* 150-152. b. *et t.* 23. *f.* 156. b. 157. c.*
Knorr Vergn. 3. *t.* 8. *f.* 5.
Martin. Conch. 2. *t.* 32. *f.* 344. 345. *et t.* 34. *f.* 350. 351. 352. 355.
Schroet. Einl. in Verſt. 4. *t.* 9. *f.* 7.
β) *Liſt. Conch. t.* 1056. *f.* 9.
Habitat in mari mediterraneo *et* indico, *teſta vix ultra* 3 *pollices longa, nunc laevi, nunc magis minusve evidenter ſtriata: labio exteriori interiore margine dentato.*

tigrinum. 188 B. teſta ovata laevi caeruleſcente: faſciis transverſis luteis fuſco maculatis characteribusque fuſcis indermediis. *Martyn. univ. Conchol.* 1. *t.* 8.
Habitat ad novam Seelandiam.

undulatum. 18. B. teſta rarius transverſim ſtriata undatim maculata: ſpira obtuſa labroque interiori glaberrimis.
Liſt. Conch. t. 996. *f.* 61.
β) *Bonann. recr. et muſ. Kirch.* 3. *f.* 159.
Gualt. teſt. t. 39. B.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 68. *f.* 14. 15. 17.
Habitat - - - Areolae affine, at teſta magis producta.

cicatricoſum. 19. B. teſta ovata ſcrobiculis punctata laevi: ſpira elongata, labiis dentatis, cauda recurva. *Gronov. zooph. t.* 19. *f.* 1. 2.

 Habitat

Habitat in India, *areolae affine, at teſta magis ovali, ſpira cancellata, labio exteriori dentato, interiori rugoſo.*

teſſellatum. 20. B. teſta tenui cinerea: faſciis albis fuſco teſſellatis, anfractibus quinquefariam tuberculatis.
Seb. muſ. 3. *t.* 73. *f.* 1. 12. 13.
Martin. Conch. 2. *t.* 36. *f.* 369. *et t.* 37. *f.* 374.
Habitat rariſſimum in Oceano auſtrali, *teſta ultra 6 pollices longa.*

pennatum. 21. B. teſta alba: faſciis flaveſcente ſpadiceo alboque variis, cauda recurva.
Rumpf muſ. t. 23. *f. C.*
Martin. Conch. 2. *t.* 36. *f.* 372. 373.
Habitat rarum in India.

maculoſum. 22. B. teſta faſciis quatuor maculoſis, anfractibus prominulis longitudinaliter coſtatis: primo corona tuberculorum.
Liſt. Conch. t. 997. *f.* 62.
Habitat - - - pennato affine, teſta $3\frac{1}{2}$ *pollices longa.*

bilineatum. 23. B. teſta transverſim ſtriata: ſpirae obtuſae anfractibus faſcia maculoſa lineisque duabus.
Liſt Conch. t. 998. *f.* 63.
Habitat - - -

gibbum. 24. B. teſta rudi transverſim ſtriata undatim maculoſa: ſpira acuta pyramidali.
Liſt. Conch. t. 999. *f.* 64.
Habitat - - - teſta 2 *pollices longa.*

ventricoſum. 25. B. teſta ventricoſa ſtriata: labio tenui, cauda brevi.
Liſt. Conch. t. 1007. *f.* 71.
Habitat - - - an diſtincta ſpecies?

ſtrigoſum. 26. B. teſta transverſim ſtriata: ſpira acuta; anfractu primo ſecundoque ſpinis coronato, labio exteriore intus maculato extrinſecus emarginato.
Liſt. Conch. t. 1011. *f.* 71. F.
Habitat - - -

rugoſum. 27. B. teſta laevi undulatim maculata: ſpira rugoſa ſtriataque, cauda quinqueplicata, labio exteriore valido recto.
Liſt. Conch. t. 1014. *f.* 78.
Habitat rarum - - - teſta 3 *fere pollices longa.*

28. B.

pondero- ſum. 28. B. teſta rudi: ſpira prominula acuta; anfractu primo tuberculis coronato, labio exteriori intus coſtato.
Liſt. Conch. t. 1016. *f.* 74.
Habitat - - - teſta 1½ *pollicem longa.*

recurviroſtrum. 29. B. teſta laevi faſciis macularum rufarum notata: ſpira prominula; anfractu primo inflato.
Liſt. Conch. t. 1016. *f.* 75.
Habitat ad Barbados, *teſta* 2½ *pollices longa.*

trifaſciatum. 30. B. teſta transverſim ſtriata hinc inde maculoſa, faſciis tribus aequalibus notata: apertura intus caeruleſcente, labio exteriore dentato, interiore ſeriatim tuberculato.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 158.
Habitat - - - teſta 3 *pollices longa.*

ſenegalicum. 31. B. teſta ſubtiliter transverſim ſtriata: faſciis macularum tribus, ſpirae anfractu ſecundo annulo turgido cincto, labio exteriore crenato.
Adanſ. Seneg. 1. *p.* 111. *t.* 7. *f.* 7. Faſin.
Habitat ad Senegal.

ochroleucum. 32. B. teſta ochroleuca transverſim ſtriata: ſpirae anfractu primo ſpinis coronato, labio exteriori dentato, interiori repando.
Gualt. teſt. t. 43. *f.* 2.
Habitat - - - teſta ultra 2½ *pollices longa.*

ſtriatum. 33. B. teſta transverſe ſtriata: ſpira depreſſa; anfractu extimo margine ſubnodoſo, apertura dentata, cauda recurva.
Gronov. zooph. t. 19. *f.* 18.
Habitat in America.

Caſſis. 178. B. teſta obovata umbilicata fulva transverſim denſe ſtriata: cauda recurva, labio membranaceo adnato, labro acuto.
Chemn. Conch. 10. *p.* 188. *t.* 152. *f.* 1456.
Habitat in mari mediterraneo Neapoli *vicino.*

ſtrigatum. 179. B. teſta ovata transverſim ſulcata albida rufeſcenti-faſciata varicoſa: ſpira conica decuſſatim ſtriata, apertura oblonga dentata, labio interiore plicato granulato, labro fimbriato maculato. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 189. *t.* 153. *f.* 1457. 1458.
Favann. Conch. t. 24. *f.* D.
Mart. Conch. 2. *t.* 34. *f.* 356.
Habitat in Oceano indico.

180. B.

tyrrhenum. 180. B. teſta globoſa flaveſcente ſulcata ſtriata: ſpira conica, apertura alba, labro marginato intus ſubdentato. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 192. *t.* 153. *f.* 1461. 1462.
Bonann. recr. 3. *f.* 160.
muſ. Kirch. 3. *f.* 162.
Ginann. op. poſth. 2. *t.* 5. *f.* 44. *et t.* 6. *f.* 45.
Habitat in mari tyrrheno.

abbreviatum. 181. B. teſta ovata albida transverſim ſtriata ſulcataque: ſpira conica ſcalari, labro duplicato intus dentato, labio replicato rugoſo, cauda breviſſima. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 194. *t.* 153. *f.* 1463. 1464.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 153. *f.* 1465. 1466.
Habitat in Oceano indico, *β*) americano.

c Caſſidea unguiculata, *labro poſterius extrorſum aculeato, ceterum ſimilia caudatis.*

Erinaceus. 34. B. teſta ſubplicata papillis coronata. *Muſ. Lud. Ulr.* 605. *n.* 255.*
Liſt. Conch. t. 1015. *f.* 73.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 153.
Rumpf muſ. t. 25. *f.* D. *et* 6. 7.
Gualt. teſt. t. 39. *f.* D. I.
Argenv. Conch. t. 14. *f.* G.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* 8. 11-16. 29. 30.
Muſ. Gottwald. t. 23. *f.* 155. b. 156. a. 158. 161. b. c. 162. a. b. d. 163. a. b. c.
Martin. Conch. 2. *t.* 35. *f.* 363. *et t.* 38. *f.* 383-386.
β) *Liſt. Conch. t.* 1013. *f.* 77?
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 53. *f.* 21?
Habitat in mari americano *et* indico, *ad* Alexandriam *teſta ochroleuca, caeruleſcente aut alba, rarius undatim maculoſa, frequentius faſcia* 1-2 *transverſis, nunc obſoletis, nunc manifeſtis teſſellatis.*

glaucum. 35. B. teſta laevi papilliſque coronata. *Muſ. Lud. Ulr.* 606. *n.* 256.*
Rumpf muſ. t. 25. *f.* A. *et f.* 4. Caſſis cinerea laevis.
Liſt. Conch. t. 996. *f.* 60.
Gualt. teſt. t. 40. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 71. *f.* 11-16.
Muſ. Gottwald. t. 22. *f.* 153. *et t.* 23. *f.* 154. a.
Knorr Vergn. 3. *t.* 8. *f.* 3.
Martin. Conch. 2. *t.* 32. *f.* 342. 343.

Schroet.

Schroet. inner. Bau d. Conch. t. 3. f. 4.
Habitat in mari indico, *teſta ad* 5 *pollices longa, cinerea: faſciis* 4-6 *obſcurioribus notata intus fuſca, rarius extrinſecus obſolete transverſim ſtriata: ſpira acuta pyramidali, anfractibus extimis cancellatis, labro exteriore dentato ſpinis ſubtus* 3-4 *armato, interiore infra rugoſo ſubpunctato, ſupra glaberrimo albo.*

Vibex. 36. B. teſta tota laevi. *Muſ. Lud. Ulr.* 606. *n.* 257.*
Rumpf muſ. t. 25. *f.* E. *et* 8. 9. Fimbriata laevis.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 152.
Gualt. teſt. t. 39. *f.* F. L.
Argenv. Conch. t. 14. *f.* H.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* 3-7. 10. 17-20. 23. 31.
Muſ. Gottwald. t. 25. *f.* 166. a. b. 167. a. b. 168. a. b.
Knorr Vergn. 6. *t.* 11. *f.* 3.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 10. *f.* 40.
Martin. Conch. 2. *t.* 35. *f.* 364. 366.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 53. *f.* 9.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 53. *f.* 26. 27.
δ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 53. *f.* 22.
Habitat ad Alexandriam, *in* mari americano *et* indico, *teſta maculis undatis ex fuſco luteis varia, columellae plicis* 2, *nonne mera erinacei varietas?*

teſſulatum. 37. B. teſta ſubventricoſa: ſpirae anfractibus baſi faſcia nigro teſſellata.
Liſt. Conch. t. 975. *f.* 30. b.
Martin. Conch. 2. *t.* 38. *f.* 387. 388.
Habitat - - - teſta utplurimum maculis undatis aliisque ſpadiceis varia.

noduloſum. 38. B. teſta ſubplicata papillis coronata: labro laevi ſuperius maculato, poſterius bifariam acute ſpinoſo.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 383. *t.* 2. *f.* 9.
Habitat - - - erinaceo affine, teſta pollicem circiter longa.

Fimbria. 39. B. teſta ſulcata: ſpira acuta, anfractibus ſeriatim tuberculatis.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* 1. 2.
Habitat - - - teſta grandi ex cinereo flava: ſulcis albis.

papilloſum. 40. B. teſta undique tuberculata. *Muſ. Lud. Ulr.* 607. *n.* 258.*
Rumpf muſ. t. 29. *f.* M. Buccinum granulatum rotundum.
Liſt. Conch. t. 969. *f.* 23.
Gualt. teſt. t. 44. *f.* G.

Argenv.

Argenv. Conch. t. 9. *f.* I.
Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 57-59.
Knorr Vergn. 2. *t.* 27. *f.* 2.
Martin. Conch. 4. *t.* 125. *f.* 1204. 1205.
Habitat rarius in mari indico, *teſta* 2½ *pollices fere longa flavicante: maculis ſpadiceis, tuberculis in ſeries digeſtis, labro ſpinis* 6 *armato.*

Glans. 41. B. teſta laevi: labio interiore bidentato. *Muſ. Lud. Ulr.* 607. *n.* 259.*
Liſt. Conch. t. 981. *f.* 40.
Rumpf muſ. t. 29. *f.* P.
Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 56. 57. 60.
Knorr Vergn. 3. *t.* 5. *f.* 5.
Martin. Conch. 4. *t.* 125. *f.* 1196-1200.
Habitat rarius in mari indico, *teſta levi, ſubventricoſa, paulisper ultra* 2 *pollices longa alba: lineis obliquis flavis vel ex luteo fuſcis, maculis fuſcis, apice rubro.*

d Calloſa, *columellae labio dilatato incraſſato.*

Arcularia. 42. B. teſta plicata papillisque coronata. *Muſ. Lud. Ulr.* 608. *n.* 260.*
Rumpf muſ. t. 27. *f.* M. Arcularia major.
Liſt. Conch. t. 970. *f.* 24. 25.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 175. 340.
Gualt. teſt. t. 44. *f.* O. Q. R.
Argenv. Conch. t. 14. *f.* C.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* 28. 32-35. 37-41.
Muſ. Gottwald. t. 26. *f.* 178. d. *f.* 183. a. b. c.
Knorr Vergn. 6. *t.* 22. *f.* 3.
Martin. Conch. 2. *t.* 41. *f.* 409-412.
Schroet. inn. Bau Conchyl. t. 5. *f.* 10.
β) *Rumpf muſ. t.* 27. *f.* N.
Gualt. teſt. t. 44. *f.* n.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* 44. 45.
Martin. Conch. 2. *t.* 41. *f.* 413.
γ) *Bonann. recr. et muſ. Kircher* 3. *f.* 59.
δ) *Gronov. zoophyl. t.* 19. *f.* 7. 8. Buccinum faſciolatum.
ε) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 154. *f.* 1474.
Habitat in Oceano indico, *Malacis ornamento arcarum inſerviens, teſta nunc alba, nunc cinerea, nunc ſubfuſca aut fuſca faſcia interdum alba, rarius rubeſcente faſcia alba, cancellata, labro coſtato.*

Pullus. 43. B. teſta gibba oblique ſtriata.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 8. *f.* 11? Totombo.
Liſt. Conch. t. 971. *f.* 26.
Gualt. teſt. t. 44. *f.* N.
Knorr Vergn. 6. *t* 22. *f.* 5.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 328. *t.* 2. *f.* 2.
Habitat in mari mediterraneo, *arcularia dimidio minor, teſta ferruginea decuſſatim ſtriata, faſcia una aut 2 albis transverſis, labio exteriori rotundato dentato, interiori nitido albo.*

gibboſulum. 44. B. teſta gibba laevi.
Liſt. Conch. t. 972. *f.* 270. *t.* 973. *f.* 28.
Bonann. recr. 3. *f.* 383.
muſ. Kirch. 3. *f.* 369.
Gualt. teſt. t. 44. *f.* L.
Muſ. Gottwald. t. 26. *f.* 178. c.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* 46.
Knorr Vergn. 6. *t.* 22. *f.* 6.
Martin. Conch. 2. *t.* 41. *f.* 414. 415.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 329. *f.* 3. a. b.
β) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 22. *f.* 4.
γ) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 22. *f.* 5.
δ) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 36. *f.* 5?
Habitat rarius in mari mediterraneo *et* indico, *teſta nivea, aut tincta maculatave.*

mutabile. 45. B. teſta laevi, adultiore rugoſa: ſpira exſerta, labio interiore ſubexplanato.
Gualt. teſt. t. 44. *f.* B.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta tenera, laevi, pallida, alba, aut ex luteo fuſceſcente, faſciis interdum 2 obſoletis: ſpira exquiſita; anfractibus diſtinctiſſimis longitudine teſtae margine ſuperiore obſolete albis ruſisque; adultiore longitudinaliter rugoſa cinerea opaca, labio interiori antrorſum extenſo craſſiuſculo.*

neriteum. 46. B. teſta convexa obtuſa laevi: labio interiori obſoleto.
Gualt. teſt. t. 65. *f.* C. I.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 10. *f.* 3. 4.
Habitat rarius in mari mediterraneo, *teſta piſi magnitudine, neritae facie, at apertura poſterius emarginata a neritis diſtincta, fere orbiculata, pallida, ſubtus planiuſcula, alba, gibboſa: ſutura ſuperiori ſecundum anfractus linea purpuraſcente, vermiculari.*

c De-

e Detrita, *columellae labio quaſi abraſo plano.*

√ Harpa. 47. B. teſta varicibus aequalibus longitudinalibus diſtinctis mucronatis: columella laevigata. *Muſ. Lud. Ulr.* 609. *n.* 261.*
Rumpf muſ. t. 32. *f.* K. L. M. Harpa.
Argenv. Conch. t. 17. *f.* D. Harpa nobilis.
Liſt. Conch. t. 992. 993. 994. *f.* 55-57.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 185.
Gualt. teſt. t. 29. *f.* C. D. E. G.
Klein oſtr. t. 6. *f.* 105.
Leſſer teſtaceoth. f. 59.
Seb. muſ. 3. *t.* 70. *fig. innom. omn.*
Muſ. Gottwald. t. 15.
Knorr Vergn. 1. *t.* 9. *f.* 3. *et* 2. *t.* 8. *f.* 2. *et t.* 19. *f.* 1. 2.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 14.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 14.
Martin. Conch. 3. *t.* 119. *f.* 1090-1092. 1094-1097.
β) *Pallas ſpic. zool.* 10. *p.* 33. *t.* 3. *f.* 1. 2. Buccinum Gerverſianum.
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 152. *f.* 1451.
δ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 152. *f.* 1453.
Habitat in mari indico, *teſta* 4-5 *pollices longa, ovata, nunc majore, nunc minore, ſubtus utplurimum badia aut fuſca, coſtis obliquis nunc latioribus, nunc anguſtioribus, utplurimum, nunc rarius, nunc confertim ſtriis transverſis nigris notatis, aliquando maculatis: maculis nonnunquam teſſellatis, coſtarum interſtitio creberrime albo, maculis pennatis picto; in* β) *teſta griſea undulatim maculata, intus ex purpura violacea.*

coſtatum. 48. B. teſta varicibus aequalibus longitudinalibus confertis mucronatis, columella laevigata.
Argenv. zoomorph. t. 11. *f.* F.
Martin. Conch. 3. *t.* 119. *f.* 1093.
Favann. Conch. t. 28. *f.* A4.
Chemn. Conch. 10. *t.* 152. *f.* 1452.
β) Fimbriata Buccinum. *Mart. univ. Conch.* 1. *t.* 6.
Habitat rariſſimum - - - β) *ad* inſulas Falkund, *coſtis approximatis, rarius ſtriatis et maculatis ab harpa diſtinctum, an forſan mera ejus varietas?*

Perſicum. 49. B. teſta ſcabra: labro crenulato, columella plana. *Muſ. Lud. Ulr.* 609. *n.* 262.*
Rumpf muſ. t. 27. *f.* E. Cochlea patula.
Argenv. Conch. t. 17. *f.* E. Concha perſica.

Liſt.

Liſt. Conch. t. 987. *f.* 46. 47.
Gualt. teſt. 51. *f.* H? L.
Seb. muſ. 3. *t.* 72. *f.* 10. 11.
Knorr Vergn. 3. *t.* 2. *f.* 5. *et* 4. *t.* 5. *f.* 4.
Martin. Conch. 3. *t.* 69. *f.* 760.
β) *Valent. Abh. t.* 3. *f.* 20.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 72. *f.* 12-16.
Favann. Conch. t. 27. *f.* D³.
Chemn. Conch. 10. *t.* 154. *f.* 1467. 1468.
Habitat in mari indico, ſinu perſico *rarius, teſta* 4 *fere pollices longa aut fuſca transverſim ſtriata alboque maculata vel filis albo fuſcoque maculatis cincta, aut faſciis ejusmodi picta.*

mono-don. 50. B. teſta ſcabra, labro crenulato, columella plana ſpinam ſubulatam oblique exſerente.
Pallas ſpic. zool. 10. *p.* 33. *t.* 3. *f.* 3. 4.
Knorr Vergn. 4. *t.* 30. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 69. *f.* 761.
Regenſ. Conch. 2. *t.* 7. *f.* 2.
Favann. Conch. t. 27. *f.* D¹.
Martyn Conch. 1. *t.* 10. 2. *f.* 50.
Chemn. Conch. 10. *t.* 154. *f.* 1469. 1470.
Habitat rarum in mari Americam *alluente, perſico affine, teſta griſea, intus alba.*

patulum. 51. B. teſta muricata: labro extus crenato, columella falcata.
Muſ. Lud. Ulr. 610. *n.* 263.*
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 7. *f.* 3. Pakel.
Liſt. Conch. t. 989. *f.* 49.
Bonann. recr. 3. *f.* 368.
muſ. Kircher. 3. *f.* 361.
Gualt. teſt. t. 51. *f.* D. E.
Muſ. Gottwald. t. 26. *f.* 179. a.
Knorr Vergn. 6. *t.* 24. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 69. *f.* 757. 758.
Habitat rarius in mari aethiopico *et* americano, *murici neritoideo affine, teſta ad* 4 *usque pollices longa, ſolida, ſtriis transverſis nigris intermediisque lineis albis varia, faſciis crebro* 2 *albis, ventris anfractibus cingulo triplici nodoſo acuto, et duplici inferiore magis obtuſo.*

haemaſto-ma. 52. B. teſta ſubmuricata; labro intus ſtriato, columella planiuſcula, fauce fulva.

 Liſt.

Liſt. Conch. t. 988. *f.* 48.
Gualt. teſt. t. 51. *f.* A.
Muſ. Gottwald. t. 11. *f.* 80. a? b? e? f?
Martin. Conch. 3. *t.* 101. *f.* 964. 965.
Habitat in mari mediterraneo *et* aethiopico, *teſta ad* 2 *pollices longa, ovata, rudi, transverſim ſtriata, fuſca vel cinerea interdum fuſco lineata, labro intus crenulato, ſpira obtuſa, anfractibus faſcia duplici nodoſa cinctis.*

Lapillus. 53. B. teſta ovata acuta ſtriata laevi: columella. *Fn. ſuec.* 2167.
It. wgoth. t. 5. *f.* 4.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 7. *f.* 4. Sadot.
Müll. zool. dan. prodr. 2944. *O. Fabr. Fn. groenl.* 398. Tritonium Lapillus.
Liſt. Conch. t. 965. *f.* 18. 19. *et t.* 975. *f.* 30. a?
anim. angl. t. 3. *f.* 5. 6.
Act. pariſ. 1711. *p.* 199. *t.* 6. *f.* 5-7.
Knorr Vergn. 6. *t.* 29. *f.* 4.
Stroem. ſondm. 183.
Beſch. berl. Naturf. 4. *n.* 13.
Ferber n. Beytr. z. Mineralg. 1. *p.* 449.
Martin. Conch. 3. *t.* 121. *f.* 1111. 1112. *et* 4. *t.* 122. *f.* 1124. 1125. 1128. 1129. 1136. 1137.
Habitat ad Oceani europaei *littora, teſta vix ultra* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa alba, cinerea vel flavicante, interdum transverſim faſciata, nunc tenuiore: apertura edentula, nunc ſolidiore: apertura dentata; incolae feminini ovaria ſucco glutinoſo albo flavo fuſcoque farta, qui lanae aut linteo affricatus et ad ſolem ſiccatus nitido eoque ſtabili colore purpureo comparet: Ova olim pro hydra triticea habita.*

ſmaragdulus. 54. B. teſta ovata, acuta glaberrima, columella ſubplicata planiuſcula. *Muſ. Lud. Ulr.* 670. *n.* 264.*
Argenv. Conch. t. 6. *f.* P. Smaragdus minor.
Habitat - - - teſta ſulcata matris perlarum inſtar nitente, et viridi quoque colore nitente.

Tuba. 55. B. teſta ſubfuſiformi ex fuſco lutea: ſpira cancellata; anfractu primo ſublaevi reliquis triplo longiore.
Martin. Conch. 3. *t.* 94. *f.* 908.
Habitat rariſſimum in India, *teſta ſupra ſubventricoſa, infra anguſta.*

Pyrum. 56. B. teſta turbinata: apertura rubra, columella laevi, ſpira brevi; anfractu primo ventricoſo.

Martin.

Martin. Conch. 3. *t.* 94. *f.* 909. 910.
β) *Scop. del. inſ.* 2. *t.* 24. *f.* 2?
Habitat rariſſimum in India *et* mari rubro.

ſpadiceum. 57. B. teſta oblongo turbinata ſpadicea: lineis transverſis undulatis albis.
Martin. Conch. 3. *t.* 94. *f.* 911.
Habitat - - -

foſſile. 58. B. teſta convexa transverſim plicata: ſpira brevi, columella calloſa.
Martin. Conch. 3. *t.* 94. *f.* 912-914.
Habitat - - - *hactenus modo foſſile et calcinatum ſat frequens prope* Oedenburg Hungariae.

umbilicatum. 59. B. teſta oblongo turbinata plicata: ſpira nodoſa, apertura intus ſulcata, columella ſubumbilicata.
Martin. Conch. 3. *t.* 94. *f.* 915. 915. a.
Habitat - - -

candidum. 60. B. teſta oblonga turbinata ſolida laevi alba.
Martin. Conch. 3. *vign.* 31. *f.* 2. 3. *p.* 198.
Habitat - - -

Scala. 61. B. teſta oblonga: apertura ovali emarginata quadridentata, baſi alba, ſpira acuta; anfractibus diſtantibus, primo coſtis quatuor glabris.
Martin. Conch. 3. *t.* 118. *f.* 1089. a. b.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 360. *t.* 2. *f.* 8.
β) *Knorr Vergn.* 3. *t.* 7. *f.* 2.
γ) *Liſt. Conch. t.* 1059. *f.* 2.
Habitat - - - *teſta nunc alba, nunc fuſca.*

craſſum. 62. B. teſta ventricoſa rudi griſea glabra: apertura ovali, columella calloſa, baſi bicalloſa.

 Martin.

Cui tribui accenſendae, ſi quidem diſtinctae ſint hujus generis ſpecies ab Argenville *zoomorph. t.* 4. *f.* A. *a* Liſtero *Conch. t.* 37. *f.* 36. *t.* 580. *f.* 34. a. *t.* 792. *f.* 45. *t.* 827. *f.* 49. d. *t.* 897. *f.* 17. a. *t.* 912. *f.* 3. *t.* 924. *f.* 16. a. b. *t.* 962. *f.* 15. a. *t.* 964. *f.* 49. e. f. *t.* 965. b. *f.* 20. *t.* 968. *f.* 22 b. c. *t.* 976. *f.* 32. *t.* 983. *f.* 42. b. *et t.* 992. *f.* 54. *a* Seba *muſ.* 3. *t.* 50. *f.* 31. *t.* 60. *f.* 36. 50. *et t.* 39. *f.* 61. *ab* Argenvillio *Conch. t.* 10. *f.* I. *et zoomorph. t.* 4. *f.* E. *a* Gualtieri *teſt. t.* 44. *f.* H. I. D. P. *t.* 55. *f.* C. *et t.* 43. *f.* P. *a* Bonanni *Muſ. Kircher.* 3. *f.* 33. 63. 71. 398. 151. *et muſ.* Gottwaldtian. *t.* 26. *f.* 175. c. *et f.* 181. *delineatae? an buccini ſpecies teſta a* Knorrio *Vergn.* 5. *t.* 15. *f.* 5. *delineata? a* Liſtero *anim. angl. t.* 3. *f.* 10.

Martin. Conch. 3. *t.* 120. *f.* 1099. 1100.
Habitat - - - ſpira vix prominula: anfractibus 5.

marginatum. 63. B. teſta ſubgloboſa glaberrima: apertura ovali utrinque marginata, labro dentato, columella ſubſtriata, ſpira vix prominula.
Martin. Conch. 3. *t.* 120. *f.* 1101. 1102.
Habitat - - - hactenus modo foſſile repertum in Pedemontio, *teſta ſubfuſca, baſi ſtriis nonnullis obliquis exarata.*

Labyrinthus. 64. B. teſta ponderoſa convexa glaberrima: anfractibus diſtantibus marginatis, apertura ampla ovali, columellae plicis obliquis.
Seb. muſ. 3. *t.* 57. *f.* t.
Martin. Conch. 3. *t.* 120. *f.* 1103.
Habitat ad Scheveningen Hollandiae, *teſta ex luteo ſubfuſca.*

ruſticum. 65. B. teſta rudi ovato-oblonga alba: ſtriis transverſis fuſcis, apertura ovali, cauda prominula, anfractuum primo ventricoſo.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 9. *f.* 25. Tafon.
Liſt. Conch. t. 831. *f.* 55.
Gualt. teſt. t. 43. *f.* X.
Seb. muſ. 3. *t.* 54. *f.* 14-16.
Knorr Vergn. 3. *t.* 14. *f.* 5.
Martin. Conch. 3. *t.* 120. *f.* 1104. 1105.
Habitat in India *et* Africa, *ſtriis transverſis interdum fuſco lacteoque variis, in colorem caeruleum viridemque vergentibus.*

varium. 66. B. teſta ovata rudi flava: coſtis transverſis obſcurioribus elevatis noduloſis, apertura ovata edentula.
Knorr Vergn. 6. *t.* 23. *f.* 3.
Martin. Conch. 3. *t.* 121. *f.* 1106.
Habitat - - -

filoſum. 67. B. teſta ovata albida, rubris filis cincta: ſpira prominula, apertura ovali, labro rubro ſtriato, columella ſubumbilicata.
Martin. Conch. 3. *t.* 121. *f.* 1113. 1114.
Habitat - - -

coronatum. 68. B. teſta ovata ſtriata exalbida ſpadiceo obumbrata: faſcia media alba, maculis utrinque fuſcis ſtipata.
Martin. Conch. 3. *t.* 121. *f.* 1115. 1116.

β) *Liſt.*

β) *Liſt. Conch. t. 986. f. 45.*
Klein oſtr. t. 4. f. 75.
Habitat - - - teſta medio gibba.

ſquali-dum. 69. B. teſta ſubgloboſa albida maculis porraceis luridisque teſſellatis in ſeries digeſtis varia.
Bonann. recr. 3. f. 393.
muſ. Kirch. 3. f. 379.
Habitat - - - ſpirae anfractibus 4.

craſſum. 185. B. teſta ſubcylindrica transverſim ſtriata rufeſcente ſpadiceo faſciata labro denticulato. *Kaemm. Cab. Rudolſt. p. 119. t. 7. f. 2. 3.*
Habitat ad Zeylon.

fornica-tum. 186. B. teſta ſtriata fuſca albo maculata faſciataque: anfractibus canaliculatis quadrifariam noduloſis. *Kaemmerer Cab. Rudolſt. p. 120. n. 14. t. 9. f. 1.*
Habitat - - - teſta 1½ pollicem longa.

* Laevigata (*nec praecedenti cuidam tribui inſerta.*)

ſpiratum. 70. B. teſta laevi: anfractibus canali plano diſtinctis, columella abrupta perforata. *Muſ. Lud. Ulr. 611. n. 265.*
Columm. purp. 15. t. 16. f. 2.
α) *Argenv. Conch. t. 17. f. N.* Contabulata.
Liſt. Conch. t. 983. f. c.
Bonann. recr. 3. f. 370.
muſ. Kircher. 3. f. 362.
Rumpf muſ. t. 49. f. D.
Gualt. teſt. t. 51. f. B.
Seb. muſ. 3. t. 73. f. 21. 22. 24? 25?
Knorr Vergn. 2. t. 6. f. 5. et 3. t. 3. f. 4.
Regenſ. Conch. 1. t. 10. f. 41.
Martin. Conch. 4. t. 122. f. 1118.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 4. f. 3.
β) *Liſt. Conch. t. 981. f. 41.*
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. f. 70.
Rumpf muſ. t. 49. f. C.
Klein oſtr. t. 2. f. 46.
Seb. muſ. 3. t. 73. f. 23. 26.
Martin. Conch. 4. t. 122. f. 1120. 1121.
Habitat in India. *β. (rarius) in* Sina, *teſta 2 circiter pollices longa, β) paulo longiori, alba, maculis lineisque ſpadiceis aliter aliterque varia, ſpirae anfractibus 6-7: primo ventricoſo, apertura ovata emarginata ſupra in canalem termi-*

terminata, umbilico profundo quaſi bipartito, baſi in α) caerulea.

pyrozonias. 71. B. teſta transverſim plicata et undulatim ſtriata: baſi ſpiraque prominulis; anfractibus ſingulis faſcia fulva, primo duplici.
Martin. Conch. 3. *t.* 109. *f.* 1017.
Habitat - - -

laeve. 72. B. teſta oblonga tenuiſſime ſtriata dilute fuſca obſcurius faſciata; apertura ovali in canalem deſinente, anfractu primo gibbo maximo.
Martin. Conch. 4. *t.* 124. *f.* 1150.
Habitat in India, *ſpirae anfractibus* 5-6.

ocellatum. 73. B. teſta laevi atra: guttis maculisque albis ſeriatis, ſpira prominula; anfractu primo ventricoſo.
Martin. Conch. 4. *t.* 124. *f.* 1160. 1161.
Habitat - - -

pyramidale. 74. B. teſta obtuſe pyramidali transverſim ſtriata alba, nebulis maculis virgatis aliisque nigris et ſubfuſcis varia.
Liſt. Conch. t. 976. *f.* 31.
Martin. Conch. 4. *t.* 124. *f.* 1170. 1171.
β) *Liſt. Conch. t.* 980. *f.* 39.
Habitat ad Tranquebar.

glaberrima. 75. B. teſta glaberrima minuta.
Martin. Conch. 4. *t.* 125. *f.* 1177. 1180.
β) *Martin. Conch.* 4. *t.* 125. *f.* 1178.
γ) *Martin. Conch.* 4. *t.* 125. *f.* 1179.
δ) *Martin. Conch.* 4. *t.* 125. *f.* 1181.
ε) *Martin. Conch.* 4. *t.* 125. *f.* 1182.
Habitat - - - β) anfractibus 2 primis faſcia teſſulata cinctis, γ) anfractu primo ſerie macularum cincto, δ) teſta fuſco undulata, ε) maculata et punctata.

ſtrigoſum. 76. B. teſta minuta transverſim ſtriata.
Martin. Conch. 4. *t.* 125. *f.* 1183.
β) *Martin. Conch.* 4. *t.* 125. *f.* 1184.
γ) *Martin. Conch.* 4. *t.* 125. *f.* 1185.
δ) *Martin. Conch.* 4. *t.* 125. *f.* 1186-1188.
Habitat - - - teſtae apertura in β) et δ) dentata, in hac maculata.

77. B.

triſaſciatum. 77. B. teſta glabra: faſciis intus tribus latis rubris, ſpirae anfractu primo ventricoſo.
Gualt. teſt. t. 44. f. A.
Habitat - - - teſta ultra pollicem longa.

leucozonias. 78. B. teſta glabra: faſcia alba lineisque ſpadiceis varia.
Seb. muſ. 3. t. 39. f. 37.
Habitat - - - teſta minuta.

cancellatum. 79. B. teſta glabra faſciis lineisque decuſſantibus varia.
Seb. muſ. 3. t. 39. f. 38.
Habitat - - - teſta minuta.

obtuſum. 80. B. teſta glabra ochroleuca: ſpirae apice obtuſo caeruleo; anfractu primo ventricoſo.
Knorr Vergn. 5. t. 18. f. 3.
Martin. Conch. 4. t. 125. f. 1193.
Habitat - - - teſta 2 pollices longa.

glabratum. 81. B. teſta glaberrima: anfractibus obſoletis; infimo baſi ſubcanaliculato producto. *Muſ. Lud. Ulr.* 611. *n.* 266.*
Liſt. Conch. t. 974. f. 29.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. f. 149.
Gualt. teſt. t. 43. f. T.
Argenv. Conch. t. 9. f. G.
Knorr Vergn. 2. t. 16. f. 4. 5.
Martin. Conch. 4. t. 122. f. 1117.
β) *Klein oſtr. t. 2. f. 47.* Dipſacus.
Liſt. Conch. t. 982. f. 42.
Martin. Conch. 4. t. 122. f. 1119.
Chemn. Beſch. berl. Naturf. 3. t. 8. f. B.
γ?) *Martyn univ. Conch. 2. t. 48.*
Habitat in mari americano *et* africano *rarius, teſta* 3½-4 *pollices longa nitida, aurantia albo intermiſto, β) alba ſpadiceo maculata apice rubella.*

ſtromboides. 82. B. teſta glabra: anfractibus diſtinctis, ventre retro labrum ſuperne ſolutum portato ad baſin oblique ſtriato. *Hermann Naturf. 16. p. 53. t. 2. f. 5. 6.*
Habitat - - - ſtrombo gibberulo affine, teſta ex fuſceſcente lutea, ſpirae anfractibus 5-6 convexis.

praeroſum. 83. B. teſta ovata laevi atra: ſpira carioſa; columella glaberrima.
Liſt. Conch. t. 124. f. 24?
Chemn. Conch. 9. t. 120. f. 1035. 1036.

Habitat in Europa *magis auſtrali* v. g. *ad aquaeductum* Sevillae, *teſta fabae fere magnitudine rudi; vertice quaſi praemorſo.*

auſtrale. 173. B. teſta oblonga laevi tenui faſciata: apertura ovali integra. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 120. *f.* 1033. 1034.
Favann. Cat. t. 1. *f.* 46.
Habitat in novae Seelandiae fluviis, *inter buccina, bullas, et helices quaſi media, teſta* 3 *pollices longa.*

Orbita. 183. B. teſta ovata craſſa albida transverſim coſtata ſulcataque: apertura ovali, labro intus plicato, labio plano. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 199. *t.* 154. *f.* 1471. 1472.
Martyn Conchol. 2. *f.* 45.
β) *Martyn Conchol.* 1. *f.* 7.
Chemn. Conch. 10. *t.* 154. *f.* 1473.
Habitat ad novae Seelandiae *littora.*

turgitum. 184. B. teſta obovata ſubumbilicata flaveſcente maculis ſanguineis ſeriatis notata: labro ſinuato. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 201. *t.* 154. *f.* 1475. 1476.
Zorn n. danz. Abh. 1. *t.* 3. *f.* 4.
Martyn Conch. 2. *f.* 49.
Habitat ad novae Seelandiae *littora.*

g Angulata (*neque praegreſſis tribubus adſcripta.*)

undoſum. 84. B. teſta ovata: ſtriis transverſis elevatis glabris, ventre obtuſe quinquangulari, labro intus ſtriato. *Muſ. Lud. Ulr.* 612. *n.* 268.*
Rumpf muſ. t. 29. *f.* O. Buccinum undoſum.
Liſt. Conch. t. 938. *f.* 33.
Argenv. Conch. t. 9. *f.* N.
Seb. muſ. 3. *t.* 52. *f.* 26.
Knorr Vergn. 2. *t.* 14. *f.* 4. 5.
Martin. Conch. 4. *t.* 122. *f.* 1126. 1127. *et t.* 123. *f.* 1146. 1146ª.
β) *Bonann. muſ. Kirch.* 3. *f.* 399?
Habitat rarius in freto Malaccenſi, *teſta* 2 *circiter pollices longa flavicante; ſtriis fuſcis: angulis nonnunquam* 7-8, *cauda canaliculata reflexa*

affine. 85. B. teſta ovata: ſtriis transverſis elevatis glabris, ventre cylindrico, labro intus ſtriato.
Martin. Conch. 4. *t.* 123. *f.* 1135.
Habitat - - - *an ſatis diſtinctum ab undoſo?*

tranquebaricum. 86. B. teſta ovata: ſpira 12 angulata transverſim ſtriata, apertura dentata, labro aurantio, columella perforata.
Muſ. Gottwald. t. 26. *f.* 175. 175. a. b.
Martin. Conch. 4. *t.* 123. 1147-1149.
Habitat ad Coromandel.

verſicolor. 87. B. teſta rudi ſordide fuſca transverſim ſtriata: ſtriarum interſtitiis bifariam nigro maculatis, ſpirae anfractibus quatuor canaliculatis.
Martin. Conch. 4. *t.* 123. *f.* 1145.
Habitat in India, *teſta brevi: apertura ampla oblonga in canalem brevem deſinente, teſta interdum tenuiore longiuſcula lineis angularibus picta.*

cruentatum. 88. B. teſta transverſim ſtriata: maculis rubellis parallelogrammis.
Martin. Conch. 4. *t.* 123. *f.* 1143. 1144.
Habitat - - - -

ſulcatum. 89. B. teſta ovata fuſca, maculis niveis varia; ſpirae anfractibus ſulcatis, fauce ſtriata, labro crenulato.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 10. *f.* 5. 6.
Habitat - - - -

Rumpfii. 90. B. teſta tenui ventricoſa anguſta: ſpira conico-depreſſa; anfractu primo et ſecundo ſpinis coronato.
Rumpf muſ. t. 25. *f.* 3.
Habitat - - - teſta 4 *fere pollices longa.*

Bezoar. 91. B. teſta ſubrotunda rugoſa: anfractibus anterius lamellatis, columella perforata.
Argenv. Conch. t. 15. *f.* G.
Martin. Conch. 3. *t.* 68. *f.* 754-755.
Spengl. ſelt. Conch. t. 2. *f.* H.
Habitat in Sina, *teſta ſordide ochroleuca fuſco varia, intus flava, rudi, decuſſatim rugoſa vel ſtriata, cauda ſolida flexa rugoſa imbricatim ſquamoſa, ſpira angulata lateribus rectis, anterius planiuſcula plicata aut ſuperne dentata.*

glaciale. 92. B. teſta laevi ſubſtriata ovato-oblonga: anfractu infimo ſubcarinato. *Fn. ſuec.* 2162.*
Müll. zool. dan. prodr. 2942. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 397. *n.* 397. Tritonium glaciale.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 270. *t.* 3. *f.* 20. 21.

Chemn. Schr. berl. Naturf. 6. *t.* 6. *f.* 4. 5. *Conch.* 10. *t.* 152. *f.* 1446. 1447.
Habitat ad Oceani ſeptentrionalis *a* Groenlandia *ad extremam* Aſiam *littora*, *teſta ad* 2 *pollices longa craſſa lapidea laevi pallide rubicunda*, *intus alba polita*; *ſpirae anfractibus* 7 *curvato multangulis.*

undatum. 93. B. teſta oblonga rudi transverſim ſtriata: anfractibus curvato-multangulis. *Fn. ſuec.* 2263.*
Müll. zool. dan. 2. *t.* 50. *prodr.* 2938. *rar.* 2. *p.* 28. O. *Fabr. Fn. groenl.* 394. Tritonium teſta oblonga transverſim ſtriata, anfractibus oblique carinatis.
Liſt. Conch. t. 962. *f.* 14.
anim. angl. t. 3. *f.* 2.
Bonann. recr. f. 189.
muſ. Kirch. 3. *f.* 191.
Petiv. gaz. p. 83.
Rumpf muſ. t. 29. *f.* H.
Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 76-80.
Knorr delic. t. B. VI. *f.* 6.
Vergn. 4. *t.* 19. *f.* 1.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 9. *f.* 14. 15.
Martin. Conch. 4. *t.* 126. *f.* 1206-1211.
β) *Bonann. muſ. Kirch.* 3. *f.* 399.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 39. *f.* 81. 82.
δ) *v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t.* 9. *f.* 15. 16. *ind. p.* 253.
Chemn. Conch. 9. *t.* 105. *f.* 892. 893.
Habitat in Oceano europaeo, *potiſſimum* ſeptentrionali, mari *quoque* glaciali *et* indico, *teſta* 4½ *pollices longa ſcabra, minus ſpectabili cinerea vel ſubfuſca*, *rarius ſpadicea albo faſciata aut caerulea*, *transverſim et oblique undulata*, *ſpirae anfractibus* 8-9, *apertura lunata*, *operculo corneo extrinſecus ſtriis ſubtiliſſimis concentricis notato*, *tecta*, *incola nigro maculato albo ſubtus fuſco*, *tentaculis ſubulatis oculisque binis*, *ſiphone canalem mentiente.*

ciliatum. 94. B. teſta turrita patulo ſubcaudata angulata longitudinaliter ciliata, columella ſubplicata. O. *Fabr. Fn. groenl. p.* 401. *n.* 402.
Habitat rarius in maris Groenlandiam alluentis *profundioribus*, *undato affine*, *ſed magis amplum*, *teſta* 6 *fere lineas longa albida*, *intus glabra*, *epidermide ciliato-plicata munita*, *apertura ampla*, *ſpirae anfractibus* 5 *minus convexis*, *mucrone glabro.*

viridulum. 95. B. teſta oblonga laevi glabra acuminata transverſim minute ſtriata, longitudinaliter coſtata. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 402. *n.* 403.
Habitat in maris Groenlandiam alluentis *profundioribus undato proximum, teſta* 4 *lineas longa tenera ſubdiaphana ex albo vireſcente, cauda brevi obtuſa vix reflexa, labio acuto, ſpirae anfractibus* 6-7 *minus ventricoſis.*

carinatum. 96. B. teſta oblongo-conica transverſim ſtriata: anfractibus ſuperioribus oblique obtuſeque multangulis; inferioribus unicarinatis. *Phipps it. p.* 197. *t.* 13. *f.* 2.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *ad portum* Smeerenberg.

ſolutum. 97. B. teſta ovata: varicibus ventris longitudinalibus inaequaliter diſtantibus, labro canaliculo ſubſoluto. *Hermann Naturf.* 16. *p.* 52. *t.* 2. *f.* 3. 4.
Habitat - - - *undato affine, teſta exalbida flavo miſta, ſpira obtuſa, anfractu primo ſecundo quintuplo latiori,* 6 *coſtis inaequali.*

Taenia. 98. B. teſta oblonga glabra fuſca: anfractu primo faſcia flavicante media.
Knorr Vergn. 5. *t.* 10. *f.* 3.
Habitat - - -

lineatum. 99. B. teſta cinerea: ſtriis longitudinalibus undulatis transverſisque interruptis fuſcis, margine albo fuſco maculato, apertura alba.
Knorr Vergn. 3. *t.* 14. *f.* 4.
Habitat - - - *undoſo affine, at teſta non multangula.*

maclovienſe. 100. B. teſta oblonga maculis undatis nebuliſque picta; ſpira brevi; anfractu primo gibbo, cauda anguſta ſubprominula.
Valent. Abh. t. 11. *f.* 97.
Habitat ad fanum S. Maclovii.

foliorum. 101. B. teſta tenui: ſpira brevi acuta tenuiter coſtata: anfractu primo ſubgloboſo.
Rumpf muſ. t. 29. *f.* Y.
Habitat in India *ad arborum fruticumque maritimorum folia ramosque, teſta pollicem circiter longa ex vireſcente cinerea atro punctata.*

textum. 102. B. teſta ventricoſa cancellata: anfractibus diſtantibus.
Martin. Conchb. 4. *t.* 125. *f.* 1201. 1202.
Habitat - - - *teſta pollicem longa.*

103. B.

ſtrigoſum. 103. B. teſta oblonga longitudinaliter plicata transverſim ſtriata: ſtriis fuſcis albo nigroque ſtriatis.
Bonann. muſ. Kirch. et recr. 3. *f.* 38.
Chemn. Conch. 4. *p.* 49. *vign.* 38. *f.* a. b.
Habitat - - - teſta vix 2 *pollices longa ſubventricoſa: apertura coſtata, columella ſubplicata; an ad muricem relegandum?*

anglicum. 104. B. teſta oblonga: ſtriis transverſis elevatis, ſpirae anfractibus ſex fuſcis.
Liſt. Conch. t. 963. *f.* 17.
Bytem. app. t. 11. *f.* 43.
Martin. Conch. 4. *t.* 126. *f.* 1212.
Habitat ad Angliae *littora, teſta parum ventricoſa.*

porcatum. 105. B. teſta ventricoſa coſtata fuſca: anfractu primo alterum ſubtegente.
Knorr Vergn. 6. *t.* 33. *f.* 3?
Martin. Conch. 4. *t.* 126. *f.* 1213. 1214.
β) *Liſt. Conch. t.* 963. *f.* 16.
Habitat ad Angliae *littora.*

laeviſſimum. 106. B. teſta glaberrima alba: ſpirae apice obtuſo caeruleſcente, anfractu primo ventricoſo reliquis duplo majore.
Martin. Conch. 4. *t.* 127. *f.* 1215. 1216.
β) *Liſt. Conch. t.* 978. *f.* 35.
Habitat - - - -

igneum. 107. B. teſta oblonga anguſtata glabra flavicante: maculis undatis nebuliſque rubris, anfractibus extimis perpendiculariter ſtriatis.
Martin. Conch. 4. *t.* 127. *f.* 1217.
Habitat - - - an muricis potius ſpecies?

plumatum. 108. B. teſta oblonga anguſta ſpadicea: cinguſis obſcurioribus, fauce anguſta atra caeruleave; dentibus albis labroque intus ſtriato.
Liſt. Conch. t. 822. b. *f.* 41.
Knorr Vergn. 4. *t.* 21. *f.* 6.
Martin. Conch. 4. *t.* 127. *f.* 1218-1220.
Habitat in inſulis Americae auſtrali *obverſis, ſpirae apice acuto; an ad murices potius referendum?*

lyratum. 109. B. teſta oblonga anguſta horizontaliter coſtata: coſtis transverſim ſtriatis.

Martin.

Martin. Conch. 4. *t.* 127. *f.* 1221. 1222.
β) Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 34?
Habitat - - - teſta ſubturrita, naſo ſubprominulo, columella laevi.

clathratum. 110. B. teſta cana ovato-ventricoſa: rugis longitudinalibus plicas transverſas decuſſantibus, labro intus ſulcato.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 9. *f.* 17. 18.
Habitat - - - ſpira acuta, cauda brevi recurva.

reticulatum. 111. B. teſta ovato-oblonga transverſim ſtriata longitudinaliter rugoſa, apertura dentata.
Liſt. Conch. t. 966. *f.* 21.
Petiv. gaz. t. 64. *f.* 8. *et t.* 75. *f.* 4.
Act. pariſ. 1710. *p.* 463. *et* 1711. *p.* 199. *t.* 6. *f.* 9.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 62.
Gualt. teſt. t. 44. *f.* C.
Knorr Vergn. 5. *t.* 10. *f.* 3.
v. Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 9. *f.* 16.
Martin. Conch. 4. *t.* 124. *f.* 1164.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 346. *t.* 2. *f.* 5.
Habitat frequens in mari mediterraneo, anglico, aethiopico, *teſta omnibus fere coloribus variante, avellanae magnitudine.*

niveum. 112. B. teſta ovata cancellata alba: anfractu primo ventricoſo.
Martin. Conch. 4. *t.* 122. *f.* 1122. 1123.
Habitat Tranquebariae, *teſta ad pollicem usque longa, cauda ſubprominula, ſpirae anfractibus* 7.

ſcalare. 113. B. teſta flava faſciis dilute fuſcis: ſpira cancellata; anfractibus diſtantibus planis, primo ſubconvexo, apertura triangulari; labro dentato, columella plicata verrucoſa umbilicata.
Chemn. Conch. 4. *p.* 1. *vign.* 37. *f.* a. b. c.
Meuſſch muſ. Leenſ. f. b.
β) Knorr Vergn. 6. *t.* 17. *f.* 7.
Martin. Conch. 4. *t.* 122. *f.* 1130.
Habitat pretioſum - - - teſta interdum rubella, ſpirae anfractibus 6, *umbilico infundibuliformi.*

indicum. 114. B. teſta decuſſatim ſtriata fuſca intus alba.
Martin. Conch. 4. *t.* 123. *f.* 1138. 1139.
Habitat in India.

nodulo-ſum. 115. B. teſta alba fuſco varia transverſim ſtriata hinc inde noduloſa.
Muſ. Gottwald. t. 26. *f.* 175. d. e?
Martin. Conch. 4. *t.* 123. *f.* 1140.
Habitat ad inſularum Americae auſtrali *obverſarum littora.*

piſcatorium. 116. B. teſta cancellata in ſectionis angulis noduloſa: apertura utrinque dentata acuta.
Liſt. Conch. t. 1024. *f.* 89.
Martin. Conch. 4. *t.* 124. *f.* 1151. 1152.
Habitat in India, *an ad volutas referendum?*

S. Mauritii. 117. B. teſta alba intus flaveſcente: labro ſexdentato, anfractibus ſpinis; primo quadrifariam coronatis.
Martin. Conch. 4. *t.* 124. *f.* 1153. 1154.
Habitat in inſula S. Mauritii.

armillatum. 118. B. teſta oblonga: apertura ampla edentula, anfractibus ſingulis tuberculorum ſerie coronatis.
Liſt. Conch. t. 954. *f.* 5.
Knorr Vergn. 4. *t.* 26. *f.* 2.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 11. *f.* 6. 7.
Martin. Conch. 4. *t.* 124. *f* 1155-1157.
Habitat - - - teſta tenui.

plicatulum. 119. B. teſta oblonga perpendiculariter plicata transverſimque ſtriata faſciis albis fuſcisque alternis varia intus violacea.
Martin. Conch. 4. *t.* 124. *f.* 1158. 1159.
β) Gualt. teſt. t. 44. *f.* E?
Habitat in India.

vulgatum. 120. B. teſta ventricoſo-oblonga: ſtriis longitudinalibus pliciformibus transverſas ſubtiliores undulatas decuſſantibus.
Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 61. 62.
Martin. Conch. 4. *t.* 124. *f.* 1162. 1163.
β) Gualt. teſt. t. 44. *f.* V?
Martin. Conch. 4. *t.* 124. *f.* 1165. 1166.
Habitat frequentiſſimum in mari mediterraneo, *ad* Angliae inſularumque canarienſium *et* Azorum littora, *teſta mediae magnitudinis, coloris varii, ſtriis albis et caeruleſcentibus, ſubfuſcis et flavicantibus alternis.*

ſtolatum. 121. B. teſta faſciis discoloribus transverſim ſtriatis varia: ſpira horizontaliter coſtata; anfractus primi altera parte glaberrima.

Martin.

Martin. Conch. 4. *t.* 124. *f.* 1167-1169.

β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 53. *f.* 43?

Habitat frequens ad Tranquebariae *littora, teſta nunc fuſca vel rubella faſciis albis, nunc alba faſciis fuſcis vel rubellis, apertura intus dentata, columellae plica ſimplici.*

nanum. 122. B. teſta minuta alba cancellata: ſpira acuta.
Martin. Conch. 4. *t.* 125. *f.* 1176.
Habitat - - - -

exile. 123. B. teſta parva anguſta cancellata: apertura ampla crenata maculata.
Martin. Conch. 4. *t.* 125. *f.* 1189-1191.
Habitat - - - -

Chalys. 124. B. teſta cancellata: coſtis perpendicularibus: interſtitiis laevibus planis, apertura ovata.
Martin. Conch. 4. *t.* 125. *f.* 1192.
Habitat - - - *teſta minuta, ſpira vix prominula.*

verrucoſum. 125. B. teſta decuſſatim ſtriata in ſectionum angulis nodoſa ſubventricoſa lutea: anfractibus ſingulis faſcia caeruleſcente.
Gualt. teſt. t. 43. *f.* M.
Habitat - - - *teſta* $1\frac{1}{4}$ *pollicem longa.*

alatum. 126. B. teſta gibba decuſſatim ſtriata in ſectionum angulis nodoſa: ſtriis transverſis undulatis, labro alato.
Gualt. teſt. t. 43. *f.* Z.
Habitat - - - *teſta pollicem circiter longa.*

nigropunctatum. 127. B. teſta anguſta rugoſa: rugis albo tuberculatis et nigro punctatis.
Gualt. teſt. t. 44. *f.* F.
Habitat - - - *teſta* $\frac{3}{4}$ *pollicis circiter longa.*

nitidulum. 128. B. teſta gibba ovato-oblonga nitida faſciata longitudinaliter ſtriato rugoſa: labro intus ſubdentato.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 60?
Gualt. teſt. t. 52. *f.* C.
Martin. Conch. 4. *t.* 125. *f.* 1194? 1195.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta colore faſciisque varia, ſaepe cingulo nigro circumdata, columellae labio minime replicato.*

laevigatum. 129. B. teſta ovato oblonga nitida fuſco-ſtriata laevi: apertura edentula unilabiata.
Gualt. teſt. t. 52. *f.* B.

Habitat

Habitat in mari mediterraneo, *nitidulo affine, at apertura minime dentata, columellae labio nullo: ſpirae plicis nullis diſtincta, teſta pallida obſolete maculata: ſtriis obſcurioribus.*

lamelloſum. 173. B. teſta ſubplicata transverſim coſtata ſulcata tuberculata lamelloſa brunneo alboque faſciata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 179. *vign.* 21. *f.* A. B.
Martyn Conchol. 2. *f.* 44.
Habitat in freto novae Seelandiae inſulis interjecto.

ſcutulatum. 174. B. teſta laevi brunnea venoſa; anfractibus planiuſculis, cauda obtuſa. *Chemn. Conch.* 10. *vign.* 21. *f.* C. D.
Martyn. Conchol. 2. *f.* 55.
Habitat ad novae Seelandiae *littora.*

Hauſtorium. 175. B. teſta ovata ventricoſa atra: ſpira brevi, columella depreſſa alba, fauce alba, labro introrſum ſtriato crenulato. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 183. *t.* 152. *f.* 1449. 1450.
v. Zorn n. Danz. Abh. 1. *p.* 272. *n.* 95.
Martyn Conchol. 1. *f.* 9.
Habitat ad novae Seelandiae *littora.*

ventricoſum. 187. B. teſta ovato-oblonga fuſca albo ſtriata ſubplicata. *Martyn univ. Conch.* 2. *t.* 47.
Habitat ad Sinum R. Georgii.

teſtudineum. 176. B. teſta ovata laevi maculis albicantibus fuſceſcentibusque alternis interrupte ſeriatis. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 187. *t.* 152. *f.* 1454.
Zorn n. Danz. Abh. 1. *t.* 3. *f.* 5.
Habitat ad novae Seelandiae *littora.*

Catarrhacta. 177. B. teſta ovata ſcabra transverſim confertim ſulcata flammeo undulata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 188. *t.* 152. *f.* 1455.
Habitat ad novam Seelandiam.

tahitenſe. 182. B. teſta turrita transverſim coſtata ſulcataque: ſtria ad anfractuum ſuturam ſpirali noduloſa, apertura ovata, labro ſubplicato. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 202. *t.* 154. *f.* 1477.
Habitat ad Tahiti *littora.*

lamellatum. 187. B. teſta imperforata lamellata alba intus purpurea: labio albo. *Kaemm. Cab. Rudolſt. p.* 134. *n.* 43. *t.* 9. *f.* 2.
Habitat - - - *teſta* 1½ *pollicem longa.*

h Turrita, *laevia ſubulata.*

maculatum. 130. B. teſta ſubfuſiformi: anfractibus laevibus indiviſis integerrimis. *Muſ. Lud. Ulr.* 613. *n.* 269.*
Rumpf muſ. t. 30. *f.* A. Strombus 1.
Liſt. Conch. t. 846. *f.* 74.
Bonann. recr. 3. *f.* 317.
muſ. Kircher. 3. *f.* 313.
Gualt. teſt. t. 56. *f.* I.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* 4.
Knorr Vergn. 3. *t.* 23. *f.* 2. *et* 6. *t.* 19. *f.* 6.
Martin. Conch. 4. *t.* 153. *f.* 1440.
β) *Knorr Vergn.* 3. *t.* 23. *f.* 3?
γ) *Rumpf muſ. t.* 30. *f.* D.
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* 11.
Martin. Conch. 4. *t.* 153. *f.* 1442.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 349. *t.* 2. *f.* 6.
Habitat in Aſiae Africaeque *maribus frequens*, γ) *rarius in* Indiae, *teſta* 8 *pollices longa flaveſcente albo faſciata ſeriatim ſpadiceo maculata, ſpirae anfractibus* 14 *et pluribus laevibus, extimis modo transverſim ſtriatis; in* γ) *omnibus ſtriatis: ſtriis horizontalibus arcuatis.*

ſubulatum. 131. B. teſta ſubulata laevi indiviſa integerrima. ✓
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 4. *f.* 5. Favat.
Liſt. Conch. t. 842. *f.* 70.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 118.
Rumpf muſ. t. 30. *f.* B.
Gualt. teſt. t. 56. *f.* B.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* X.
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* 16. 23. 24. 27. 28.
Martin. Conch. 4. *t.* 153. *f.* 1441.
β) *Knorr Vergn.* 1. *t.* 23. *f.* 4.
Martin. Conch. 4. *t.* 154. *f.* 1443.
γ) *Liſt. Conch. t.* 841. *f.* 69.
Martin. Conch. 4. *t.* 154. *f.* 1446.
δ) *Martin. Conch.* 4. *t.* 154. *f.* 1447.
ε) *Liſt. Conch. t.* 845. *f.* 72. c.
ζ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 56. *f.* 39.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 10. *f.* 9.
Habitat frequens in Oceano indico, *teſta* 5 *fere pollices longa pallida maculis ſubquadratis ferrugineis in ſingulis anfractibus per paria adſcendentibus, teſta minime gibba a maculato diſtinctum.*

crenulatum. 132. B. ſpirae anfractibus bifidis margine crenatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 613. *n.* 270.*
Liſt. Conch. t. 846. *f.* 75.
Rumpf muſ. t. 30. *f.* E.
Gualt. teſt. t. 57. *f.* L.
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* 9. 10.
Knorr Vergn. 1. *t.* 8. *f.* 7.
Martin. Conch. 4. *t.* 154. *f.* 1445.
β) *v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 10. *f.* 8. Buccinum candidum.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 56. *f.* 35?
δ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 56. *f.* 36?
ε) *Argenv. Conch. t.* 11. *f.* Y?
Habitat in mari, Africam *et* Indiam *alluente*, *teſta ultra* 5 *pollices longa, ex carneo ſubfuſca ſaepius exalbida, anfractuum margine inferiori callo crenato cincto, crenarum fuſco ſtriatarum lateri nodulis ſubquadratis adjacentibus, ſingulis quoque punctorum fuſcorum ſerie duplici primo triplici cinctis.*

hecticum. 133. B. ſpirae anfractibus bifidis: margine ſuperiore compreſſo attenuato.
Gualt. teſt. t. 56. *f.* C.
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* 21.
β) *Gualt. teſt. t.* 56. *f.* D.
Habitat in mari, Africam *alluente*, *teſta* 4 *pollices longa et longiori, alba, anfractibus ſingulis faſcia obſoleta luteo maculata cinctis.*

vittatum. 134. B. teſta ſubſtriata: ſutura anfractuum duplici crenulata.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 4. *f.* 2. Rafel.
Liſt. Conch. t. 977. *f.* 34.
Klein oſtrac. t. 7. *f.* 121.
Knorr Vergn. 6. *t.* 36. *f.* 4.
Martin. Conch. 4. *t.* 155. *f.* 1461-1463.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 3. *f.* 8.
Einl. in Conch. 1. *p.* 352. *t.* 2. *f.* 7.
β) *Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 4. *f.* 1. Miran.
Liſt. Conch. t. 977. *f.* 33.
Martin. Conch. 4. *t.* 155. *f.* 1468. 1469. *et t.* 157. *f.* 1491.
γ) *Martin. Conch.* 4. *t.* 155. *f.* 1470.
δ) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 22. *f.* 5.
Martin. Conch. 4. *t.* 155. *f.* 1471.
Habitat in mari Africam *et* Indiam *alluente*, *teſta ultra* 2 *pollicet longa, nunc ex caeruleſcente cinerea: cingulis albis,*

bis, nunc alba: anfractibus extremis rubellis, cinereis aut caeruleſcentibus, ovato-turrita, ſtriis transverſis remotis, apertura ampla: margine nitido albo.

ſtrigilatum. 135. B. ſpirae anfractibus bifidis oblique ſtriatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 614. *n.* 271.
Rumpf muſ. t. 30. *f.* H. Strombus nonus granulatus.
Liſt. Conch. t. 845. *f.* 73.
Knorr Vergn. 6. *t.* 22. *f.* 8. 9.
Martin. Conch. 4. *t.* 155. *f.* 1456.
β) *Liſt. Conch. t.* 979. *f.* 36.
Gualt. teſt. t. 57. *f.* O.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* R.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 11. *f.* 10.
Chemn. Conch. 4. *p.* 235. *vign.* 40. *f.* 1.
γ) *Liſt. Conch. t.* 979. *f.* 37?
δ) *Argenv. Conch. t.* 11. *f.* S?
Habitat in mari Aſiam *auſtralem alluente, teſta ſtraminea aut fuſca,* 2¾ *pollices longa, ſpirae anfractibus* 16-20, *et ultra.*

duplicatum. 136. B. ſpirae anfractibus bipartitis ſtriatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 614. *n.* 272.*
Liſt. Conch. t. 837. *f.* 64.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 110.
Gualt. teſt. t. 57. *f.* N.
Knorr Vergn. 6. *t.* 18. *f.* 6. *et t.* 24. *f.* 5.
Martin. Conch. 4. *t.* 155. *f.* 1455.
β) *v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 10. *f.* 13? Buccinum pertuſum.
Habitat in India, *teſta ultra* 4 *pollices longa, fuſca, cingulis dilutioribus et anfractus primi faſcia anguſta alba, aut chalybea, aut rufeſcente, longitudinaliter ſtriata, anfractibus ſingulis cingulo lato plano bipartitis.*

lanceatum. 137. B. teſta laevi: anfractibus integris; lineis longitudinalibus teſtaceis.
Rumpf muſ. t. 30. *f.* G.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* Z.
Knorr Vergn. 6. *t.* 24. *f.* 4.
Martin. Conch. 4. *t.* 134. *f.* 1450.
Habitat rarum in India, *teſta tenui pellucida ad apicem leviſſime ſtriata cana, ſpira acuta, cauda vix retuſa.*

dimidiatum. 138. B. ſpirae anfractibus bifidis laevibus.
Liſt. Conch. t. 843. *f.* 71.

Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 107.
Rumpf muſ. t. 30. *f. C.*
Gualt. teſt. t. 57. *f.* M.
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* 15. 19.
Knorr Vergn. 1. *t.* 23. *f.* 5. *et* 6. *t.* 18. *f.* 5.
Martin. Conch. 4. *t.* 154. *f.* 1444.
β) *Gualt. teſt. t.* 57. *f.* I?
γ) *v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 10. *f.* 7. Buccinum ferruginlum.
Habitat in mari Africam *et* Indiam *alluente, teſta ultra* 4 *pollices longa, lateritia maculis undatis faſciisque albis.*

murinum. 139. B. ſpirae anfractibus ſubangulatis: ſtriis tribus muricatis.
Gualt. teſt. t. 57. *f.* P.
Habitat ad Africam, *teſta nigra baſi gibba, anfractibus ſaepe baſi albis.*

tigrinum. 140. B. teſta pellucida alba rufeſcenti-punctata: anfractibus ſingulis dorſo ſubemarginatis.
Gualt. teſt. t. 56. *f.* G.
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* A.
Martin. Conch. 4. *t.* 154. *f.* 1448.
Habitat - - - teſta minuta.

Acus. 141. B. teſta acuta exalbida lineis undulatis horizontalibus, anfractibus bifidis crenulatis rugoſis, columella ſpiraliter torta.
Martin. Conch. 4. *t.* 154. *f.* 1449.
Habitat - - - teſta $1\frac{1}{2}$ *pollicem circiter longa.*

ſuccinctum. 142. B. teſta ſubulata horizontaliter ſtriata: anfractibus ſingulis cingulatis.
Martin. Conch. 4. *t.* 154. *f.* 1451.
Habitat frequens in Oceano indico, *teſta alba vel ſtraminea.*

commaculatum. 143. B. teſta ſubulata lituris flavis et rufeſcentibus varia: anfractibus planiuſculis transverſim ſtriatis cingulo elevato cinctis.
Martin. Conch. 4. *t.* 154. *f.* 1452.
β) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 22. *f.* 8. 9?
Habitat - - - teſta alba aut cana.

haſtatum. 144. B. teſta ſubventricoſa: anfractibus perpendiculariter ſtriatis; faſciis alternis fuſcis albisque.
Martin. Conch. 4. *t.* 154. *f.* 1453. 1454.
Habitat - - - teſta vix $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa.*

aciculatum. 145. B. teſta alba: faſciis fuſcis punctorum excavatorum.
Martin. Conch. 4. *t.* 155. *f.* 1457.
Habitat - - -

Phallus. 146. B. ſpirae anfractibus longitudinaliter coſtatis baſi ſutura rugoſa, labro prominulo ſuperne emarginato.
Martin. Conch. 4. *t.* 155. *f.* 1464. 1465.
Schroet. Flusconch. p. 401. *n.* 194.
Habitat in Indiae, *an fluviis? teſta tenui ſub epidermide fuſca flavicante, ſubfuſca aut ruſeſcente diaphana, coſtis albis, intus laevis; ſpirae anfractibus* 9, *coſtis ſubincurvis.*

flumineum. 147. B. ſpirae anfractibus convexis diſtantibus transverſim ſtriatis: ſuperioribus horizontaliter coſtatis.
Liſt. Conch. t. 118. *f.* 13.
Martin. berl. Mag. 4. *t.* 10. *f.* 52.
Habitat in - - - *aquis dulcibus, teſta* 3½ *pollices longa.*

aſperum. 148. B. ſpirae anfractibus coſtatis transverſim ſtriatis: primo gibbo, cauda prominula.
Liſt. Conch. t. 925. *f.* 17.
β) *Liſt. Conch. t.* 925. *f.* 18.
Habitat - - - *teſta* 1½ *pollicem longa.*

muricinum. 149. B. teſta reticulata rugoſa: ſpira incurvata, apertura crenata; columella rugoſa, labro incraſſato. *Gron. zooph. p.* 308. *n.* 1381.
Liſt. Conch. t. 926. *f.* 19.
Habitat - - - *murici clathrato affine; an hujus tribus?*

tuberculatum. 150. B. ſpirae anfractibus ſingulis tuberculorum ſerie cinctis.
Liſt. Conch. t. 958. *f.* 11. b.
Habitat - - - *teſta exili.*

punctulatum. 151. B. teſta ſubulata punctata transverſim ſtriata; apertura obovata, ſpirae anfractibus faſcia cinctis; primo ventricoſo.
Liſt. Conch. t. 979. *f.* 38.
Habitat - - - *teſta vix pollicem longa.*

Acicula. 152. B. teſta ſubulata laevi tenuiſſima ſubtiliſſime transverſim ſtriata: ſpirae anfractibus contiguis.
Liſt. Conch. t. 1055. *f.* 7.
Habitat in - - - *aquis dulcibus, teſtae apertura ovali.*

faſciolatum. 153. B. teſtae apertura ovato-oblonga: anfractibus ventricoſis diſtantibus horizontaliter ſtriatis: ſtriis elevatis faſcia intermedia ſejunctis.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 45.
Klein oſtr. t. 7. *f.* 123.
Habitat - - -

niveum. 154. B. teſta ſubulata laevi nivea bifaſciata: ſpirae anfractibus contiguis.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 109.
Klein oſtr. t. 7. *f.* 117.
Habitat - - -

mucronatum. 155. B. teſta ſubventricoſa alba fuſco undulata: apertura ovali.
Bonann. muſ. Kirch. 3. *f.* 400.
Habitat - - - *teſta ultra* 3 *pollices longa, ſpirae anfractibus* 5.

Digitellus. 156. B. teſta rudi apice obtuſa ſubincurva.
Rumpf muſ. t. 29. *f.* Q.
Habitat in India, *teſta* ½ *pollicem longa, nunc granulata griſea et faſciata, nunc laeviſſima nivea.*

obliquum. 157. B. ſpirae anfractibus integris oblique decuſſatimque ſtriatis.
Rumpf muſ. t. 30. *f.* F. Strombus ſeptimus.
Habitat in India, *ſtrigilato affine, teſta digiti longitudine, calami craſſitie.*

chalybeum. 158. B. teſta ſubangulata ſulcata.
Rumpf muſ. t. 30. *f.* 1. Strombus chalybeus.
Habitat in India, *teſta* 1¼ *pollicis longa chalybea, aut albo nigroque punctata.*

fluviatile. 159. B. teſta tenui: anfractibus contiguis, cauda ſubemarginata.
Rumpf muſ. t. 30. *f.* P. Strombus fluviatilis.
Mart. berl. Mag. 4. *t.* 9. *f.* 39.
Habitat in Indiae fluviorum oſtiis *limoſis, teſta opaca ex cinereo viridi,* 4-5 *pollices longa, interdum nigro lineata.*

radiatum. 160. B. teſta ſubulata albida rufeſcenti-radiata: anfractibus convexis ſtriis granulatis cinctis; primo ventricoſo ſecundo duplo majore.
Gualt. teſt. t. 52. *f.* D.
Habitat - - -

lividu-lum. 161. B. ſpirae anfractibus longitudinaliter rugoſis transverſim granulato-ſtriatis: anfractu primo altero duplo majore.
Gualt. teſt. t. 56. *f.* F.
Habitat - - - *teſta pollicem circiter longa.*

edentu-lum. 162. B. anfractibus maculatis, apertura elongata edentula, columella plicata.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* O.
Habitat - - -

Pugio. 163. B. teſta longitudinaliter ſtriata: faſciis punctatis maculatis inter anfractus intermediis.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* Q.
Habitat - - - *ſtrigilato affine.*

canalicu-latum. 164. B. teſta maculata: ſpirae anfractibus canaliculatis.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* T.
Habitat - - - *ſpirae anfractibus* 17.

varico-ſum. 165. B. ſpirae anfractibus convexis coronatis bifariam, primo trifariam punctatis.
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* 17.
Habitat - - - *teſta* $3\frac{1}{2}$ *pollices longa.*

cuſpida-tum. 166. B. teſta ſubulata maculata: anfractibus convexis ſubremotis.
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* 20.
Habitat - - -

cinereum. 167. B. teſta ſubulata laevi cinerea obſolete faſciata: anfractibus indiviſis ad ſuturam longitudinaliter ſtriatis.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 10. *f.* 11. 12.
Habitat - - - *teſta parum infra* 2 *pollices longa*; *ſpirae anfractibus* 14.

virgini-cum. 168. B. teſta ex vireſcente flava: faſciis duabus ſanguineis, ſpirae anfractibus planiuſculis, apertura ampla ovali.
Liſt. Conch. t. 113. *f.* 7.
Martin. berl. Magaz. 4. *p.* 347. *t.* 10. *f.* 48.
Habitat in Virginiae *fluviis.*

proxima-tum. 169. B. ſpirae anfractibus bifidis, inferiore ſubſtriato, ſuperiore filiformi. *Mant.* 2. *p.* 550.
Habitat - - - *teſta ſubulata nitida.*

Monile. 170. B. ſpirae anfractibus bifidis: inferiore ſulcato, ſuperiore moniliformi. *Mant.* 2. *p.* 550.
Habitat - - - *teſta ſubulata albida ſubflaveſcente.*

cingulatum. 171. B. cingulis tribus elevatis ſupra infraque canaliculatis. *Mant.* 2. *p.* 550.

Habitat in Islandia, *murici doliario affine, teſta ovata, cinerea, transverſim ſtriata, pruni minoris magnitudine: cingulis laevibus, ventris 3, ſpirae 2, anfractibus ſupra planiuſculis, apertura obovata, columella planiuſcula.*

geminum. 172. B. ſpirae anfractibus bifidis: inferiore ſubſtriato, ſuperiore protuberantiore. *Mant.* 2. *p.* 550.

Habitat - - - teſta ſubulata alba.

324. STROMBUS. *Animal* Limax.

Teſta univalvis, ſpiralis, latere ampliata.

Apertura labro ſaepius dilatato, deſinens in canalem ſiniſtrum.

* Digitati, *labio in lacinias lineares exeunte.*

Fuſus. 1. Str. teſta turrita laevi: cauda ſubulata, labro dentato.
Muſ. Lud. Ulr. 638. *n.* 316. Murex Fuſus.
Liſt. Conch. t. 854. *f.* 12.
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* 1.
Knorr Vergn. 5. *t.* 6. *f.* 1. *et t.* 7. *f.* 1.
Martin. Conch. 4. *t.* 158. *f.* 1495. 1496.
Spengl. ſelt. Conch. t. 3. *f.* B.
Chemn. Naturf. 9. *t.* 6. *f.* 2.
Schroet. Journ. 5. *t.* 1. *f.* 2.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 56. *f.* 3.
Martin. Conch. 4. *t.* 158. *f.* 1497.
γ) *Liſt. Conch. t.* 854. *f.* 11. *et t.* 916. *f.* 9.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 121.
Argenv. Conch. t. 10. *f.* D.
Klein oſtr. t. 4. *f.* 77.
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* 2.
Martin. Conch. 4. *t.* 159. *f.* 1500.
Chemn. Conch. 4. *p.* 344. *vign.* 41.
Habitat frequens in mari rubro, γ) *rariſſimus, teſta fuſca, laevi, ad baſin transverſim ſtriata, columella alba, cauda extrinſecus nigra, dubii generis, labro dentato cum ſtrombis conve-*

conveniens, cauda magis recta recedens, a muricibus teſta laevi.

Pes pelecani. 2. Str. teſta labro tetradactylo palmato digitis angulato, fauce laevi. *Fn. ſuec.* 2164.* *Muſ. Lud. Ulr.* 615. *n.* 273.*
Liſt. Conch. t. 865. *f.* 20. *t.* 866. *f.* 21. b. *et t.* 1059. *f.* 3.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 85. 87.
Gualt. teſt. t. 53. *f.* A. B. C.
Argenv. Conch. t. 41. *f.* M.
Klein oſtr. t. 2. *f.* 41. 42.
Leſſer teſtaceoth. f. 80.
Seb. muſ. 3. *t.* 62. *f.* 17.
Muſ. Gottwald. t. 18. *f.* 130. a. b.
Knorr Vergn. 3. *t.* 7. *f.* 4.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 21.
Müll. zool. dan. 3. *p.* 10. *t.* 87. *f.* 1. 2.
Martin. Conch. 3. *t.* 85. *f.* 848-850.
Habitat frequens in Oceano europaeo, norwegico, mediterraneo, americano, *teſta vix 2 pollices longa mucronata, exalbida, cinerea aut rufeſcente, intus alba laevi nitida, anfractibus trifariam, rarius bifariam tuberculatis.*

Chiragra. 3. Str. teſtae labro hexadactylo: digitis curvis, cauda recurvata. *Muſ. Lud. Ulr.* 615. *n.* 274.*
Rumpf muſ. t. 35. *f.* A. Harpago.
Liſt. Conch. t. 870. *f.* 24.
Gualt. teſt. t. 35. *f.* B.
Leſſer teſtaceoth. f. 81.
Beſl. gazoph. t. 22. *f.* 2.
Lochn. muſ. Beſler. t. 21. *f.* 6.
Seb. muſ. 3. *t.* 82. *f.* 1. 6. 7. 9. 10. 12.
Muſ. Gottwald. t. 20. *f.* 141. b.
Knorr delic. t. B. 11. *f.* 1.
Vergn. 1. *t.* 27. *f.* 1.
Martin. Conch. t. 86. *f.* 853. 854. *et t.* 87. *f.* 856. 857.

Strombi *junioris teſtae carent labro, et turbinatam figuram referunt, perperam hinc ab autoribus ad diſtincta genera relatae: Cui* ſtromborum *tribui adſcribendae teſtae a* Liſtero *Conch. t.* 848. *f.* 2-4. *et t.* 859. *f.* 15. *a* Bonanni *recr* 3. *f.* 292. *et muſ. Kirch.* 3. *f.* 294. *a* Gualtieri *teſt. t.* 28. *f.* H. *t.* 31. *f.* L. *et t.* 32. *f.* C. *Seb. muſ.* 3. *t.* 52. *f.* 17. 18. *t.* 61. *f.* 26. 27. 40. 48. 49. 54 *t.* 62. *f.* 42. 43. *Knorr Vergn.* 5. *t.* 22. *f.* 4. *et minus adultae a* Liſtero *t.* 890. *f.* 10. a. *a* Bonanni *recr.* 3. *f.* 291. *et muſ. Kirch.* 3. *f.* 293. *a* Seba *muſ.* 3. *t.* 61. *f.* 22. 23. *t.* 62. *f.* 33. *et t.* 83. *f.* 8. 9. 11. *delineatae.*

b) junior.

Liſt. Conch. t. 875. *f.* 31. *et t.* 883. *f.* 6.
Bonann. recr. 3. *f.* 314. 315.
muſ. Kircher. 3. *f.* 317.
Rumpf muſ. t. 35. *f.* B. C. *et t.* 37. *f.* 1. Harpago femina.
Gualt. teſt. t. 26. *f.* B. *et t.* 35. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 62. *f.* 34. *t.* 73. *f.* 29. *et t.* 83. *f.* 1. 2.
Muſ. Gottwald. t. 21. *f.* 144. b.
Martin. Conch. t. 85. *f.* 851. 852. *et t.* 92. *f.* 895-901.

Habitat pretioſus in Oceano indico, *teſta grandi, fuſca albo varia, dorſo tuberculis coronata, fauce ſanguinolenta in labio interiore ſubſtriata, labio ſubtus antrorſum rima diſtincto, inter digitos poſteriores ad caudam hiante, digitis una cum cauda 6, antrorſum incurvatis, longis, infimis duobus furcae inſtar divergentibus, ſubtus ſutura coalitis.*

Scorpius. 4. Str. teſtae labro heptadactylo: digitis nodoſis; poſteriore longiſſimo. *Muſ. Lud. Ulr.* 616. *n.* 275.*

Rumpf muſ. t. 36. *f.* K. ; Cornuta nodoſa.
Argenv. Conch. t. 14. *f.* B. Scorpio.
Liſt. Conch. t. 867. *f.* 22.
Bonann. recr. 3. *f.* 312. 313.
muſ. Kirch. 3. *f.* 316.
Valent. Abh. t. 3. *f.* 28.
Gualt. teſt. t. 36. *f.* C.
Seb. muſ. 3. *t.* 82. *f.* 11. 15.
Muſ. Gottwald. t. 21. *f.* 144. a.
Knorr Vergn. 2. *t.* 3. *f.* 1.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 29.
Martin. Conch. t. 88. *f.* 860.

Habitat rarior in Oceano indico, *teſta ad* 4 *pollices longa, craſſa, dorſo transverſim ſtriata et trifariam tuberculata, fauce violacea ſtriata, utrinque dentibus albis armata.*

Lambis. 5. Str. teſtae labro heptadactylo: digitis rectiuſculis, fauce laevi. *Muſ. Lud. Ulr.* 617. *n.* 276.*

Rondel. teſt. 79. *f.* 71. Aporrhais.
Barrel. rar. 1326. *f.* 7.
Rumpf muſ. t. 35. *f.* F. H.
Gualt. teſt. t. 36. *f.* A. B.
Leſſer teſtaceoth. f. 82.
Seb. muſ. 3. *t.* 82. *f.* 8.
Muſ. Gottwald. t. 20. *f.* 141. a.

Martin. Conch. 3. *t.* 86. *f.* 855. *et* (a) *t.* 91. *f.* 888.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 2. *f.* 1.
Chemn. Naturf. 9. *t.* 6. *f.* 1. (a).
β) *Rumpf muſ. t.* 35. *f.* E. Cornuta.
Argenv. Conch. t. 14. *f.* E. Lambis.
Gualt. teſt. t. 35. *f.* C.
Seb muſ. 3. *t.* 82. *f.* 2. 3. 5. 16. 17. 20.
Knorr Vergn. 1. *t.* 28. *f.* 1.
Muſ. Gottwald. t. 21. *f.* 139. a. *f.* 142.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 4. *f.* 45.
Martin. Conch. 3. *t.* 87. *f.* 858. 859.
a) *Rumpf muſ. t.* 35. *f.* D.
Gualt. teſt. t. 30. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 61. *f.* 9. 10. *et t.* 83. *f.* 10.
Knorr Vergn. 2. *t.* 27. *f.* 4.
Muſ. Gottwald. t. 28. *f.* 205. a. b.
Martin. Conch. 3. *t.* 90. *f.* 884. *et t.* 91. *f.* 889.
Schroet. Einl. in Verſtein. 4. *t.* 8. *f.* 4.
b) *Liſt. Conch. t.* 866. *f.* 21.
Rumpf muſ. t. 36. *f.* G.
Seb. muſ. 3. *t.* 82. *f.* 18. 19.
Muſ. Gottwald. t. 18. *f.* 128. b. *t.* 20. *f.* 140. *t.* 21. *f.* 139. b. *et f.* 143.
Knorr Vergn. 3. *t.* 7. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 92. *f.* 902. 903.
γ) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 4. *f.* 3.
Chemn. Conch. 10. *t.* 158. *f.* 1508. 1509.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 469. *t.* 2. *f.* 15. *et* 2. *t.* 7. *f.* 4.
δ) *Chemn. Conch.* 10. *p.* 205. *t.* 155. *f.* 1478.

Habitat in mari Aſiam auſtralem *alluente, teſta ſaepius grandi fuſca albo varia: fauce rufeſcente, digitis non nodoſis.*

Millepeda. 6. Str. teſtae labro decadactylo: digitis inflexis, fauce ſubſtriata, dorſo gibbere compreſſo. *Muſ. Lud. Ulr.* 618. *n.* 277.*
Rumpf muſ. t. 36. *f.* I. Cornuta millepeda.
Argenv. Conch. t. 15. *f.* B. Millepeda (b.)
Liſt. Conch. t. 868. *f.* 23. *et t.* 869. *f.* 23.
Bonann. recr. 3. *f.* 311.
muſ. Kirch. 3. *f.* 315.
Martin. Conch. 3. *t.* 88. *f.* 861. 862. *et* (a) *t.* 93. *f.* 906. 907.
β) *Chemn. Conch.* 10. *p.* 207. *t.* 155. *f.* 1479. 1480.
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 157. *f.* 1494. 1495.

Habitat paulo rarior in mari Aſiam auſtralem *alluente.*

7. Str.

Clavus. 7. Str. teſta territa laevi: cauda ſubulata, labro ſimplici.
Mant. 2. *p.* 549.
Argenv. Conch. t. 10. *f.* A.
Martin. Conch. 4. *t.* 159. *f.* 1501. 1502.

** Lobati.

lentiginoſus. 8. Str. teſtae labro anterius trilobo incraſſato, dorſo verrucoſo coronato, cauda obtuſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 619. *n.* 378.*
Rondel. teſt. 91. Turbo auritus.
Rumpf muſ. t. 37. *f.* Q. Lentiginoſa.
Barrel. rar. 1326. *f.* 4. *et* 1327. *f.* 5.
Liſt. Conch. t. 861. *f.* 18.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 300.
Gualt. teſt. t. 32. *f.* A.
Argenv. Conch. t. 15. *f.* C.
Seb. muſ. 3. *t.* 62. *f.* 11. 30.
Muſ. Gottwald. t. 17. *f.* 128. b. †. c. †. d. †.
Knorr Vergn. 3. *t.* 13. *f.* 2. *et t.* 26. *f.* 2. 3.
Martin. Conch. 3. *t.* 80. 81. *f.* 825-828.
a) *Seb. muſ.* 3. *t.* 61. *f.* 7.
Muſ. Gottwald. t. 17. *f.* 128. a. †.
Martin. Conch. 3. *t.* 78. *f.* 800-802. *et t.* 91. *f.* 892.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 52. *f.* 17. 18.
Knorr Vergn. 3. *t.* 26. *f.* 2. 3.
Chemn. Conch. 10. *t.* 158. *f.* 1510. 1511.
Habitat in Aſia auſtrali *et* Africa, *teſta fuſca aut rufeſcente, ranae inſtar varia,* 3½ *pollices longa, ponderoſa, apertura glabra, rarius ex atro violacea, crebrius cum labro et columella matris perlarum inſtar nitente; operculum inter blattas byzantinas.*

faſciatus. 9. Str. teſtae labro integro, dorſo trifariam verrucis coronato inter verrucas roſeo.
Liſt. Conch. t. 860. *f.* 17.
Bonann. recr. 3. *f.* 306.
muſ. Kircher. 3. *f.* 307.
Klein oſtr. t. 6. *f.* 107.
Seb. muſ. 3. *t.* 62. *f.* 6-8.
Muſ. Gottwald. t. 17. *f.* 127.
Knorr Vergn. 3. *t.* 17. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 82. *f.* 833. 834.
a) *Liſt. Conch. t.* 883. *f.* 5.
Knorr Vergn. 5. *t.* 16. *f.* 4.

Martin.

Martin. Conch. 3. *t.* 90. *f.* 880. *et t.* 91. *f.* 893.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 155. *f* 1483. 1484.
Habitat in Africa, *teſta tenuiori, duplo longiori, labro magis prominulo a lentiginoſo diſtinctus, teſta ceterum alba, anfractibus plurimis ſimplici verrucarum corona cinctis.*

raninus. 10. Str. teſtae labro tenui rugoſo ſuperne repando, dorſo aurantio transverſim ſtriato verrucis coronato, apertura alba nitida.
Knorr Vergn. 6. *t.* 29. *f.* 8.
Habitat - - -

Gallus. 11. Str. teſtae labro anterius mucronato longiſſimo, dorſo coronato, cauda recta. *Muſ. Lud. Ulr.* 619. *n.* 279.*
Rumpf muſ. t. 37. *f.* 5. Laphoon.
Liſt. Conch. t. 874. *f.* 30.
Bonann. recr. 3. *f.* 309. 310.
muſ. Kirch. 3. *f.* 310. 311.
Gualt. teſt. t. 32. *f.* M.
Seb. muſ. 3. *t.* 62. *f.* 1.
Muſ. Gottwald. t. 18. *f.* 129. a.
Knorr delic. t. B. IV. *f.* 3.
Vergn. 4. *t.* 12. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 84. *f.* 841. 842. *et t.* 85. *f.* 846.
β) *Liſt. Conch. t.* 871. *f.* 25.
Bonann. recr. 3. *f.* 307. 308.
muſ. Kirch. 3. *f.* 308. 309.
Valent. Abh. t. 10. *f.* 91.
Gualt. teſt. t. 32. *f.* F.
Klein oſtr. t. 6. *f.* 108.
Seb. muſ. 3. *t.* 62. *f.* 4. 5. 9. 10. 12. 14. 15. 27.
Muſ. Gottwald. t. 19. *f.* 133. a.
Knorr Vergn. 3. *t.* 11. *f.* 1.
Martin Conch. 3. *t.* 83. *f.* 836. 837.
a) *Liſt. Conch. t.* 891. *f.* 11.
Muſ. Gottwald. t. 28. *f.* 199. a. 201.
Seb. muſ. 3. *t.* 62. *f.* 35-37.
Knorr Vergn. 5. *t.* 9. *f.* 5.
γ) *Martin. Conch.* 3. *t.* 89. *f.* 871. *et t.* 91. *f.* 891.
Seb. muſ. 3. *t.* 63. *f.* 6.
δ) *Martin. Conch.* 3. *t.* 84. *f.* 843-845.
ε) *Liſt. Conch. t.* 873. *f.* 29.
Martin. Conch. 3. *t.* 85. *f.* 847.
a) *Argenv. Conch. t.* 14. *f.* K.

Martin.

Martin. Conch. 3. *t.* 91. *f.* 890.
ζ) *Schroet. Einl. in Conch.* 1. *p.* 453. *t.* 11. *f.* 13.
η) *Seb. muſ.* 3. *t.* 62. *f.* 3?
ϑ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 62. *f.* 2.
Spengl. ſelt. Conch. t. 3. *f.* A.
Chemn. Conch. 10. *t.* 158. *f.* 1506. 1507.
Habitat in mari Aſiam Americamque auſtralem *alluente, etiam rubro, teſta cum mucrone bipollicari 6 pollicea longo, nunc unicolore fuſca, flava aut violacea, nunc maculis radiisque varia lata, dorſo coſtis laevibus, nunc ſimplicibus, nunc duplicibus cincto, anfractu primo corona tuberculorum, in ſequentibus vix conſpicuorum.*

Auris Dianae. 12. Str. teſtae labro mucronato, dorſo muricato, cauda erecta acuta. *Muſ. Lud. Ulr.* 620. *n.* 280.*
Rumpf muſ. t. 37. *f.* R. Pugiles.
Argenv. Conch. t. 14. *f.* O. Auris Dianae.
Liſt. Conch. t. 872. *f.* 28.
Bonann. recr. 3. *f.* 301. 302.
muſ. Kircher. 3. *f.* 302. 303.
Gualt. teſt. t. 32. *f.* D. H.
Klein oſtr. t. 6. *f.* 106.
Leſſer teſtaceoth. t. 79.
Muſ. Gottwald. t. 19. *f.* 131. a-k. *f.* 132. *f.* 133. b. *f.* 135. a.
Seb. muſ. 3. *t.* 61. *f.* 3-6. *et t.* 62. *f.* 13.
Knorr Vergn. 2. *t.* 15. *f.* 1. 2.
Martin. Conch. 3. *t.* 84. *f.* 838. 839.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 2. *f.* 9.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 61. *f.* 1. 2. *et t.* 62. *f.* 16.
Martin. Conch. 3. *t.* 84. *f.* 840.
γ) *Liſt. Conch. t.* 871. *f.* 26.
δ) *Favann. Conch. t.* 21. *f.* A².
Martyn Conch. 1. *f.* 1.
Chemn. Conch. 10. *t.* 156. *f.* 1485. 1486.
ε) *Liſt. Conch. t.* 872. *f.* 27.
Chemn. Conch. 10. *t.* 156. *f.* 1487. 1488.
Habitat in mari Aſiam auſtralem *alluente, teſta vix ultra 3 pollices longa, craſſa, rarius unicolore, quam variegata, dorſo trifariam vel quadrifariam tuberculis acutis coronato, interſtitiis ſeriatum transverſim coſtatis, anfractibus extimis cancellatis, fauce incarnata, columella alba.*

Pugilis. 13. Str. teſtae labro anteriori prominente rotundato laevi, ſpira ſpinoſa, cauda triloba obtuſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 620. *n.* 281.*

Liſt.

Liſt. Conch. t. 864. *f.* 19.
Bonann. recr. 3. *f.* 229. 299.
muſ. Kircher. 3. *f.* 229. 301.
Gualt. teſt. t. 32. *f.* B.
Argenv. Conch. t. 15. *f.* A.
Muſ. Gottwald. t. 17. *f.* 125. 125. a. b. 126. a. b.
Knorr Vergn. 1. *t.* 9. *f.* 1. *et* 3. *t.* 16. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 81. *f.* 830. 831.
a) *Rumpf muſ. t.* 36. *f.* 6.
Gualt. teſt. t. 31. *f.* G.
Seb. muſ. 3. *t.* 62. *f.* 44. 50.
Muſ. Gottwald. t. 28. *f.* 202. a. b. c. 203. 204. a. b. 207. a.
Knorr Vergn. 1. *t.* 30. *f.* 1. *et* 6. *t.* 29. *f.* 6. 7.
Mart. Conch. 3. *t.* 90. *f.* 882. 883.
Schroet. Einl. in Verſtein. 4. *t.* 8. *f.* 9.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 156. *f.* 1493.
Habitat in Oceano, Jamaicam *et* auſtralem Americam *alluente, teſta incarnata, rufeſcente aut ſubfuſca, intus ſpiraque dilutiore nitida, labro intus ſubdentato, dorſo laevi, ſpirae anfractu primo ſpinis coronato, in ſequentibus ſenſim evanidis, anfractibus extimis cancellatis.*

alatus. 14. Str. teſtae labro anteriori prominente rotundato laevi, ſpira inermi, cauda triloba obtuſa.
Martin. Conch. 3. *t.* 91. *f.* 894.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 454. *t.* 2. *f.* 14.
Habitat - - - teſta fuſca: faſcia alba fuſco maculata, ſpira alba fuſco radiata et undulata, ventre et columella dilute badiis, cauda incarnata, fauce alba, labro intus fuſco caeruleo rubroque nitente, ad marginem incarnato, dorſo laevi ad baſin tuberculis ſubacutis coronato.

marginatus. 15. Str. teſtae labro prominulo, dorſo marginato laevi, cauda integra.
Martin. Conch. 3. *t.* 79. *f.* 816.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 431. *t.* 2. *f.* 10.
Chemn. Conch. 10. *t.* 156. *f.* 1489. 1490.
Habitat rarior - - - teſta ex fuſco lutea: faſciis anguſtis albis filis fuſcis interruptis, anfractibus primis dilute ſubfuſcis extimis roſeis, labro columellaque niveis, intus dentatis, dorſo laevi, anfractibus 4 primis marginatis.

Luhuanus. 16. Str. teſtae labro prominulo, dorſo laevi, anfractibus rotundatis aequalibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 621. *n.* 282.*
Rumpf muſ. t. 37. *f.* S. Luhuana.

Liſt.

Liſt. Conch. t. 850. *f.* 5. *et t.* 851. *f.* 6.
Gualt. teſt. t. 31. *f.* H. I.
Argenv. Conch. t. 14. *f.* N. (*deſcr.*)
Seb. muſ. 3. *t.* 61. *f.* 11. 12. 20. *et t.* 62. *f.* 31. 32.
Knorr Vergn. 5. *t.* 16. *f.* 5. *et* 6. *t.* 15. *f.* 3.
Martin. Conch. 3. *t.* 77. *f.* 789-791. 799.
a) *Liſt. Conch. t.* 849. *f.* 4. a.
Seb. muſ. 3. *t.* 61. *f.* 13. 14.
Muſ. Gottwald. t. 28. *f.* 191. a. b.
Martin. Conch. 3. *t.* 88. *f.* 865-869.
β) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 17. *f.* 2.
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 157. *f.* 1499. 1500.
Habitat frequens in mari Aſiam auſtralem *alluente, teſta alba crebro radiata aut transverſim faſciata,* 2½ *pollices circiter longa, columella nigro-lineata, fauce rubra, labro rufeſcente.*

gibberulus. 17. Str. teſtae labro prominulo, dorſo laevi, anfractibus gibboſis inaequalibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 621. *n.* 283.*
Rumpf muſ. t. 37. *f.* V. Canarium.
Liſt. Conch. t. 847. *f.* 1.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 150.
Valent. Abh. t. 7. *f.* 64.
Gualt. teſt. t. 31. *f.* N.
Argenv. Conch. t. 14. *f.* N. (*ic.*)
Seb. muſ. 3. *t.* 61. *f.* 17-19. 51-53. *et t.* 62. *f.* 48. 49.
Muſ. Gottwald. t. 28. *f.* 190. a. b. c. *f.* 195.
Knorr Vergn. 2. *t.* 14. *f.* 3. *et* 3. *t.* 13. *f.* 4.
Martin. Conch. t. 27. *f.* 792-798.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 3. *f.* 3.
a) *Muſ. Gottwald. t.* 28. *f.* 190. d.
Seb. muſ. 3. *t.* 61. *f.* 21.
Martin. Conch. 3. *t.* 88. *f.* 863. 864.
Habitat in mari, Aſiam auſtralem *alluente, teſta alba, crebro faſciata, maculata, aut nebuloſa, labro intus ſtriato et columella intus partim nunc caeruleis vel caeruleſcentibus, nunc rubellis, vel rubris.*

Oniſcus. 18. Str. teſta obovata cingulis nodoſis, mucrone ſubulato laevi.
Liſt. Conch. t. 791. *f.* 44.
Valent. Abh. t. 4. *f.* 33.
Gualt. teſt. t. 22. *f.* I.
Muſ. Gottwald. t. 26. *f.* 179. b. 180.
Seb. muſ. 3. *t.* 55. *f.* 23.
Knorr Vergn. 4. *t.* 12. *f.* 4. *et* 6. *t.* 15. *f.* 4.

Martin. Conch. 2. *t.* 34. *f.* 357. 358.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 4. *f.* 8.
Habitat in Oceano, Americam *auſtralem alluente, teſta vix ultra pollicem longa, avellanae magnitudine, pallida maculis nigricantibus, nodis trifariam longitudinaliter diſpoſitis, cauda nulla baſique vix manifeſte emarginata, ſpira obtuſiſſima cingulo ſolitario noduloſo, apertura alba longitudinali, columella laevi, labro exteriore vix repando; an hujus generis?*

*** Ampliati.

Lucifer. 19. Str. teſtae labro anterius rotundato integro, ventre dupliciter ſtriato, ſpira coronata: tuberculis ſuperioribus minutis.
Liſt. Conch. t. 887. *f.* 8. *et t.* 888. *f.* 9.
Bonann. recr. 3. *f.* 288. 303.
muſ. Kircher. 3. *f.* 289. 305.
Barrel. rar. t. 1327. *f.* 7.
Rumpf muſ. t. 49. *f.* M.
Valent. Abh. t. 10. *f.* 88.
Gualt. teſt. t. 54. *f.* M. *et t.* 55. *f.* A. B.
Argenv. Conch. t. 14. *f.* I.
Klein oſtr. t. 4. *f.* 85.
Leſſer teſtaceoth. f. 75.
Seb. muſ. 3. *t.* 61. *f.* 8? *et t.* 62. *f.* 38-40.
Muſ. Gottwald. t. 28. *f.* 199. b. 200. a. b. c. *et t.* 31. *f.* 215-217.
Knorr Vergn. 2. *t.* 29. *f.* 1. *et* 3. *t.* 5. *f.* 4. *et t.* 16. *f.* 4.
Martin. Conch. 3. *t.* 90. *f.* 878. 879. 881. 885. 886.
β) *Valent. Abh. t.* 10. *f.* 90.
γ) *Gualt. teſt. t.* 48. *f.* F?
δ) *Bonann. recr. et muſ. Kirch.* 3. *f.* 86?
ε) *Liſt. Conch. t.* 886. *f.* 7?
ζ) *Gualt. teſt. t.* 54. *f.* M.
Habitat in Oceano, Americam auſtralem *alluente, teſta variegata, tenuiori, ſpiniſque longe minoribus armata, quam in Str. Gigante; nonne aetate minore ſolummodo ab hoc diverſus?*

Gigas. 20. Str. teſtae labro rotundato maximo, coronata ventre ſpiraque ſpinis conicis patentibus.
Aldrov. exang. Rondel. piſc. 76. Murex marmoreus.
Geſn. aq. 340. Conchylium.
Lochn. muſ. Besler. t. 20. Murex aculeata.
Columm. aq. t. 60. *f.* 5.

Bonann. recr. 3. *f.* 304. 321. 404. 405.
muſ. Kircher. 3. *f.* 304. 321. 385. 386.
Gualt. teſt. t. 33. *f.* A. *et t.* 34.
Olear. muſ. t. 32. *f.* 5.
Muſ. Gottwald. t. 18. *f.* 128. a.
Martin. Conch. 3. *t.* 80. *f.* 824.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 1. *f.* 1.
Habitat in Oceano, Americam auſtralem *alluente, teſta ad* 11 *pollices longa,* 9 *lata nitente alba, intus vivide roſea, perquam ſolida.*

latiſſimus. 21. Str. teſtae labro rotundato maximo, ventre inermi, ſpira ſubnodoſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 622. *n.* 284.*
Rumpf muſ. t. 36. *f.* L. Alata lata.
Liſt. Conch. t. 856. *f.* 12. c. *et t.* 862. *f.* 18. a.
Seb. muſ. 3. *t.* 63. *f.* 1-3.
Martin. Conch. 3. *t.* 82. *f.* 832. *et t.* 83. *f.* 835.
α) *Seb. muſ.* 3. *t.* 83. *f.* 12-14.
Martin. Conch. 3. *t.* 89. *f.* 874.
β) *Martin. Conch.* 3. *t.* 89. *f.* 875. 876.
Habitat rarior in mari, Aſiam auſtralem *alluente, teſta ſolida, ad* 14 *pollices longa, fuſco alboque varia, interdum radiata, labro intus albo, fauce roſea.*

Epidromis. 22. Str. teſtae labro rotundato brevi, ventre laevi, ſpira ſubnodoſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 622. *n.* 285.*
Rumpf muſ. t. 36. *f.* M. Epidromis.
Liſt. Conch. t. 853. *f.* 10.
Seb. muſ. 3. *t.* 62. *f.* 21. 22. 26.
Knorr Vergn. 6. *t.* 33. *f.* 2.
Martin. Conch. 3. *t.* 79. *f.* 821.
β) *Bonann. recr. et muſ. Kircher.* 3. *f.* 342.
Habitat in mari, Aſiam auſtralem *alluente, teſta* 3-3½ *pollices longa, nunc alba, nunc variegata, ſpira plicis nodoſis inaequali, extima cancellata, labro ſemicirculari intus columellaque niveis.*

minimus. 23. Str. teſtae labro retuſo gibbo, ventre ſpiraque plicato nodoſis, apertura bilabiata laevi. *Mant.* 2. *p.* 549.
Rumpf muſ. t. 36. *f.* P. Epidromis minima.
Valent. Abh. t. 5. *f.* 46.
Gualt. teſt. t. 31. *f.* L.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 439. *t.* 2. *f.* 11.
Chemn. Conch. 10. *t.* 156. *f.* 1491. 1492.

Habitat

Habitat in India, *urceo affinis, ſed teſta minore vix* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, nunc teſtacea, nunc alba, faſciis ſuperne* 2 *flaveſcenti punctatis, inferne* 2 *ſpadiceis, radiisque per anfractus decurrentibus, labio utroque albido, fauce laevi flava nec ſtriata.*

Canarium. 24. Str. teſta ſubcordata: labro rotundato brevi retuſo ſpiraque laevi. *Muſ. Lud. Ulr.* 623. *n.* 287.*
Liſt. Conch. t. 853. *f.* 9.
Petiv. gazoph. t. 98. *f.* 11.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 146. 147.
Rumpf muſ. t. 36. *f.* N.
Argenv. Conch. t. 14. *f.* Q.
Klein oſtr. t. 4. *f.* 73.
Seb. muſ. 3. *t.* 62. *f.* 23-25. 28. 29.
Muſ. Gottwald. t. 19. *f.* 137. a. b. c.
Knorr Vergn. 1. *t.* 18 *f.* 5.
Martin. Conch. 3. *t.* 79. *f.* 817. 818.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 61. *f.* 16?
γ) *Knorr Vergn.* 3. *t.* 13. *f.* 3?
δ) *Muſ. Gottwald. t.* 19. *f.* 135. b?
Habitat in mari, Aſiam auſtralem *alluente, teſta* $2\frac{1}{2}$ *pollices circiter longa flava vel fuſca, lineis transverſis fuſcis angulatis interdum notata, valde gibba, columella nivea.*

vittatus. 25. Str. teſtae labro rotundato brevi, ventre laevi, ſpirae elongatae anfractibus ſutura elevata diſtinctis. *Muſ. Lud. Ulr.* 623. *n.* 287.*
Rumpf muſ. t. 36. *f.* O. Epidromis.
Liſt. Conch. t. 852. *f.* 8. *t.* 855. *f.* 12. a. b.
Argenv. Conch. t. 9. *f.* F.
Seb. muſ. 3. *t.* 62. *f.* 18-20.
Muſ. Gottwald. t. 19. *f.* 136. 138. *et t.* 28. *f.* 206.
Knorr Vergn. 3. *t.* 20. *f.* 2.
Martin. Conch. 3. *t.* 79. *f.* 815. 819. 820.
β) *Walch et Knorr Petref.* 2. *t.* C. II. *f.* 1?
γ) *Favann. Conch. t.* 20. *f.* A8.
Chemn. Conch. 10. *t.* 155. *f.* 1481. 1482.
δ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 157. *f.* 1496.
Habitat rarior in mari, Aſiam auſtralem *alluente, teſta* 4 *circiter pollices longa, rarius unicolore, quam albida, faſciis fuſcis, aut fuſca faſciis albis maculatis, ſpira longiore, anfractibus magis diſtantibus et longitudinaliter plicatis ab epidromide diſtinctus.*

ſuccinctus. 26. Str. teſtae labro rotundato retuſo, ventre laevi cingulis quatuor pallidis lineari-punctatis.
Liſt. Conch. t. 859. *f.* 16.
Rumpf muſ. t. 37. *f.* X.
Gualt. teſt. t. 33. *f.* B.
Argenv. Conch. t. 10. *f.* C.
Seb. muſ. 3. *t.* 61. *f.* 15.
Muſ. Gottwald. t. 19. *f.* 134. a. b.
Martin. Conch. 3. *t.* 79. *f.* 815. 816.
a) *v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 10. *f.* 14. 15.
Martin. Conch. 3. *t.* 89. *f.* 877.
Habitat in mari, Aſiam auſtralem *alluente, teſta laevi teſtacea: dorſo laevi ſubcarinato, cincto lineis bigeminis albopunctatis, ſpirae anfractibus ſtriatis: carinula crenata, labio exteriori intus ſtriato, interiori adnato laevi gibbo, anterius ſubſtriato.*

ſpinoſus. 27. Str. teſtae labro attenuato integro ſubplicato coronato ſpinis argutis, ſpira aculeata.
Syſt. nat. XI. *p.* 715. *n.* 271. Conus ſpinoſus.
Gualt. teſt. t. 55. *f.* E?
Pet. gaz. t. 78. *f.* 11.
Argenv. Conch. t. 29. *f.* 10.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis inventus, ſtatura volutae veſpertilionis, baſi tamen minime emarginata, nec columella ſemper plicata, teſta albida lineolis purpuraſcentibus parallelis numeroſis varia ſuperne angulata, et ſpinis acutiſſimis coronata.

Fiſſurella. 28. Str. teſtae labro continuato in carinam fiſſam longitudinalem.
Argenv. Conch. t. 33. *lin.* 2. *n.* 6. Mitra.
Pet. gaz. t. 73. *f.* 7. 8.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 30.
Martin. Conch. 4. *t.* 158. *f.* 1498. 1499.
Habitat in India, *frequentius foſſilis in* Campania Gallica, *teſta alba, magnitudine et ſtatura Turbinis Clathri, anfractibus coſtis carinatis, excepto maximo ſubtus laevi, apertura oblongiuſcula, labro exteriore parum dilatato, interiore adnato, cauda brevi recta.*

Urceus. 29. Str. teſtae labro attenuato retuſo brevi ſtriato, ventre ſpiraque plicato-nodoſis, apertura bilabiata inermi. *Muſ. Lud. Ulr.* 624. *n.* 288.*
Rumpf muſ. t. 37. *f.* T. Canarium.

Petiv. gazoph. t. 98. *f.* 19.
Liſt. Conch. t. 857. *f.* 13.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 144.
Valent. Abh. t. 7. *f.* 65.
Gualt. teſt. t. 32. *f.* E? G.
Seb. muſ. 3. *t.* 60. *f.* 28. 29. *t.* 61. *f.* 24-30. 31. 57-59. 62-64. 66-68. *et t.* 62. *f.* 41. 45. 46. 47?
Muſ. Gottwald. t. 28. *f.* 193. 194. a. b. 196. a-d. 197. 198. a-e.
Knorr Vergn. 3. *t.* 13. *f.* 5.
Martin. Conch. 3. *t.* 78. *f.* 803-806.
α) *Muſ. Gottwald. t.* 28. *f.* 194. b.
Martin. Conch. 3. *t.* 80. *f.* 870.
β) *Rumpf muſ. t.* 37. *f.* W. *f.* 870.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 61. *f.* 28. 29. 36. 37.
δ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 61. *f.* 32. 33.
ε) *Seb. muſ.* 3. *t.* 61. *f.* 35.
ζ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 61. *f.* 38. 39.
η) *Seb. muſ.* 3. *t.* 61. *f.* 50.
ϑ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 61. *f.* 60. 61.
Habitat in Oceano indico, *frequens ad* Amboinam *et inſulam* S. Mauritii, *teſta ad* 2½ *pollices longa, utplurimum minore, colore et pictura mirifice varia.*

tridentatus. 30. Str. teſta tenui alba aurantio maculata et nebuloſa, dorſo laevi plicato, cauda violacea, anfractibus canaliculatis, labro triacantho.
Liſt. Conch. t. 858. *f.* 14.
Gualt. teſt. t. 33. *f.* C. D.
Seb. muſ. 3. *t.* 61. *f.* 34.
Martin. Conch. 3. *t.* 78. *f.* 810-814.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 157. *f.* 1503.
Habitat rarior in mari indico, *urceo affinis.*

dentatus. 31. Str. teſtae labro attenuato brevi dentato, ventre ſpiraque plicatis.
Seb. muſ. 3. *t.* 61. *f.* 25. 41-47.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 446. *t.* 2. *f.* 12.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 61. *f.* 55.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 61. *f.* 65?
δ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 61. *f.* 56?
Habitat - - - urceo affinis, at ſpirae plicis obliquis et anfractibus longius diſtantibus aperturaeque ſtriis evidentioribus diſtinctus, teſta ceterum 1½ *pollicem longa, nunc varia, nunc alba ad marginem ſubfuſco maculata, nunc lutea albo lineata, nunc tenui diaphana, nunc ſolida opaca.*

 32. Str.

coſtatus. 32. Str. teſtae labro craſſiſſimo, anfractu primo verrucis coronato: interſtitiis verrucarum plicatis, altero transverſim coſtato, reliquis transverſim ſtriatis.
Liſt. Conch. t. 863. *f.* 18. b.
Martin. Conch. 3. *t.* 81. *f.* 829.
a) *Muſ. Gottwald. t.* 17. *f.* 824.
Martin. Conch. 3. *t.* 91. *f.* 887.
Habitat - - - *teſta craſſa* 5½ *pollices longa*, 5 *lata, ſaepius lutea, et inter verrucas roſea.*

Bryonia. 33. Str. teſtae conicae labro mucronato octodentato, ſpira nodoſa.
Liſt. Conch. t. 882. *f.* 4.
Martin. Conch. 3. *t.* 93. *f.* 904. 905.
a) *Seb. muſ.* 3. *t.* 63. *f.* 3.
Chemn. Conch. 10. *t.* 159. *f.* 1512-1515.
Habitat rariſſimus - - - *teſta ultra* 7 *pollices longa, fuſca, albo varia, hinc inde caeruleſcenti-nebuloſa, utrum huic, an priori cuidam tribui accenſendus?*

affinis. 34. Str. teſta transverſim ſtriata gibba: ſpira inermi; anfractu primo verrucis coronato.
Liſt. Conch. t. 889 *f.* 10.
Habitat - - - *Lucifero affinis.*

latus. 35. Str. teſtae labro prominulo inferne bis emarginato, ſpirae anfractu primo medio laevi utrinque transverſim ſtriato, reliquis nodis obtuſis coronatis.
Seb. muſ. 3. *t.* 63. *f.* 4. 5.
Habitat - - -

laevis. 36. Str. teſta laevi argentea fuſco radiata transverſim obſolete plicata, ſpirae elongatae anfractibus inflatis rotundis.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 67.
Habitat - - - *teſta paulisper ultra* 2 *pollices longa.*

vexillum. 52. Str. teſta ſolidula ſubcylindrica rufeſcenti et ochroleuco alternatim faſciata: labro intus denticulato, columella plana glabra baſi emarginata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 222. *t.* 157. *f.* 1504. 1505.
Kaemmer. Rudolſt. Cabin. t. 7. *f.* 2. 3.
Habitat rariſſimus in Oceano indico.

norwegicus. 53. Str. teſta oblonga ſubalata alba: anfractibus teretibus, apertura patula ovata, cauda ſubadſcendente. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 218. *t.* 157. *f.* 1497. 1498.

Habitat

Habitat ad Norwegiae *littora; utrum diſtincta hujus generis ſpecies?*

**** Turriti, *ſpira longiſſima.*

tuberculatus. 37. Str. teſta ovato-oblonga tuberculata, labro incraſſato.
Seb. muſ. 3. *t.* 55. *f.* 21.
v. Born muſ. Caeſ. t. 10. *f.* 16. 17.
Martin. Conch. 4. *t.* 157. *f.* 1490.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta rudi, quaſi calce obducta, anfractibus punctis corneis eminentibus ſeriatis, labro ſutura quaſi gibbo, apertura ovata, cauda breviſſima, recurvata.*

paluſtris. 38. Str. teſta laeviuſcula: labro poſterius ſoluto.
Liſt. Conch. t. 837. *f.* 63.
Rumpf muſ. t. 30. *f.* Q.
Seb. muſ. 3. *t.* 50. *f.* 13. 14. 17. 18.
Knorr Vergn. 3. *t.* 18. *f.* 1. *et* 5. *t.* 13. *f.* 8.
Martin. Conch. 4. *t.* 156. *f.* 1472.
Habitat in Indiae inſularumque Oceani indici *paludibus, teſta utplurimum craſſa, lutea vel fuſca; ſpirae anfractibus* 12-16, *primo altero duplo majore, reliquis longitudinaliter plicatis et ter transverſim ſtriatis.*

ater. 39. Str. teſta laevi: labro anterius et poſterius ſoluto. *Muſ. Lud. Ulr.* 624. *n.* 289.*
Müll. hiſt. verm. fluv. et terr. 2. *p.* 188. *n.* 375. Nerita teſta ſubulata laevi, apertura antice poſticeque ſinuata.
Liſt. Conch. t. 115. *f.* 10.
Petiv. gaz. t. 13. *f.* 16.
Rumpf muſ. t. 33. *f.* R.
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* 13. 14.
Chemn. Conch. 9. *t.* 135. *f.* 1227.
Habitat in Amboinae paludibus, *teſta* 26 *circiter lineas longa, ex fuſco atra vel badia intus alba, ſubtiliſſime transverſim ſtriata; apertura ovata; ſpira ſubulata: anfractibus* 12 *planiuſculis contiguis.*

lineatus. 40. Str. teſta ſubulata fuſca: lineis ſeptem ſpiralibus impreſſis, apertura ovata.
Müll. hiſt. verm. fl. et terr. 2. *p.* 189. *n.* 376.* Nerita lineata.
Liſt. Conch. t. 116. *f.* 11.
Klein oſtr. p. 54.
Martin. Berl. Magaz. 4. *p.* 348. *t.* 10. *f.* 50.

Habitat - - - teſta 18 *lineas longa, glabra, fauce caeruleſcente decuſſatim ſtriata.*

punctatus. 41. Str. teſta ſubulata luteſcente: faſcia juxta ſuturam candida ſtriis rubris, anfractibus minoribus ſulcatis.
Müll. hiſt. verm. fluv. et terr. 2. *p.* 190. *n.* 377. Nerita punctata.
Liſt. Conch. t. 979. *f.* 36.
Pet. gaz. t. 13. *f.* 15.
Rumpf muſ. t. 30. *f.* P.
Gualt. teſt. t. 6. *f.* E. F?
Knorr Vergn. 1. *t.* 8. *f.* 7.
Martin. Berl. Magaz. t. 9. *f.* 39.
Habitat - - - teſta tenera, pellucida, glabra, $18\frac{1}{2}$ *lineas longa, fauce et columella albidis, apertura obovata, ſpirae anfractibus* 12-13, *majoribus* 6 *laevibus.*

Vibex. 42. Str. teſta ſubulata cinerea transverſim ſtriata: anfractibus nodulosis ſtrigisque ſanguineis.
Müll. hiſt. verm. fl. et terr. 2. *p.* 191. *n.* 378. Nerita tuberculata.
Liſt. Conch. t. 119. *f.* 4.
Petiv. gazoph. t. 100. *f.* 11.
Gualt. teſt. t. 6. *f.* G.
Klein oſtr. p. 34.
Martin. berl. Mag. 4. *t.* 10. *f.* 51.
Chemn. Conch. 9. *t.* 136. *f.* 1261. 1262.
β) Crinchled Club. Martyn. univ. Conch. 1. *t.* 12.
Habitat in Coromandel, *teſta albida, pellucida,* 4-14 *lineas longa, labio interiori glabro β) ad* inſulas amicas *candido, apertura ovata, anfractibus* 8-11, *ſingulis bifariam nodulosis.*

auritus. 43. Str. teſta fuſco-faſciata: anfractibus muricatis, apertura ovata.
Müll. hiſt. verm. fl. et terr. 2. *p.* 192. *n.* 379. Nerita aurita.
Liſt. Conch. t. 121. *f.* 16.
Klein oſtr. p. 30.
Martin berl. Magaz. 4. *t.* 10. *f.* 55.
Chemn. Conch. 9. *t.* 136. *f.* 1265. 1266.
Habitat in Africa, *teſta duriuſcula,* 16 *lineas longa, nunc lutea, nunc alba, nunc flava, fauce columellaque albis, labio exteriore repando, ſpirae anfractibus* 7, *ſingulis tuberculis* 7 *luteis, craſſis, obtuſis, compreſſis.*

44. Str.

aculeatus. 44. Str. teſta fuſca tuberculoſa: anfractibus muricatis, labro depreſſo crenulato.
Müll. hiſt. verm. fluv. et terr. 2. *p.* 193. *n.* 380. Nerita aculeata.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 10. *f.* 1. Popel.
Liſt. Conch. t. 121. *f.* 17. *et t.* 122. *f.* 20.
Klein oſtr. t. 2. *f.* 39.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* &c.
Martin. Berl. Mag. 4. *t.* 11. *f.* 58.
Chemn. Conch. 9. *t.* 136. *f.* 1267. 1268.
β) *Hercules Club. Mart. univ. Conch.* 1. *t.* 13.
Habitat in Africae torridae paludoſis, *teſta duriuſcula*, 18 *lineas longa, fauce columellaque albis, ſpirae anfractibus* 12, *ſingulis quinquefariam nodoſis: nodis in* 5 *extimis conicis acutis.*

agnatus. 45. Str. teſta laeviuſcula: labro valde prominulo poſterius emarginato.
Seb. muſ. 3. *t.* 50. *f.* 19.
Habitat - - -

dealbatus. 46. Str. teſtae anfractibus transverſim ſtriatis nigris, extimis laevibus et labri columellaeque margine albis.
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* 13. 14.
Habitat - - -

fuſcus. 47. Str. teſta fuſca, anfractibus multifariam tuberculatis, labro anterius poſteriusque ſoluto, intus fuſco ſtriato.
Knorr Vergn. 5. *t.* 13. *f.* 8.
Habitat - - - *tuberculato affinis.*

marginatus. 48. Str. teſta fuſca: anfractus infimi margine albo.
Knorr Vergn. 5. *t.* 22. *f.* 5.
Habitat - - - *an hujus generis?*

lividus. 49. Str. teſta ſubangulata nodoſo-ſpinoſa, labro anterius ſoluto.
Muſ. Lud. Ulr. 625. *n.* 290.*
Müll. hiſt. verm. fl. et terr. 2. *p.* 149. *n.* 338? Buccinum (torridum) teſta elongata fuſca transverſim ſtriata, anfractibus muricato dentatis.
Schroet. Flusconch. p. 314. *n.* 111.
Chemn. Conch. 9. *t.* 136. *f.* 1269. 1270.
Habitat - - -

ſtriatus. 50. Str. teſta convexa ſtriata alba: ſtrigis raris fulvis, columella ſinuata inflexa.
Müll. hiſt. verm. fluv. et terr. 2. *p.* 149. *n.* 339. Buccinum ſtriatum.
Habitat rarius - - - teſta tenera, pellucida, 3-7 *lineas ultra* 2 *pollices longa, apertura ovato-oblonga, ſpirae anfractibus* 7-8: *marginibus incumbentibus; utrum hujus generis, an potius ad helices relegandus.*

ſiniſter. 51. Str. teſta contraria tenui longitudinaliter ſtriata. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 114. *f.* 982. 983.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis repertus in Helvetia, *teſta* 1¾ *pollices longa: anfractibus* 10.

325. MUREX. *Animal* Limax.

Teſta univalvis, ſpiralis, exaſperata ſuturis membranaceis.

Apertura definens in canalem integrum rectum ſ. ſubadſcendentem.

α ſpinoſi, *cauda exſerta.*

Hauſtellum. 1. M. teſta ovata tuberculata, cauda elongata ſubulata recta muricata. *Muſ. Lud. Ulr.* 626. *n.* 291.*
Rumpf. muſ. t. 26. *f.* F. Hauſtellum.
Argenv. Conch. t. 16. *f.* B. Hauſtellum.
Liſt. Conch. t. 903. *f.* 23.
Bonann. recr. 3. *f.* 268.
muſ. Kircher. 3. *f.* 270.
Gualt. teſt. t. 30. *f.* E.
Klein oſtr. t. 4. *f.* 81.
Leſſer lithoth. f. 71.
Seb. muſ. 3. *t.* 78. *f.* 5. 6.
Knorr Vergn. 1. *t.* 12. *f.* 2. 3.
Martin. Conch. 3. *t.* 115. *f.* 1066.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 3. *f.* 1.
β) *Martin. Conch.* 3. *t.* 115. *f.* 1068.
γ) *Knorr Vergn.* 3. *t.* 9. *f.* 4.
δ) *Martin. Conch.* 3. *t.* 115. *f.* 1067.
Habitat paulo rarior in mari rubro, *omnique* Aſiam Americamque *auſtralem alluente, colore caudaeque obliquis tubercu-*

berculorum ordinibus armatae longitudine varians, apertura rotundata utplurimum roſea, fauce nunc alba, nunc caeruleſcente.

Tribulus. 2. M. teſta ovata ſpinis ſetaceis trifariis, cauda elongata ſubulata recta ſimiliter ſpinoſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 626. *n.* 292.*

α) *Columm. aq. t.* 60. *f.* 6. Purpura clavata.
Bonann. recr. 3. *f.* 269. Hyſtrix marina.
muſ. Kirch. 3. *f.* 271.
Liſt. Conch. t. 902. *f.* 22.
Rumpf muſ. t. 26. *f.* G.
Gualt. teſt. t. 31. *f.* A. 1-3.
Seb. muſ. 3. *t.* 78. *f.* 4.
Olear. muſ. t. 29. *f.* 1.
Leſſer teſtaceoth. f. 72.
Knorr delic. t. B. V. *f.* 5.
Vergn. 1. *t.* 11. *f.* 3. 4.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 15.
Martin. Conch. 3. *t.* 113. *f.* 1053-1056.

β) *Rumpf muſ. t.* 26. *f.* 3. Tribulus.
Gualt. teſt. t. 31. *f.* A. 4.
Argenv. Conch. t. 16. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 78. *f.* 1-3.
Knorr Vergn. 4. *t.* 27. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 113. *f.* 1052.

Habitat in mari rubro, *omnique* Aſiam Americamque *auſtralem alluente, teſta exalbida vel rufeſcente transverſim ſtriata, ſpinis in β) rariore multo longioribus.*

cornutus. 3. M. teſta ſubrotunda ſpinis ſubulatis obliquis cincta, cauda elongata ſubulata recta ſpinis ſparſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 627. *n.* 293.

Columm. aq. t. 60. *f.* 3. Purpura cornuta.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 8. *f.* 20. Bolin.
Petiv. gaz. t. 68. *f.* 12.
Liſt. Conch. t. 901. *f.* 21.
Bonann. recr. 3. *f.* 283.
muſ. Kirch. 3. *f.* 284.
Rumpf muſ. t. 26. *f.* 5.
Gualt. teſt. t. 30. *f.* D.
Seb. muſ. 3. *t.* 78. *f.* 7-9. 10? 11?
Knorr Vergn. 6. *t.* 17. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 114. *f.* 1057.

Habitat pretioſus in mari, Africam, *potiſſimum* occidentalem, *alluente,*

alluente, teſta ad 8 pollices longa, transverſim ſtriata, alba flava vel ſubſpadicea intus roſea, ſpinis ad 2 pollices longis, anfractibus rotundis inflatis.

Brandaris. 4. M. teſta ſubovata ſpinis rectis cincta, cauda mediocri ſubulata recta ſpiniſque oblique circumdata.
Rondel. teſt. 64. Murex Purpura.
Petiv. gaz. t. 68. *f.* 12.
Ginann. adr. 2. *t.* 8. *f.* 61. 62.
Liſt. Conch. t. 900. *f.* 20.
Argenv. zoomorph. t. 4. *f.* C.
Bytem. app. t. 12. *f.* 60.
Muſ. Gottwald. t. 38. *f.* 262. a-d. 263. a-c. *et* 264. a-d.
Knorr Vergn. 2. *t.* 18. *f.* 1. 2. *et t.* 22. *f.* 4. 5.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 6. *f.* 67.
Martin. Conch. 3. *t.* 114. 115. *f.* 1058-1065.
β) *Bonann. recr.* 3. *f.* 282.
muſ. Kirch. 3. *f.* 283.
Gualt. teſt. t. 30. *f.* F.
γ) *Bonann. recr.* 3. *f.* 281.
muſ. Kirch. 3. *f.* 282.
Rumpf muſ. t. 26. *f.* 4.
δ) *Favann. Conch. t.* 38. *f.* E[1].
Chemn. Conch. 10. *t.* 164. *f.* 1571.
ε) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 161. *f.* 1530. 1531.
ζ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 161. *f.* 1532-1535.
η) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 164. *f.* 1571.
Habitat frequens in mari mediterraneo *et* adriatico, *teſta alba, cinerea aut ſubfuſca, triplici ſpinarum, earumque minorum ſerie, tertia ex brevioribus compoſita, β) dupliei, γ) ſpinis conicis, rarius ſerie ſimplici, caudaque inermi.*

Trunculus. 5. M. teſta ovata nodoſa anterius ſpinis cincta: cauda breviore truncata perforata. *Muſ. Lud. Ulr.* 627. *n.* 294.*
Column. purp. t. 13. *f.* 1.
Liſt. Conch. t. 947. *f.* 42. *t.* 952. *f.* 1? *et t.* 1010. *f.* 71. d?
Bonann. recr. 3. *f.* 271. 272. 274. 277?
muſ. Kirch. 3. *f.* 273. 274. 276.
Klein oſtr. t. 6. *f.* 104.
Gualt. teſt. t. 31. *f.* C.
Seb. muſ. 3. *t.* 52. *f.* 15. 16.
Muſ. Gottwald. t. 38. *f.* 256. c. 258? 259a-f. *et* 261. a. b.
Knorr Vergn. 3. *t.* 13. *f.* 1. *et* 5. *t.* 13. *f.* 4. *et t.* 19. *f.* 6.
Martin. Conch. 3. *t.* 109. *f.* 1018-1020.

β) *Walch*

β) *Walch Petref.* 2. 1. *p.* 119. *t.* C. II. *f.* 2?
γ) *Walch Petref.* 2. 1. *p.* 122. *t.* C. III. *f.* 7?
δ) *Spengl. catal. raiſ. t.* 2. *f.* 2. 3. - - -
ε) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 105. *f.* 897. 898.
ζ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 161. *f.* 1528. 1529.
η) *Kaemm. Cab. Rudolſt. p.* 107. *n.* 112. *t.* 9. *f.* 4.
Habitat in mari mediterraneo; *et* Jamaicam *alluente, teſta colore varia, interdum faſciata transverſim ſtriata, cauda nunc recta, nunc ſiniſtrorſum flexa.*

Pomum. 6. M. teſta ovata nodoſa: varicibus tribus ad ſeptem, cauda latiore.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 9. *f.* 22.
Liſt. Conch. t. 944. *f.* 39. a.
Argenv. zoom. t. 3. *f.* E.
Knorr Vergn. 3. *t.* 9. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 109. 110. *f.* 1021-1025.
Habitat in mari, Africam *occidentalem alluente, teſta ponderoſa, trunculo affinis.*

decuſſatus. 7. M. teſta ovata transverſim ſulcata coſtata: coſtis convexis nodos perpendiculares decuſſantibus, cauda imperforata.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 9. *f.* 21. Jaton.
Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 65?
Knorr Vergn. 4. *t.* 23. *f.* 3.
Martin. Conch. 3. *t.* 110. *f.* 1026-1028.
Chemn. Conch. 118. *t.* 161. *f.* 1540. 1541.
Habitat in mari, Africam occidentalem *alluente, labri margine membranaceo, ſpirae anfractibus* 7 *diſcretis.*

triacanthus. 8. M. teſta turgida nodoſa transverſim ſtriata trifariam ſpinoſa.
Walch Petref. 2. 1. *p.* 118. *t.* C. I. *f.* 5.
Habitat - - - hactenus modo inter foſſilia inventus, teſta ficus figura, cingulis 5-6 *horizontalibus ſtrias decuſſantibus inaequali: cauda ultra pollicem longa, anfractibus* 3 *extimis nodoſis prominulis.*

melanamathos. 9. M. teſta transverſim ſtriata octofariam ſpinoſa: ſpinis cavis nigris, ſpira ſubnodoſa aculeata, cauda ſubulata.
Martin. Conch. 3. *t.* 108. *f.* 1015.
Habitat rarus - - - teſta abbreviata.

Radix. 10. M. teſta alba multifariam frondoſo-ſpinoſa: frondibus nigris undulatis.
Argenv. zoom. t. 11. *f.* K.
Habitat rariſſimus - - - an hujus tribus?

11. M.

candidus. 11. M. teſta alba ſeriatim ſpinoſa cauda breviſſima.
Argenv. Conch. t. 16. *f.* G.
Habitat - - - teſta 2 pollices longa, ſpinarum nonnullis nigris.

faſciatus. 12. M. teſta inflata ſeriatim ſpinoſa alba fuſco faſciata, ſpirae anfractibus quatuor diſcretis turgidis.
Knorr Vergn. 6. *t.* 40. *f.* 6.
Habitat - - -

* β * Frondoſi, *ſuturis criſpato-frondeſcentibus, cauda abbreviata, vulgo* Purpurae *dicti.*

ramoſus. 13. M. teſta trifariam frondoſa: ſpira contigua, cauda truncata. *Muſ. Lud. Ulr.* 628. *n.* 295.*
Rumpf muſ. t. 26. *f.* A. *et* 1. Murex ramoſus.
Argenv. Conch. t. 16. *f.* C. E. Purpura ramoſa.
zoomorph. t. 4. *f.* D.
Columm. aq. t. 60.
Liſt. Conch. t. 946. *f.* 41.
Bonann. recr. 3. *f.* 275. 276.
muſ. Kirch. 3. *f.* 280. 281.
Valent. Abh. t. 4. *f.* 38. *et t.* 9. *f.* 85.
Gualt. teſt. t. 37. *f.* H. *et t.* 38. *f.* A.
Klein oſtr. t. 4. *f.* 82.
Seb. muſ. 3. *t.* 52. *f.* 21. *et. t.* 77. *f.* 1-4. 7. 8. 11. 12.
Bytem. app. t. 11. *f.* 45.
Muſ. Gottwald. t. 37. *f.* 255. a. *et* 256. b. *et.* 38. *f.* 257. a.
Knorr Vergn. 1. *t.* 25. *f.* 1. 2. *et t.* 26. *f.* 1. 2. 3. *t.* 9. *f.* 3. *et* 5. *t.* 11. *f.* 1.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 7. *f.* 6.
Martin. Conch. 3. *t.* 102-105. *f.* 980-989. 992. 995-997.
Spengl. ſelt. Conch. t. 3. *f.* 1.
β) *Rumpf muſ. t.* 26. *f.* C.
Valent. Abh. t. 5. *f.* 42.
Gualt. teſt. t. 37. *f.* D. G. I. L.
Argenv. Conch. t. 16. *f.* H.
Seb. muſ. 3. *t.* 77. *f.* 9. 10.
Knorr Vergn. 2. *t.* 7. *f.* 4. 5.
Martin. Conch. 3. *t.* 105. *f.* 990. 991.
γ) *Martin. Conch.* 3. *t.* 105. *f.* 993. 994.
δ) *Bonann. recr.* 3. *f.* 278.
muſ. Kirch. 3. *f.* 277.
Martin. Conch. 3. *t.* 110. *f.* 1029. 1030.
ε) *Martin. Conch.* 3. *t.* 110. *et* 111. *f.* 1031-1037?

Schroet.

Schroet. Einl. in Conch. I. *p.* 550. *t.* 3. *f.* 8.
ζ) *Martin. Conch.* 3. *t.* 111. *f.* 1038?
η) *Valent. Abh. t.* 1. *f.* 5?
Habitat in mari rubro, ſinu Perſico, *omnique fere* mari, Aſiam Americamque *auſtralem alluente*, *teſta transverſim ſtriata*, *ceterum forma*, *colore*, *frondium ſinubus quam maxime varia.*

foliatus. 174. M. teſta trifariam frondoſa: apertura unidentata. *Martyn. univ. Conchol.* 2. *t.* 66.
Chemn. Conch. 10. *f.* 153.
Habitat ad Americae ſeptentrionalis littus occidentale.

Scorpio. 14. M. teſta quadrifariam frondoſa: ſpira capitata, cauda truncata. *Muſ. Lud. Ulr.* 628. *n.* 296.*
Rumpf muſ. t. 26. *f.* D. Scorpio.
Valent. Abh. t. 4. *f.* 36. 37.
Gualt. teſt. t. 37. *f.* M.
Argenv. Conch. t. 16. *f.* D.
Seb. muſ. 3. *t.* 77. *f.* 13-16.
Knorr Vergn. 2. *t.* 11. *f.* 4. 5.
Martin. Conch. 3. *t.* 106. *f.* 998-1003.
Spengl. ſelt. Conch. t. 2. *f.* C.
Habitat pretioſus et rarus in mari, Aſiam auſtralem *alluente*, *teſta alba fuſca aut nigra*, *apertura orbiculari*, *ſpirae anfractu altero turgido et reliquis majore.*

ſaxatilis. 15. M. teſta quinquefariam frondoſa, ſpira contigua, cauda abbreviata. *Muſ. Lud. Ulr.* 629. *n.* 297.*
Rumpf muſ. t. 26. *f.* 2. Murex minor.
Klein oſtr. t. 6. *f.* 109.
Seb. muſ. 3. *t.* 77. *f.* 5. 6.
Muſ. Gottwald. t. 38. *f.* 255. aa. bb. 256. a. 257. b. c.
Knorr Vergn. 3. *t.* 9. *f.* 2. *et* 6. *t.* 19. *f.* 1. *et t.* 40. *f.* 7.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 6. *et t.* 9. *f.* 26.
Murray teſtac. t. 1. *f.* 26.
Martin. Conch. 3. *t.* 107. 108. *f.* 1004-1014.
Schroet. Journ. 5. *p.* 418. *f.* 4.
β) *Martin. Conch.* 3. *t.* 105 *f.* 1013.
γ) *Walch Petref.* 2. 1. *p.* 116. *t.* C. *f.* 3. 4.
Habitat in mari mediterraneo, *et* Aſiam auſtralem *alluente*, *varietate multiplici.*

diaphanus. 16. M. teſta alba diaphana ſexfariam frondoſa: frondibus apice nigris.

Argenv.

Argenv. Conch. t. 16. *f.* F.
Habitat - - -

Cichoreum. 17. M. teſta ochroleuca transverſim ſtriata multifariam frondoſa.
Argenv. Conch. t. 16. *f.* K.
Habitat - - - frondibus minus prominentibus minusque criſpis.

verſicolor. 18. M. teſta albo rubroque varia, frondibus planis acutis acie nigris.
Knorr Vergn. 5. *t.* 4. *f.* 1.
Habitat - - -

Erinaceus. 19. M. teſta multifariam ſubfrondoſo ſpinoſa: ſpirae anfractibus retuſo coronatis, cauda abbreviata.
Gualt. teſt. t. 49. *f.* H.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 11. *f.* 3. 4?
Habitat in mari mediterraneo.

ſtriatus. 20. M. teſta ſeptifariam frondoſa alba: ſtriis transverſis elevatis fuſcis.
Gualt. teſt. t. 30. *f.* C?
Martin. Conch. 3. *t.* 109. *f.* 1016.
Habitat in India, *ſpirae anfractibus* 7.

tripterus. 21. M. teſta elongata trigona: angulis alato-membranaceis.
Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. ind. p. 287. *t.* 10. *f.* 18. 19.
Habitat - - - foſſilis in Campania gallica, *teſta nivea transverſim rugoſa: rugis ſtrias longitudinales decuſſantibus, apertura oblongo-ovata granulata, ſpirae anfractibus 7, inter ſuturas granulatis; an diſtincta a ramoſo ſpecies?*

Sacellum. 164. M. teſta umbilicata muricato coſtata: anfractibus ſupra late planiuſculis margine acutis, labro crenato, cauda recta adſcendente. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 267. *t.* 163. *f.* 1561. 1562.
Habitat ad inſulas Nicobaricas.

Motacilla. 165. M. teſta triangulari nodoſa transverſim ſulcata trifariam varicoſa, cauda ſubulata elongata recta, fauce alba. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 268. *t.* 163. *f.* 1563.
Habitat in Oceano indico.

triqueter. 22. M. teſta elongata triquetra ſubalata reticulatim coſtata: roſtro recto clauſo. *v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. ind. p.* 288. *t.* 11. *f.* 1. 2.

Habitat

Habitat - - teſta alba rubro maculata, apertura elliptica, labro crenato, teſtae pyramidalis anfractibus ſex; an hujus tribus?

γ Varicoſi, *ſuturis rotundatis toroſis craſſisque.*

lyratus. 175. M. teſta varicibus cingula laevia decuſſantibus, apertura ovata. *Martyn. univ. Conch. 2. t. 43.*
Habitat ad ſinum R. Georgii.

Rana. 23. M. teſta varicibus oppoſitis compreſſis ſcabra: cingulis muricatis, apertura ſubedentula ovata. *Muſ. Lud. Ulr. 629. n. 298.**
α) *Rumpf muſ. t. 24. f.* G. Rana.
Pet. gazoph. t. 100. *f.* 12.
Liſt. Conch. t. 995. *f.* 58.
Bonann. recr. 3. *f.* 182.
muſ. Kirch. 3. *f.* 183.
Gualt. teſt. t. 49. *f.* L.
Seb. muſ. 3. *t.* 60. *f.* 13. 15-18.
Muſ. Gottwald. t. 36. *f.* 232. a. b. 233. a?
Knorr Vergn. 2. *t.* 13. *f.* 6. 7.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 6. *f.* 64.
Martin. Conch. 4. *t.* 133. *f.* 1268-1273.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 4. *f.* 9.
β) *Liſt. Conch. t.* 949. *f.* 44.
Seb. muſ. 3. *t.* 60. *f.* 19.
Knorr Vergn. 3. *t.* 7. *f.* 5.
Martin. Conch. 4. *t.* 133. *f.* 1274-1276.
γ) *Liſt. Conch. t.* 995. *f.* 59.
δ) *Bonann. recr.* 3. *f.* 350.
Bonann. muſ. Kirch. 3. *f.* 346.
Habitat in mari, Aſiam auſtralem *alluente, teſta alba, cineraſcente aut ſubfuſca, cingulo muricato in α) duplici, in β) ſimplici, ſtriis transverſis elevatis, in α) granulatis.*

Gyrinus. 24. M. varicibus oppoſitis continuatis, pūnctis tuberculoſis faſciata, apertura orbiculari.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 8. *f.* 13? Jabick.
Liſt. Conch. t. 939. *f.* 34.
Gualt. teſt. t. 49. *f.* E.
Argenv. Conch. t. 9. *f.* P.
Seb. muſ. 3. *t.* 60. *f.* 21-27.
Muſ. Gottwald. t. 35. *f.* 228. a. *et t.* 36. *f.* 231. a. b. 235. a. b. 236. 237. a. b. 238.

Knorr Vergn. 6. *t.* 25. *f.* 5. 6.
Martin. Conch. 4. *t.* 127. *f.* 1224 1227. *et t.* 128. *f.* 1229-1235.
β) *Valent. Abh. t.* 11. *f.* 93?
β) *Martin. univ. Conch.* 2. *t.* 41.
Habitat in mari mediterraneo, atlantico, americano, indico, *teſta alba, ſubfuſca aut fuſca, quadrupla, interdum avellanae magnitudine, cingulis ex punctis elevatis compoſitis, alternis minoribus, a tertio ad extimum ſpirae anfractum in ſingulis anfractibus duplici.*

affinis. 25. M. teſta turgida: varicibus oppoſitis continuatis, ſpira acuminata, anfractibus tuberculorum corona cinctis, extimis glabris.
Valent. Abh. t. 11. *f.* 95.
Habitat - - - tuberculorum teretium corona in primo ſpirae anfractu triplici vel quadruplici.

Lampas. 26. M. teſta varicibus ſuboppoſitis, gibboſa tuberibus longitudinaliter tuberculoſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 630. *n.* 299.
Rondel. teſt. 2. *p.* 81.
Bubo. β) *Rumpf muſ. t.* 28. *f.* C. Hector.
Liſt. Conch. t. 1023. *f.* 88.
Gualt. teſt. t. 50. *f.* D.
Muſ. Gottwald. t. 25. *f.* 174. x. a. b.
Martin. Conch. 4. *t.* 129. *f.* 1238. 1239.
Rubeta. γ) *Rumpf muſ. t.* 28. *f.* D. Ajax.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 103.
Argenv. Conch. t. 9. *f.* D.
Klein oſtr. t. 3. *f.* 59.
Muſ. Gottwald. t. 26. *f.* 174. a. b.
Knorr Vergn. 2. *t.* 28. *f.* 1.
Martin. Conch. 4. *t.* 128. *f.* 1236. 1237.
Habitat in Oceano indico, *teſta rubra, aut ſpadicea*, 4, β) 14 *pollices longa, tuberculis minimis ſparſis aſpera, apertura ovali utrinque dentata ex albo incarnata, limbo intus ovali aurantio.*

Oleari-um. 27. M. teſta varicibus ſubalternis numeroſo tuberculata, dorſo poſterius mutico ſtriato, apertura edentula.
Rondel. teſt. 2. *p.* 88.
Column. aq. t. 53.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 105.
Gualt. teſt. t. 49. *f.* G.
Knorr Vergn. 3. *t.* 9. *f.* 5.

Martin.

Martin. Conch. 4. *t.* 130. *f.* 1242?
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 267.
Einl. in Conch. 1. *p.* 492. *t.* 3. *f.* 1.
β) *Walch Petref.* 2. 1. *p.* 119. *t.* C. II. *f.* 5?
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 57. *f.* 34?
Habitat in mari mediterraneo, africano.

Femorale. 28. M. teſta varicibus decuſſatis trigona rugoſa anterius noduloſa, apertura edentula anterius transverſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 630. *n.* 300.
Grew. muſ. t. 11. *f.* 7. 8.
Liſt. Conch. t. 941. *f.* 37.
Bonann. recr. 3. *f.* 290.
muſ. Kirch. 3. *f.* 291.
Gualt. teſt. t. 50. *f.* C.
Argenv. Conch. t. 10. *f.* B.
Seb. muſ. 3. *t.* 63. *f.* 7-10.
Muſ. Gottwald. t. 32. *f.* 218. a-i.
Knorr del. t. B. IV. *f.* 2.
Vergn. 4. *t.* 16. *f.* 1.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 21.
Martin. Conch. 3. *t.* 111. *f.* 1039.
Habitat in mari, Aſiam auſtralem, Guineam, Americam *alluente, teſta nonnunquam ultra* 7 *pollices longa fuſca, coſtis transverſis aperturam verſus albis: ſulcis intermediis transverſim ſtriatis, apertura ovali, cauda intorta.*

cutaceus. 29. M. teſta varice ſolitaria nodis angulata ſubrugoſa, apertura dentata, columella perforata.
Liſt. Conch. t. 942. *f.* 38?
Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 63. 64. 71-73. *et t.* 52. *f.* 10? 11.
Muſ. Gottwald. t. 27. *f.* 187. b.
Knorr Vergn. 2. *t.* 24. *f.* 5.
Martin. Conch. 3. *t.* 118. *f.* 1085? 1086? 1087. 1088.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 5. *f.* 5.
Chemn. Conch. 10. *t.* 163. *f.* 1559. 1560.
Habitat ad Barbariae, Guineae, Americae auſtralis *et* inſularum obverſarum *littora, teſta ſubfuſca, perſici florum colore tincta aut alba, lineis perpendicularibus undulatis,* $2\frac{1}{2}$-3 *pollices longa.*

Lotorium. 30. M. teſta varicibus decuſſatis angulata: nodis longitudinaliter tuberculoſis, cauda flexuoſa, apertura dentata. *Muſ. Lud. Ulr.* 631. *n.* 301.*
Liſt. Conch. t. 934. *f.* 29. *t.* 937. *f.* 32. *et t.* 948. *f.* 43.

Rumpf muſ. t. 26. *f.* B.
Argenv. Conch. t. 10. *f.* M.
Martin. Conch. 4. *t.* 130. *f.* 1246. 1247. 1249.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 493. *t.* 3. *f.* 2.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 57. *f.* 30.
Knorr Vergn. 5. *t.* 21. *f.* 1.
Martin. Conch. 4. *t.* 131. *f.* 1252. 1253.
Chemn. Conch. 10. *t.* 169. *f.* 1634.
Habitat - - -

Pileare. 31. M. teſta varicibus decuſſatis ſubnodoſo rugoſa: apertura dentata, cauda ſubadſcendente.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 8. *f.* 12? Vojet.
Rumpf muſ. t. 49. *f.* I.
Gualt. teſt. t. 49. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 52. *f.* 1. 2. *et t.* 57. *f.* 23? 24.
Muſ. Gottwald. t. 35. *f.* 227. a.
Martin. Conch. 4. *t.* 130. *et* 131. *f.* 1243. 1248. 1250. 1151?
Schroet. Einl. in. Conch. 1. *p.* 493. *t.* 3. *f.* 3.
neue Litterat. 3. *p.* 267.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 52. *f.* 3?
Habitat in mari mediterraneo.

bufonius. 32. M. teſta varicibus ſex oppoſitis continuatis fornicatis, cingulis nodoſis, cauda obliqua.
Argenv. Conch. t. 9. *f.* R.
Seb. muſ. 3. *t.* 60. *f.* 14. 20.
Muſ. Gottwald. t. 39. *f.* 234. b.
Martin. Conch. 4. *c.* 129. *f.* 1240. 1241.
Habitat rarior - - ; *gyrino affinis.*

Pyrum. 33. M. teſta varicoſa ovata transverſim ſulcata nodoſa, cauda longiore flexuoſa ſubulata.
Rumpf muſ. t. 26. *f.* E. Pyrum exſiccatum.
Gualt. teſt. t. 37. *f.* F.
Argenv. Conch. t. 10. *f.* O. *et t.* 16. *f.* I.
Klein oſtr. t. 6. *f.* 110.
Knorr Vergn. 2. *t.* 7. *f.* 2. 3. *et* 6. *t.* 26. *f.* 2.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 6. *f.* 60.
Martin. Conch. 3. *t.* 112. *f.* 1040-1044.
β) *Rumpf muſ. t.* 24. *f.* H.
Klein oſtr. t. 3. *f.* 64.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 5. *f.* 50.
Martin. Conch. 3. *t.* 112. *f.* 1048. 1049.
γ) *Martin. Conch.* 3. *t.* 67. *f.* 743. a.

δ) *Liſt.*

δ) *Liſt. Conch. t.* 935. *f.* 29. a.
Rumpf muſ. t. 24. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 112. *f.* 1050. 1051.
ε) *Mart. Concholog.* 2. *t.* 56.
Habitat in Oceano indico auſtrali, *teſta alba interdum fuſco varia, aut ſpadicea, aut ex luteo fuſca, angulata, longitudinaliter ſtriata, transverſim ſulcata, apertura ovali dentata, columella nunc dentata, nunc edentula.*

caudatus. 34. M. teſta tenui transverſim ſtriata fuſca albo varia, cauda ſubulata, ſpira prominula apice fuſca: anfractibus canaliculatis; primo gibbo.
Martin. Conch. 3. *t.* 112. *f.* 1045-1047.
β) *Liſt. Conch. t.* 893. *f.* 13?
Habitat - - -

Rubecula. 35. M. teſta varicibus decuſſatis, obtuſa rugis nodoſis, ventre aequali, apertura dentata. *Muſ. Lud. Ulr.* 631. *n.* 302.*
Gualt. teſt. t. 49. *f.* F? I.
Argenv. Conch. t. 9. *f.* K.
Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 1-6.
Muſ. Gottwald. t. 36. *f.* 228. b-d. 229. a. b. 230. a. b.
Knorr Vergn. 1. *t.* 13. *f.* 3. 4. *et* 3. *t.* 5. *f.* 2. 3.
Martin. Conch. 4. *t.* 132. *f.* 1259-1267.
Chemn. Conch. 10. *t.* 162. *f.* 1546. 1547.
Habitat ad Indiae, Africae, Americae auſtralis *littora, rarior, teſta rubra vel flava, faſciata.*

Scrobiculator. 36. M. teſta varicibus ſcrobiculatis ſuboppoſitis, laevigata, apertura dentata.
Gualt. teſt. t. 49. *f.* B.
Liſt. Conch. t. 943. *f.* 39?
Petiv. gaz. t. 100. *f.* 12.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 257. *t.* 2. *f.* 16. 17.
Favann. Conch. t. 32. *f.* E.
Chemn. Conch. 10. *t.* 163. *f.* 1556. 1557.
Habitat in mari mediterraneo.

reticularis. 37. M. teſta varicibus ſuboppoſitis reticulata, maculis tuberculatis, columella ſubedentula, cauda adſcendente. *Muſ. Lud. Ulr.* 632. *n.* 303.
Liſt. Conch. t. 935. *f.* 30.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 193.
Gualt. teſt. t. 49. *f.* M. *et t.* 50. *f.* A.
Leſſer teſtaceoth. f. 64.

 Murray

Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 18.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 11. *f.* 5.
Martin. Conch. 2. *t.* 41. *f.* 405. 406. *et* 4. *t.* 128. *f.* 1228.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 263. *t.* 3. *f.* 18. 19.
Habitat in mari mediterraneo, *et* Americam *alluente, rarior, teſta interdum 6 pollices longa, transverſim coſtata, longitudinaliter ſtriata, nodis in decuſſatione diverſicoloribus, aperturae limbo rubro, labro dentato.*

lamelloſus. 174. M. teſta varicibus membranaceis per ſpiram continuatis, ſpina terminatis. *Martyn univ. Conchol.* 2. *t.* 42.
Habitat ad inſulas Falkland.

nodatus. 177. M. anfractibus nodoſis, cauda recta apertura violacea, labio dentato. *Martyn. univ. Conch.* 2. *t.* 51.
Habitat ad novam Hollandiam.

Anus. 38. M. teſta varice labiisque dilatato-membranaceis, gibboſa reticulato-tuberculata, apertura ſinuoſa, cauda erecta. *Muſ. Lud Ulr.* 632. *n.* 304.*
Rumpf muſ. t. 24. *f.* F. Auris hirſuta.
Argenv. Conch. t. 9. *f.* H. Diſtorſio ſ. Grimace.
Liſt. Conch. t. 833. *f.* 57.
Pet. gaz. t. 74. *f.* 9. *vel t.* 99. *f.* 10.
Bonann. recr. 2. *f.* 279. 280.
muſ. Kirch. 3. *f.* 278. 279.
Gualt. teſt. t. 37. *f.* B. E.
Seb. muſ. 3. *t.* 60. *f.* 4. 6 7.
Muſ. Gottwald. t. 26. *f.* 177. 178. a. b.
Knorr Vergn. 3. *t.* 3. *f.* 5.
Martin. Conch. 2. *t.* 41. *f.* 403. 404.
Spengl. ſelt. Conch. t. 3. *f.* G.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 4. *f.* 7.
β) *Gualt. teſt. t.* 31. *f.* D.
Habitat in mari mediterraneo *et* Aſiam auſtralem *alluente, teſta vix ultra 3 pollices longa, utplurimum fuſca: faſciis albis, apertura ſubtriangulari.*

miliaris. 39. M. teſta varicoſa: cingulis tuberculatis, apertura ſubdentata, cauda elongata, anfractibus ventricoſis.
Valent. Alb. t. 2. *f.* 14. a. 15. b. 16. c. 17. d. 18. e.
Knorr Vergn. 3. *t.* 29 *f.* 5.
Martin. Conch. 3. *p.* 303. *vign.* 36. *f.* 1-5.
Chemn. Conch. 10. *t.* 161. *f.* 1532-1535.

Habitat

Habitat - - - teſta nunc cinerea, nunc ex vireſcente alba, nunc rufa, nunc alba, tuberculis utplurimum nigris, rarius rufis.

ſenegalenſis. 40. M. teſta tranſverſim ſtriata varicoſa: varicibus ſpinoſis; ſpinis apicem verſus decreſcentibus.
Adanſ. Seneg. 1. *p.* 125. *t.* 8. *f.* 19. Sirat.
Habitat ad Senegal, *teſta circiter* $2\frac{1}{2}$ *pollices longa, varicibus* 9, *alternatim minoribus, ſingulis* 8 *ſpinis armatis, ſpirae anfractibus* 8.

δ Ecaudati *ſubechinati.*

Ricinus. 41. M. teſta obovata: ſpinis ſubulatis, apertura dentata, labro dentato. *Muſ. Lud. Ulr.* 633. *n.* 305.*
Rumpf muſ. t. 24. *f.* E. Os luteum.
Gualt. teſt. t. 28. *f.* N.
Seb. muſ. 3. *t.* 60. *f.* 37. 39. 42.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 19.
Habitat in Oceano aſiatico, *teſta* $1\frac{1}{2}$ *pollicem circiter longa, ſpinis ſeriatis, ſpira prominula, fauce violacea.*

Nodus. 42. M. teſta obovata: ſpinis conicis, labro dentato, columella laevi colorata. *Muſ. Lud. Ulr.* 635. *n.* 309.*
Knorr Vergn. 6. *t.* 24. *f.* 7?
Habitat - - - teſta longiore, quam ricini, ad $3\frac{1}{2}$ *pollices longa, utplurimum tamen minore, apertura intus incarnata.*

neritoideus. 43. M. teſta nodoſa plurimis ordinibus: labro angulato, columella planiuſcula.
Syſt. nat. X. 1. *p.* 777. *n.* 628. Nerita nodoſa.
Liſt. Conch. t. 804. *f.* 12. 13.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 173.
Klein. oſtr. t. 1. *f.* 30.
Seb. muſ. 3. *t* 60. *f.* 41. 48.
Muſ. Gottwald. t. 11. *f.* 81. a? b? c.
Knorr Vergn. 1. *t.* 25. *f.* 5. 6.
Martin. Conch. 3. *t.* 101. *f.* 972. 973. *et t.* 102. *f.* 976-979.
Habitat in India, *ſtructura neritae, habitu muricis, teſta nunc alba tuberculis nigris, fauce violacea, nunc luteofuſca, tuberculis fuſcis, apertura flava: anfractus primi dorſo tuberculorum ordinibus* 4, *labro ſubalato, ſpinis* 3-4 *armato, columellae dentibus* 2-4.

 44. M.

Fucus. 44. M. teſta rudi ventricoſa nodorum ordinibus quatuor transverſim ſtriata, columella impreſſa et anfractibus extimis planiuſculis.
Liſt. Conch. t. 990. *f.* 50.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 174.
Gualt. teſt. t. 66. *f.* B, O.
Martin. Conch. 3. *t.* 100. *f.* 959-962.
Habitat rarior - - - teſta vix ultra 1½ *pollicem longa, columella guttis* 2-3 *nigris notata.*

Loco. 45. M. teſta obovata anterius nodoſa: apertura edentula ſuborbiculata. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 180.
Habitat in mari regnum Chilenſe *alluente, teſta* 4-5 *pollices alta, incola in veſicula collari ſuccum purpureum continente, carne duriuſcula, ſapida, eduli.*

Hyſtrix. 46. M. teſta ſubovata: ſpinis acutis, apertura edentula repanda. *Muſ. Lud. Ulr.* 635. *n.* 310.*
Argenv. Conch. t. 14. *f.* A. Hericius.
Gualt. teſt. t. 28. *f.* R. *et t.* 44. *f.* S.
Seb. muſ. 3. *t.* 52. *f.* 29? 30. 31. *et t.* 60. *f.* 33-38? 43. 47.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 3. *f.* 32.
Martin. Conch. 3. *t.* 101. *f.* 974 975.
β) *Walch Petref.* 2. 1. *p.* 120. *t.* C. II. *f.* 9?
Habitat - - - teſta nunc badia alboque varia, nunc ex luteo fuſca, unicolore vel maculata, ſpinarum ordinibus 4, *apertura ampla.*

?Hemicinella. 47. M. teſta ovata: ſpinis obſoletis, apertura edentula, columella transverſim ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 636. *n.* 311.*
Liſt. Conch. t. 956 *f.* 8. *et t.* 957. *f.* 9. 10.
Rumpf muſ. t. 24. *f.* 5.
Argenv. Conch. t. 17. *f* H.
Seb. muſ. 3. *t.* 60. *f.* 45.
Muſ. Gottwald. t. 11. *f.* 80. c. d. *et t.* 26. *f.* 176.
Knorr Vergn. 3. *t.* 29. *f.* 6.
Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 9. *f.* 19. 20.
Martin. Conch 3. *t.* 101. *f.* 966-968. 970. a. b. 971.
Schroet. Einl. in Verſt. 4. *t.* 7. *f.* 7.
β) *Liſt. Conch. t.* 956. *f.* 7.
Martin. Conch. 3. *t.* 100. *f.* 963.
γ) *Adanſ. Seneg.* 1. *p.* 100. *t.* 7. *f.* 1. Sakum.
Habitat rarior in mari, Aſiam auſtralem, β) Africam occidentalem *alluente, teſta alba, interdum ſubfuſca albo-varia,*

varia, ſpinis aliquando nigricantibus, nunc magis, nunc minus turgida.

Hippocaſtanum. 48. M. teſta ovata ſtriata quadrifariam ſubſpinoſa, apertura transverſim ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 636. *n.* 312.*
Rumpf muſ. t. 24. *f.* C. Pimpeltjes e Banda.
Liſt. Conch. t. 958. *f.* 11?
Bonann. recr. 3. *f.* 346?
muſ. Kircher. 3. *f.* 345?
Gualt. teſt. t. 37. *f.* C. *et t.* 43. *f.* V.
Argenv. Conch. t. 14. *f.* L.
Klein oſtrac. t. 3. *f.* 58. *et t.* 7. *f.* 112.
Seb. muſ. 3. *t.* 52. *f.* 22. 23. 27. 28. *et t.* 60. *f.* 12. 30. 31? 32?
Knorr Vergn. 5. *t.* 4. *f.* 2. *et* 6. *t.* 24. *f.* 2. *et t.* 35. *f.* 3.
Muſ. Gottwald. t. 38. *f.* 260. a? b?
Martin. Conch. 3. *t.* 99. *f.* 945. 946. *et t.* 100. *f.* 951? 952? 953?
β) *Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 7. *f.* 2. Laborin.
Liſt. Conch. t. 991. *f.* 52. 53.
Seb. muſ. 3. *t.* 60. *f.* 11.
Martin. Conch. 3. *t.* 100. *f.* 956-958.
γ) *Martin. Conch.* 3. *t.* 100. *f.* 954. 955.
δ) *Liſt. Conch. t.* 896. *f.* 16.
Chemn. Conch. 10. *t.* 160. *f.* 1518. 1519.
ε) *Liſt Conch. t.* 896. *f.* 16. a. b.
ζ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 67. *f.* d.
Martin. Conch. 3. *t.* 101. *f.* 969.
η) *Liſt. Conch. t.* 955. *f.* 6. *et t.* 990. b. *f.* 51.
Bonann. recr. 3. *f.* 381.
muſ. Kirch. 3. *f.* 368.
Muſ. Gottwald. t. 26. *f.* 182.
ϑ) *Martin. Conch.* 3. *t.* 121. *f.* 1110.
ι) *Rumpf muſ. t.* 24. *f.* D.
Habitat in Guinea, India, inſulisque Oceani indici, *teſta dorſo transverſim ſtriato, ſpinarum obtuſarum ordinibus numero variantibus armata, ſpirae anfractibus diſtantibus.*

ſenticoſus. 49. M. teſta ſubturrita longitudinaliter coſtata transverſim cancellata, apertura ſtriata.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 35.
Rumpf muſ. t. 29. *f.* N.
Gualt. teſt. t. 51. *f.* G.
Argenv. Conch. t. 9. *f.* O.
Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 45-48.

Knorr. Vergn. 4. *t.* 23. *f.* 4. 5.
Martin. Conch. 4. *t.* 155. *f.* 1466. 1467.
Habitat in Oceano indico, *teſta ad* 2 *pollices usque longa flavicante, anfractibus ſingulis faſcia fuſca cinctis, coſtis aculeatis, apertura oblonga, columellae plica ſolitaria, ſpira acuminata: anfractibus diſtantibus.*

Melongena. 50. M. teſta obovata glauca, anfractu ſubſpinoſo, ſpira prominula, apertura laevi. *Muſ. Lud. Ulr.* 637. *n.* 313.*
Liſt. Conch. t. 904. *f.* 24.
Bonann. recr. 3. *f.* 186. 295.
muſ. Kircher. 3. *f.* 186. 296.
Rumpf muſ. t. 24. *f.* 2. 3.
Gualt. teſt. t. 26. *f.* F.
Argenv. Conch. t. 15. *f.* H.
Seb. muſ. 3. *t.* 72. *f.* 1-9.
Muſ. Gottwald. t. 11. *f.* 71. 72. 73. a. b.
Knorr Vergn. 1. *t.* 17. *f.* 5. *et* 2. *t.* 10. *f.* 1.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 5. *f.* 49. *et t.* 10. *f.* 36.
Martin. Conch. 2. *t.* 39. *et* 40. *f.* 389-397.
β) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 4. *f.* 2.
γ) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 35. *f.* 3?
δ) *Rumpf muſ. t.* 24. *f.* 6.
Martin. Conch. 2. *p.* 76. *n.* 2.
ε) *Rumpf muſ. t.* 23. *f.* D. *et t.* 24. *f.* 4.
Gualt. teſt. t. 31. *f.* F.
Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 80-82. *t.* 52. *f.* 19. 20. *et t.* 60. *f.* 10.
Muſ. Gottwald. t. 11. *f.* 74. *t.* 27. *f.* 187. a. *et t.* 28. *f.* 207. b.
Knorr Vergn. 3. *t.* 7. *f.* 3.
Martin. Conch. 2. *t.* 40. *f.* 398-401.
ζ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 60. *f.* 9.
Muſ. Gottwald. t. 11. *f.* 75. 77. 78.
Martin. Conch. 2. *t.* 40. *f.* 402.
η) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 164. *f.* 1568.
Habitat in Oceano indico *et* Americam auſtralem *inſulasque obverſas alluente, teſta ad* $5\frac{1}{2}$ *pollices usque longa, utplurimum fuſca, albo faſciata, apertura ovali ampla, ſpirae anfractibus rarius laevibus, quam nodoſis, anfractu primo maximo turgido, ſpinarum utplurimum coronis cincto.*

Conſul. 159. M. teſta craſſa ventricoſa alba transverſim ſulcata nodoſa; apertura repando-ovata, labro ſinuoſo intus plicato denticulato. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 236. *t.* 160. *f.* 1516. 1517.
Habitat in Oceano indico.

Lima. 176. M. teſta fuſca ſubovata ſubcaudata: cingulis confertis noduloſis dilutioribus. *Martyn univ. Conch.* 2. *t.* 46.
Habitat ad ſinum *a* R. Georgio *denominatum.*

ζ Caudigeri, *cauda ſubulata clauſa recta elongata, teſta inermi.*

cerioſus. 51. M. teſta ecaudata ſubplicata ovata acuminata, apice carioſo.
Habitat in aquaeductu *ad* Sevillam, *teſta magnitudine fabae, oblonga, acuminata, cinerea, ſubdiaphana, longitudinaliter ſulcata, baſi emarginata; an vere diſtincta integra hujus generis et hujus tribus ſpecies?* Alſtroemer.

babylonius. 52. M. teſta turrita cingulis acutis maculatis recto-caudata, labro fiſſo. *Muſ. Lud. Ulr.* 639. *n.* 317.
Rumpf muſ. t. 29. *f.* L. Turris babylonica.
Argenv. Conch. t. 9. *f.* M. Turris babylonica.
Liſt. Conch. t. 917. *f.* 11.
Valent. Abb. t. 1. *f.* 8.
Gualt. teſt. t. 52. *f.* N.
Knorr delic. t. B IV. *f.* 6.
Vergn. 4. *t.* 13. *f.* 2.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 9.
Martin. Conch. 4. *t.* 143. *f.* 1331. 1332.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 2. *f.* 8.
β) *Chemn. Conch.* 4. *p.* 143. *Vign.* 39. *f.* C.
γ) *Argenv. zoomorph. t.* 4. *f.* b.
Chemn. Conch. 4. *p.* 143. *Vign.* 39. *f.* B.
δ) *Bonann. recr. et muſ. Kircher.* 3. *f.* 46.
Muſ. Gottwald. t. 34. *f.* 221. f.
Knorr Vergn. 6. *t.* 27. *f.* 3.
Martin. Conch. 4. *t.* 143. *f.* 1334. 1335.
ε) *Martin. Conch.* 4. *t.* 145. *f.* 1345. 1346.
ζ) *Favann univ. raiſ. t.* 4. *f.* 997.
Chemn. Conch. 10. *t.* 162. *f.* 1550. 1551.
Habitat in Oceano indico *γ) rarior quoque in* mari *inſulas* Americae oppoſitas *circumfluente, teſta ad* 4 *usque pollices longa, cingulis albis: maculis quadratis fuſcis vel atris.*

javanus. 53. M. teſta turrita: cingulis nodoſis immaculatis, labro ſinu ſeparato.
Liſt. Conch. t. 915. *f.* 8.
Martin. Conch. 4. *t.* 143. *f.* 1336-1338.
Habitat in Oceano indico, *babylonico ſimillimus, at teſta alba, immaculata, radiis modo interdum ex fuſco luteis varia,*

varia, cauda nunc longiore, nunc breviore, anfractibus nunc carinatis, nunc tuberculis carinatis, ſubſtriatis.

ſinenſis. 54. M. teſta ventricoſa acuminata, cauda canaliculata reflexa, apertura ovali, anfractibus granulatim transverſim ſtriatis, baſi ſpinis coronatis.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 10. *f.* 3. Goumier.
Liſt. Conch. t. 1018. *f.* 80.
Gualt. teſt. t. 56. *f.* M. N.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* F.
Seb. muſ. 3. *t.* 50. *f.* 23. 24.
Martin. Conch. 4. *t.* 157. *f.* 1489.
β) *Martin. Conch.* 4. *t.* 157. *f.* 1487?
γ) *Liſt. Conch. t.* 122. *f.* 18?
Klein oſtr. t. 2. *f.* 40?
Martin. berl. Mag. t. 10. *f.* 57?
δ) *Schroet. Flusconch. t.* 9. *f.* 9.
ε) *Martyn univ. Conch.* 2. *t.* 58.
Habitat in mari Senegaliam *alluente, teſta utplurimum maculata, columellae plica unica; an hujus tribus?*

ſtramineus. 55. M. ſpira annulis elevatis: interſtitiis bacillis repletis, anfractibus ſingulis baſi tuberculis coronatis, apertura violacea, labro undulato columellaque niveis.
Spengl. Naturf. 17. *t.* 2. *f.* A. B.
Chemn. Conch. 10. *t.* 160. *f.* 1520. 1521.
Favann. Conch. t. 79. *f.* S.
Martyn Conch. 2. *f.* 53. 54.
Habitat in Oceano auſtrali, *teſta ſtraminea,* 3 *pollices longa.*

auſtralis. 56. M. teſta ovata longitudinaliter ſtriata; labro undulato, ſpirae anfractibus canaliculatis: primo turgido quadriplicato, altero triplicato.
Spengl. Naturf. 17. *t.* 2. *f.* C. D.
Habitat in Oceano auſtrali, *ſtramineo affinis, teſta quoque ſtraminea, at* 1½ *pollicem longa, columella flava, labio niveo, an hujus tribus?*

uncinatus. 57. M. ſpira acuminata transverſim ſtriata: anfractibus quatuor primis callo medio uncis armato, quinto ſextoque coſtatis, reliquis glabris.
Schroet. Flusconch. t. 8. *f.* 15.
Habitat - - - teſta pollicem longa, apertura ovali, labro dentato, ſpirae anfractibus novem.

Turris. 58. M. teſta turrita: ſpirae anfractibus tuberculis coronatis cinguloque granulato cinctis; primo ſubtiliter transverſim ſtriata.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. f. 79.
Habitat - - - babylonio affinis, at labro integro, teſta alba faſcia anfractuum coloris inter vinoſum et rufum intermedii.

coſtatus. 59. M. cauda ſubreflexa oblique ſtriata, ſpirae anfractibus tribus primis coſtatis, reliquis quatuor cancellatis, primo obconico, columellae plica unica.
Argenv. Conch. t. 29. n. 10. f. 3.
Knorr Petref. 2. t. C. II. f. 7.
Schroet. Einl. in Verſtein. 4. t. 8. f. 3. 8.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis prope Courtagnon Campaniae gallicae *repertus, coſtis primorum anfractuum ſuperne in ſpinas terminatis; an hujus tribus?*

aſper. 60. M. teſta longitudinaliter plicata transverſim coſtata: ſpira parum prominula, apertura ovata, labro crenulato.
Martin. Conch. 4. t. 150. f. 1396. 1397.
Habitat - - - teſta rufeſcente, ſpirae anfractibus 5-6, coſtis acutis.

Colus. 61. M. teſta turrita ſubrecto-caudata ſtriata nodoſa carinata, labro crenulato. *Muſ. Lud. Ulr. 639. n. 317.**
Rumpf muſ. t. 29. f. F. Fuſus.
Liſt. Conch. t. 917. f. 10. et t. 918. f. 11. a.
Bonann. recr. 3. f. 360?
muſ. Kircher. 3. f. 353?
Gualt. teſt. t. 52. f. L.
Argenv. Conch. t. 9. f. B.
Klein oſtr. t. 4. f. 78?
Knorr Vergn. 3. t. 5. f. 1.
Martin. Conch. 4. t. 144. f. 1342.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 2. f. 6.
β) *Regenſ. Conch. 1. t. 12. f. 62?*
γ) *Favann. Conch. t. 33. f.* A^5.
Chemn. Conch. 10. t. 160. f. 1523.
δ) *Favann. Conch. t. 35. f.* C^1.
Chemn. Conch. 10. t. 161. f. 1536. 1537.
Habitat paulo rarior in Oceano indico, *teſta alba transverſim ſtriata nunc terete, nunc angulata, ſpirae anfractibus ſulco diſcretis nodis coronatis ſuperioribus fuſcis, cauda 3 fere pollices longa, infra ſubfuſca.*

62. M.

Morio. 62. M. teſta patulo caudata nigra: faſcia alba, ſpirae anfractibus ſubnodoſis, columella rugoſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 640. *n.* 319.*
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 9. *f.* 31. Nivar.
Liſt. Conch. t. 928. *f.* 22.
Bonann. recr. 3. *f.* 357.
muſ. Kircher. 3. *f.* 350.
Seb. muſ. 3. *t.* 80. *f. fere omnes.*
Muſ. Gottwald. t. 29. *f.* 209. a. *et t.* 31. *f.* 209. b.
Knorr delic. t. B. V. *f.* 4.
Vergn. 1. *t.* 20. *f.* 1. *et* 2. *t.* 6. *f.* 2.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 11. *f.* 61.
Martin. Conch. 4. *t.* 139. *f.* 1300. 1301.
Schroet. Journ. 5. *f.* 5.
inn. Bau der Conch. t. 2. *f.* 4.
β) *Martin. Conch.* 4. *t.* 140. *f.* 1302. 1303.
Habitat in mari Africam, *potiſſimum* occidentalem *alluente, teſta ad 6 pollices longa, ex atro fuſca, rarius ſubfuſca,* β) *cinerea, transverſim ſtriata.*

Cochlidium. 63. M. teſta patulo-caudata: ſpirae anfractibus ſupra planis. *Muſ. Lud. Ulr.* 640. *n.* 320.*
Argenv. Conch. t. 9. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 52. *f.* 6. *t.* 57. *f.* 27. 28.
Favann. Conch. t. 35. *f.* B3.
Chemn. Conch. 10. *t.* 164. *f.* 1569.
Habitat in Oceano indico.

Spirillus. 64. M. teſta caudata: ſpirae mucronatae anfractibus ſupra convexis.
Knorr Vergn. 6. *t.* 24. *f.* 3.
Martin. Conch. 3. *t.* 115. *f.* 1069.
Spengl. ſelt. Conch. t. 3. *f.* E.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 517. *t.* 3. *f.* 4.
Habitat Tranquebariae, *hauſtello et canaliculato affinis, at anfractibus ſulco non diſtinctis, corpore ſubtus ventricoſo ſupra convexo, ſpirae centro mucrone prominente obtuſo, anfractibus ſupra margine acuto cinctis, cauda ſubcylindrica, verſus aperturam ventris non dilatata, columella ruga transverſa a ventre diſtincta.*

canaliculatus. 65. M. teſta patulo-caudata: ſpirae anfractibus ſupra canaliculo diſtinctis. *Muſ. Lud. Ulr.* 641. *n.* 321.*
Valent. Abh. t. 11. *f.* 92.

Gualt.

Gualt. teſt. t. 47. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 68. *f.* 21? 22?
Knorr delic. t. B. VI. *f.* 4.
Martin. Conch. 3. *t.* 66. *f.* 738-740. *et t.* 67. *f.* 742. 743.
Habitat ad Canadam *et in* mari glaciali, *teſta fuſca nunc majore unicolore, nunc minore radiata laevi aut transverſim ſtriata, dorſi margine nodoſo.*

Ficus. 66. M. teſta patulo-caudata ſtriata: anfractibus canaliculo diſtinctis, extimis ſulcis, primo baſi nodis coronato.
Martin. Conch. 3. *t.* 66. *f.* 741.
β) Gualt. teſt. t. 26. *f.* N.
γ) Chemn. Conch. 10. *t.* 163. *f.* 1564. 1565.
Habitat γ) in mari rubro.

Carica. 67. M. teſta patulo-caudata transverſim ſtriata: ſpirae prominulae anfractibus baſi ſpinis coronatis.
Liſt. Conch. t. 880. *f.* 3. b.
Gualt. teſt. t. 47. *f.* B.
Knorr Vergn. 1. *t.* 30. *f.* 4. *et* 6. *t.* 27. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 67. *f.* 744. *et t.* 69. *f.* 756. 757.
Habitat - - - teſta ad 8 *pollices et ultra longa.*

Rapa. 68. M. teſta ſolida umbilicata trifariam nodoſa transverſim ſtriata: apertura ampla ſtriata.
Knorr Vergn. 5. *t.* 21. *f.* 2.
Martin. Conch. 3. *t.* 68. *f.* 750-753.
Spengl. ſelt. Conch. 3. *f.* C.
β) Liſt. Conch. t. 894 *f.* 14?
γ) Liſt. Conch. t. 895. *f.* 15?
Habitat in India, *minor* Tranquebariae, *Bullae Rapae affinis.*

niveus. 69. M. teſta patulo-caudata nivea diaphana: ſpirae anfractibus canaliculo diſtinctis; primo coſtis transverſis carinatis.
Bonann. recr. 3. *f.* 338.
muſ. Kircher 3. *f.* 337.
Habitat in mari Braſiliam *alluente.*

Granum. 70. M. teſta hemiſphaerica glabra diaphana, cauda recta patula, vertice papillari. *Syſt. nat.* X. 1. *p.* 752. *n.* 477.
Liſt. Conch. t. 881. *f.* 3. e.
Muſ. Gottwald. t. 30. *f.* 2. 5.
Ellis corall. t. 33. *f.* Aa.
Habitat - - - anfractibus convexis, apicem verſus ſenſim decreſcentibus.

aruanus. 71. M. teſta patulo-caudata: ſpira ſpinoſo-coronata. *Muſ. Lud. Ulr.* 641. *n.* 322.*
Rumpf muſ. t. 28. *f.* A. Buccinum aruanum.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 101.
Chemn. Conch. 4. *p.* 143. *vign.* 39. *f.* D.
Habitat rarus ad inſulam Aru, *et* novam Guineam, *teſta ponderoſa rudi ſaepius atra aut caeruleſcente annulis cincta, apertura angulata, cauda ſatis longa, ſpira mucronata.*

pervertus. 72. M. teſta patulo-repandoque caudata: ſpira contraria ſubcoronata. *Muſ. Lud. Ulr.* 642. *n.* 323.*
Argenv. Conch. t. 15. *f.* F. Unique.
Liſt. Conch. t. 907. *f.* 27.
Gualt. teſt. t. 30. *f.* B.
Muſ. Gottwald. t. 32. *f.* 219. a. 219. b.
Ellis corall. t. 33. *f.* B.
Baſt. op. ſubſec. t. 6. *f.* 1. B.
Chemn. Conch. 9. *t.* 107. *f.* 906. 907.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 11. *f.* 8. 9.
β) *Liſt. Conch. t.* 908. *f.* 28?
γ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 107. *f.* 904. 905.
Habitat rariſſimus in mari americano, *ſpinis nunc acuminatis, nunc magis obtuſis.*

antiquus. 73. M. teſta patulo-caudata oblonga: anfractibus octo teretibus. *Fn. ſuec.* 2165.
Müll. zool. dan. 3. *p.* 64. *t.* 118. *f.* 1-3. *prodr* 2939. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 397. *n.* 396. Tritonium antiquum.
Jonſt. exſang. t. 11. Turbo longus.
Liſt. Conch. t. 962. *f.* 15.
anim. angl. t. 3. *f.* 1. 3.
Bonann. recr. 3. *f.* 190.
muſ. Kircher. 3. *f.* 192.
Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 75. *t.* 83. *f.* 3-6. *et t.* 93. *f.* 3.
Martin. Conch. 4. *t.* 138. *f.* 1292-1294. 1296.
Hermann Naturf. 16. *t.* 2. *f.* 7.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 83. *f.* 7?
γ) *Martin. n. Mannigf.* 4. *p.* 419. *t.* 2. *f.* 14?
δ) *Liſt. Conch. t.* 913. *f.* 4.
Habitat frequens in Oceano ſeptentrionali, mari *quoque* glaciali, *buccino undato affinis, teſta ſqualida, ad* 6 *usque pollices longa, ſubtiliſſime cancellata, vel transverſim ſtriata, vel longitudinaliter obſolete plicata, ſpirae anfracti-*

fractibus ſulco diſcretis, medio nonnunquam tuberculis coronatis, rarius contrariis.

deſpectus. 74. M. teſta patulo-ſubcaudata oblonga: anfractibus octo lineis duabus elevatis. *Fn. ſuec.* 1266. *It. wgoth. t.* 5. *f.* 8.
Müll. zool. dan. prodr. 2940. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 396. *n.* 395. Tritonium deſpectum.
Martin. Conch. 4. *t.* 138. *f.* 1295.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 523. *t.* 3. *f.* 5.
β) *Liſt. Conch. t.* 1657. *f.* 1?
γ) *Martyn Conch.* 1. *f.* 5.
Favann. cat. raiſ. t. A. *f.* 946.
Chemn. Conch. 10. *t.* 163. *f.* 1558.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *teſta rudi, cana: anfractibus extimis utplurimum fuſcis, apertura interdum aurata.*

fornicatus. 75. M. teſta patulo-caudata ovato-oblonga: anfractibus ventricoſis ſtriatis longitudinaliter angulato ſubfornicatis.
O. Fabr. Fn. groenl. 399. Tritonium fornicatum.
Habitat in mari, auſtralem Groenlandiam *alluente, incola eduli, teſta ultra* 3 *pollices longa ſubdiaphana laeviuſcula flava, intus alba et glabra, ſpirae anfractibus* 7 *late transverſim ſtriatis; an diſtincta a deſpecto ſpecies?*

incraſſatus. 76. M. teſta oblonga transverſim rugoſa longitudinaliter ſtriata: labro intus denticulato extus incraſſato.
Müll. zool. dan. prodr. 2946. Tritonium incraſſatum.
Act. Nidroſ. 4. *p.* 96. *t.* 16. *f.* 25.
Habitat - - - an hujus generis?

truncatus. 77. M. teſta oblonga longitudinaliter coſtata: cauda ſubreflexa emarginato-truncata.
Müll. zool. dan. prodr. 2947.
Act. Nidroſ. 4. *p.* 97. *t.* 16. *f.* 26.
Habitat - - - an hujus generis?

Argus. 78. M. taſta gibba transverſim tuberculato-coſtata fuſca obſcurius faſciata intus alba, apertura ovata.
Rumpf muſ. t. 49. *f.* B.
Klein oſtr. t. 7. *f.* 128.
Leſſer teſtaceoth. f. 62.
Knorr Vergn. 5. *t.* 3. *f.* 3.
Martin. Conch. 4. *t.* 127. *f.* 1223.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 57. *f.* 33.
Martin. Conch. 4. *t.* 131. *f.* 1255. 1256.

Chemn. Conch. 10. *t.* 160. *f.* 1522.

γ?) Flag-Buccinum. *Martyn univ. Conchol.* 1. *t.* 3.

Habitat rarus in India, γ) *ad* inſulas amicas *et* ſociales.

maculoſus. 79. M. teſta cancellata flava: faſciis albis liturisque ſpadiceis alternis, columella laevi, ſpirae anfractibus undecim teretibus.

Liſt. Conch. t. 1022. *f.* 86.

Rumpf muſ. t. 49. *f.* G.

Seb. muſ. 3. *t.* 51. *f.* 20. 21.

Martin. Conch. 4. *t.* 132. *f.* 1257. 1258.

Favann. Conch. t. 33. *f.* X³ ?

Chemn. Conch. 10. *t.* 163. *f.* 1552. 1553.

β) *Bonann. recr. et muſ. Kircher.* 3. *f.* 48.

Habitat rariſſimus in India.

magellanicus. 80. M. teſta ventricoſa umbilicata transverſim ſtriata cinerea intus violacea: ſpirae anfractibus parallele coſtatis; primo praegrandi.

Knorr Vergn. 4. *t.* 30. *f.* 2.

Martin. Conch. 4. *t.* 139. *f.* 1297.

β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 164. *f.* 1570.

Habitat in freto magellanico, Buccino Harpae *ſtructura ſimilis, apertura ovali, anfractuum coſtis altis, acutis, foliaceis.*

cancellatus. 81. M. teſta ovata ſolida opaca cinerea: ſpirae anfractibus cancellatis ſulco diſtinctis.

Knorr Vergn. 2. *t.* 27. *f.* 3.

Habitat - - -

ſcolopaceus. 82. M. teſta fuſca: ſpirae anfractibus ſulcis cinctis ſupra tuberculis cinctis; tuberculorum apice et apertura albis.

Knorr Vergn. 3. *t.* 26. *f.* 4.

β) *Knorr Vergn.* 3. *t.* 26. *f.* 5?

Habitat - - - *teſta* β) *magis elongata ſordide lutea, anfractuum faſcia obſoleta, tuberculis magis globoſis.*

litteratus. 83. M. teſta ventricoſa turrita nigro maculata: columella uniplicata, cauda brevi. *v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt.* p. 327. *t.* 11. *f.* 14. 15.

Habitat - - - *teſta nivea, apertura ampliata, ſpirae anfractibus octo aculeatis.*

trigonus. 84. M. teſta ſubtrigona cancellata: ſpirae anfractibus inflatis contiguis; primo tuberculo magno diſtincto.
Adanſ. Seneg. 1. *p.* 122 *t.* 8. *f.* 14. Samier.
Habitat in Senegalia, *teſta* 2 *circiter pollices longa: ſpirae anfractibus* 7; *an hujus tribus?*

ſemilunaris. 85. M. teſta longitudinaliter coſtata ſubtiliter transverſim ſtriata: ſpirae anfractibus planiuſculis diſtantibus ſeriatim tuberculatis, apertura ſemilunari.
Adanſ. Seneg. 1. *p.* 122. *t.* 8. *f.* 15. Solat.
Habitat in Senegalia, *teſta pollicem longa, ſpirae anfractibus tuberculorum ſerie ſimplici, ſecundo duplici vel triplici, primo* 6-7 *plici.*

coſtatus. 86. M. teſta annulatim ſtriata: ſpirae anfractibus teretibus inflatis; ſingulis coſtis novem rotundatis parallelis ſpinoſis.
Adanſ. Seneg. 1. *p.* 125. *t.* 8. *f.* 19. Sirat.
Habitat in Senegalia, *teſta* 2½ *pollices circiter longa.*

ſulcatus. 87. M. teſta rotundata annulatim ſulcata, apertura ovali, ſpirae anfractu primo turgido.
Adanſ. Seneg. 1. *p.* 133. *t.* 9. *f.* 25. Tafon.
Habitat in Senegalia, *teſta* 1½ *pollicem circiter longa, ſpirae anfractibus novem ſubcontiguis, nunc ſubinflatis, nunc planiuſculis, an hujus generis?*

fuſiformis. 88. M. teſta elongata: tuberculis minimis confertis multifariam aſpera.
Adanſ. Seneg. 1. *p.* 132. *t.* 9. *f.* 23. Loſet.
Habitat in Senegalia, *teſta* 6 *circiter lineas longa, ſpirae anfractibus circiter* 8, *primo tuberculorum ordinibus* 12-15, *ſecundo* 5.

Tritonis. 89. M. teſta ventricoſa oblonga laevi: anfractibus rotundatis, apertura dentata, cauda brevi. *Muſ. Lud. Ulr.* 642. *n.* 324.*
Rondel. teſt. 81. Buccinum.
Rumpf muſ. t. 28. *f.* B. *et* 1. Buccinum Tritonis.
Valent. Abh. t. 8. *f.* 66-67.
Liſt. Conch. t. 959. *f.* 12.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 188.
Gualt. teſt. t. 48. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 81. *fig. ann.*
Muſ. Gottwald. t. 34. *f.* 224. a. *et t.* 35. *f.* 225. b.
Knorr delic. t. B. VI. *f.* 1.

Knorr Vergn. 2. *t.* 16. *f.* 2. 3. *et* 5. *t.* 5. *f.* 1.
Martin. Conch. 4. *t.* 134. 135. *f.* 1277-1283.
β) *Liſt. Conch. t.* 960. *f.* 13.
Muſ. Gottwald. t. 35. *f.* 224.
Martin. Conch. 4. *t.* 136. *f.* 1284. 1285.
γ) *Klein oſtr. t.* 7. *f.* 127?
Habitat in Oceano indico *et* auſtrali, β) *in* mari mediterraneo, *teſta a* novae Seelandiae *incolis tibiae muſicae loco, ab* Orientis *et* Africae *paſtoribus pro cornu militari adhibita vehementiori ſono quam tubae ſtentoreae vulgaris, aut cornu capri:*

Buccina jam priſcos cogebat ad arma Quirites.

teſta ad 16 *usque pollices longa alba, fuſco, flavo et nigro quaſi ſquamata, apice utplurimum laeſa, columella alba: ſtriis transverſis nigris, ſpirae anfractibus ſutura noduloſa diſtinctis, hinc inde quaſi abſciſſis et nodo agglutinatis, primo ſulcis ſtriatis notato.*

Puſio. 90. M. teſta ventricoſa oblonga laevi: ſpira ſtriata; anfractibus rotundatis, apertura laevi, cauda brevi.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 4. *f.* 3. Nifat.
Liſt. Conch. t. 914. *f.* 7.
Rumpf muſ. t. 49. *f.* E.
Gualt. teſt. t. 52. *f.* I.
Martin. Conch. 4. *t.* 147. *f.* 1357.
Habitat rariſſimus in mari mediterraneo, *et ad* Africae littora, *teſta avellanae magnitudine, raro* $1\frac{1}{2}$ *pollicem ſuperante, alba maculis fuſcis aut fulvis interdum ſeriatis.*

Tulipa. 91. M. teſta ventricoſa oblonga laevi: anfractibus rotundatis ſutura geminata, columella biplicata, cauda patula ſtriata.
Argenv. Conch. t. 10. *f.* K. Tulipa.
Liſt.

An hujus generis diſtinctae ſpecies et cujus tribus ſunt teſtae, quas Liſter *Conch. t.* 905. *f.* 24. a. *t.* 906. *f.* 26. *t.* 929. *f.* 23. *et* 24. *t.* 950. *f.* 44. c. *t.* 953. *f.* 2-3. *t.* 954. *f.* 4. *et t.* 962. *f.* 15. a. *a* Bonanni *recr. et muſ. Kircher.* 3. *f.* 51. 58. 61. 77. 81. *et* 343. *recr.* 3. *f.* 273. 284. 285. 289. *et* 338. *muſ. Kircher.* 3. *f.* 275. 285. 286. 290. *et* 337. *a* Kleinio *oſtr. t.* 3. *f.* 57. 63. *t.* 5. *f.* 86. *t.* 7. *f.* 120. *a* Rumpf *muſ. t.* 24. *f.* 1. *a* Gualtieri *teſt. t.* 31. *f.* E. M. *t.* 43. *f.* R. S. *t.* 49. *f.* C. D. *t.* 51. *f.* I. *t.* 54. *f.* I. *t.* 56. *f.* L. *et t.* 57. *f.* B. C. F. *ab* Argenville *Conch. t.* 9. *f.* L. *a* Seba *muſ.* 3. *t.* 49. *f.* 7. 8. 49. 50. 54. 66-68. 78. *t.* 50. *f.* 52-53. *t.* 51. *f.* 36. *t.* 52. *f.* 8. 12-14. 24. 25. *et t.* 57. *f.* 29. 31. 32. *a* Knorr *Vergn.* 6. *t.* 26. *f.* 3. *t.* 35. *f.* 1. *t.* 40. *f.* 6. *et Petref.* 2. *t.* C. I. *f.* 8. *et* C. II. *f.* 11. *et muſ.* Gottwald. *t.* 34. *f.* 223. o. *et t.* 36. *f.* 231. c. *depictas dederunt?*

Liſt. Conch. t. 910. *f.* 1. *et t.* 911. *f.* 2.
Bonann. recr. 3. *f.* 187.
muſ. Kircher. 3. *f.* 186.
Rumpf muſ. t. 49. *f.* H.
Gualt. teſt. t. 46. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 71. *f.* 23-31.
Muſ. Gottwald. t. 29. *f.* 220. a. b.
Knorr Vergn. 5. *t.* 18. *f.* 5. *et* 6. *t.* 29. *f.* 1.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 9. *f.* 35.
Martin. Conch. 4. *t.* 136. 137. *f.* 1286-1291.
β) *Gualt. teſt. t.* 46. *f.* E?
Habitat in mari, Americam auſtralem *alluente, teſta utplurimum maculata et nebuloſa, intus transverſe ſtriata, anfractibus utplurimum bicinctis, rarius unicinctis.*

clathratus. 92. M. teſta oblonga caudata: plicis longitudinalibus ſubmembranaceis, ſulcata.
Liſt. Conch. t. 926. *f.* 19.
Klein oſtr. t. 3. *f.* 67.
Habitat in mari, Islandiam *alluente, teſta magnitudine et facie Turbinis Clathri, at breviſſime caudata, plicis plurimis erectis, compreſſis, ſuperne inclinatis.*

Naſſa. 93. M. teſta ſolida nigra vel dilute fuſca: faſcia alba ſubdiaphana, anfractibus nodoſis, columella ſubplicata.
Liſt. Conch. t. 828. *f.* 50.
Valent. Abh. t. 8. *f.* 71.
Knorr Vergn. 6. *t.* 20. *f.* 7.
Martin. Conch. 4. *t.* 122. 123. *f.* 1131-1134.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 7. *f.* 1.
Spengl. ſelt. Conch. t. 3. *f.* F.
Habitat rarus - - - inter volutas et murices quaſi intermedius.

plicatus. 94. M. ſpirae anfractibus plicatis nodoſisque.
Liſt. Conch. t. 939. *f.* 34. a.
Klein oſtr. t. 3. *f.* 56.
Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 70.
Martin. Conch. 4. *t.* 123. *f.* 1141. 1142.
Habitat paulo rarior in India.

Scala. 95. M. teſta umbilicata: ſpirae anfractibus diſtantibus cuneatis coſtatis transverſim ſtriatis, apertura cordata.
Muſ. Leeſ. f. b.
Chemn. Conch. 4. *p.* 1. *vign.* 37. *f.* a. b. c.

Habitat rarus - - - teſta ex rufeſcente alba, frequentius flava faſciis dilute fuſcis varia.

Fiſcellum. 160. M. teſta angulata longitudinaliter plicata transverſim ſtriata: labro dentato, fauce violacea, cauda recta brevi. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 242. *t.* 160. *f.* 1524. 1525.
Habitat ad inſulam Pulo Condore, *prope* Sinam.

Corona. 161. M. teſta faſtigiata fuſco et flaveſcente faſciata: anfractibus ſupra planiuſculis; lamellis undoſis imbricatis, cauda recta integra. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 243. *t.* 161. *f.* 1526. 1527.
Davil. catal. raiſ. 1. *t.* 9. *f.* A.
Habitat in ſinu mexicano.

Dolarium. 96. M. teſta patulo-caudata ovata: anfractibus cingulis aliquot elevatis obtuſis.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 347.
Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 74? 75?
Knorr Vergn. 5. *t.* 3. *f.* 5.
Habitat in Oceano, *teſta cornea, juglandis magnitudine, utrinque attenuata, cingulis pluribus òbtuſis maxime elevatis cincta, duobus in ſpira anfractus, columella perforata, apertura ovata, anterius ſubtransverſa, ad marginem exteriorem ſecundum cingula excavata, poſterius in canalem vix manifeſtum vixque emarginatum attenuata.*

corneus. 97. M. teſta oblonga rudi: anfractuum marginibus complicatis, apice tuberculoſo, apertura edentula, cauda adſcendente. *It. wgoth. t.* 5. *f.* 6. (*foſſilis*).
Liſt. anim. angl. t. 3. *f.* 4.
Gualt. teſt. t. 46. *f.* F?
Habitat in mari ſeptentrionali *et* britannico, *teſta digito breviore, ſub cornea epidermide alba, pellucida, transverſim ſtriata, ſpirae anfractibus* 8 *teretibus.*

lignarius. 98. M. teſta oblonga rudi: anfractibus obtuſe nodoſis, apertura edentula, cauda brevi rectiuſcula.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 32?
Seb. muſ. 3. *t.* 52. *f.* 4.
Knorr Vergn. 6. *t.* 26. *f.* 5.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *teſta vix digitum longa, laevi, rudi, anfractibus ſimplici nodorum ſerie.*

Trapezium. 99. M. teſta oblonga obtuſe angulata: anfractibus ſubnodoſis, apertura dentata, cauda breviore recta. *Muſ. Lud. Ulr.* 643. *n.* 325.

Rumpf

Rumpf muſ. t. 29. *f.* E. *et t.* 49. *f.* K. Pſeudopurpura.
Liſt. Conch. t. 931. *f.* 26.
Bonann. recr. 3. *f.* 287.
muſ. Kircher. 3. *f.* 288.
Gualt. teſt. t. 46. *f.* B.
Argenv. Concb. t. 10. *f.* F.
Muſ. Gottwald. t. 28. *f.* 208. *et t.* 29. *f.* 210. 210. a. b.
Knorr Vergn. 4. *t.* 20. *f.* 1.
Martin. Conch. 4. *t.* 139. *f.* 1298. 1299.
β) *Liſt. Conch. t.* 920. *f.* 12.
Rumpf muſ. t. 29. *f.* G. *et t.* 49. *f.* F.
Gualt. teſt. t. 52. *f.* T.
Argenv. Conch. t. 10. *f.* H.
Muſ. Gottwald. t. 34. *f.* 22. a. b.
Knorr Vergn. 2. *t.* 15. *f.* 3.
Martin. Conch. 4. *t.* 140. *f.* 1310. 1311.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 2. *f.* 10.
Habitat in Oceano indico, *teſta interdum ultra* 6 *pollices longa, apertura intus transverſim ſtriata, columella plicata, cauda extus rugoſa, anfractibus ſingulis lineu gemina fuſca, et tuberculorum obtuſorum ſerie notatis.*

Veſpertilio. 100. M. teſta ſolida ventricoſa laevi: apertura oblongo-ovali, cauda ſpiraque coronata ſtriatis: anfractibus extimis canaliculatis.
Liſt. Conch. t. 884. *f.* 6. a. *et t.* 885. *f.* 6. b.
Valent. Abh. t. 6. *f.* 57. 58.
Muſ. Gottwald. t. 31. *f.* 213. a.
Martin. Conch. 4. *t.* 142. *f.* 1323. 1324. 1326. 1327.
Schroet. Einl. in Verſt. 4. *t.* 8. *f.* 2.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 52. *f.* 6?
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 164. *f.* 1566. 1567.
Habitat in Oceano indico, *teſta ultra* 4 *pollices longa ſpadicea, intus incarnata.*

Scolymus. 101. M. teſta tenui diaphana ventricoſa transverſim ſtriata; dorſi medio laevi, ſpira obtuſe undulatimque nodoſa, columella triplicata.
Martin. Conch. 4. *t.* 142. *f.* 1325.
β) *Gualt. teſt. t.* 52. *f.* R?
Habitat - - - *inter volutas et murices quaſi medius, teſta alba: ſpirae anfractibus* 9-10, *tuberculis intus cavis, cauda annulata.*

Harpa. 102. M. teſta ventricoſa longitudinaliter coſtata: coſtis transverſim ſtriatis, ſpira prominula; anfractibus diſtantibus.
Martin. Conch. 4. *t.* 142. *f.* 1328-1330.
Habitat - - -

Tuba. 103. M. teſta fuſiformi transverſim ſtriata alba: ſpirae apice ſubfuſco, anfractibus diſtantibus baſi nodis coronatis.
Martin. Conch. 4. *t.* 143. *f.* 1333.
Habitat rarus in Sina, *teſta 6 fere pollices longa, cauda ſatis longa, ſpirae anfractibus* 8.

ſyracuſanus. 104. M. teſta oblonga: anfractibus ſtriatis plicatis tuberculoſo-carinatis, apertura edentula, cauda brevi.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 80.
Habitat rariſſimus in mari mediterraneo, *anfractuum tectis teſtaceis, parietibus albis, cauda mediocri extrinſecus oblique ſtriata.*

craticulatus. 105. M. teſta oblonga: anfractibus rotundatis plicatis transverſim reticulatis, apertura dentata, cauda brevi.
Rondel. teſt. 89. Turbo angulatus.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta albida longitudinaliter ſubplicata: angulis elevatis ferrugineis, anfractibus ſtriis elevatis, apertura intus ſtriata.*

ſcriptus. 106. M. teſta ſubecaudata fuſiformi laevi pallida: ſtriis fuſcis longitudinalibus variis, labio dentato.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta oblonga, ſemine hordei paulo majore, ſtriis flexuoſis ſubpiceis notata.*

ternatanus. 107. M. teſta transverſim ſtriata: anfractibus diſtantibus undulatim tuberculatis, apertura oblonga, cauda recta longiuſcula.
Liſt. Conch. t. 892. *f.* 12.
Valent. Abh. t. 1. *f.* 2.
Seb. muſ. 3. *t.* 52. *f.* 5.
Muſ. Gottwald. t. 31. *f.* 211. a. b. c. *f.* 212. a. b. *et f.* 214.
Knorr Vergn. 6. *t.* 15. *f.* 4. *et t.* 26. *f.* 1.
Martin. Conch. 4. *t.* 140. *f.* 1304. 1305.
Habitat ad littora inſulae Ternate, *teſta flava, ad 4 usque pollices longa.*

Infundibulum. 108. M. teſta umbilicata undulatim nodoſa, ſtriis elevatis fuſcis varia, umbilico infundibuliformi columella biplicata.
Liſt. Conch. t. 921. *f.* 14.

Bonann.

Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 104.
Seb. muſ. 3. *t.* 50. *f.* 54.
Chemn. Conch. 4. *p.* 143. *vign.* 39. *f.* A.
Habitat rariſſimus - - - teſta 4 *pollices longa, ſpirae anfractibus* 9.

polygonus. 109. M. teſta ſubventricoſa undulatim tuberculata ſtriata ſulcataque obtuſe multangula atra: apertura ovali, cauda brevi.
Liſt. Conch. t. 922. *f.* 15.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 75.
Gualt. teſt. t. 52. *f.* P.
Argenv. Conch. t. 10. *f.* L.
Muſ. Gottwald. t. 34. *f.* 222. g.
Knorr Vergn. 5. *t.* 10. *f.* 4. *et* 6. *t.* 15. *f.* 5. *et t.* 37. *f.* 1.
Martin. Conch. 4. *t.* 140. *f.* 1306-1309. *et t.* 141. *f.* 1314-1316.
Habitat in Oceano indico, *infundibulo affinis, teſta* $3\frac{1}{2}$ *pollices longa, nunc umbilicata, nunc umbilico nullo, columella nunc plicata, nunc laeviſſima.*

islandicus. 110. M. teſta transverſim ſtriata ſub epidermide fuſca nivea, ſpirae apice papilloſo, anfractibus teretibus; primo praegrandi ventricoſo.
Martin. Conch. 4. *t.* 141. *f.* 1312. 1313.
Habitat frequens ad Islandiae littora, *teſta ad* 5 *fere pollices longa, ſpirae anfractibus* 6-9, *apertura oblonga, cauda brevi, labro acuto, columella laevi.*

laevigatus. 111. M. teſta fuſiformi: ſpirae transverſim ſtriatae anfractibus diſtantibus planiuſculis; primo tereti laevi, cauda longiuſcula.
Argenv. Conch. t. 29. *n.* 6. *f.* 4.
Martin. Conch. 4. *t.* 141. *f.* 1319. 1320.
Schroet. Einl. in Verſt. 4. *t.* 10. *f.* 7.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis in Campania gallica *inventus, teſta ad* $3\frac{1}{4}$ *pollices longa, apertura ovali.*

foſſilis. 112. M. teſta fuſiformi tenui cancellata: cauda longa.
Martin. Conch. 4. *t.* 141. *f.* 1321. 1322.
Schroet. Einl. in Verſt. 4. *t.* 8. *f.* 5.
Habitat - - - foſſilis modo repertus prope Courtagnon Campaniae gallicae, *teſta* $1\frac{1}{4}$ *pollicem longa, anfractibus nunc magis nunc minus diſtantibus, columella nunc plicata, nunc laevi.*

candidus. 113. M. teſta nivea transverſim ſtriata: ſpirae anfractibus diſtantibus medio carinatis tuberculis coronatis, apertura ovali, labro intus ſulcato margine denticulato.
Martin. Conch. 4. *t.* 144. *f.* 1339.
Habitat - - - teſta 9½ *pollices longa.*

anſatus. 114. M. teſta fuſca transverſim ſtriata: ſpira mucronata; anfractibus convexis diſtantibus baſi nodoſis, cauda longa.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 62.
Martin. Conch. 4. *t.* 144. *f.* 1340.
Habitat - - - teſta 5¼ *pollices longa, ſtriis alternatim minoribus.*

undatus. 115. M. teſta ſolida ventricoſa undato-multangula tenuiſſime transverſim ſtriata, ſpira mucronata: anfractibus baſi nodoſis, labro denticulato.
Martin. Conch. 4. *t.* 145. *f.* 1343.
Habitat rarus in India, *teſta alba,* 8½ *pollicem longa ponderoſa, ſpirae anfractibus* 14, *cauda ſubincurva.*

longiſſimus. 116. M. teſta tenui ſtriata: ſpira obtuſa nodoſa, cauda longa rectiſſima.
Martin. Conch. 4. *t.* 145. *f.* 1344.
Habitat rarus in India, *teſta alba* 9 *pollices longa, ſpirae anfractibus* 10; *nodis crebrioribus humilioribus, quam in undato.*

Lancea. 117. M. teſta anguſtata: ſpirae anfractibus transverſim coſtatis longitudinaliter crenatis, apertura ovata intus albo-coſtata margine dentata, columella biplicata.
Martin. Conch. 4. *t.* 145. *f.* 1347.
Habitat in Amboina, *teſta inter murices tenuiſſima et anguſtiſſima, juniorum rubella, adultiorum alba, coſtarum interſtitiis et apertura violaceis, ſpirae anfractibus* 11-12.

anguſtus. 118. M. teſta anguſtata: ſpirae anfractu primo longitudinaliter plicato transverſim coſtato; reliquis laevibus teretibus, cauda transverſim coſtata.
Valent. Abh. t. 1. *f.* 6.
Habitat - - - Lanceae affinis.

verſicolor. 119. M. teſta ſubcylindrica: ſpira obtuſa; anfractibus teretibus ſtriatis, inferioribus ceterum glabris.
Knorr Vergn. 3. *t.* 14. *f.* 1.
Martin. Conch. 4. *t.* 146. *f.* 1348.

Habitat

Habitat in India, *teſta fuſca varia, rarius nivea, ſpirae anfractibus* 9.

verrucoſus. 120. M. teſta umbilicata cingulis, mediis elatioribus, cincta: anfractibus tuberculis fuſco maculatis coronatis, cauda inflexa.
Martin. Conch. 4. *t.* 146. *f.* 1349. 1356.
α) *Martin. Conch.* 4. *t.* 144. *f.* 1341.
β) *Bonann. recr. et muſ. Kircher.* 3. *f.* 88.
γ) *Muſ. Gottwald. t.* 43. *f.* 221. e?
Habitat in mari rubro.

ſtriatulus. 121. M. teſta tenui transverſim ſtriata: ſpira mucronata; anfractibus teretibus, cauda longa, apertura ovata, labro crenulato.
Muſ. Gottwald. t. 34. *f.* 221. c. d.
Martin. Conch. 4. *t.* 146. *f.* 1351. 1352.
Habitat - - - *teſta* 4 *pollices longa: epidermide fuſca.*

Pardalis. 122. M. teſta rotundata alba violaceo maculata longitudinaliter coſtata transverſim ſtriata: ſpira obtuſa, cauda elongata.
Knorr Vergn. 2. *t.* 3. *f.* 4.
Martin. Conch. 4. *t.* 149. *f.* 1384.
β) *Bonann. recr. et muſ. Kircher.* 3. *f.* 145.
Habitat - - -

Gigas. 123. M. ſpirae anfractibus turgidis gibbis nodoſis annulatis, cauda reflexa, labro inferne denticulato.
Liſt. Conch. t. 931.a.
Habitat - - - *teſta* 21 *pollices longa.*

lignoſus. 124. M. teſta albida: ſpira obtuſa: anfractibus ſubcoronatis tuberculis rugoſis inaequalibus, cauda transverſim ſtriata.
Gualt. teſt. t. 52. *f.* O.
Habitat - - - *teſta* 1½ *pollicem longa.*

gibbulus. 125. M. teſta turrita aurantia: ſpira obtuſa; anfractibus diſtantibus longitudinaliter coſtatis transverſim flexuoſe ſtriatis, cauda brevi.
Knorr Vergn. 5. *t.* 10. *f.* 4.
Habitat rarus - - - *an varietas polygoni?*

granularis. 126. M. teſta turrita: ſpirae anfractibus contiguis linea flexuoſa diſcretis; primo ventricoſo.
Knorr Vergn. 5. *t.* 14. *f.* 4.
Habitat in mari adriatico.

127. M.

Vexillum. 127. M. teſta turrita transverſim coſtata: ſpirae anfractibus convexis, apertura ovali, labro denticulato, cauda brevi.
Knorr Vergn. 6. *t.* 26. *f.* 5.
Habitat - - - teſta aurantia: cingulis fuſcis.

vulpinus. 128. M. teſta oblonga ventricoſa: anfractuum margine ſtriato, apertura glabra, cauda brevi extrorſum flexa.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. 1. *p.* 318. 319. *t.* 11. *f.* 10. 11.
Habitat - - - teſta ſpadicea mediae magnitudinis, ſpirae anfractibus 8.

afer. 129. M. teſta ovata transverſim ſtriata: ſpirae anfractibus planiuſculis tuberculorum rotundatorum ſerie coronatis.
Adanſ. Seneg. 1. *p.* 125. *t.* 8. *f.* 18. Lipin.
Habitat ad Senegal, *teſta ad* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, fulva, aut alba fuſcoque varia, ſpirae anfractibus* 9.

campanicus. 130. M. teſta ventricoſa: ſpira obtuſa cancellata; anfractibus carinatis, primo ventricoſo caudaque longa laevibus.
Argenv. Conch. t. 29. *n.* 6. *f.* 5.
Schroet. Einl. in Verſt. 4. *t.* 8. *f.* 7.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis in Campania gallica *inventus, teſta* 3 *pollices longa.*

arenoſus. 131. M. ſpirae anfractibus decuſſatim coſtatis: primo praegrandi, tribusque extimis laevibus, cauda acuta, apertura ovali, labro exterius dentato.
Spengl. n. Samml. Schr. daen. Geſ. 1. *p.* 373. *t.* 2. *f.* 8.
Habitat in arena littorea Indiae, *teſta minuta.*

maroccenſis. 132. M. teſta anguſtata ſubfuſca transverſim ſtriata: ſpira mucronata: anfractibus diſtantibus contrariis teretibus longitudinaliter coſtatis, cauda prominula, apertura ovali.
Martin. n. Mannigfalt. 4. *p.* 422. *t.* 2. *f.* 17-19.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 4. *f.* 6.
Chemn. Conch. 9. *t.* 105. *f.* 896.
Habitat frequens ad littus maroccenſe, *teſta* $1\frac{1}{4}$ *pollices longa.*

166. M.

An diſtinctae hujus tribus ſpecies teſtae, quas Liſter *Conch. t.* 913. *f.* 5. *t.* 914. *f.* 6. *t.* 921. *f.* 14. *t.* 924. *f.* 16. *t.* 926. *f.* 20. *t.* 927. *f.* 21. *t.* 930. *f.* 25. *t.* 932. *f.* 27. *t.* 935. *f.* 28. *t.* 936. *f.* 31. *t.* 950. *f.* 44. b. *et t.* 1057. *f.* 2. Klein *oſtr. t.* 3. *f.* 62. *et* 68. Bonanni *recr. et muſ. Kircher.* 3. *f.* 47. 53. 72. 76. 79. *et* 145. Gualtieri *teſt. t.* 46. *f.* D. *t.* 50. *f.* B. *t.* 52. *f.* A. H. Q. S. Argenville *Conch. t.* 9. *f.* S. *et t.* 10. *f.* N. Seba *muſ.* 3. *t.* 49. *f.* 60. *et t.* 52. *f.* 7. *et* 9. *et* Muſ. Gottwald. *t.* 31. *f.* 210. c. *et* 213. b. *t.* 34. *f* 221. b. 222. d. 222. e. 222. *f.* 222. h. 222. i. *et* 223. a. b. *delineatas ſiſtunt?*

lineatus. 166. M. teſta oblonga albida transverſim rufeſcente ſtriata, cauda brevi recta. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 278. *t.* 164. *f.* 1572.
Habitat ad novam Seelandiam.

Perron. 167. M. teſta ſubturrita: anfractibus ſupra carinatis, marginatis, complanatis, cauda recta elongata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 278. *t.* 164. *f.* 1573. 1574.
Davil. cat. raiſ. 1. *t.* 5. *f.* L.
Habitat in Oceano auſtrali.

Larva. 168. M. teſta cylindrica: ſpira cingulo calloſo-crenato; anfractibus ſuperioribus plicato-nodoſis, inferioribus planiuſculis, cauda recta brevi emarginata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 280. *t.* 164. *f.* 1575. 1576.
Habitat - - -

neritoideus. 169. M. teſta ſolida craſſa rudi: ſpira exſerta; anfractibus transverſim ſtriatis, apertura ſemiorbiculata ſtriata, cauda brevi recta. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 280. *t.* 165. *f.* 1577. 1578.

priſmaticus. 170. M. teſta ovato-angulata longitudinaliter ſulcata plicataque irideſcente, cauda recta, labro denticulato. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 282. *t.* 169. *f.* 1635. 1636.
Martyn Conch. 1. *f.* 2.
Habitat in Oceano indico *et* auſtrali.

Columbarium. 171. M. teſta longitudinaliter plicato-coſtata transverſimque ſulcata angulata ſpinoſa, carinata alternatim albo fuſcoque varia, anfractibus gradatis, cauda recta brevi, fauce violacea. *Chemn. Conch.* 18. *p.* 284. *t.* 169. 1637. 1638.
Martyn Conch. 1. *f.* 4.
Habitat ad inſulam Pulo Condore.

aſperrimus. 172. M. teſta fuſco, flavo alboque varia coſtata; anfractibus obliquis margine tuberculatis: faſcia media fuſca, altera alba cauda brevi dilatata adſcendente. *Kaemm. Cab. Rudolſt.* *p.* 137. *n.* 4. *t.* 9. *f.* 7.
Habitat - - - *teſta 2 fere pollices longa.*

undulatus. 173. M. teſta alba badio undulata ſulcata: ſulcis elevato-ſtriatis, anfractibus margine noduloſis, cauda recta. *Kaemm. Cab. Rudolſt. p.* 138. *n.* 5. *t.* 10. *f.* 1.
Habitat in mari rubro, *teſta ultra 4 pollices longa.*

η Tur-

η Turriti *ſubulati, cauda breviſſima.*

Vertagus. 133. M. ſpirae anfractibus ſuperne plicatis, cauda adſcendente, columella intus plicata.
Rumpf muſ. t. 30. *f.* K. Strombus caudatus albus.
Petiv. gaz. t. 56. *f.* 4.
Liſt. Conch. t. 1020. *f.* 83.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 84.
Gualt. teſt. t. 57. *f.* D.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* P.
Klein oſtr. t. 7. *f.* 118.
Seb. muſ. 3. *t.* 50. *f.* 22. *et* 42. *et t.* 51. *f.* 24. 33. 34.
Knorr Vergn. 6. *t.* 40. *f.* 4. 5.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 28.
Martin. Conch. 4. *t.* 156. 157. *f.* 1479. 1480.
β) *Liſt. Conch. t.* 1021. *f.* 85. b.
Gualt. teſt. t. 57. *f.* F. H.
Seb. muſ. 3. *t.* 50. *f.* 43. 44.
Knorr Vergn. 3. *t.* 20. *f.* 3. *et* 5. *t.* 15. *f.* 6.
Martin. Conch. 4. *t.* 157. *f.* 1481. 1482.
Habitat in India, *teſta alba* 3 *circiter pollices longa, forma digiti, ſpirae anfractibus teretibus,* 15 *et pluribus, ſulco diſcretis, inferioribus altera parte laevibus, cauda breviſſima.*

Aluco. 134. M. ſpirae anfractibus tuberculatis: ſtria media ſpinoſa, columella uniplicata, cauda adſcendente. *Muſ. Lud. Ulr.* 643. *n.* 326.
Rumpf muſ. t. 30. *f.* O. Strombus anguloſus.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 10. *f.* 2. Cerite.
Liſt. Conch. t. 1025. *f.* 87.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 67. 69.
Gualt. teſt. t. 57. *f.* G.
Seb. muſ. 3. *t.* 50. *f.* 15. 16. 36.
Knorr Vergn. 1. *t.* 16. *f.* 4.
Martin. Conch. 4. *t.* 156. *f.* 1473-1477.
Schroet. Fluſconch. t. 8. *f.* 13.
β) *Argenv. Conch. t.* 11. *f.* H. Eruca contabulata.
Liſt. Conch. t. 1017. *f.* 79.
Rumpf muſ. t. 30. *f.* N.
Gualt. teſt. t. 57. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 50. *f.* 37. 39. *et t.* 51. *f.* 22. 23. 25.
Knorr Vergn. 3. *t.* 16. *f.* 5.
Martin. Conch. 4. *t.* 156. *f.* 1478.
γ) *Spengl. Naturf.* 9. *t.* 5. *f.* 3.

Favann.

Favann. Conch. t. 79. *f.* N.
Chemn. Conch. 10. *t.* 162. *f.* 1548. 1549.
δ) *Schroet. Flusconch. t.* 8. *f.* 11. 12.
ε) *Bonann. recr. et muſ. Kircher.* 3. *f.* 82.
ζ) *Gualt. teſt. t.* 57. *f.* B?
Habitat in Oceano auſtrali indico, mari rubro, atlantico, *teſta ad* 4 *pollices longa, utplurimum exalbida, guttis caeruleis vel ſubfuſcis conſperſa, anfractibus transverſim ſtriatis, labro rotundato, apertura ovali.*

annularis. 135. M. ſpirae anfractibus cingulatis: cingulis longitudinaliter, anfractu primo transverſim ſtriato, cauda adſcendente.
Martin. Conch. 4. *t.* 157. *f.* 1486.
Habitat - - -

plicatulus. 136. M. teſta ventricoſa: ſpira transverſim ſtriata; anfractibus longitudinaliter nodoſo-plicatis, apertura ovali.
Martin. Conch. 4. *t.* 157. *f.* 1488.
Habitat - - - *teſta flavicante: plicis albis, ſpirae anfractibus* 8, *columellae ruga ſolitaria.*

ſordidus. 137. M. teſta ventricoſa transverſim ſtriata nodis atris coronata: labro ſubalato.
Martin. Conch. 4. *t.* 157. *f.* 1490.
Habitat - - - *teſta utplurimum caeruleſcente, cauda vix prominula; an forſan ſtrombi tuberculati varietas?*

cingulatus. 138. M. ſpira transverſim ſtriata ſulcataque: anfractibus granulis trifariam cinctis; primo ſubnodoſo.
Martin. Conch. 4. *t.* 157. *f.* 1492.
Habitat Tranquebariae.

fuſcus. 139. M. teſta fuſca rotundata: ſpirae anfractu primo gibbo, ſequentibus varicoſis, extimis multifariam ſpinoſis.
Liſt. Conch. t. 120. *f.* 15.
Klein oſtr. t. 2. *f.* 38.
Martin. berl. Magaz. 4. *t.* 10. *f.* 54.
Habitat in - - - *fluviis.*

faſciatus. 140. M. teſta transverſim ſtriata: ſpira coronata.
Liſt. Conch. t. 121. *f.* 16.
Martin berl. Magaz. 4. t. 10. *f.* 55.
β) *Liſt. Conch. t.* 121. *f.* 17.
Klein oſtr. t. 2. *f.* 39.
Martin. berl. Mag. 4. *t.* 10. *f.* 56.
Habitat in Africae fluviis.

141. M.

fluviatilis. 141. M. teſta fuſca: ſpirae anfractibus primis ſpinis, reliquis nodis coronatis, apertura repanda.
Liſt. Conch. t. 122. *f.* 20.
Martin. berl. Magaz. 4. *t.* 11. *f.* 58.
Habitat in - - - fluviis.

alatus. 142. M. teſta reticulata: ſpira mucronata; anfractu primo ſulcato et transverſim ſtriato, labro alato.
Martin. Conch. 4. *t.* 159. *f.* 1503. 1504.
Habitat - - - ſpira annulata: anfractibus 9 *faſcia ſtriata cinctis.*

nodulofus. 143. M. teſta transverſim ſtriata alternatim fuſco alboque faſciata: ſpira mucronata; anfractibus diſtantibus undulato-nodoſis.
Martin. Conch. 4. *t.* 159. *f.* 1505. 1506.
Habitat - - - labro prominulo.

Terebella. 144. M. ſpirae anfractibus ſingulis cingulo triplici moniliformi, apertura ovali intus arcuatim ſtriata.
Knorr Vergn. 3. *t.* 15. *f.* 3.
Martin. Conch. 4. *t.* 155. *f.* 1458-1460.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 5. *f.* 2.
β) *Bonann. recr.* 3. *f.* 327.
muſ. Kircher. 3. *f.* 328.
γ) *v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. p.* 329. *t.* 11. *f.* 16.
Habitat - - - teſta pollicem ad 2½ *longa, nunc ſpadicea, nunc fuſca, nunc ex ſpadiceo alba, nunc unicolore, nunc ſpadicea cingulis albis, nunc alba cingulis ſpadiceis, apertura interdum ex caeruleo alboque varia.*

fuſcatus. 145. M. ſpirae anfractibus crenulatis: ſtria ſuperiore denticulata.
Gualt. teſt. t. 56. *f.* H.
Argenv. Conch. t. 11. *f. ult.*
Habitat in mari mediterraneo, *teſta ſub epidermide fuſca alba, baſi obtuſa, anfractibus ſingulis medio cingulo nodoſo, utrinque faſcia altera granulata, altera crenulata.*

146. M.

Au hanc muricum familiam quoque ſpectant teſtae a Liſtero *Conch. t.* 1019. *f.* 82. *et t.* 1024. *f.* 90. *et* 91. *a* Bonanni *recr. et muſ. Kircher.* 3 *f.* 81. 83. 108. *et* 344. *a* Klein *oſtr. t.* 7. *f.* 120. *a* Gualtieri *teſt. t.* 56 *f.* E. L. *et t.* 58. *f.* F. *et a* Seba *muſ.* 3. *t.* 50. *f.* 20. 21. 26. 27. 32-36. 38. 40. 41. 45. 46. *et* 53. *et t.* 51. *f.* 26-30. *an diſtinctae ſpecies?*

torulofus. 146. M. ſpirae anfractibus ſuperne zona toruloſa, cauda brevi.
Habitat - - - teſta alba laevi vel obſolete longitudinaliter ſtriata, apice plicata, anfractuum zona elevata, gibba, obtuſa.

Radula. 147. M. ſpirae anfractibus tuberculatis: ſtriis duplici ſerie punctatis.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 539. *t.* 3. *f.* 6.
Habitat in mari africano, *teſta rubella, fuſca, vel ſubfuſca, tuberculis ſaepe apice albis, apertura ovali.*

aſper. 148. M. ſpirae anfractibus ſulcatis transverſim ſtriatis muricatis, cauda adſcendente.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 540. *t.* 3. *f.* 7.
Habitat ad Guineam, *teſta lactea, ſeriatim fuſco punctata, ſolida: ſulcis longitudinalibus* 12-14, *apertura ſubovali, columellae plica ſolitaria.*

granulatus. 149. M. teſta tuberculis decuſſatim adſperſa: cauda acuta adſcendente.
Rumpf muſ. t. 30. *f.* L. Strombus caudatus anguloſus.
Liſt. Conch. t. 1020. *f.* 84.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* K.
Klein oſtr. t. 7. *f.* 119.
Seb. muſ. 3. *t.* 51. *f.* 35.
Martin. Conch. 4. *t.* 157. *f.* 1483.
Habitat in India, *teſta* 2 *pollices longa, alba anfractibus longitudinaliter coſtatis transverſim ſtriatis, apertura ovali, columellae plica unica.*

decollatus. 150. M. ſpirae anfractibus longitudinaliter plicato ſulcatis: apice decollato.
Habitat - - - helici decollatae ſimilis, at baſi emarginata, apertura obovata, anfractuum margine ſuperiori attenuato: ſtriis longitudinalibus plicis imbricatis: ſulcis ipſis atris opacis.

moluccanus. 151. M. teſta ſtriata: ſpirae anfractibus transverſim ſulcatis longitudinaliter undulatim plicatis, labro ſubalato crenulato, cauda tubuloſa.
Liſt. Conch. t. 1021. *f.* 85.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 68.
Rumpf muſ. t. 30. *f.* T.
Gualt. teſt. t. 57. *f.* E.

 Martin.

Martin. Conch. 4. *t.* 157. *f.* 1484. 1485.
Habitat in inſularum moluccarum uliginoſis.

minimus. 152. M. teſtae ſtriis transverſis undulatis lineas longitudinales decuſſantibus, apertura orbiculata.
Liſt. Conch. t. 1018. *f.* 81.
Habitat in mari Jamaicam circumfluente.

ſtrigilatus. 153. M. teſta longitudinaliter ſtriata: anfractibus indiviſis; cingulo ſuturali niveo rufo maculato. *v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. ind. p.* 260. *t.* 10. *f.* 10.
Habitat - - -

tuberculatus. 154. M. teſta transverſim ſtriata nodis glabris cincta: labro incraſſato. *v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. p.* 282. *t.* 10. *f.* 16. 17.
Habitat - - - *teſta ſolida, ſubgibba, obtuſa: nodis nigris, apice albis.*

gibboſus. 155. M. ſpirae anfractibus marginatis, ventre gibbo, labro fiſſo denticulato, cauda brevi. *v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. p.* 325. *t.* 11. *f.* 12. 13.
Habitat - - - *ſpirae anfractibus* 9 *transverſim ſtriatis, longitudinaliter plicatis, cauda recta alba, maculis rubellis varia.*

atratus. 156. M. teſta atra: anfractibus transverſim ſtriatis tuberculatis, columella uniplicata, cauda recta. *v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. p.* 329. *t.* 11. *f.* 17. 18.
Habitat - - - *ſpirae anfractibus* 10, *labro crenulato.*

contrarius. 157. M. teſta patulo-caudata contraria, ſtriis geminatis. *Mant. p.* 551.
Liſt. Conch. p. 950. *f.* 44. b. c.
Bonann. muſ. Kirch. 3. *n.* 399.
Regenſ. Conch. 2. *t.* 4. *f.* 36.
Mant. n. Mannigf. 4. *t.* 2. *f.* 14.
Favann. Conch. t. 32. l. N. *t.* 79. l. F. *t.* 80. l. R.
Chemn. Conch. 9. *t.* 105. *f.* 894. 895.
Habitat in mari ſeptentrionali.

eburneus. 158. M. teſta contraria hyalina: anfractibus ſex ſubtiliſſime crenulatis. *Chemn. Conch.* 9. *p.* 66. *t.* 105. *f.* 899.
Habitat in mari - - -

conditus. 174. M. teſta turrita granulis ſcaberrima: labro duplicato utrinque emarginato intus dentato, apertura ovali ſtriata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 254. *t.* 162. *f.* 1544. 1545.
Habitat - - - Aluconi affinis.

Clava. 162. M. teſta transverſim ſtriata maculata, anfractibus plicato-nodoſis, cauda adſcendente, labro duplicato dilatato, labio replicato glabro. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 256. *Vign.* 22. *f.* A. B.
Martyn Conch. 2. *f.* 57.
Habitat ad inſulam Pulo-Condore *prope* Sinam.

hexagonus. 163. M. teſta flaveſcente hexagona transverſim granulatim ſtriata: anfractu primo tuberculato, apertura ſubrotunda, labro dilatato. *Chemn. Conch.* 10. *t.* 162. *f.* 1554. 1555.
Habitat in mari auſtrali, *frequentior inter petrefacta.*

326. TROCHUS. *Animal* Limax.

Teſta univalvis ſpiralis ſubconica.

Apertura ſubtetragono-angulata ſ. rotundata, ſuperius transverſa coarctata; columella obliquata.

* Umbilicati *erecti, columella perforata.*

niloticus. 1. Tr. teſta conica laeviuſcula ſubumbilicata.
Ol. muſ. t. 29. *f.* 5.
Liſt. Conch. t. 617. *f.* 3. *t.* 619. *f.* 5. *et t.* 620. *f.* 6.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 102.
Rumpf muſ. t. 21. *f.* A. *et* 3. 4.
Gualt. teſt. t. 59. *f.* B. C.
Argenv. Conch. t. 8. *f.* C.
Muſ. Gottwald. t. 39. *f.* 265. a. b. c.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 4. *f.* 42.
Knorr Vergn. 1. *t.* 12. *f* 4. *et* 2. *t.* 5. *f.* 1. *et t.* 6. *f.* 1.
Chemn. Conch. 5. *p.* 3. *vign.* 42. *f.* C. *t.* 167. *f.* 1605-1609. *et t.* 168 *f.* 1614.
Habitat rarior in Oceano indico, *congeneribus major, teſta ponderoſa, ſtriis oblique perpendicularibus rubris, etiam ſubtus picta, detracta extima tunica tota argentea; apice obſo-*

obſolete noduloſo, anfractibus minime nodoſis, apertura argentea, labro interiore obſolete bilobo; a maculato teſtae fauce laevi, columella non denticulata, baſi ventris convexa laevi diſtinctus.

maculatus. 2. Tr. teſta conica tuberculata: umbilico obliquo, labio interiore obſolete bilobo. *Muſ. Lud. Ulr.* 644. *n.* 327.*
Rumpf muſ. t. 21. *f.* B. Trochus maculoſus.
Liſt. Conch. t. 632. *f.* 20?
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 96.
Gualt. teſt. t. 61. *f.* DD.
Muſ. Gottwald. t. 39. *f.* 266. a? b?
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 20.
Chemn. Conch. 5. *t.* 168. *f.* 1615-1618.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 648. *t.* 3. *f.* 9.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 169. *f.* 1623. 1624.
γ) *Rumpf muſ. t.* 21. *f.* C?
Habitat in mari, Aſiam Americamque auſtralem *alluente, teſta magnitudinis variae, ponderoſa, tuberculis ſeriatis variae altitudinis cincta, radiis rubris, fuſcis, albis, viridibus varia, ſpirae anfractibus* 9 *planiuſculis.*

perſpectivus. 3. Tr. teſta convexa, obtuſa marginata: umbilico pervio crenulato. *Muſ. Lud. Ulr.* 646. *n.* 329.*
Rumpf muſ. t. 27. *f.* L. Umbilicata.
Argenv. Conch. t. 8. *f.* M. Solarium.
Liſt. Conch. t. 636. *f.* 24.
Pet. amb. t. 2. *f.* 14.
Bonann. recr. 3. *f.* 27. 28.
muſ. Kircher. 3. *f.* 26. 27.
Gualt. teſt. t. 65. *f.* O.
Leſſer teſtaceoth. f. VII.
Seb. muſ. 3. *t.* 40. *f.* 1. 2. 13. 14. 28. 41. 42.
Knorr Vergn. 1. *t.* 11. *f.* 1. 2.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 6. *f.* 61.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. p. 326. *vign. f.* b.
Chemn. Conch. 5. *p.* 3. *vign.* 42. *f.* E. *t.* 172. *f.* 1691-1696.
Schroet. Journ. 5. *p.* 431. *f.* 8.
β) *Liſt. Conch. t.* 633. *f.* 21.
γ) *Gualt. teſt. t.* 65. *f.* D.
δ) *Bonann. recr. et muſ. Kirch.* 3. *f.* 196?
ε) *Bonann. recr.* 3. *f* 211?
muſ. Kirch. 3. *f.* 210?
ζ) *Bonann. recr. et muſ. Kircher.* 3. *f.* 213?

Habitat

Habitat ad Aſiae auſtralis *et* Africae *littora, teſta* $2\frac{1}{4}$ *pollices ex diametro, et pollicem alta, altero latere plana, umbilico infundibuliformi cingulo granulato duplici, ſtupendo naturae artificio..*

hybridus. 4. Tr. teſta convexa, columella bidentata, umbilico crenulato. *Muſ. Lud. Ulr.* 646. *n.* 330.*
Chemn. Conch. 5. *t.* 173. *f.* 1702? - 1705?
Habitat in mari mediterraneo, *perſpectivo affinis, at teſta minore albo fuſcoque varia, ſubtus tota alba, umbilico anguſtiore.*

cruciatus. 5. Tr. teſta convexa: ſtriis calloſo-punctatis, columella unidentata. *Chemn. Conch.* 5. *t.* 171. *f.* 1674.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 653. *t.* 3. *f.* 10.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta ferruginea aut rubella, avellana minore, faſciis albidis, ſpirae anfractibus* 4-5.

Pharaonis. 6. Tr. teſta ſubovata ſtriata: punctis concatenatis globoſis, columella aperturaque dentata, umbilico crenato. *Muſ. Lud. Ulr.* 647. *n.* 331.*
Rondel. teſt. 104. Umbilicus varius.
Argenv. Conch. t. 8. *f.* L. Q. Camiſole.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 12. *f.* 3. Vaſſat.
Liſt. Conch. t. 637. *f.* 25.
Petiv. gaz. t. 14. *f.* 10.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 222. 223.
Gualt. teſt. t. 63. *f.* B.
Knorr Vergn. 1. *t.* 30. *f.* 6. *et* 4. *t.* 26. *f.* 3. 4.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1672. 1673.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 171. *f.* 1678.
Habitat rarior in mari rubro, mediterraneo, *et ad* Braſiliae *littora, teſta rubra, ſtriis ex punctis concatenatis obſita, alternatim ex albis nigrisque, et ex rubris.*

Magus. 7. Tr. teſta oblique umbilicata convexa: anfractibus obtuſe nodulosis. *Muſ. Lud. Ulr.* 647. *n.* 332.*
Argenv. Conch. t. 8. *f.* S. Sorciera.
Liſt. Conch. t. 641. *f* 32.
Gualt. teſt. t. 62. *f.* L. *t.* 64. *f.* C?
Seb. muſ. 3. *t.* 41. *f.* 4-6.
Knorr Vergn. 6. *t.* 27. *f.* 4.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1656-1660.
β) *Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 12. *f.* 8? Datat.

Habitat varior in mari mediterraneo *et* rubro, *teſta cinerea aut rubra nebuloſa, ſpirae anfractibus* 4-5 *longitudinaliter nodoſis, obſolete ſtriatis.*

Modulus. 8. Tr. teſta ſtriata ſupra plicata, ſubtus convexiore: apertura obovata unidentata.
Liſt. Conch. t. 653. *f.* 52.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1665.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 656. *t.* 3. *f.* 11.
β) *Liſt. Conch.* 653. *f.* 53.
γ) *Liſt. Conch. t.* 654. *f.* 54.
Habitat in mari rubro, *pharaonii magnitudine, teſta ſublenticulari, albida, purpuraſcenti-maculata: fauce ſtriata.*

muricatus. 9. Tr. teſta ſubumbilicata ovata: tuberculis muricatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 648. *n.* 333.*
Gualt. teſt. t. 64. *f.* H.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta avellanae magnitudine alba: apertura ovata, laevi; umbilico minuto oblongo.*

ſcaber. 10. Tr. teſta ſubovata: ſulcis alternis majoribus moniliformibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 648. *n.* 334.*
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1667?
Habitat - - - mago affinis, teſta nigricante: apertura flaveſcente.

varius. 11. Tr. teſta oblique umbilicata convexa: anfractibus ſubmarginatis.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta pallida: faſciis cineraſcentibus, obſoleto margine cincta.*

cinerarius. 12. Tr. teſta oblique umbilicata ovata: anfractibus rotundatis. *Fn. ſuec.* 2167. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 35. *t.* 102. *f.* 1-4. *prodr.* 2925. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 399. *n.* 388.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1686.
Habitat in mari mediterraneo *et* norwegico, *teſta cinerea: faſciis obliquis pallidis, aut alba: maculis ſubſpadiceis.*

divaricatus. 13. Tr. teſta ſubumbilicata ovata: anfractu infimo remotiore, umbilico ſubconſolidato. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 392. *n.* 389.
Habitat in mari mediterraneo *et* groenlandico, *teſta viridi, punctis ſanguineis faſciata.*

umbilicaris. 14. Tr. teſta cylindrico-umbilicata conico-convexa, anfractu ſubemarginato.

Chemn.

Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1666.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta cinerea aut ferruginea nebuloſa: umbilico pervio exacte cylindrico, intus albo.*

ſolaris. 15. Tr. teſta convexo conica: anfractibus ſpinoſo radiatis, apertura ſemicordata. *Muſ. Lud. Ulr.* 645. *n.* 328.
Rumpf muſ. t. 20. *f.* K. Zonnehooren.
Martin. neueſt. Mannigf. 1. *p.* 419. *t.* 2. *f.* 15.
Chemn. Conch. 5. *t.* 173. *f.* 1700. 1701.
β) *Liſt. Conch. t.* 622. *f.* 9.
Bonann. recr. 3. *f.* 366. 367.
muſ. 3. *f.* 359. 360.
Klein aſtr. t. 1. *f.* 19.
Leſſer teſtaceoth. f. 15.
Seb. muſ. 3. *t.* 59. *f.* 1-4.
Knorr Vergn. 4. *t.* 8. *f.* 2. *et* C. *t.* 26. *f.* 4.
Chemn. Conch. 5. *t.* 174. *f.* 1716. 1717.
Schroet. Journ. 5. *f.* 9. (*Operc.*)
Habitat rariſſimus in India, β) *minus rarus in* mari Americam auſtralem *alluente, teſta diametri* 2 *pollicum, transverſim ſtriata, baſi arcuatim, albida,* β) *aurata fuſco radiata.*

Tectum. 16. Tr. teſta depreſſa obliqua alba fuſco lineata: ſpira transverſim ſtriata longitudinaliter coſtata; anfractu primo ventricoſo, apertura orbiculari.
Liſt. Conch. t. 653. *f.* 51.
Gualt. teſt. t. 64. *f.* 6.
Knorr Vergn. 4. *t* 6. *f.* 5.
Chemn. Conch. 5. *t.* 165. *f.* 1567. 1568.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 165. *f.* 1569. 1570?
γ) *Liſt. Conch. t.* 654. *f.* 54.
Favann. Conch. 2. *t.* 8. *f.* D.
Knorr. Cab. Rudolſt. t. 12. *f.* 1.
Chemn. Conch. 10. *t.* 165. *f.* 1583. 1584.
Habitat - - - turbini affinis columellae limbo fuſco, anfractu primo reliquis duplo majore; an helicis potius ſpecies?

Conus. 17. Tr. teſta conica alba rubro maculata: ſpirae anfractibus teretibus: cingulis granulorum moniliformibus.
Chemn. Conch. 5. *t.* 167. *f.* 1610.
Habitat in India, *umbilico tantum ſpirae primum anfractum tranſeunte.*

ſpinoſus. 18. Tr. teſta ſubaequali mucronata: ſpirae anfractibus inferne ſpinoſis, faſcia utrinque albo nigroque lineata, cinguloque nodulorum triplici.
Chemn. Conch. 5. *t.* 167. *f.* 1611.
Habitat rariſſimus - - - teſta mediae magnitudinis violacea et nigricante, ſpirae anfractibus 9.

jujubinus. 19. Tr. teſta lateritia albo-maculata: baſi plana lineis concentricis punctorum concatenatorum: anfractibus canaliculatis margine inferiore albo ſpadiceoque teſſellatis, utrinque punctis elevatis cinctis.
Muſ. Gottwald. t. 39. *f.* 269?
Chemn. Conch. 5. *t.* 167. *f.* 1612. 1613.
Habitat rarus ad inſulam S. Mauritii, *et in* mari, Americam *auſtralem alluente, zizyphino affinis.*

Alveare. 20. Tr. teſta plicato-noduloſa granulatim transverſim ſtriata cinguliſque punctorum concatenatorum exornata, umbilico infundibuliformi, columella crenulata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 168. *f.* 1619.
Gualt. teſt. t. 60. *f.* P.
β) *Chemn Conch.* 5. *t.* 168. *f.* 1622.
Habitat in India, *teſta dilute viridi et alba, intus margaritacea, ſubtiliter annulata.*

concavus. 21. Tr. teſtae baſi et umbilico continuo infundibuliformi, ſpirae anfractibus contiguis undulatim plicatis, apertura margine denticulata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 168. *f.* 1620. 1621.
β) *Gualt. teſt. t.* 63. *f.* A.
γ) *Liſt. Conch. t.* 627. *f.* 13.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 20.

Habitat

Huic tribui trochorum adſcribendae quoque, an diſtinctae ejus ſpecies, quas Liſter *Conch. t.* 61. *f.* 58. *t.* 583. *f.* 37. *t.* 585. *f.* 44. *t.* 616. *f.* 2. *t.* 618. *f.* 4. *t.* 621. *f.* 7. *et* 8. *t.* 623. *f.* 9. a. *t.* 626. *f.* 11. a. *t.* 629. *f.* 15. *t.* 630. *f.* 16. *t.* 631. *f.* 18. *t.* 632. *f.* 19. *t.* 633. *f.* 21. *t.* 638. *f.* 26. *t.* 639. *f.* 27. *et* 28 *t.* 640 *f.* 29. *t.* 641. *f.* 31. *t.* 643. *f.* 35. *t.* 646. *f.* 39. *t.* 648. *f.* 42. *t.* 648. *f.* 43. *et t.* 654. *f* 54. Bonanni *recr. et muſ. Kircher.* 3. *f.* 89. 94. 95. 97. 98. 170 171. 195. 196 202. 207. 213. 341. 396. *recr.* 3. *f.* 211. *muſ. Kircher.* 3. *f.* 210. Klein *oſtr t.* 2. *f.* 35. Rumpf *muſ. t.* 21. *f.* 1. 2. *nr.* 2. *f.* 5 *nr.* 5. *f.* 6. *nr.* 6. *t.* 21. *f.* 8. *nr.* 8. *f.* 9. *nr.* 9. 10. *f* 10. Gualtieri *teſt. t.* 60. *f.* A. C. R *t.* 61. *f.* A. H. I. L. *et t.* 65. *f.* L. M. Argenville *Conch. t.* 8. *f* K. R. *et t.* 27. *f.* 4. *zoomorph. t.* 3. *f.* D. Seba *muſ.* 3. *t.* 41. *f.* 2. Knorr *Vergn.* 1. *t.* 12. *f.* 1. 2 *t.* 2. *f.* 4. 5. 4. *t.* 8. *f.* 2. *et t.* 23. *f.* 2. *et* 6. *t.* 27. *f.* 5. *et* Regenfus *Conch.* 1. *t.* 3. *f.* 27. *delinearunt?*

Habitat in India, *teſta 2 circiter pollices lata et alta, ex thalaſſino, rubro et violaceo miſta, apertura utrinque compreſſa.*

vernus. 22. Tr. teſta granulis nodisque cincta viridi apicem verſus albicante, apice ipſo guttis nigris vario.
Chemn. Conch. 5. *t.* 169. *f.* 1625. 1626.
Habitat in India.

conſperſus. 23. Tr. teſta maculis albis, virentibus et cervinis, apice rubris nigrisque varia, intus margaritacea, baſi alba ſanguineo maculata, anfractibus multifariam nodulofis margine inferiori glabris.
Gualt. teſt. t. 60. *f.* B.
Chemn. Conch. 5. *t.* 169. *f.* 1627.
Habitat in India.

Tentorium. 24. Tr. teſta rugoſo plicata ſub epidermide hyalina thalaſſina intus margaritacea, anfractibus inferne nodulofis, medio punctis concatenatis.
Chemn. Conch. 5. *t.* 169. *f.* 1628.
Habitat in India, *anfractibus 2 primis quam maxime diſtantibus, umbilico infundibuliformi.*

ochroleucus. 25. Tr. teſta plicato rugoſa oblique crenata transverſim ſtriata, baſi plana alba ſanguineo guttata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 169. *f.* 1629.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 169. *f.* 1632.
Habitat in India.

ſtellatus. 26. Tr. teſta plicato-rugoſa thalaſſina: ſpirae anfractibus punctis concatenatis: ſupremis margine radiato-ſpinoſis.
Chemn. Conch. 5. *t.* 169. *f.* 1630.
Habitat in India.

Spengleri. 27. Tr. nodulis granisque ochroleucis rubro undatis multifariam cincta, baſi altera parte laevi.
Chemn. Conch. 5. *t.* 169. *f.* 1631.
Habitat - - -

coſtatus. 28. Tr. teſta punctis elevatis concatenatis: anfractibus infra nodis oblongis albis: ſulcis intermediis purpureis.
Argenv. Conch. t. 8. *f.* T.
Chemn. Conch. 5. *t.* 169. *f.* 1633. 1634.
Habitat - - - *teſtae baſi alba ſtriata punctataque, ſpiram verſus rubro radiata.*

inaequalis. 29. Tr. teſta nodis graniſque inaequalibus aſpera: anfractibus multifariam nodoſis: ordine utroque marginali tuberculis majoribus.
Gualt. teſt. t. 60. *f.* O.
Chemn. Conch. 5. *t.* 170. *f.* 1635. 1636.
Habitat - - - teſta utplurimum viridi ſpadiceo nebuloſa et radiata, baſi alba granuloſa, radiis roſeis.

regius. 30. Tr. teſta transverſim ſtriata multifariam nodoſa alba roſeo obumbrata, anfractuum margine utroque prominulo, umbilico infundibuliformi.
Chemn. Conch. 5. *t.* 170. *f.* 1637.
Habitat - - - teſtae baſi plana alba, ſtriis concentricis granulatis cincta.

verrucoſus. 31. Tr. teſta conica alba purpureo radiata, umbilico infundibuliformi immaculato, anfractuum margine noduloſo.
Chemn. Conch. 5. *t.* 170. *f.* 1638.
Habitat - - -

cylindricus. 32. Tr. teſta cylindrica ſubfuſca: anfractibus convexis; ſtriis transverſis crenulatis, umbilico ſubcrenato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 170. *f.* 1639. a. b.
Habitat rarus - - - teſta mediae magnitudinis.

radiatus. 33. Tr. teſta pyramidali rubro radiata: anfractibus punctis concatenatis, umbilico infundibuliformi.
Chemn. Conch. 5. *t.* 170. *f.* 1640.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 170. *f.* 1641.
γ) *Chemn. Conch. t.* 170. *f.* 1642. *α. β.*
δ) *Gualt. teſt. t.* 61. *f.* E.
Habitat in America *auſtrali*, inſulisque *obverſis.*

viridis. 34. Tr. teſta viridi: anfractu primo quinquefariam, ſecundo quadrifariam noduloſis, reliquis glabris.
Chemn. Conch. 5. *t.* 170. *f.* 1643. 1644.
Habitat - - - teſta mediae magnitudinis, umbilico infundibuliformi, ſecundum ſpirae anfractum non aſſequente.

ruſticus. 35. Tr. teſta obtuſe pyramidali ex atro fuſca.
Chemn. Conch. 5. *t.* 170. *f.* 1645. 1646.
Habitat in Sina.

nigerrimus. 36. Tr. teſta nigerrima: ſpira transverſe ſtriata; anfractibus planiuſculis, columella unidentata.

Chemn.

Chemn. Conch. 5. *t.* 170. *f.* 1647.
Habitat in Sina, *teſta mediae magnitudinis.*

Fanulum. 37. Tr. ſpirae anfractibus ochroleucis plicato-tuberculatis ſulco maculato rugoſo diſcretis.
Bonann. recr. 3. *f.* 396.
muſ. Kircher. 3. *f.* 372.
Knorr Vergn. 4. *t.* 25. *f.* 5.
Chemn. Conch. 5. *t.* 170. *f.* 1648. 1649.
Habitat in aquis fernambucenſibus.

ſtrigoſus. 38. Tr. teſta pyramidali transverſim ſtriata ochroleuca ſanguineo varia apice nigra: ſpirae anfractibus planiuſculis margine ſanguineo maculato tumidiuſculis.
Chemn. Conch 5. *t.* 170. *f.* 1650.
β) Chemn. Conch. 5. *t.* 170. *f.* 1651.
Habitat ad littus Maroccenſe, *teſta minuta.*

Pyramis. 39. Tr. teſta pyramidali ſpadiceo maculata et nebuloſa: anfractibus margine fornicato-noduloſis.
Chemn. Conch. 5. *t.* 170. *f.* 1652.
β) Chemn. Conch. 5. *t.* 170. *f.* 1653.
Habitat - - - teſta ultra dimidium, in β) integrum pollicem alta, inter nodulos marginis granulato ſtriata.

capenſis. 40. Tr. teſta depreſſa albo ſpadiceoque varia: baſi convexa annulo coccineo obſcurius maculato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1661. 1662.
Habitat ad caput bonae ſpei.

aegyptius. 41. Tr. teſta depreſſa alba rubro maculata: anfractibus diſtantibus transverſe ſtriatis plicatisque, columella unidentata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1663. 1664.
Habitat rarior in mari rubro *prope* Suez, *teſta* $\frac{3}{4}$ *pollicis alta.*

depreſſus. 42. Tr. teſta depreſſa albida rubello radiata apice rubra: anfractibus cingulo punctorum moniliformi.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1668.
β) Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1669.
Habitat - - - teſta mediae magnitudinis.

laevigatus. 43. Tr. teſta dilute fuſca baſi ſubconvexa: ſpirae anfractibus laevibus obſolete transverſim ſtriatis, umbilico infundibuliformi albo.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1670.
Habitat - - - teſta minuta.

44. Tr.

groenlandicus. 44. Tr. teſta pellucida incarnata baſi convexa: anfractibus convexis ſubtiliſſime transverſim ſtriatis.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1671.
Habitat ad Groenlandiae *littora*, *ſpirae anfractibus* 6, *apertura ſuborbiculari.*

roſeus. 45. Tr. teſta convexa roſea ſulcata: umbilico minimo.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1675.
Habitat frequens ad caput bonae ſpei, *teſta exili.*

patholatus. 46. Tr. teſta depreſſa fuſca albido maculata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1676.
Habitat - - - *teſta minima.*

viridulus. 47. Tr. teſta virente oblique albo radiata: ſpirae anfractibus convexis cingulo granorum moniliformi inſtructis, columella dentata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1677.
Habitat - - - *teſta mediae magnitudinis.*

urbanus. 48. Tr. teſta convexa multifariam granulata, umbilico denticulato, apertura crenulata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1679.
Habitat - - - *granulis vel nodulis partim albis, partim incarnatis.*

guineenſis. 49. Tr. teſta fuſco canoque nebuloſa, multifariam granulata et noduloſa; apertura crenata, umbilico dentato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1680.
Habitat ad Guineam, *teſta* 8 *lineas lata, et ultra* 6 *alta.*

Nodulus. 50. Tr. teſta cinerea: cingulis granorum moniliformibus, umbilico albo dentato, apertura crenata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1681.
Habitat - - - *guineenſi minor.*

carneus. 51. Tr. teſta depreſſa ſubcarnea: cingulis granorum moniliformibus confertis, umbilico amplo unidentato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1682.
Habitat - - - *nodulo minor.*

teſſellatus. 52. Tr. teſta transverſim ſtriata: ſpirae anfractibus diſtantibus: maculis quadratis multifariis.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1683.
Habitat frequens in mari mediterraneo.

croceus. 53. Tr. teſta convexa ſpadicea: ſpirae anfractibus convexis; extimis croceis.

Chemn.

Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1684.
Habitat frequens ad Africae, *praeſertim* Marochii *littora.*

obliquatus. 54. Tr. teſta convexo-depreſſa radiis obliquis ſubviolaceis varia; ſpirae anfractibus convexis.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1685.
Habitat in mari mediterraneo.

vittatus. 55. Tr. teſta convexa ſpadicea: anfractibus margine ſuperiori vitta ex rubro alboque varia.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1687.
Argenv. Conch. t. 9. *f.* E?
Habitat - - -

Schroeteri. 56. Tr. teſta depreſſo-pyramidali baſi concava: ſpirae anfractibus transverſe ſtriatis oblique coſtatis; primo margine carinato, umbilico infundibuliformi.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 716. 2. *t.* 7. *f.* 2. 3.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis in Campania gallica *inventus.*

indicus. 57. Tr. teſta convexo-conica: anfractibus muticis, apertura ſemicordata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 172. *f.* 1697. 1698.
Habitat in India, *teſta vix pollicem alta ſubtiliſſime oblique ſtriatus umbilico ſpirali, ſpirae anfractibus* 5 *hyalinis.*

infundibuliformis. 58. Tr. teſta depreſſa ſpadicea: ſpirae anfractibus planiuſculis multifariam granulatis transverſim ſtriatis, crenatis, umbilico pervio crenulato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 173. *f.* 1706. 1707.
Habitat rariſſimus - - -

ſtramineus. 59. Tr. teſta ſtraminea: anfractibus convexis crenatis decuſſatim ſtriatis ſulco diſcretis, umbilico pervio.
Liſt. Conch. t. 635. *f.* 23.
Chemn. Conch. 5. *t.* 172. *f.* 1699.
Habitat ad Tranquebariae *littora, ſpirae anfractibus* 5-6.

variegatus. 60. Tr. teſta alba ſubfuſco radiata ſtriis crenatis exarata; umbilico pervio crenato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 173. *f.* 1708. 1709.
Habitat - - -

Areola. 61. Tr. teſta convexa transverſim ſtriata alba maculis quadratis rubellis varia: umbilico crenulato.

Chemn.

Chemn. Conch. 5. *t.* 173. *f.* 1710. 1711.
Habitat - - - *anfractibus ſtria alba diſcretis.*

inermis. 62. Tr. teſta ex viridi lutea: coſtis longitudinalibus plicatis ſpina terminatis, apertura compreſſa umbilico rugoſo.
Chemn. Conch. 5. *t.* 173. *f.* 1712. 1713.
Habitat - - -

imperialis. 63. Tr. teſta conica olivacea, ſquamis violaceis ſeriatis fornicatis tecta: anfractibus inflatis margine ſpinoſo radiatis, umbilico infundibuliformi albo.
Chemn. Conch. 5. *t.* 173. 174. *f.* 1714. 1715.
Habitat in mari auſtrali, *teſta ſatis magna: ſpirae anfractibus* 7.

planus. 64. Tr. teſta depreſſa ſtraminea obſcurius coſtata: ſpirae anfractibus plicatis, umbilico pervio.
Chemn. Conch. 5. *t.* 174. *f.* 1721. 1722.
Habitat - - -

albidus. 65. Tr. teſta conica alba: faſciis obliquis fuſcis, anfractibus prope ſuturam canaliculatis.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 11. *f.* 19. 20. Trochus cinerarius.
Habitat - - -

fuſcatus. 66. Tr. teſta conica: baſi ex viridi cinerea fuſco maculata, anfractibus teretibus, umbilico cylindrico.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 12. *f.* 1. 2. Trochus umbilicaris.
Habitat - - -

faſciatus. 67. Tr. teſta conica laevi alba fuſco maculata, roſeo faſciata: anfractibus teretibus ad ſuturam planiuſculis.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. ind. 1. *p.* 336. *t.* 12. *f.* 3. 4.
Habitat - - - *turbini affinis.*

corallinus. 68. Tr. teſta conica rubra albo punctata ſubumbilicata: anfractibus teretibus; primo 15fariam, altero ſexfariam tuberculatis.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 12. *f.* 4. Fujet.
β) *Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 12. *f.* 5. Sari.
Habitat in Senegalia, *teſta* 4 *lineas longa, ſpirae anfractibus* 6; *an hujus tribus?*

griſeus. 69. Tr. teſta griſea albido maculata: ſpirae anfractibus planiuſculis transverſim ſulcatis.

Adanſ.

Adanſ. Seneg. 1. *t.* 12. *f.* 6. Lonier.
Habitat in Senegalia.

ferrugineus. 70. Tr. teſta convexa: ſpirae anfractibus contrariis.
Martin. neueſt. Manigf. 4. *p.* 404. *t.* 1. *f.* 1. 2.
Chemn. Conch. 9. *t.* 114. *f.* 977. a. b.
Habitat - - - in mineram ferri converſus prope Scaphuſiam.

novus. 71. Tr. teſta pyramidali: anfractibus contrariis teretibus; tribus quatuor trifariam tuberculatis, quarto maximopere diſtante.
Spengl. n. Samml. daen. Geſ. Wiſſenſch. 1. *t.* 1. *f.* 5.
Chemn. Conch. 9. *t.* 113. *f.* 970.
Habitat - - - baſi plana, apertura compreſſa.

fragilis. 72. Tr. teſta tenuiſſima cerea: ſpirae anfractu primo magno; faſcia media fuſca.
Schroet. Flusconch. p. 281.
Einl. in Conch. 1. *p.* 754. *t.* 3. *f.* 16.
Habitat - - - teſta minima.

calloſus. 73. Tr. teſta obtuſe pyramidali: ſpirae anfractibus quatuor elevatis contiguis margine tumidis.
Chemn. Conch. 9. *t.* 122. *f.* 1051.
Schroet. Flusconch. t. 6. *f.* 10.
β) *Schroet. Flusconch. t.* 6. *f.* 12.
Habitat - - - apertura compreſſa, umbilico pervio.

afer. 74. Tr. teſta convexa griſea albido maculata: ſpirae anfractibus planiuſculis.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 12. *f.* 6. Lonier.
Habitat in Senegalia, *teſta 6 circiter lineas longa, at duplo fere latiori.*

neritoideus. 123. Tr. teſta ſubovata convexo depreſſa laevi rubicunda glabra. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 393. *n.* 391.
Habitat frequens ad Groenlandiae *littora, cinerario affinis, teſta 2 lineas longa, incola ex nigro caeruleſcente.*

perlatus. 128. Tr. teſta rubeſcente punctis elevatis inaequaliter coſtata: ſpira depreſſa; anfractibus convexis. *Kaemm. Cab. Rudolſt. p.* 163. *n.* 20. *t.* 12. *f.* 1.
Habitat - - - teſta 7 lineas alta.

** Imper-

** Imperforati, *erecti, umbilico clauſo.*

veſtiarius. 75. Tr. teſta conico-convexa, baſi gibboſo-calloſa, apertura ſubcordata.
Liſt. Conch. t. 649-652. *f.* 44-50.
Petiv. gaz. t. 11. *f.* 6.
Bonann. recr. 3. *f.* 208-210. 355. 356.
muſ. Kircher. 3. *f.* 208. 209. 211. 348. 349.
Gualt. teſt. t. 65. *f.* E-H.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 13-15.
Knorr Vergn. 4. *t.* 21. *f.* 4. *et* 6. *t.* 22. *f.* 7.
Chemn. Conch. 5. *t.* 166. *f.* 1601. a-h.
β) *Bonann. recr. et muſ. Kirch.* 3. *f.* 212.
Chemn. Conch. 5. *t.* 166. *f.* 1602. *n.* 1-3.
γ) *Gualt. teſt. t.* 65. *f.* A.
δ) *Schroet. Einl. in Conch.* 1. *p.* 666. *t.* 3. *f.* 12.
ε) *Schroet. Einl. in Conch.* 1. *p.* 666. *t.* 3. *f.* 13.
ζ) *Gualt. teſt. t.* 65. *f.* B.
Habitat in mari mediterraneo, *et* Aſiam auſtralem *alluente, teſta laevi, minuta, ſtatura pharaonii ſupra glauca lineis transverſis undatis pallidis, ſaepe varia, ſubtus callo convexo lato albido notata.*

Labio. 76. Tr. teſta ovata ſubſtriata: columella unidentata. *Muſ. Lud. Ulr.* 649. *n.* 335.*
Rumpf muſ. t. 21. *f.* E. Labio.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 12. *f.* 2. Retan.
Liſt. Conch. t. 584. *f.* 42. *et t.* 645. *f.* 37.
Argenv. Conch. t. 6. *f.* N.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 12. *f.* 7. 8.
Chemn. Conch. 5. *t.* 166. *f.* 1579-1581.
β) *Knorr Vergn.* 1. *t.* 10. *f.* 7.
γ) *Martyn univ. Conchol.* 1. *t.* 34.
Habitat in Oceano, Aſiam auſtralem, Africam, novam Seelandiam *alluente; nonne ad turbines relegandus?*

Tuber. 77. Tr. teſta depreſſiuſcula: anfractibus ſubcarinatis margine ſuperiore inferioreque noduloſis.
Seb. muſ. 3. *t.* 74. *f.* 12.
Argenv. Conch. t. 8. *f.* I.
Knorr Vergn. 1. *t.* 3. *f.* 2. *et* 4. *t.* 4. *f.* 3. 4.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 76.
Chemn. Conch. 5. *t.* 164. *f.* 1561. *et t.* 156. *f.* 1572-1576.
β) *Regenſ. Conch.* 1. *t.* 3. *f.* 27.
Habitat in mari mediterraneo, *et* Americam auſtralem *alluente, teſta ponderoſa, viridi, varia, diametri aliquando*

do 2 pollicum, anfractibus longitudinaliter coſtatis; nonne potius turbinis ſpecies?

ſtriatus. 78. Tr. teſta conica: anfractu infimo ſubangulato, apertura obovata.
Gualt. teſt. t. 61. *f.* N.
Chemn. Conch. 5. *t.* 162. *f.* 1527. 1528.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta minuta alba: lineis obliquis nigris.*

Conulus. 79. Tr. teſta conica laevi: anfractibus linea elevata interſtinctis.
Liſt. anim. angl. t. 3. *f.* 15.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 91. 93. 99?
Gualt. teſt. t. 61. *f.* B. G. M.
Chemn. Conch. 5. *t.* 166. *f.* 1588-1591.
Habitat in mari mediterraneo aliisque europaeis, *an varietas zizyphini? teſta rubra vel flava, crebro ſpadiceo varia, faſciata aut radiata, apice tuberculata, anfractibus planiuſculis, extimis noduloſis.*

zizyphinus. 80. Tr. teſta conica livida laevi: anfractibus marginatis. *Fn. ſuec.* 2168. *Muſ. Lud. Ulr.* 650. *n.* 336.* *Müll. zool. dan. prodr.* 2926.
Liſt. Conch. t. 616. *f.* 1.
an. angl. t. 3. *f.* 14.
Gualt. teſt. t. 61. *f.* C.
Argenv. Conch. t. 8. *f.* N.
Klein oſtr. t. 2. *f.* 36.
Knorr Vergn. 3. *t.* 14. *f.* 2. 3. *et* 6. *t.* 27. *f.* 5.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 12. *f.* 9. 10.
Chemn. Conch. 5. *t.* 166. *f.* 1592-1594. 1597. 1598.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 166. *f.* 1595. 1596.
γ) *Rumpf muſ. t.* 21. *f.* 1?
Habitat in mari mediterraneo *et* omni europaeo, *etiam ad* Africae *littora frequens, teſta ſub tunica extima plumbea, transverſim ſtriata; anfractibus contiguis, ſuperioribus ſubtiliter granulatis.*

Obeliſcus. 81. Tr. teſta conica granulis albis vel viridibus moniliformibus multifariam cincta, columella unidentata.
Knorr Vergn. 1. *t.* 12.
Chemn. Conch. 5. *t.* 160. *f.* 1510-1512.
Habitat rarior in India, *teſta 2 pollices alta, et ejusdem diametri.*

diſtortus. 82. Tr. teſta alba ſolida nitida ſtriata diſtorta apice obtuſa: ſpirae anfractu primo gibbo, apertura compreſſa ovata.
Pall. ſpic. zool. 10. *t.* 3. *f.* 7. 8. Helix hyonetiana.
Martin. berl. Samml 7. *t.* 1. *f.* 4. 5.
Chemn. Conch. 5. *t.* 160. *f.* 1513. a. b.
Habitat - - - ſpirae anfractibus 7, *an hujus tribus?*

virgatus. 83. Tr. teſta pyramidali roſeo alboque virgata multifariam nodoloſa: baſi circulis concentricis albis rubrisque.
Liſt. Conch. t. 631. *f.* 17.
Chemn. Conch. 5. *t.* 160. *f.* 1514. 1515.
β) *Muſ. Gottwald. t.* 39. *f.* 268. 270.
Habitat in India.

foveolatus. 84. Tr. teſta cinereo, virente albido rubelloque varia: ſpirae anfractibus margine inferiori tuberculatis; extimis circum circa ſcrobiculatis.
Chemn. Conch. 5. *t.* 161. *f.* 1516. 1517.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 161. *f.* 1518. 1519.
Habitat in mari rubro, *teſta ſatis ſpectabili, ſpirae anfractibus* 13, *columella unidentata.*

diaphanus. 85. Tr. teſta tenui pellucida: cingulis granulorum moniliformibus alternatim ſpadiceis et albis, anfractibus convexis.
Spengl. Naturf. 9. *p.* 152. *t.* 5. *f.* 2. a. b.
Chemn. Conch. 5. *t.* 161. *f.* 1520. 1521.
Habitat ad novae Seelandiae *littora, teſta* 1½ *pollicem alta, et perinde lata, apertura ampla.*

Iris. 86. Tr. teſta ſub epidermide glaberrima caeruleſcente lineis rubellis angulatis undulatisque varia iridis coloribus micante ſtriata.
Walch Naturf. 4. *p.* 42. *t.* 1. *f.* 5. 6.
Zorn Naturf. 7. *p.* 161. *t.* 2. *f.* C. 1. C. 2.
Chemn. Conch. 5. *t.* 161. *f.* 1522. 1523.
β) *Martyn univ. Conchol.* 1. *t.* 24.
Habitat in Oceano auſtrali, *ſpira acuta: anfractibus* 7-9 *contiguis.*

roſtratus. 87. Tr. teſta pyramidali transverſim ſtriata albo rubroque varia apice viridi pellucida.
Chemn. Conch. 5. *t.* 161. *f.* 1524. 1525.
Habitat in Oceano auſtrali, *teſta pollicem alta, ſpirae anfractibus* 7.

notatus. 88. Tr. teſta decuſſatim ſtriata intus ſulcata apice ruberrima.
Schroet. Journ. 5. *p.* 438. *f.* 10. 11.
Einl. in Conch. 1. *p.* 682. *t.* 3. *f.* 14.
Habitat in Oceano auſtrali?

elegans. 89. Tr. teſta pyramidali ſtriata ex purpureo ſubfuſca.
Zorn Naturf. 7. *p.* 167. *t.* 2. *f.* D. 1. 2.
Habitat in Oceano auſtrali, *nonne cum notato varietas roſtrati?*

melanoſtoma. 90. Tr. teſta obtuſe pyramidali virente maculata; apertura intus nigerrima.
Chemn. Conch. 5. *t.* 161. *f.* 1526. a. b.
Habitat in Oceano auſtrali, *vix avellanae magnitudine.*

erythroleucos. 91. Tr. teſta minuta pyramidali albo rubroque ſtriata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 162. *f.* 1529. a. b.
Habitat ad Marochii *littora.*

punctulatus. 92. Tr. teſta minima rubra punctulata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 162. *f.* 1530.
Habitat ad Marochii *littora, erythroleuco minor.*

imbricatus. 93. Tr. teſta pyramidali oblique ſulcata plicata et coſtata: anfractibus margine prominulis.
Liſt. Conch. t. 628. *f.* 14.
Gualt. teſt. t. 60. *f.* Q.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 12. *f.* 19. 20.
Chemn. Conch. 5. *t.* 162. *f.* 1531.
β) Knorr Vergn. 3. *t.* 29. *f.* 1. 2.
Chemn. Conch. 5. *t.* 162. *f.* 1532. 1533.
Habitat in mari, Americam auſtralem *alluente.*

americanus. 94. Tr. teſta longitudinaliter ſulcata ochroleuca: anfractibus transverſim ſtriatis, labio denticulato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 162. *f.* 1534. 1535.
Habitat in mari, Americam auſtralem *alluente, teſta mediae magnitudinis: ſpirae anfractibus* 6.

caelatus. 95. Tr. teſta thalaſſina varicibus plicisque ſquamoſis obliquis inaequali; ſpirae anfractibus medio transverſim ſulcatis ſtriatisque, anfractus primi margine inferiori ſpinis fornicatis aſpero.
Liſt. Conch. t. 646. *f.* 38. *t.* 647. *f.* 40.
Bonann. recr. 3. *f.* 11. 167. 394.
muſ. Kircher. 3. *f.* 11. 12. 167. 380.
Seb. muſ. 3. *t.* 60. *f.* 1. 2.

Knorr Vergn. 5. *t.* 12. *f.* 3.
Chemn. Conch. 5. *t.* 162. *f.* 1536. 1537.
β) *Favann. Conch. t.* 79. *f.* I?
Martyn Conch. 1. *f.* 33.
Chemn. Conch. 10. *t.* 165. *f.* 1581. 1582.
Habitat in mari, Americam auſtralem *alluente*, *teſta baſi ſubconvexa, ſpirae anfractibus teretibus, apertura argentea.*

purpureus. 96. Tr. teſta purpurea: anfractibus plicato tuberculatis, cingulis granulorum minimorum moniliformibus, apertura ſuborbiculata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 162. *f.* 1538. 1539.
Habitat rariſſimus - - - *teſta mediae magnitudinis.*

Cookii. 97. Tr. teſta thalaſſina multifariam tuberculata oblique et undulatim plicata: ſpirae anfractibus utrinque canaliculatis; primo ſupra convexo, ſubtus planiuſculo.
Spengl. Naturf. 9. *p.* 156. 203. *t.* 3. *f.* 5. 6.
Chemn. Conch. 5. *t.* 163. *f.* 1640. *et f.* a. b. *et t.* 164. *f.* 1551.
Habitat in Cookii freto *ad* novam Seelandiam, *teſta* 4 *pollices alta, et aequalis diametri, operculo corneo.*

noduloſus. 98. Tr. teſta ſubfuſca baſi convexa: anfractibus unifariam; primo bifariam tuberculato, utroque labio marginato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 163. *f.* 1545. 1546.
Habitat in Oceano auſtrali, *et (minor)* mari, Americam meridionalem *alluente, tuberculis minutis albis.*

mauritianus. 99. Tr. teſta pyramidali albo, rubello viridique varia; anfractibus margine inferiori obtuſo ſpinoſis, columella emarginata plicata.
Liſt. Conch. t. 625. *f.* 11.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 90.
Gualt. teſt. t. 61. *f.* D. F.
Chemn. Conch. 5. *p.* 3. *vign.* 42. *f.* C. *et t.* 163. *f.* 1547. 1548.
Habitat frequens ad inſulas Barboniae *et* S. Mauritii, *ſpirae anfractibus* 10-12.

feneſtratus. 100. Tr. teſta alba pyramidali: ſpirae anfractibus longitudinaliter coſtatis; cingulis granulorum viridium moniliformibus transverſis.
Rumpf muſ. t. 21. *f.* 7.
Gualt. teſt. t. 60. *f.* N.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 13.
Muſ. Gottwald. t. 39. *f.* 267.

Chemn. Conch. 5. *t.* 163. *f.* 1549. 1550.
Habitat in Oceano indico *et* auſtrali, *teſtae diametro circiter* 1½ *pollicis, columella ſubincurvata: dente excavato.*

helicinus. 101. Tr. teſta utrinque convexa ſolida: ſpira laevi, anfractibus duobus primis oblique coſtatis medio excavatis, apertura ſubſemilunari.
Knorr Vergn. 4. *t.* 6. *f.* 2.
Chemn. Conch. 5. *t.* 164. *f.* 1560.
Habitat in Oceano Americam auſtralem *alluente?*

Argyroſtomus. 102. Tr. teſta ovata undulatim coſtata transverſim ſtriata: apertura ſubcompreſſa, ſpirae anfractibus ventricoſis; primo baſi ſubcarinato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 165. *f.* 1562. 1563.
Habitat in Oceano auſtrali, *teſta 2 pollices lata et alta nigra, coſtis in primo anfractu ſerie tuberculorum terminatis, columella viridiſſima.*

ſinenſis. 103. Tr. teſta obtuſe pyramidali nigra: baſeos faſcia purpurea, columella alba, ſpirae anfractibus omnibus rotundatis.
Knorr Vergn. 5. *t.* 3. *f.* 1.
Chemn. Conch. 5. *t.* 165. *f.* 1564. 1565.
Habitat in Sina, *ſpirae anfractibus* 5-6, *faſcia baſeos ſaepe albo flavoque maculata.*

lugubris. 104. Tr. teſta nigra baſi ſubconvexa granulata: anfractibus ſulcatis; cingulis granulorum alternatim alborum nigrorumque moniliformibus.
Chemn. Conch. 5. *t.* 165. *f.* 1571.
Habitat in Oceano auſtrali, *teſta minuta: anfractibus* 5.

aſper. 105. Tr. teſta obtuſa: ſpirae anfractibus teretibus multifariam tuberculatis ſulcatis transverſim ſtriatis, columella dentata, apertura lunata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 166. *f.* 1582.
Habitat - - - teſta mediae magnitudinis cinerea vel teſtacea, labio intus plicato rugoſoque.

teſſellatus. 106. Tr. teſta conico-convexa transverſim ſtriata maculis oblongo-quadratis ſeriatis varia, apertura ampla ſubcompreſſa, labio nigro maculato, columella alba dentiformi.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 12. *f.* 5. 6.
Chemn. Conch. 5. *t.* 166. *f.* 1583.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 166. *f.* 1585.

 γ) *Chemn.*

γ) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 166. *f.* 1586. 1587.
δ) *Adanſ. Seneg* 1. *t.* 12. *f.* 1. Oſilin.
Liſt. Conch. t. 642 *f* 33. 34.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 201.
Gualt. teſt. t. 63. *f.* D. E. G.
Klein oſtr. t. 2. *f.* 53. 54.
Knorr Vergn. 1. *t.* 10. *f.* 6.
Chemn. Conch. 5. *t.* 166. *f.* 1584.
Habitat in mari mediterraneo, δ) *etiam in* mari Africam occidentalem *alluente, ſpirae anfractibus teretibus, maculis nigricantibus, cinereis, rarius rubellis.*

citrinus. 107. Tr. teſta conico-convexa citrina lineis angulatis nigris picta: anfractibus duobus primis fuſco obumbratis.
Knorr Vergn. 1. *t.* 10. *f.* 7.
Habitat in Aſia, *an diſtincta ſpecies?*

Granatum. 108. Tr. teſta pyramidali alba coccineo varia baſi ſubconvexa: ſpirae anfractibus convexis; cingulis granorum moniliformibus, primis duobus maximis.
Chemn. Conch. 5. *t.* 170. *f.* 1654. 1655.
Habitat in Oceano auſtrali, *teſta 2 fere pollices alta, et pene perinde lata, ſpirae anfractibus* 9-10.

crocatus. 109. Tr. teſta laevi conica alba apice crocea: ſpirae anfractibus teretibus ſulco ad ſuturam diſcretis.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 12. *f.* 11. 12.
Habitat - - - -

conchyliophorus. 110. Tr. ſpirae anfractibus teretibus obſolete plicatis: anfractu primo aperturaque compreſſa ſubfuſcis, fauce baſique concava fuſcis.
Martin. Beſchr. berl. Naturf. 2. *t.* 12. *f.* 2. 3.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 12. *f.* 21. 22.
Chemn. Conch. 5. *t.* 172. *f.* 1688-1690.
Habitat rarus in Oceano, Americam auſtralem *alluente, ſaepius lapides, teſtacea, corallia, accreſcentia ſibi habens, teſta 2 pollices alta, et diametri baſeos* $2\frac{1}{2}$ *pollicum, ſpirae anfractibus* 6.

pantherinus. 111. Tr. teſta convexa alba viridi fuſco fulvoque maculata: ſpirae anfractibus bifariam tuberculatis; anfractu ſecundo plicato, carinato.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 12. *f.* 9. Kachin.
β) *Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 12. *f.* 10. Gor.

Habitat

Habitat in Senegalia, *teſta* 8 *circiter lineas longa, et paulo latiori.*

grandinatus. 126. Tr. teſta globulis concatenatis ſcaberrima baſi convexa concentrice granulatim ſtriata: labro duplicato dentato. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 291. *t.* 169. *f.* 1639.
Martyn Conch. 1. *f.* 38.
Habitat ad Palmerſtoni inſulam.

inaequalis. 127. Tr. teſta depreſſa ſubtus cingulis albo-punctatis varia, anfractibus ſpinis duplicique punctorum eminentium ordine coronatis. *Mart. univ. Conch.* 1. *t.* 31.
Habitat ad inſulas amicas.

Tigris. 128. Tr. teſta ſubovata griſea ſanguineo virgata transverſim albo ſtriata. *Mart. Conchol.* 2. *t.* 75.
Habitat ad novam Seelandiam.

Pulligo. 131. Tr. teſta conica fuſca oblique nigro ſtriata. *Martyn univ. Conchol.* 2. *t.* 76.
Habitat ad ſinum *a* R. Georgio *denominatum.*

*** Turriti, *columella exſerta, qui poſiti cadunt in latus.*

Teleſcopium. 112. Tr. teſta imperforata ſtriata: columella ſpirali. *Muſ. Lud. Ulr.* 650. *n.* 337*
Argenv. Conch. t. 11. *f.* B. Teleſcopium.
Liſt. Conch. t. 624. *f.* 10.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 92.
Rumpf muſ. t. 21. *f.* 12.
Gualt. teſt. t. 60. *f.* D. E.
Seb. muſ. 3. *t.* 50. *f.* 1-12.
Knorr delic. t. B. IV. *f.* 9.
Vergn. 3. *t.* 22. *f.* 2. 3.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 27.
Schroet. einl. Bau Conch. t. 5. *f.* 8.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. p. 326. *vign. f.* d.
Chemn. Conch. 5. *p.* 3. *vign.* 42. *f.* A. B *t.* 160. *f.* 1507-1509.
Habitat in Oceano indico, *teſta* 4 *pollices longa, nunc fuſca aut hepatica, nunc nigricante: anfractu primo utplurimum albo-faſciato, columellae prominulae dente plicave media: ſpirae anfractibus planiuſculis.*

dolabratus. 113. Tr. teſta umbilicata glabra; columella recurvato contorta plicata. *Muſ. Lud. Ulr.* 651. *n.* 338.*

Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 121. *n.* 318. Helix teſta turrita perforata polita: axi contorto-triplicato, apertura dentata.
Liſt. Conch. t. 844. *f.* 72.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* L.
Knorr Vergn. 6. *t.* 29. *f.* 2.
Walch Naturf. 1. *t.* 3. *f.* 3.
Chemn. Conch. 5. *t.* 167. *f.* 1603. 1604.
β) *Liſt. Conch. t.* 844. *f.* 72. b.
γ) *Pet. gaz. t.* 118. *f.* 15.
δ) *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 123. *n.* 319. Helix Terebella.
Gualt. teſt. t. 4. *f.* M.
Habitat in mari, Americam auſtralem *alluente, teſta alba, lineis utplurimum flavis, nonnullis fuſcis cincta; anfractibus teretiuſculis ſulco ſubtili diſcretis, apertura dentata, columella triplicata.*

perverſus. 114. Tr. teſta imperforata glabra: anfractibus contrariis ſerie duplici excavato-punctatis.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta parva fere cornea: anfractibus cylindricis praeter margines etiam crenato punctatis, apertura quadrata, columella baſi prominula.*

puſillus. 115. Tr. teſta baſi plana: ſtriis ſubtilibus transverſis ſubtiliores obliquas decuſſantibus, apertura compreſſa, anfractibus contrariis.
Spengl. n. Schrift. daen. Geſ. 1. *t.* 1. *f.* 1.
Chemn. Conch. 9. *t.* 113. *f.* 966.
Habitat in arena *teſtaceis majoribus* maris indici intruſa, *teſta vix* ¼ *pollicis longa; nonne mera perverſi varietas?*

undulatus. 116. Tr. teſta baſi plana: coſtis longitudinalibus ſtrias transverſas flexuoſas decuſſantibus, apertura ſemilunari, anfractibus contrariis.
Spengl. n. Schr. der daen. Geſ. 1. *t.* 1. *f.* 2.
Chemn. Conch. 9. *t.* 113. *f.* 967.
Habitat in arena maris indici, *puſillo minor.*

ventricoſus. 117. Tr. teſta cancellata baſi glabra: apertura ſubovata; anfractibus contrariis, primis ventricoſis turgidis.
Spengl. n. Schrift. der daen. Geſ. 1. *t.* 7. *f.* 3.
Chemn. Conch. 9. *t.* 113. *f.* 968.
Habitat in arena maris indici, *aequalis cum undulato magnitudinis.*

118. Tr.

annulatus. 118. Tr. ſpirae anfractibus contrariis utrinque coſtatis, apertura ſubtetragona.
Spengl. n. Schr. daen. Geſ. 1. *t.* 1. *f.* 4.
Chemn. Conch. 9. *t.* 113. *f.* 969.
Habitat in arena maris indici, *aequalis cum ventricoſo magnitudinis, ſpirae anfractibus* 12-15. *Ad poſteriores* 5 *ſpecies accedit* Trochites contrarius, *in Dania repertus, et a* Chemnizio *Conch.* 9. *t.* 114. *f.* 981. *delineatus?*

flumineus. 119. Tr. teſta ſubpyramidali umbilicata laevi alba apice rubella, anfractibus ſulco diſtinctis, apertura ſemilunari.
Schroet. Flusconch. t. 6. *f.* 12.
Habitat in humo conchacea; *an hujus tribus?*

punctatus. 120. Tr. teſta imperforata: anfractibus ſerie triplici punctorum prominentium.
Habitat in mari, Europam auſtralem *et* Africam *alluente, teſta ferruginea, magnitudine grani hordei, tota granis obtuſis obſita, apertura quadrata, columella vix manifeſte canaliculata.*

ſtriatellus. 121. Tr. teſta imperforata: ſtriis longitudinalibus parallelis obliquatis.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta admodam parva, ſubalata, alba, apice violacea.*

Ziczac. 122. Tr. teſta ſubſtriata lineis angulatis obſcurioribus picta, apertura ſuborbiculata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 166. *f.* 1599. a. b.
β) Liſt. Conch. t. 583. *f.* 38.
Chemn. Conch. 5. *t.* 166. *f.* 1600. a. b.
Habitat - - - *ſpirae anfractibus* 5-6, *an hujus tribus et generis?*

lunaris. 123. Tr. teſta contraria modice convexa laevi ſubumbilicata.
Chemn. Conch. 9. *t.* 113. *f.* 971.
Habitat - - - *anfractibus* 5, *turbini affinis.*

hortenſis. 124. Tr. teſta pyramidali ſubimperforata candida: faſcia rufeſcente. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 122. *f.* 1055. 1056.
Müll. hiſt. verm. t. 2. *p.* 79. *n.* 275. Helix-Trochus.
Habitat in terrarum calidiorum hortis.

337. TURBO. *Animal* Limax

Teſta univalvis, ſpiralis, ſolida.

Apertura coarctata, orbiculata, integra.

* Neritoidei, *aperturae margine columnari plano imperforato.*

obtuſatus. 1. T. teſta ſubrotunda laevi ſuperne ventricoſiore obtuſiſſima.
Knorr Vergn. 6. *t.* 23. *f.* 8.
Chemn. Conch. 5. *t.* 185. *f.* 1854. *n.* a-f?
Müll. zool. dan. prodr. 2928?
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *teſta fuſca albo varia.*

neritoides. 2. T. teſta ovata glabra obtuſiuſcula.
Knorr Vergn. 6. *t.* 23. *f.* 9.
Chemn. Conch. 5. *t.* 185. *f.* 1854. *n.* 1-11?
Habitat numeroſiſſimus in mari mediterraneo, mari Americam auſtralem *alluente*, *teſta minuta nunc unicolore flava, rubra vel ſubfuſca, nunc variegata, faſciata, lineata, apertura ovata; nonne potius ad neritas relegandus?*

littoreus. 3. T. teſta ſubovata acuta ſtriata. *Fn. ſuec.* 2169. *It. wgoth.* 169 199 *t.* 5. *f.* 4.
Baſter opuſc ſubſec. 3. *p.* 110. *t.* 14. *f.* 1. Turbo littoralis.
O. *Fabr. Fn. groenl. p.* 403. *n.* 405. Nerita littorea.
Liſt. Conch. t. 585 *f.* 43.
[illegible] *anim. angl. t.* 3. *f.* 9.
Gualt. teſt. t. 45. *f.* A. C. G.
Argenv. Conch. t. 6. *f.* L.
[illegible] *zoomorph. t.* 3. *f.* A.
Swammerd. bibl. nat. 183.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 12. *f.* 13. 14.
Chemn. Conch. 5. *t.* 185. *f.* 1852. *n.* 1-8.
Schroet. Fluſconch. t. 8. *f.* 5. *et t.* 11. *min.* C. *f.* 5.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 185. *f.* 1853.
γ) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 185. *f.* 1855. a-g.
Schroet. Fluſconch. t. 9. *f.* 6. 7. 16. 18. 19. 7. a. b.
δ) *Liſt. Conch. t.* 1059. *f.* 6.
ε) *Liſt. Conch. t.* 1059. *f.* 7.
Habitat in Oceano europaeo, *frequens ad* Groenlandiae et Norwegiae *littora, littorum ſcopulos adſcendendo ventum impetuoſum, deſcendendo quietem praenuncians*, t[illegible] 1½ pollic[illegible]

pollicis alta, ſubtiliter transverſim ſtriata, nunc atra lineis albis, nunc fuſca lineis obſcurioribus, nunc griſea aut lutea lineis fuſcis, nunc flavicante lineis fuſcis et apice vireſcente, anfractibus 7 contiguis, primo reliquis majore, apertura ſubovata.

murica-tus. 4. T. teſta umbilicata ſubovata acuta cincta ſtriis punctis eminentibus, margine columnari obtuſiuſculo.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 12. *f.* 2. Boſon.
Liſt. Conch. t. 30. *f.* 28.
Gual. teſt. t. 45. *f.* E.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 12. *f.* 15. 16.
Chemn. Conch. 5. *t.* 177. *f.* 1752. 1753.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 2. *f.* 2.
Habitat in mari, Europam Americam*que* auſtralem *et* Africam *alluente, teſta vix pollicem magna ex albido caeruleſcente: fauce fuſca, anfractibus transverſim ſtriatis diſtantibus, primo reliquis ſimul ſumtis minore.*

Lituus. 111. T. teſta ſubovata laevi, apertura laterali marginata, umbilico tecto. *Martyn univ. Conch.* 1. *t.* 27.
Habitat ad Pulo Condore; *an hujus generis?*

punctula-tus. 113. T. teſta ſubovata laevi fuſca: cingulis dilutioribus planis obſcurius punctatis, apertura margaritacea. *Mart. univ. Conchol.* 1. *t.* 36.

** Solidi *imperforati.*

Cimex. 5. T. teſta oblongo ovata ſtriis decuſſatis: punctis eminentibus.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 10. *f.* 6? Soni?
Gualt. teſt. t. 44. *f.* X.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta minuta albida, labio intus albo limbato, ſpirae anfractu primo ſequentibus* 4-5 *majore.*

Pullus. 6. T. teſta ovota laevi: apertura anterius diducta.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 12. *f.* 17. 18.
Habitat in mari mediterraneo, *petholato teſtae apertura potiſſimum antrorſum angulata affinis, teſta nitida, magnitudine ſeminis carthami faſciis maculisve purpuraſcentibus fuſcis albidisve picta.*

perſona-tus. 7. T. teſta convexa laevi; apertura diducta. *Muſ. Lud. Ulr.* 652. *n.* 339.*
Rumpf muſ. t. 19. *f.* 1.

Habitat

Habitat in India, *teſta cinerea fuſco punctata, avellanae magnitudine, neritae ſimili.*

pethola-tus. 8. T. teſta ovata laevi nitida: anfractibus ſurſum ſubangulatis.
Muſ. Lud. Ulr. 652. *n.* 340.*
Bellon. aq. 340. Cochlus ſ. Umbilicus.
Rumpf. muſ. t. 19. *f.* D. *et* 5. 6. 7. Cochlea petholata.
Argenv. Conch. t. 6. *f.* K. Cochlea variegata.
zoomorph. t. 10. *f.* D.
Liſt. Conch. t. 584. *f.* 39.
Valent. Abh. 6. *f.* 55.
Gualt. teſt. t. 64. *f.* F.
Klein oſtr. t. 2. *f.* 51.
Seb. muſ. 3. *t.* 74. *f.* 17-19. 23-29.
Knorr delic. t. B. T. III. *f.* 7.
Knorr Vergn. 1. *t.* 3. *f.* 4. 2. *t.* 22. *f.* 1. 2. 3. *t.* 3. *f.* 3. *et t.* 23. *f.* 4. *et t.* 28. *f.* 2-5.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 18. *et t.* 9. *f.* 27.
Chemn. Conch. 5. *t.* 183. *et* 184. *f.* 1826-1839.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 74. *f.* 3.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 74. *f.* 5.
δ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 74. *f.* 7. 8.
ε) *Seb. muſ.* 3. *t.* 74. *f.* 16.
ζ) *Gualt. teſt. t.* 63. *f.* I.
η) *Valent. Abh. t.* 2. *f.* 27.
ϑ) *Bonanni recr. et muſ. Kircher.* 3. *f.* 320?
Habitat ad inſulas maris indici *et* Americam auſtralem *alluentis, teſta ſpectabili, nitida, glaberrima, ſpadicea, faſciata: anfractibus teretibus, columella ex flaveſcente viridi.*

Cochlus. 9. T. teſta ovata ſtriata: ſtria unica dorſali craſſiore.
Liſt. Conch. t. 584. *f.* 40.
Valent. Abh. t. 6. *f.* 53. 54. 56.
Klein. oſtr. t. 2. *f.* 55.
Seb. muſ. 3. *t.* 74. *f.* 30.
Knorr Vergn. 1. *t.* 3. *f.* 5.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 12.
Chemn. Conch. 5. *t.* 182. *f.* 1805. 1806.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 12. *t.* 3. *f.* 17.
β) *Liſt. Conch. t.* 586. *f.* 45.
γ) *Argenv. Conch. t.* 6. *f.* C?
δ) *Knorr delic. t.* B. III. *f.* 6?
Vergn. 1. *t.* 3. *f.* 3?
Habitat rarus in India, *teſta viridi, interdum ex viridi fuſca albo varia: faſciis albis fuſco-maculatis, apertura argentea,*

tea, ſtriis longitudinalibus ſubtiliſſimis, transverſa unica craſſa dorſi.

Chryſoſtomus. 10. T. teſta ſubovata rugoſa: anfractibus bifariam ſpinulis fornicatis cincta. *Muſ. Lud. Ulr.* 653. *n.* 341.*
Rumpf muſ. t. 19. *f.* E. Cochlea lunaris aſpera.
Argenv. Conch. t. 6. *f.* D. Os aureum.
Gualt. teſt. t. 62. *f.* H.
Klein oſtr. t. 7. *f.* 126.
Seb. muſ. 3. *t.* 74. *f.* 9-11.
Knorr Vergn. 2. *t.* 14. *f.* 2. *et* 5. *t.* 13. *f.* 3.
Chemn. Conch. 5. *t.* 178. *f.* 1766.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 5. *f.* 4.
Habitat rarior in India, *teſta flavicante fuſco radiata intus aurata, labio et columella albis, anfractibus diſtantibus transverſim ſtriatis, longitudinaliter lineatis, ſuperioribus plicatis.*

echinatus. 110. T. teſta ſubovata rugoſa, anfractibus ſpinulis obtuſis fornicatis, labio expanſo crenato. *Mart. univ. Conch.* 1. *t.* 26.
β) *Martyn univ. Conch.* 1. *t.* 30.
Habitat in Oceano auſtrali, *ad* inſulas amicas.

Tectum perſicum. 11. T. teſta ovata: ſpinis obtuſis depreſſis, ſubtus papilloſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 653. *n.* 342.*
Argenv. Conch. t. 8. *f.* P?
Chemn. Conch. 5. *t.* 163. *f.* 1543. *f.* 1544.
β) *Gualt. teſt. t.* 60. *f.* M?
Habitat in India, *teſta cinerea fuſco faſciata, ſpirae anfractibus* 6, *transverſim rugoſis, bifariam ſpinoſis, ſpinis in* β) *acuminatis, fauce alba ſulcata.*

Pagodus. 12. T. teſta conica: ſpinis obtuſis concatenatis, ſubtus papilloſo-ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 654. *n.* 343.
Rumpf muſ. t. 21. *f.* D. Trochus papuanus ſ. longaevus.
Argenv. Conch. t. 8. *f.* A. Pagodus.
Liſt. Conch. t. 644. *f.* 36.
Klein oſtr. t. 2. *f.* 37.
Seb. muſ. 3. *t.* 60. *f.* 3.
Knorr Vergn. 1. *t.* 25. *f.* 3. 4.
Chemn. Conch. 5. *t.* 163. *f.* 1541. 1542.
Spengl. Conch. t. 2. *f.* K.
Habitat rarus in India, *teſta ad* 3 *pollices alta, aſpera, undulatim plicata et rugoſa, teſtacea: apertura ochroleuca, ſpirae anfractibus* 8-9, *primo bifariam ſpinoſo.*

ſulcatus. 112. T. teſta ſubconica atro griſeoque varia fornicato-ſquamoſa: apertura margaritacea crenulata. *Martyn univ. Conch.* 1. *t.* 35.
Habitat ad inſulas amicas.

Calcar. 13. T. teſta ſubimperforata depreſſa: anfractibus ſcabris; ſupra ſpinis fornicato-compreſſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 654. *n.* 344.*
Rumpf muſ. t. 20. *f.* 1. Calcar.
Argenv. Conch. t. 6. *f.* R. *et t.* 8. *f.* H. Calcar.
Liſt. Conch. t. 608. *f.* 46? 46. a.
Gualt. teſt. t. 65. *f.* N. P.
Klein. oſtr. t. 1. *f.* 21? 27.
Seb. muſ. 3. *t.* 59. *f.* 5. 6.
Knorr Vergn. 4. *t.* 4. *f.* 2. *et t.* 6. *f.* 2.
Chemn. Conch. 5. *t.* 164. *f.* 1552. *et t.* 124. *f.* 1718-1720.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 164. *f.* 1553.
γ) *Knorr Vergn.* 4. *t.* 4. *f.* 3?
δ) *Knorr Vergn.* 4. *t.* 4. *f.* 4?
ε) *Knorr Vergn.* 4. *t.* 7. *f.* 1?
ζ) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 180. *f.* 1786. 1787.
Martin. neueſt. Mannigf. 1. *p.* 435. *t.* 2. *f.* 16. 17.
η) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 165. *f.* 1585. 1586.
Habitat paulo rarior in India, β) *in* Oceano auſtrali, ζ) *in* mari mediterraneo, *teſta vireſcente: anfractibus* 5 *nodoſis diſtantibus.*

rugoſus. 14. T. teſta ſubovata ſtriata: anfractibus ſuperne rugoſis.
Liſt. Conch. t. 647. *f.* 41.
Bonann. recr. 3. *f.* 12. 13.
muſ. Kirch. 3. *f.* 12. 13? 14.
Gualt. teſt. t. 63. *f.* F. H.
Argenv. Conch. t. 8. *f.* O.
Klein oſtr. t. 2. *f.* 50.
Knorr Vergn. 3. *t.* 20. *f.* 1.
Chemn. Conch. 5. *t.* 180. *f.* 1782-1785.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 181. *f.* 1803. 1804?
γ) *Gualt. teſt. t.* 63. *f.* C.
Habitat in mari mediterraneo *et* adriatico, β) *ad* novam Seelandiam, *teſta vireſcente, cinereo albove obumbrata, columella rubra, fauce argentea, anfractibus latere ſuperiore rugis obſolete nodoſis: Operculum hujus umbilici veneris nomine notum.*

marmoratus. 15. T. teſta ſubovata laevi: anfractibus trifariam marginato-noduloſa, cauda poſterius explanata. *Muſ. Lud. Ulr.* 655. *n.* 345.*

Liſt.

Liſt. Conch. t. 587. *f.* 46.
Gualt. teſt. t. 64. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 74. *f.* 1. 2.
Knorr Vergn. 3. *t.* 26. *f.* 1. *et t.* 27. *f.* 1.
Chemn. Conch. 5. *t.* 179. *f.* 1775. 1776.
Habitat rarior in mari, Aſiam auſtralem *alluente, oleario affinis, at teſta tenuiori, nodulorum ordinibus binis incompletis diſtinctus, teſta ceterum obſcure viridi: faſciis ex maculis albis, fuſcis et rubellis conflatis.*

ſarmaticus. 16. T. teſta convexa obtuſa: anfractibus ſupra nodoſis canali interſtinctis.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 166?
Argenv. Conch. t. 8. *f.* V.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 7.
Chemn. Conch. 5. *t.* 179. *f.* 1777. 1778. 1781.
Schroet. Journ. 5. *f.* 12.
β) *Knorr delic. t.* B. III. *f.* 2.
Vergn. 1. *t.* 3. *f.* 1.
Habitat rarus in mari, Aſiam Africam*que* auſtralem *alluente, teſta ſub epidermide aurantia flavicante, ſub hac nigerrima, intus argentea, anfractibus multifariam nodoſis, nodis ſupremae ſeriei maximis.*

Olearius. 17. T. teſta convexa obtuſa angulato-laevi.
Rondel. teſt. 96.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 9. 184.
Rumpf muſ. t. 19. *f.* A. B.
Gualt. teſt. t. 68. *f.* A.
Klein oſtr. t. 7. *f.* 124.
Knorr Vergn. 2. *t.* 9. *f.* 1.
Chemn. Conch. 5. *t.* 178. *f.* 1771. 1772.
β) *Bonann. recr.* 3. *f.* 406.
muſ. Kircher. 3. *f.* 386.
γ) *Regenſ. Conch.* 1. *t.* 5. *f.* 52?
Chemn. Conch. 5. *t.* 178. *f.* 1773. 1774?
Habitat in India, *teſta dorſo trifariam nodoſo, anfractu primo obliquo gibbo.*

cornutus. 18. T. ſpirae anfractibus teretibus decuſſatim ſtriatis: primo trifariam imbricato-ſpinoſo.
Chemn. Conch. 5. *t.* 179. *f.* 1779. 1780.
Habitat in Sina, *teſta ſatis magna, olivacea.*

radiatus. 19. T. teſta rugoſa: anfractibus teretibus diſtantibus transverſim ſtriatis imbricatim ſpinuloſis.
Chemn. Conch. 5. *t.* 180. *f.* 1788. 1789.
Habitat in mari rubro, *teſta albida ſpadiceo radiata, vel ſubfuſca albo radiata, intus argentea.*

imperialis. 20. T. teſta glaberrima nitida viridi, intus nivea: apertura argentea, columellae labio ſuperne calloſo.
Chemn. Conch. 5. *t.* 180. *f.* 1790.
Habitat rarus in Sina, *teſta ſpectabili: anfractibus valde convexis.*

coronatus. 21. T. teſta rugoſa alba vireſcente-nebuloſa, apice aurantia: anfractibus ſpinis nodisque coronatis, columella caudata.
Liſt. Conch. t. 575. *f.* 28?
Chemn. Conch. 5. *t.* 180. *f.* 1791. 1792.
β) *Argenv. Conch. t.* 6. *f.* Q.
Chemn. Conch. 5. *t.* 180 *f.* 1793.
Habitat rariſſimus in freto Malaccenſi.

canaliculatus. 22. T. teſta ſulcata transverſim ſtriata alba viridi hinc inde ſpadiceo varia: anfractibus valde convexis.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 10. *f.* 44.
Chemn. Conch. 5. *t.* 181. *f.* 1794.
Habitat in India, *teſta ponderoſa: anfractibus ſex.*

ſetoſus. 23. T. ſpirae anfractibus cylindricis ſulcatis transverſim ſtriatis, labio externo crenato.
Rumpf muſ. t. 19. *f.* C.
Gualt. teſt. t. 64. *f.* B.
Chemn. Conch. 5. *t.* 181. *f.* 1795. 1796.
Habitat rariſſimus in India, *teſta maculis piceis, radiisque albis et ſpadiceis, alternis varia, anfractibus* 6.

ſpinoſus. 24. T. teſta oblonga transverſim ſtriata: ſtriis ſpinoſis, apertura argentea.
Chemn. Conch. 5. *t.* 181. *f.* 1797.
Habitat in India, *chryſoſtomo affinis, teſta albida luteaque nigro radiata, anfractibus* 6.

Sparverius. 25. T. teſta oblonga late et glabre ſtriata flavicante fuſco maculata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 181. *f.* 1798.
Habitat in India, *ſtriis inaequalibus, anfractibus 6 teretibus, apertura matris perlarum inſtar nitente.*

26. T.

Moltkianus. 26. T. teſta ex argenteo cana: faſciis luteis et aurantiis transverſis: ſpirae anfractibus cingulis granorum moniliformibus ſuperne plicatis, nodoſis et fornicato ſpinoſis.
Chemn. Conch. 5. *t.* 181. *f.* 1799. 1800.
Habitat - - - apertura matris perlarum inſtar nitente, columella argentea.

Spenglerianus. 27. T. teſta alba flavicante varia: ſpirae anfractibus teretibus transverſim ſtriatis canali interſtinctis.
Chemn. Conch. 5. *t.* 181. *f.* 1801. 1802.
β) *Hermann Naturf.* 16. *p.* 51. *t.* 2. *f.* 1. 2.
Habitat rariſſimus in Oceano indico, *apertura intus argentea.*

Caſtanea. 28. T. teſta transverſim ſtriata fuſca b. albo maculata: anfractibus nodulorum ordinibus cinctis.
Chemn. Conch. 5. *t.* 182. *f.* 1807. 1808.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 182. *f.* 1809. 1810.
γ) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 182. *f.* 1813. 1814.
δ) *Regenſ. Conch.* 1. *t.* 12. *f.* 70?
Habitat in mari, Americam auſtralem *alluente, ſpirae anfractibus* 5.

crenulatus. 29. T. teſta ex argenteo cana nodulis multifariam cincta: apertura intus lactea.
Chemn. Conch. 5. *t.* 182. *f.* 1811. 1812.
Habitat - - - Caſtaneae affinis.

Smaragdus. 30. T. teſta ponderoſa ſubdepreſſa laeviuſcula oblique rugoſa: ſpirae anfractibus quatuor; primo terete ampliore.

v. Zorn

Huic tribui inſerendae videntur, an diſtinctae ſpecies? teſtae a Liſtero *Conch. t.* 583. *f.* 36. *t.* 584. *f.* 41. *t.* 1059. *f* 8. a Bonanni *recr. et muſ. Kircher.* 3. *f.* 100. 199. 335. *muſ. Kirch.* 3. *f.* 389. 397. *a* Rumpf *muſ. t.* 21. *f.* 11. *a* Gualtieri *teſt. t.* 45. *f.* F. *t.* 62. *f.* E. F. G. I. M. N. *et t.* 63. *f.* L. M. N. *ab* Argenville *Conch.* t. 6. *f.* G. I. T. *et zoomorph. t.* 8. *f.* 4. *a* Seba *muſ* 3. *t.* 39. *f.* 25-28. et *f.* 47. *t.* 40. *f.* 44. *et a* Knorr *Vergn.* 3. *t.* 4. *f* 3. *delineatae? quintae autem tribui, quas* Liſter *Conch. t.* 18. *f.* 13. *t.* 19. *f.* 14. *et* 14. A. *t.* 20. *f.* 15. *t.* 21. *f.* 17. 18. *t.* 22. *f.* 19. *t.* 31. *f.* 29. *t.* 588. *f.* 52. *t.* 589. *f.* 53. *t.* 591. *f.* 56 57. *t.* 592. *f.* 60. *t.* 593. *f.* 61. Klein *oſtr. t.* 2. *f.* 44. Martini *berl. Mag* 3. *t.* 5. *f.* 57. 58. 60. 64. 65. *et* 4. *t.* 9. *f.* 44. Bonanni *recr. et muſ. Kircher.* 3. *f* 39. 42. *et* 106. Valentyn *Abh* t. 1. *f.* 7. Gualtieri *teſt. t.* 4. *f.* F. G. H. I. L. N. R. *t.* 44. *f.* Z. Argenville *Conch. t.* 11. *f.* I. *t.* 27. *n.* 5. *f.* 32. *et t.* 28. *f.* 15. 16. 18. 24. *et zoomorph. t.* 9. *f.* 12. 14. Seba *muſ.* 3. *t.* 56 *f.* 22. 29. Knorr *Vergn.* 5. *t.* 15. *f.* 7. *et* 6. *t.* 39. *f.* 2. *Quartae denique tribui teſtae a* Gualtieri *t.* 58. *f.* G. *et* I. *ultima etiam a* Schroetero *Einl. in Verſtein.* 4. *t.* 10. *f.* 5. *delineatae.*

v. Zorn Naturf. 7. *p.* 157. *t.* 2. *f.* A. 1. A. 2.
Chemn. Conch. 5. *t.* 182. *f.* 1815. 1816.
Habitat ad novam Seelandiam, *teſta viridi ultra* 2 *pollices lata et alta.*

papyraceus. 31. T. teſta pellucida tenuiſſima ſubtiliſſime annulata: anfractu primo maximo, faſcia ad alterum albo rubroque varia, apertura ovali.
Chemn. Conch. 5. *t.* 182. *f.* 1817. 1818.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 182. *f.* 1819?
Habitat - - -

Aethiops. 32. T. teſta transverſim ſulcata nigra: anfractibus primis argutis ſtriatis, ſequentibus argenteis labio utroque limbo fuſco.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. p. 340. *vign. f.* b.
Chemn. Conch. 5. *t.* 182. *f.* 1820. 1821.
Habitat - - - *teſta mediae magnitudinis, apertura dilatata.*

nicobaricus. 33. T. teſta ſubfuſca reticulata: anfractibus cingulatis, apertura limbo vireſcente pellucido, columella callo citreo, fauce aurata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 182. *f.* 1822. 1823.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 182. *f.* 1824. 1825.
γ) *v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t.* 13. *f.* 16. 17. Helix paradoxa.
Habitat ad inſulas Nicobaricas, *teſta mediae magnitudinis.*

Cidaris. 34. T. teſta laevi: anfractibus ex compreſſo teretiuſculis, primo tereti ampliſſimo, apertura compreſſa viridi argentea, columella prominula.
α) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 184. *f.* 1840. 1841. Cidaris turcica.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 184. *f.* 1842. 1843. Cidaris viridis.
Valent. Abh. t. 4. *f.* 35.
γ) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 184. *f.* 1844. 1845. Cidaris aurantia.
δ) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 184. *f.* 1846. Cidaris faſciata.
Argenv. Conch. t. 6. *f.* B.
ε) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 184. *f.* 1847. Cidaris ſpadicea.
Argenv. Conch. t. 6. *f.* O.
ζ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 74. *f.* 13. 14. Cidaris marmorata.
η) *Seb. muſ.* 3. *t.* 74. *f.* 15. Cidaris polyzonias.
ϑ) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 82. Cidaris flavicans rubro lineata.
ι) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 82. Cidaris ex caeruleo rubella variegata.

κ) Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 83. Cidaris vireſcens ſpadiceo lineata.

λ) Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 83. Cidaris ſubfuſca, baſi marginata.

μ) Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 83. Cidaris dilutius et obſcurius fuſco radiata.

ν) Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 83. Cidaris lutea obſcurius radiata.

Habitat rarior in India *et* Sina, *infinitae fere varietatis.*

nigerrimus. 35. T. teſta laevi nigerrima: anfractibus margine excavatis diſtantibus.

Chemn. Conch. 5. *t.* 185. *f.* 1848.

β) Chemn. Conch. 5. *t.* 185. *f.* 1849.

Habitat in Oceano auſtrali.

helicinus. 36. T. teſta laevi ſubimperforata ſubrotunda: anfractibus convexis contiguis, columella incraſſata. *v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. p.* 355. 356. *t.* 12 *f.* 23. 24.

Habitat - - - teſta purpurea et vireſcente fauce argentea.

punctatus. 37. T. teſta ovata craſſa; ſpira mucronata; anfractibus laevigatis planiuſculis, primis duobus maximis.

Adanſ. Seneg. 1. *p.* 168. *t.* 12. *f.* 1. Marnat.

Habitat in Senegalia, *teſta* 6-7 *lineas longa; plumbea, interdum rubella, ſeriatim albo-punctata, intus coffeae more tincta.*

Haemaſtomus. 38. T. teſta ovata ſolida glabra: anfractibus ſenis ſtriatis, apertura marginata ovali.

Scopol. delic. inſubr. 1. *p.* 67. *t.* 25. *f.* B. Bulinus haemaſtomus.

Habitat - - - teſta triunciali alba: anfractibus ventricoſis contiguis, primo ſupra rufeſcente, apertura intus fuſceſcente.

torquatus. 106. T. teſta ovata convexo-transverſim ſulcata et ruguloſo ſtriata, anfractibus cingulo nodoſo, fauce argentea. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 295. 6. *vign.* 24. *f.* A. B.

Martyn Conch. 2. *f.* 71.

Habitat ad novam Seelandiam.

undulatus. 107. T. teſta ovato-convexa longitudinaliter undulatim ſtrigoſa: ſpira obtuſa, fauce argentea. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 296. *t.* 196. *f.* 1640. 1641.

Martyn Conch. 1. *f.* 29.
Habitat ad novam Seelandiam *et* Hollandiam.

niveus. 108. T. teſta ſpirali nivea diaphana transverſim ſtriata: anfractibus ſaepe diſtortis. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 298. *t.* 165. *f.* 1587. 1588.
Kaemm. Cab. Rudolſt. t. 8. *f.* 4. 5.
Habitat ad inſulas nicobaricas.

helicoides. 109. T. teſta cornea ſubdiaphana tricarinata laeviuſcula: anfractibus prioribus diſtantibus, apertura triangulari. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 298. *t.* 165. *f.* 1589. 1590.
Habitat in mari indico, *nonne potius ad helices ſpectat?*

*** Solidi, *umbilico perforato.*

pica. 39. T. teſta conico-rotundata laevi: denticulo umbilicali. *Muſ. Lud. Ulr.* 655. *n.* 346.
Argenv. Conch. t. 8. *f.* G. Pica.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 12. *f.* 7. Livon.
Liſt. Conch. t. 640. *f.* 30.
Petiv. gazoph. t. 70. *f.* 9.
Bonanni. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 29. 30.
Gualt. teſt. t. 68. *f.* B.
Klein oſtr. t. 2. *f.* 52.
Knorr Vergn. 1. *t.* 10. *f.* 1. *et* 2. *t.* 21. *f.* 3?
Bytem. app. t. 12. *f.* 51.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 6. *f.* 66. *et t.* 11. *f.* 57.
Chemn. Conch. 4. *t.* 151. *f.* 1420. 1421. *et* 5. *t.* 176. *f.* 1750. 1751.
Schroet. Journ. 5. *f.* 15.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 185. *f.* 1850?
γ) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 185. *f.* 1851?
δ) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 178. *f.* 1769. 1770?
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 13. *f.* 1. 2.
Habitat frequens in mari *fere omni, teſta ſolida* $2\frac{1}{2}$ *pollices alta,* $3\frac{1}{2}$ *lata nigro-radiata, columella tenui alba, anfractibus* 6 *convexis, umbilico canali duplici obtuſo.*

ſanguineus. 40. T. teſta ſubumbilicata conico-convexa ſtriata laevi: anfractibus ſubſulcatis.
Chemn. Conch. 5. *t.* 177. *f.* 1756. 1757.
Habitat in Africae *littore, teſta convexa, ſanguinea, piſi magnitudine: umbilico nunc perforato, nunc clauſo.*

41. T.

argyroſtomus. 41. T. teſta ſubovata exarata lineis dorſalibus elatioribus transverſe ſtriatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 656. *n.* 347.*
Argenv. Conch. t. 6. *f.* F. Os argenteum.
Rumpf muſ. t. 19. *f.* 2.
Gualt. teſt. t. 64. *f.* D.
Seb. muſ. 3. *t.* 74. *f.* 6.
Knorr Vergn. 3. *t.* 15. *f.* 5.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 11. *f.* 50.
Chemn. Conch. 5. *t.* 177. *f.* 1758-1761. *et f.* 1763-1765.
β) *Valent. Abh. t.* 9. *f.* 79-81.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 74. *f.* 20-22.
Habitat potiſſimum in India, *cochlo affinis, teſta albida, fuſco radiata, apice interdum rubra: ſpirae anfractibus* 6 *teretibus; primo reliquis multo majore, apertura argentea.*

margaritaceus. 42. T. teſta ſubovata: lineis dorſalibus elatioribus laevibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 656. *n.* 348.*
Rumpf muſ. t. 19. *f.* 3. 4.
Argenv. Conch. t. 6. *f.* A?
Seb. muſ. 3. *t.* 74. *f.* 4.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 10. *f.* 43.
Chemn. Conch. 5. *t.* 177. *f.* 1762.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 29. 1. *t.* 3. *f.* 18.
Habitat rarior in mari indico, *teſta ventricoſa fuſco, viridi et flaveſcente varia, ſpirae anfractibus* 5-6.

verſicolor. 43. T. teſta glaberrima ſubtiliſſime transverſim ſtriata viridi alboque varia: anfractibus planiuſculis contiguis; primo maximo rotundato.
Liſt. Conch. t. 576. *f.* 29.
Chemn. Conch. 5. *t.* 176. *f.* 1740. 1741.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 176. *f.* 1747. a. b.
γ) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 176. *f.* 1747. c. d.
Habitat in Oceano auſtrali; *ſpirae anfractibus* 4, *labro ſubfiſſo crenato, apertura matris perlarum inſtar nitente.*

Delphinus. 44. T. teſta umbilico hiſpido: anfractibus ſpinis ramoſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 657. *n.* 349.*
Argenv. Conch. t. 6. *f.* H. Delphinus.
Rumpf muſ. t. 20. *f.* H. Cochlea laciniata.
Valent. Abh. t. 5. *f.* 41.
Petiv. amb. t. 3. *f.* 1.
Grew. muſ. t. 11. *f.* 5. 6.
Liſt. Conch. t. 608. *f.* 45.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 31.

Gualt. teſt. t. 68. *f.* C. D.
Seb. muſ. 3. *t.* 59. *f.* 12-27.
Knorr Vergn. 1. *t.* 22. *f.* 4. 5. *et* 4. *t.* 7. *f.* 2. 3. *et t.* 8. *f.* 1.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 14.
Chemn. Conch. 5. *t.* 175. *f.* 1727-1735.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 174. *f.* 1725-1726.
γ) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 175. *f.* 1736.
Habitat rarior in India, *teſta fuſca, nigricante aut rubella albo varia, infinita, ſi magnitudinem, anfractuum ſuperficiem, ſpinarum formam et ambitum ſpectes, varietatis, umbilico ſpinis ſquamiſque horrido, anfractibus transverſim ſtriatis utplurimum bifariam ſpinoſis extimis complanatis.*

nodulo-ſus. 45. T. teſta depreſſa nodoſa granulatim transverſim ſtriata: anfractus primi carina dorſali inaequaliter tuberculata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 174. *f.* 1723. 1724.
Habitat rarus in India, *teſta ex rubello alba, granulis nigris.*

diſtortus. 46. T. teſta ſubmucronata undique ſpinis laevibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 657. *n.* 350.*
Chemn. Conch. 5. *t.* 175. *f.* 1737-1739.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 32. 1. *t.* 3. *f.* 19.
Habitat in India, *teſta roſea baſi alba multifariam noduloſa, nodulis ſanguineis, apertura et umbilico laevi flavis; ſpirae anfractibus 6 prominulis, diſtantibus, ſulco diſtinctis: carina media noduloſa.*

ſtellaris. 47. T. teſta vireſcente baſi convexa: anfractibus radiato-ſpinoſis; primi ſpinis duodecim maximis.
Chemn. Conch. 5. *t.* 164. *f.* 1553.
Habitat in Oceano auſtrali, *teſta* $\frac{5}{4}$ *pollicis alta,* $\frac{7}{4}$ *lata.*

aculeatus. 48. T. teſta baſi convexa: anfractibus ſpinis laciniatis coronatis; primo novem maximis, extimis complanatis.
Chemn. Conch. 5. *t.* 164. *f.* 1554. 1555.
β?) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 164. *f.* 1556. 1557.
Habitat rarus ad inſulas Nicobaricas, *ſpinis thalaſſinis.*

ſtellatus. 49. T. teſta flavicante ſubpyramidali baſi complanata: anfractibus margine inferiori ſpinuloſis.
Knorr Vergn. 4. *t.* 4. *f.* 5.
Chemn. Conch. 5. *t.* 164. *f.* 1558. 1559.
Habitat - - -

50. T.

Meſpilus. 50. T. ſpirae anfractibus convexis faſcia fuſco alboque teſſellata diſtinctis, apertura argentea, columella alba.
Chemn. Conch. 5. *t.* 176. *f.* 1742. 1743.
Habitat in Oceano auſtrali; *colore meſpilos referens.*

granulatus. 51. T. teſta annulis granulato-nodoſis cincta ſordide viridi apice rubella: apertura intus argentea, columellae labio aurantio maculato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 176. *f.* 1744. 1745.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 176. *f.* 1746.
γ) *Liſt. Conch. t.* 575. *f.* 28.
Habitat in mari indico *et* auſtrali.

Ludus. 52. T. teſta ſupra impreſſa ſubtus concava; ſpira annulata; anfractu primo maximo, umbilico cochleato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 176. *f.* 1748. 1749.
Habitat in mari auſtrali, *teſta heic alba, ibi viridi, maculis obſcuris violaceis viridibus et rubris utplurimum teſſellatis.*

atratus. 53. T. teſta nigricante: cingulis granorum moniliformibus alternatim binis nigris et cinereis, columella unidentata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 177. *f.* 1754. *f.* 1755.
Habitat ad inſulas Nicobaricas, *teſta avellanae magnitudine.*

dentatus. 54. T. teſta depreſſa orbiculata alba fuſco varia: columellae margine inferiori denticulato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 178. *f.* 1767. 1768.
Habitat - - -

Diadema. 55. T. teſta ſordide viridi fuſco varia filis confertis quaſi cincta: anfractibus quatuor; primo maximo.
Chemn. Conch. 5. *p.* 145. *vign.* 43. *f.* A. B.
Habitat ad novam Seelandiam, *teſta magna.*

cinereus. 56. T. teſta laevi ſubrotunda cinerea albo nigroque varia: anfractibus ſubſtriatis ventricoſis ad ſuturam complanatis.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. p. 356. 357. *t.* 12. *f.* 25. 26.
Habitat - - -

carinatus. 57. T. teſta tenui diaphana alba rotundo-pyramidali: anfractibus carinatis, umbilico ſpirali.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. p. 361. 362. *t.* 13. *f.* 3. 4.
Habitat - - - *ſpirae anfractibus* 6.

afer. 58. T. teſta tenui laevi: anfractibus complanatis.
Adanſ. Seneg. 1. *p.* 171. *t.* 12. *f.* 3. Daki.
β) *Adanſ. Seneg.* 1. *p.* 172. *t.* 12. *f.* 4. Rifet.
Habitat in Senegalia, *teſta vix* 2 *lineas longa fuſca, fulva aut griſea.*

planorbis. 59. T. teſta depreſſa laevi fuſca opaca. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 394. *n.* 393.
Habitat frequens in ſabulo littorum Groenlandiae *limoſo ſub lapidibus marinis teſtae diametro* 1-1½ *lineae, anfractibus* 4.

marginellus. 102. T. teſta hyalina laevi ſubcarinata, anfractibus ſex rotundatis, labro fimbriato reflexo. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 123. *f.* 1063.
Habitat - - -

helicoides. 103. T. teſta alba ſupra lineis angulatis fuſcis varia, anfractibus rotundatis: umbilico profundo amplo infundibuliformi. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 123. *f.* 1067. 1068.
Habitat - - -

foliaceus. 104. T. teſta pyramidali rugis lamellatis inaequali alba roſeo varia: umbilico amplo. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 123. *f.* 1069. 1070.
Habitat - - -

Anguis. 110. T. teſta transverſim ſtriata viridi nigro virgata intus margaritacea. *Martyn univ. Conchol.* 2. *t.* 70.
Habitat ad Veleſiam auſtralem.

Porphyrites. 111. T. teſta granulata atro, viridi flavo alboque varia, ſubumbilicata intus margaritacea. *Martyn Conch.* 2. *t.* 72.
Habitat ad novam Caleda.

ſmaragdus. 112. T. teſta glaberrima ſtriata viridi. *Martyn univ. Conchol.* 2. *t.* 73. 74.
Habitat ad novam Seelandiam.

**** Cancellati.

crenellus. 60. T. teſta umbilico patente planiuſcula, anfractibus teretibus: ſtriis crenatis.
Habitat - - - *teſta ſolida, rufa, magnitudine ſeminis lupini, ſupra plano-convexa, ſubtus concava: ſtriis longitudinalibus.*

thermalis. 61. T. teſta umbilicata oblongiuſcula obtuſa: anfractibus teretibus laevibus.

Habitat prope thermas piſanas *in* aquis dulcibus, *teſta alba, ſemine braſſicae paulo majore, anfractibus quaternis, umbilico minore.*

ſcalaris. 62. T. teſta conica anfractibus diſtantibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 658. *n.* 351.*
Argenv. Conch. t. 11. *f.* V. Scalaris.
Rumpf muſ. t. 49. *f.* A. Scalare, Wendeltrap.
Pet. amb. t. 2. *f.* 9.
Valent. Abh. t. 12. *f.* 101.
Gualt. teſt. t. 10. *f.* ZZ.
Knorr Vergn. 4. *t.* 20. *f.* 2. 3. *et* 5. *t.* 23. *f.* 1. *et t.* 24. *f.* 6.
Martin. Conch. 4. *t.* 152. *et* 153. *f.* 1426. 1427. 1430-1433.
Spengl. ſelt. Conch. t. 1. *f.* B.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 7.
β) *Pall. ſpic. zool.* 10. *t.* 3. *f.* 5. 6. Turbo principalis.
Martin. berl. Samml. 7. 1. *t.* 1. *f.* 1. 2.
Conch. 4. *t.* 152. *f.* 1428. 1429.

Habitat pretioſus ad Barbariae *littora*, β) *rarior in arena littoris* Coromandel, *teſta ad* 2-2½ *pollices longa, alba, aut rubella coſtis albis, umbilicata* β) *imperforata, columella nulla, anfractibus rotundatis* 8, *in* β) 10, *coſtis tenuibus, carinatis, ſubobliquis, longitudinalibus, continuis. Vix varietas clathri.*

Clathrus. 63. T. teſta turrita ex umbilicata: anfractibus contiguis laevibus. *Fn. ſuec.* 2170. *Muſ. Lud. Ulr.* 658. *n.* 352.*
Rumpf muſ. t. 29. *f.* W. Buccinum-ſcalare.
Rondel. teſt. 89. *f.* 5.
Liſt. Conch. t. 588. *f.* 51.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 111.
Gualt teſt. t. 58. *f.* H.
Klein oſtr. t. 3. *f.* 66.
Planc. Conch. t. 5. *f.* 7. 8.
Ginann. adr. 2. *t.* 6. *f.* 54.
Bytem. app. t. 12. *f.* 54.
Knorr Vergn. 1. *t.* 11. *f.* 5. 4. *t.* 71. *f.* 5. *et t.* 20. *f.* 4-6. *et* 6. *t.* 39. *f.* 3.
Martin. Conch. 4. *t.* 153. *f.* 1434-1438.
β) *Liſt. Conch. t.* 588. *f.* 50.

Habitat frequens in mari mediterraneo atlantico, indico, *teſta vix* 2 *pollices longa, utplurimum alba, aliquando*

 pun-

punctata aut lineata, interdum ſubfuſca obſcurius faſciata, ſpirae anfractibus anguſtioribus et minus convexis, coſtis 12-16, *utplurimum convexis a ſcalari diſcernenda. Ex hac purpura violacea veterum, nec punicea deſumta.* Plancus.

ambiguus. 64. T. teſta turrita umbilicata: anfractibus contiguis laevibus.
Habitat in mari mediterraneo, *clathro ſimillimus, at umbilico, anfractibus pallidis lineis* 2-3 *ferrugineis pictis, coſtis duplo pluribus diſtinctus.*

crenatus. 65. T. teſta ſubcancellata turrita: anfractibus contiguis ſupra crenatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 659. *n.* 353.*
Habitat rarus - - - clathro affinis, teſta alba, $\frac{3}{4}$ *fere pollicis longa: ſpirae anfractibus* 8, *coſtis rotundatis, hinc inde obſoletis.*

lacteus. 66. T. teſta turrita: ſtriis longitudinalibus elevatis confertis.
Ginann. adr. t. 6. *f.* 55.
Habitat in mari mediterraneo, *clathro ſimilis, at minor, teſta grani hordei magnitudine, nivea, ſtriis non membranaceis.*

ſtriatulus. 67. T. teſta ſubcancellata turrita: anfractibus contiguis, cingulisque varicoſis interceptis.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta alba, magnitudine ſeminis hordei: anfractibus cinctis ſtriis membranaceis parvis, paſſimque rugis convexis calloſis, apertura obovata ſubtus ſubangulata.*

Uva. 68. T. teſta ovata obtuſa: anfractibus contiguis; ſtriis longitudinalibus imbricatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 659. *n.* 354.*
Pet. gaz. t. 27. *f.* 2. Olivaris ſtriata faſciata.
Liſt. Conch. t. 588. *f.* 47-49.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 140.
Gualt. teſt. t. 58. *f.* D.
Seb. muſ. 3. *t.* 55. *f.* 21.
Knorr Vergn. 6. *t.* 25. *f.* 4.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. p. 340. *vign. f.* 2.
Martin. Conch. 4. *t.* 153. *f.* 1439. a. b.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 2. *f.* 7.
β) *Spengl. n. Schr. daen. Geſ.* 1. *t.* 2. *f.* 7?
Chemn. Conch. 9. *t.* 113. *f.* 974.
γ) *Liſt. Conch. t.* 40. *f.* 38.
Chemn. Conch. 9. *t.* 112. *f.* 965.

Habitat

Habitat in mari, Americam auſtralem *alluente, teſta ad* 1½ *pollicem longa, alba, cinerea aut ſpadicea, umbilicata, anfractibus circiter* 12, *primo triplo majore ſecundo: ſulcis intermediis ſtriis aequalibus, apertura unidentata.*

corneus. 69. T. teſta umbilicata rotundata acutiuſcula: anfractibus teretiuſculis decuſſato-ſtriatis, apertura reflexa. *Muſ. Lud. Ulr.* 660. *n.* 355.

Habitat - - - teſta pellucida fuſca aut cornea: apertura intus alba, umbilico pervio.

reflexus. 70. T. teſta umbilicata convexo-prominula: anfractibus teretibus ſubſtriatis, apertura reflexa.

Habitat in Europa *auſtrali.*

Lincina. 71. T. teſta oblonga obtuſa rugoſo-ſtriata, apertura limbo dilatato plano crenato.

Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 178. *n.* 364. Nerita (Licinia) teſta ovata incarnata ſtriata, apertura in puncto adnata.

Petiv. gaz. t. 118. *f.* 11.

Liſt. Conch. t. 26. *f.* 24.

Klein oſtr. t. 3. *f* 71. a. b.

Sloan. jam. 2. *t.* 240. *f.* 12. 13.

Chemn. Conch. 9. *t.* 123. *f.* 1060. a-e.

Martin. berl. Mag. 3. *t.* 5. *f.* 54.

Habitat in Jamaica *et* inſulis vicinis, *teſta* 8 *circiter lineas longa, dura, pellucida, umbilicata, anfractibus* 5.

lunulatus. 72. T. teſta cylindrica alba reticulata: apertura remota.

Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 180. *n.* 366. Nerita lunulata.

Habitat - - - teſta dura, pellucida, 7 *lineas longa, anfractibus* 5, *lineis lunularum rufeſcentium transverſis* 4-5 *notatis.*

Labeo. 73. T. teſta oblonga umbilicata fuſca punctis convexis ſtriata: labro albo dilatato.

Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 180. *n.* 367. Nerita Labeo.

Brown jam. p. 401. *t.* 40. *f.* 5.

Liſt. Conch. t. 25. *f.* 23.

Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 43?

Chemn. Conch. 9. *t.* 123. *f.* 1061. 1062.

Habitat in Jamaica, *teſta* 15 *lineas longa, pellucida, punctis ſplendidis, fauce fuſca glabra, anfractibus* 5 *protuberantibus, umbilico pervio.*

74. T.

elegans. 74. T. teſta ovata cinerea ſpiraliter convexa ſtriata: apertura adnata.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 177. *n.* 363. Nerita elegans.
Columm. purp. c. 9. *p.* 27.
Liſt. Conch. t. 27. *f.* 25.
anim. angl. t. 2. *f.* 5.
exerc. anat. p. 2. *t.* 1.
Gualt. teſt. t. 4. *f.* A. B.
Argenv. Conch. t. 28. *f.* 11. 12.
zoomorph. t. 9. *f.* 9.
Martin. berl. Mag. 2. *p.* 604. *t.* 1. *f.* 4. 6.
Schroet. Fluſconch. t. 9. *f.* 15. a. b.
Geofr. teſt. 1.
Habitat in Angliae, Galliae, Italiae *fluviis? teſta dura, imperforata, 6 lineas longa, anfractibus 5 convexis, operculo corneo, cochleato, ſtriis ſubtiliſſimis radiantibus exarato.*

dubius. 75. T. teſta oblonga umbilicata: anfractibus aequalibus decuſſato ſtriatis, apertura dilatata.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 13. *f.* 5. 6. Turbo Lincina.
Habitat - - -

limbatus. 105. T. teſta ſubovata rugoſa perforata alba. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 123. *f.* 1075. *α. β.*
Habitat in Coromandel.

***** Turriti *proprie dicti.*

imbricatus. 76. T. ſpirae anfractibus deorſum imbricatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 660. *n.* 356.*
Gualt. teſt. t. 58. *f.* E.
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* 26. 31. 33. 34.
Knorr Vergn. 2. *t.* 27. *f.* 1. *et* 6. *t.* 25. *f.* 2.
Martin. Conch. 4. *t.* 152. *f.* 1422.
Habitat in inſulis Americae *mediae* obverſis, *teſta fuſca variegata, rarius cinerea, ad 4 pollices longa, anfractibus 12-18 intus albis complanatis transverſim ſtriatis: ſtriis ſubtiliſſime granulatis.*

replicatus. 77. T. teſta laevi: anfractibus ſurſum imbricatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 661. *n.* 357.*
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 24.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* E.
Knorr Vergn. 6. *t.* 25. *f.* 3?

Martin.

Martin. Conch. 4. *t.* 151. *f.* 1412.

β) Liſt. Conch. t. 590. *f.* 55.

Habitat Tranquebariae, *teſta* 3 *pollices longa, et longiori, cornea, β) fuſca, tenuiſſime transverſim ſtriata: ſpirae anfractibus circiter* 10, *apertura ovali.*

acutangulus. 78. T. ſpirae anfractibus carina unica majore acuta. *Muſ. Lud. Ulr.* 661. *n.* 358.*

Liſt. Conch. t. 591. *f.* 59.

Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 117?

Gualt. teſt. t. 58. *f.* B.

Knorr Vergn. 3. *t.* 19. *f.* 5.

Martin. Conch. 4. *t.* 151. *f.* 1413.

β) Knorr Vergn. 6. *t.* 19. *f.* 5.

Habitat ad Tranquebariae *littora, teſta ad* $4\frac{1}{4}$ *pollices longa cornea, cinerea aut ochroleuca, rarius hyalina, anfractibus* 15-17 *transverſim ſtriatis teretibus.*

duplicatus. 79. T. ſpirae anfractibus carinis duabus acutis. *Muſ. Lud. Ulr.* 662. *n.* 359.*

Liſt. an. angl. t. 3. *f.* 7.

Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 114.

Gualt. teſt. t. 58. *f.* C.

Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* 7. 8.

Martin. Conch. 4. *t.* 151. *f.* 1414.

Schroet. inn. Bau Conch. t. 4. *f.* 5.

β) v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. 1. *p.* 368. *t.* 13. *f.* 8. Turbo torcularis.

Habitat ad littora Coromandel, *acutangulo affinis, teſta ad* 6 *pollices longa, carnea, cornea intusque fuſca, caeruleſcente, aut violacea, interdum faſciata; anfractibus ad* 16 *transverſim ſtriatis.*

exoletus. 80. T. ſpirae anfractibus carinis duabus obtuſis diſtantibus.

Liſt. Conch. t. 591. *f.* 58.

Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 113.

Argenv. Conch. t. 11. *f.* 10.

Martin. Conch. 4. *t.* 152. *f.* 1424. 1425.

Knorr Vergn. 6. *t.* 39. *f.* 2.

Schroeter Flusconch. t. 8. *f.* 10.

inn. Bau Conch. t. 3. *f.* 6.

Habitat

Turriculae autorum militant ſub murice, ſtrombo, buccino, trocho, turbine.

Habitat ad Guineae *littora, teſta vix 2 pollices longa, nunc eburnea, nunc alba fuſco, rarius caeruleſcente varia, rariſſime alba, intus fuſco-faſciata, anfractibus complanatis, contiguis, transverſim ſtriatis.*

Terebra. 81. T. ſpirae anfractibus carinis ſex acutis. *Fn. ſuec.* 2171.
Muſ. Lud. Ulr. 662. *n.* 360.*
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 10. *f.* 6. Ligar.
Columm. aq. t. 53. *f.* 2.
Liſt. Conch. t. 590. *f.* 54.
anim. angl. t. 3. *f.* 8.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 23. 115.
Rumpf muſ. t. 30. *f.* M.
Gualt. teſt. t. 58. *f.* A.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* D.
zoomorph. t. 4. *f.* F?
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* 12. 18. 25. 32. 40.
Knorr Vergn. 1. *t.* 8. *f.* 6.
Martin. Conch. 4. *t.* 151. *f.* 1415-1419.
β) *Adanſ. Seneg.* 1. *p.* 159. *t.* 10. *f.* 7. Meſal.
γ) *Regenſ. Conch.* 2. *t.* 12. *f.* 57.
Martyn Conch. 1. *rubr.*
Chemn. Conch. 10. *t.* 165. *f.* 1591.
δ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 165. *f.* 1592. 1593.
Habitat in mari Sinam, Africam occidentalem, Angliam, Sueciam *alluente,* adriatico, *teſta fuſca vel ſubfuſca, creberrime alba 2 ad 6 fere pollices longa, anfractibus ad 36 ſubconvexis, diſcretis, ſingulis carinis* 5-9.

variegatus. 82. T. ſpirae anfractibus planiuſculis; ſtriis ſeptem obſoletis.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 112.
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* 30. 37. 38.
Knorr Vergn. 6. *t.* 16. *f.* 8?
Martin. Conch. 4. *t.* 152. *f.* 1423.
Habitat in mari, Americam auſtralem *et* Barbariam *alluente, imbricato affinis, teſta 2-3 pollices longa, teſta variegata fuſca vel ex fuſco lutea, 2-3 pollices longa, ſubtiliſſime transverſim ſtriata, anfractibus ſubconvexis: ſtrigis nonnullis maculoſis.*

unguli-nus. 83. T. ſpirae anfractibus ſtriis decem exoletis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2930.
Habitat in mari Europaeo, *et* mediterraneo, *inter terebrum et variegatum quaſi medius, verme ventricoſo proboſcide longiſ-*

longiſſima emiſſili apice globoſa et cirris plurimis armata inſtructo, teſta 2-4½ pollices longa albo varia ex fuſco lutea vel ſpadicea, anfractibus ad 24 usque.

cryſtallinus. 84. T. ſpirae anfractibus coſtatis: apertura ovata. *Müll. zool. dan. prodr.* 2929.
Habitat in mari Daniam *alluente.*

Albulus. 85. T. teſta imperforata glabra: anfractibus rotundatis ſtriatis. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 394. *n.* 392.
Habitat rarus in profundis maris Groenlandiam *alluentis ad ramulos ſertulariarum, teſta pellucida, albida, fragili, longitudinaliter ſulcata, vix* 1⅓ *lineam longa, anfractibus* 5 *ventricoſis lente decreſcentibus.*

annulatus. 86. T. anfractuum ſutura marginata prominente.
Gualt. teſt. t. 58. *f.* L.
Habitat - - - teſta candida, ¼ *pollicis longa: apertura ſubovali.*

bidens. 87. T. teſta pellucida: anfractibus contrariis; ſutura ſubcrenata, apertura poſterius bidentata.
Müll. zool. dan. prodr. 2917. *verm. hiſt.* 2. *p.* 116. *n.* 315. Helix teſta turrita fuſca glabra ſiniſtrorſa: apertura canaliculata.
Liſt. Conch. t. 41. *f.* A.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 41.
Gualt. teſt. t. 4. *f.* D. E.
Stroem. act. Nidroſ. 3. *p.* 436. 437. *t.* 6.
Schroet. Erdconch. p. 136. A. B. *t.* 1. *f.* 4. a. *et f.* 5.
Einl. in Conch. 2. *p.* 55. 1. *t.* 3. *f.* 22.
Chemn. Conch. 9. *t.* 112. *f.* 960. *n.* 1. 2.
β) *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 120. *n.* 317. Helix papillaris.
Ginann. adr. 2. *t.* 3. *f.* 23.
Chemn. Conch. 9. *t.* 112. *f.* 963. 964.
γ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 112. *f.* 961. 962.
Habitat in Europa, *potiſſimum* auſtrali, *frequens* e. g. *in cavis arborum truncis, teſta glaberrima, dimidium circiter pollicem longa fuſca, rarius ex fuſco aurantia, anfractibus* 10-11, *in commiſſuris papillis vel denticulis albis munitis.*

perverſus. 88. T. teſta pellucida: anfractibus contrariis non crenatis, apertura tridentata. *Fn. ſuec.* 2172.*

Müll.

Müll. zool. dan. prodr. 2918. *hiſt. verm.* 2. *p.* 118. *n.* 316. Helix teſta turrita fuſca ſtriata ſiniſtrorſa, apertura canaliculata.
Liſt. Conch. t. 40. *f.* 38. *et t.* 41. *f.* 39.
anim. angl. p. 124. *t.* 2. *f.* 10.
Gualt. teſt. t. 4. *f.* C.
Argenv. Conch. t. 28. *f.* 11. 19. 20.
zoomorph. t. 9. *f.* 13. 14.
Geoffr. teſt. 23.
Stroem. act. Nidroſ. 3. *t.* 6. *f.* 17.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 2.
Schlotterb. act. helvet. 5. *t.* 3. A. *f.* 17. 18.
Schroet. Erdconch. t. 1. *f.* 4. a. b. *f.* 5.
Chemn. Conch. 9. *t.* 112. *f.* 959. a. b.
β) *Martin. berl. Mag. t.* 5. *f.* 60.
γ) *Liſt. Conch. t.* 20. *f.* 16?
δ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 112. *f.* 958. α. β.
ε) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 112. *f.* 957.
ζ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 112. *f.* 956.
η) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 114. *f.* 980. α. β.
Habitat vulgatiſſimus in Europae ſilvis *et* muſcoſis, *teſta* ¾ *circiter pollicis longa, dilute fuſca, tenui, glabra, rarius rugoſula, apertura alba.*

Fuſulus. 89. T. teſta obtuſa curvatim ſulcata: apertura edentula, anfractibus undecim.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 109. *n.* 309. Helix Fuſulus.
Habitat - - - teſta, 7½ *lineas longa.*

Fuſus. 90. T. teſta obtuſa recte ſulcata alba: apertura dentata, anfractibus novem.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 108. *n.* 308. Helix Fuſus.
Bonann. recr. 3. *f.* 140.
Habitat - - - teſta fuſiformi, apertura lunata, labro reflexo.

ſulcatus. 91. T. teſta obtuſa oblique ſulcata alba: apertura ſubquadrata, labro reflexo.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 108. *n.* 387. Helix ſulcata.
Chemn. Conch. 9. *t.* 135. *f.* 1231. 1232.
Habitat - - - teſta ſubpellucida, alba, immaculata, ſubventricoſa, 12 *lineas longa, anfractibus* 8, *apertura perpendiculari.*

quadridens. 92. T. teſta ſiniſtrorſa flavicante: apertura quadridentata.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 107. *n.* 306. Helix quadridens.

Liſt.

Liſt. Conch. t. 40. f. 38.
Geoffr. teſt. 24.
Habitat in Italia, *teſta glabra 5 lineas longa, anfractibus 9, apertura arcuata, labro ſubreflexo dentibusque albis.*

tridens. 93. T. teſta albida: apertura tridentata.
Müll. hiſt. verm. 2. p. 106. n. 305. Helix tridens.
Gualt. teſt. t. 4. f. F.
Chemn. Conch. 9. t. 135. f. 1236.
Habitat in Italia, *teſta glabra, minutiſſime ſtriata, 5 lineas longa, anfractibus 7, apertura arcuata, labro ſubreflexo.*

muſcorum. 94. T. teſta ovata obtuſa pellucida: anfractibus ſenis ſecundis, apertura edentula. *Fn. ſuec. 2173.* It. oel. 99.*
Müll. zool. dan. prodr. 2915. hiſt. verm. 2. p. 105. n. 304. Helix teſta cylindracea obtuſa: apertura edentula orbiculata, labro albo.
Liſt. anim. angl t. 2. f. 6.
Argenv. zoomorph. t. 9. f. 11.
Stroem. act. Nidroſ. 3. t. 1. f. 7.
Geoffr. teſt. 20.
Martin. berl. Mag. 3. t. 5. f. 63.
Schroeter Erdconch. t. 1. f. 7.
Chemn. Conch. 9. t. 123. f. 1076. n. 1, 2.
β) Liſt. anim. angl. t. 2. f. 8?
Argenv. Conch. t. 28. f. 17.
Martin. berl. Magaz. 3. t. 5. f. 55.
Schroet. Erdconch. t. 1. f. 6.
Habitat frequens in Europae muſcis, *teſta lineam longa, tenera, glabra, dilute fuſca, anfractibus 5-6, aperturae limbo albo, in β) dentibus 8 munita.*

obtuſus. 95. T. teſta fragili: anfractibus quinis diſtinctis transverſim ſtriatis albido-faſciatis. *Scopol. delic. inſubr. 1. p. 68. t. 25. f. C.*
Habitat - - - teſta rufeſcente, digiti auricularis longitudine imperforata, anfractibus rotundatis: ſingulis faſcia albida; primo duplici, apertura ſubovata, operculo griſeo.

Auriſcalpium. 96. T. teſta alba laeviſſima; aperturae labio porrecto planiuſculo concavo obtuſo.
Argenv. Conch. t. 32. f. 19?
Habitat in mari mediterraneo, *teſta ſubulata lactea: anfractibus 7-8, apertura dilatata auriſcalpium referente marginata.* Logie.

politus. 97. T. teſta imperforata glaberrima: apertura ovata.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta nivea, non pellucida, nitidiſſima, grani hordei magnitudine, anfractibus linea excavata tenui interſtinctis.*

nautileus. 98. T. teſta planiuſcula: anfractibus annulatis dorſo criſtatis.
Syſt. nat. X. 1. *p.* 709. *n.* 234. Nautilus Criſta.
Müll. zool. dan. prodr. 2286. *hiſt. verm.* 2. *p.* 165. *n.* 351. Planorbis (imbricatus) teſta alba umbilicata: carina dentata.
Roeſ. inſ. 3. *t.* 97. *f.* 6. 7.
Hofer act. helv. 4. *p.* 212. *t.* 9. *f.* 21. 22.
Geoffr. teſt. 8.
Martin. berl. Mag. 4. *p.* 269.
Chemn. Conch. 9. *t.* 123. *f.* 1077. A. a.
Habitat in Galliae, Helvetiae, Germaniae, Daniae ceratophyllo, *aliisque plantis aquarum ſtagnantium, teſta diametri dimidiae lineae, pellucida, fragiliſſima, alba, pallida vel cinerea, ſupra plana, ſubtus convexa umbilicata, anfractibus* $2\frac{1}{2}$, *apertura longa; nonne potius ad tertiam tribum referendus?*

obſoletus. 99. T. ſpirae anfractibus carinis duabus obtuſis approximatis.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 13. *f.* 7.
Habitat - - - exoleto affinis.

quinquedentatus. 100. T. teſta ſubumbilicata albida: apertura quinquedentata.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. 1. *p.* 378. *t.* 13. *f.* 9.
Habitat - - - bidenti affinis, teſta ſubpellucida: anfractibus 12.

pyramidalis. 101. T. teſta cornea pellucida ventricoſo-pyramidali: apertura ſupra ſubcompreſſa.
Schroet. Erdconch. t. 1. *f.* 8.
Habitat rarius in Germania, *teſta* $\frac{1}{4}$ *pollicis longa, ad ſolem et aërem primo cineraſcente, poſt albicante et opaca.*

328. HELIX. *Animal* Limax.

Teſta univalvis, ſpiralis, ſubdiaphana, fragilis.

Apertura coarctata, intus lunata ſ. ſubrotunda: ſegmento circuli demto.

* Ancipites, *teſta longitudinaliter utrinque angulata.*

Scarabaeus. 1. H. teſta ovata ſubancipiti: apertura dentata. *Muſ. Lud. Ulr.* 663. *n.* 361.*
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 88. *n.* 286. Helix (Pythia) teſta ſubumbilicata ovata utrinque ſubcarinata, apertura dentata.
Rumpf muſ. 91. *t.* 27. *f.* I. Cochlea imbrium.
Liſt. Conch. t. 577. *f.* 31. 32.
Pet. gaz. t. 4. *f.* 10.
amboin. t. 12. *f.* 8.
Bonann. recr. 3. *f.* 385.
muſ. Kircher. 3. *f.* 370.
Gualt. teſt. t. 4. *f.* S.
Argenv. Conch. t. 9 *f.* T.
Seb. muſ. 3. *t.* 60. *infra in angulo.*
Klein oſtr. t. 1. *f.* 23. 24.
Knorr Vergn. 6. *t.* 19. *f.* 2. 3.
Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. 1. *p.* 364. *vign. f.* a.
Martin. berl. Mag. 3. *t.* 6. *f.* 67.
Favann. Conch. t. 65. *t.* D^1. D^2. D^4.
Chemn. Conch. 9. *t.* 136. *f.* 1249-1253.
Martyn univ. Conchol. 1. *t.* 25.
Habitat in Aſiae montibus, inſulis amicis, *olim cum pluvia caelitus delabi credita, teſta ad* 1½ *pollicem longa fuſco alboque varia, anfractibus contiguis: primo convexo, apertura anguſta, compreſſa ſubflexuoſa, labio utroque tridentato, exteriori acuto et inaequali.*

** Carinatae, *anfractuum margine acuto.*

Lapicida. 2. H. teſta umbilicata utrinque convexa: apertura transverſali marginata ovata. *Fn. ſuec.* 2174.* *Muſ. Lud. Ulr. n.* 362.* *It. wgoth.* 27.
Müll. zool. dan. prodr. 2899. *hiſt. verm.* 2. *p.* 40. *n.* 240. Helix teſta umbilicata carinata depreſſa maculata, apertura transverſa alba.

 Liſt.

Liſt. Conch. t. 69. f. 68.
anim. angl. t. 2. f. 14.
exerc. anat. p. 182. t. 5. f. 4.
Petiv. gazoph. t. 92. f. 11.
Geoffr. teſt. 10.
Schlotterb. act. helv. 5. t. 3. f. 15.
Martin. berl. Magaz. 2. t. 3. f. 36.
Schroet. Erdconch. p. 191. n. 64. 65. t. 2. f. 23.
Chemn. Conch. 9. t. 126. f. 1107.
Habitat in Europae rupibus terreſtribus *et* arborum truncis *ut laura lignum, ſic calcem rodere perhibita, vegetabilibus victitans, teſta diametri ſemipollicaris, oculis armatis eleganter ſtriata, fuſco cornea, maculis ferrugineis, aut fuſca albo varia, rarius hyalina, anfractibus 5, umbilico pervio.*

marginata. 3. H. teſta ſubumbilicata ſubdepreſſa oblique ſtriata alba: faſciis rufis, apertura transverſali. *Müll. hiſt. verm. 2. p. 41. n. 241.*
Habitat - - - indiſcretae affinis, teſta diametri 9 linearum, ſupra convexa, ſubtus planiuſcula, anfractibus 4 glabris, primo trifaſciato, reliquis bifaſciatis, apertura ſubtriangulari.

cicatricoſa. 4. H. teſta umbilicata ſubdepreſſa rugoloſa flavicante: lineis concentricis rufis, anfractibus contrariis. *Müll. hiſt. verm. 2. p. 42. n. 242.*
Argenv. Conch. app. t. 1. f. C.
Petiv. gaz. t. 76. f. 6?
Kaemmerer Cab. Rudolſt. t. 11. f. 6.
Chemn. Conch. 9. t. 109. f. 123. vign. 19. l. A.
Favann. Conch. t. 63. f. K.
Habitat rara - - - teſta tenera, pellucida, ſupra convexa, ſubtus gibba, anfractibus 5, extimo rufo faſciato, umbilico pervio, apertura ſubquadrata, intus alba.

Aegophthalmos. 5. H. teſta umbilica ſubdepreſſa virideſcente immaculata: anfractibus ſeptem. *Müll. hiſt. verm. 2. p. 39. n. 239.*
Rumpf muſ. 1. t. 27. f. P.
Petiv. gazoph. t. 21. f. 6.
Argenv. Conch. t. 6. f. E.
Brown jam. p. 450. t. 40. f. A. B.
Habitat in India, Barbaria *et* auſtrali America, *teſta diametri interdum pollicaris, cornea ex luteo vireſcente, expalleſcendo albida ſubtiliſſime transverſim ſtriata, anfractibus 6-7,*

6-7, *in juniori ſubcarinatis, umbilico pervio, apertura lunata acuta, fauce alba.*

Oculus capri. 6. H. teſta ſubcarinata umbilicata convexa: apertura marginata.
Muſ. Lud. Ulr. 664. *n.* 363.*
Rumpf muſ. t. 27. *f.* O?
Argenv. Conch. t. 8. *f.* F.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 10?
β) *Martyn univ. Conch.* 1. *t.* 28.
Habitat in Aſiae *arboribus, teſta albida, glabra, centro fuſca, anfractibus ſubdepreſſis ex fuſco luteis, apertura alba infra flava, umbilico pervio.*

Albella. 7. H. teſta umbilicata planiuſcula ſubtus gibba: apertura ſemicordata. *Fn. ſuec.* 2175.* *It. oel.* 65.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 26. *n.* 228. Helix explanata.
Liſt. Conch. t. 64. *f.* 62. *t.* 80. *f.* 81. *et t.* 140. *f.* 46. 47.
Gualt. teſt. t. 3. *f.* Z.
Chemn. Conch. 9. *t.* 126. *f.* 1105. 1106.
Habitat in Europae rupibus, *teſta glabra, alba, immaculata, ſubtiliſſime transverſim ſtriata, diametri* $5\frac{1}{2}$ *linearum, anfractibus* 5.

maculata. 8. H. teſta perforata planiuſcula ſubcarinata alba fuſco punctata ſubtus gibba: faſciis linearibus. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 25. *n.* 227.
Habitat - - - teſta alba, diametri $4\frac{1}{2}$ *linearum: faſciis* 2 *ex punctis fuſcis; anfractibus* 3.

Albina. 9. H. teſta perforata planiuſcula alba ſubtus gibba: apertura quadrangulari. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 25. *n.* 226.
Liſt. Conch. t. 86. *f.* 86?
Habitat - - - Albellae ſimilis, teſta immaculata diametri 3 *linearum, anfractibus* 3; *an diſtincta ſpecies?*

ſtriatula. 10. H. teſta ſubcarinata umbilicata convexa ſtriata ſubtus gibboſiore: apertura ſubrotundo lunata.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 33. *n.* 235? Helix polita.
Habitat Algiriae *et? in* ripis torrentum Lombardiae, *teſta minuta, griſea vel candidiſſima glaberrima, oculo armato argute transverſim ſtriata, anfractibus* 4-5. E. Brander.

algira. 11. H. teſta ſubangulata umbilicata convexa: anfractibus ſenis, umbilico pervio.
Favann. Conch. t. 63. *f.* L.

 Chemn.

Chemn. Conch. 9. *t* 125. *f.* 1093. 1094.

β) *Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t.* 14. *f.* 3. 4?

Habitat in Mauritania, *ſtriatulae affinis, at ſpirae anfractibus 6, umbilico patentiſſimo, anfractuum angulo obſoleto diſtincta.*

Leucas. 12. H. teſta ſubcarinata umbilicata convexa laevi ſubtus gibboſa: umbilico minutiſſimo, apertura ſubrotundo-lunata.

Habitat in Africa, *teſta albida, ſupra faſcia, ſubtus lineis purpuraſcentibus.* E. Brander.

laevipes. 13. H. teſta perforata ſubdepreſſa ſubcarinata ſiniſtrorſa pallida: faſcia rufa albae adnata. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 22. *n.* 222.

Chemn. Conch. 9. *t.* 108. *f.* 915. 916.

Habitat - - - exili aliquantum affinis, teſta pellucida, diametri ¾ pollicis tenera, ſubtus magis convexa alba, anfractibus 5 ſubtiliſſime transverſim ſtriatis, aperturae margine acuto.

vermiculata. 253. H. teſta ſubgloboſa depreſſa ſcabra imperforata albo-punctata: faſciis quatuor fuſceſcentibus, labro reflexo candido. *Müll hiſt. verm.* 2. *p.* 20. *n.* 219.

Petiv. gaz. t. 52. *f.* 11.

Favann. Conch. t. 64. *f.* K². K³.

Chemn. Conch. 9. *t.* 129. *f.* 1148. a. b. c.

Habitat in Italia *et* Luſitania.

exilis. 14. H. teſta perforata depreſſa ſubcarinata pallida: faſcia rufa albae adnata, anfractibus ſtriatis. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 22. *n.* 222. 1 -

Chemn. Conch. 9. *t.* 129. *f.* 1149.

Habitat Tranquebariae, *teſta diametri* 10 *linearum, pellucida, tenera ſubtus convexa alba, anfractibus* 5, *aperturae margine acuto.*

candida. 15. H. teſta umbilicata utrinque convexa; apertura non marginata. *Kaemmer. Cab. Rudolſt. p.* 172. *n.* 45.

Martin. n. Mannigf. 4. *p.* 423. *t.* 3. *f.* 22. 23.

Habitat - - - lapicidae affinis, at teſta teneriore, 5 *lineas alta,* 10 *lata, umbilico anguſtiore.*

ſpadicea. 16. H. teſta perforata ſubdepreſſa umbilicata ſpadicea, anfractibus quinque. *Kaemmer. Cab. Rudolſt. p.* 172. *t.* 11. *f.* 2.

Habitat - - - incarnatae affinis, teſta 7 *lineas alta,* 11 *lata, ſpadicea, umbilico labiique margine albido.*

17. H.

incarnata. 17. H. teſta perforata ſubgloboſa ſubcarinata cornea: anfractibus ſex, labro incarnato. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 63. *n.* 259.
Schroet. Erdconch. p. 174. *n.* 52-54. *t.* 2. *f.* 18.
Chemn. Conch. 9. *t.* 133. *f.* 1206.
Habitat rara in Daniae, Germaniae *nemoribus*, *teſta immaculata, diametri 6 linearum, carina pallida, umbilico anguſtiſſimo.*

ſericea. 18. H. teſta perforata ſubgloboſa ſubcarinata utrinque convexa tomentoſa. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 62. *n.* 258.
Habitat in Daniae hortis, *hiſpidae affinis, teſta diametri* 3 *linearum, cornea, tranſparente, carina pallida.*

crenulata. 19. H. teſta perforata globoſa ſubcarinata ſtriata alba: faſcia fuſca. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 68. *n.* 263.
Liſt. Conch. t. 85. *f.* 85.
Habitat in Gallia Lugdunenſi, *teſta alba, minutiſſime ſtriata, diametri* $3\frac{1}{2}$ *linearum, apice fuſco, labro acuto, anfractibus* 5.

Planorbis. 20. H. teſta ſubcarinata umbilicata plana ſupra concava: apertura oblique ovata utrinque acuta. *Fn. ſuec.* 2176.
Müll. zool. dan. prodr. 2879. *hiſt. verm.* 2. *p.* 157. *n.* 344. Planorbis (carinatus) teſta pallida pellucida ſupra umbilicata, carina marginali media.
Liſt. anim. angl. t. 2. *f.* 27.
Gualt. teſt. t. 4. *f.* EE.
Swammerd. bibl. nat. t. 10. *f.* 5.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 8.
Martin. berl. Magaz. t. 8. *f.* 18.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 14. *f.* 5. 6.
Schroet. Flusconch. t. 5. *f.* 13-15.
β) *Liſt. Conch. t.* 138. *f.* 42.
Pet. gaz. t. 10. *f.* 11. *et t.* 100. *f.* 216.
Chemn. Conch. 9. *t.* 126. *f.* 1102. *n.* 1. 2.
Habitat in Europae *et* Barbariae aquis ſtagnantibus *et* fluviis, *teſta diametri* 1 *lineae ad* $\frac{1}{2}$ *pollicis, pellucida cornea, rarius opaca, tenuiſſime ſtriata, anfractibus* 4-5, *primo reliquis multo majori.*

complanata. 21. H. teſta deorſum carinata umbilicata convexa ſubtus plana: apertura ſemicordata. *Fn. ſuec.* 2177.*
Müll. zool. dan. prodr. 2881. *hiſt. verm.* 2. *p.* 160. *n.* 345. Planorbis (umbilicatus) teſta fuſca opaca utrinque ſubumbilicata, carina marginali integra.

 Geoffr.

Geoffr. teſt. 6.
Chemn. Conch. 9. *t.* 127. *f.* 1121-1123.
Schroet. Flusconch. t. 5. *f.* 22-25. *et t.* 11. *minor.* C. *f.* 4.
Einl. in Conch. 2. *p.* 129. *t.* 4. *f.* 1.
β) *Martin. Conch.* 4. *t.* 8. *f.* 22?
Schroet. Flusconch. t. 5. *f.* 27?
Habitat frequens in Europae *et* Barbariae *aquis ſtagnantibus et rivulis, incola nigro: tentaculis rufis, teſta diametri* 1-6½ *linearum, fuſca interdum pallida, ſubpellucida, ſubtiliſſime transverſim ſtriata, anfractibus* 5-6.

ringens. 22. H. teſta ſubcarinata imperforata convexa: apertura reſupinata; labio poſterius quadruplicato.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 17. *n.* 216. Helix teſta imperforata ſubcarinata, apertura reſupinata utrinque dentata.
Liſt. Conch. t. 99. *f.* 100.
Bonann. recr. 3. *f.* 330. 331.
muſ. Kircher. 3. *f.* 331. 332.
Argenv. Conch. t. 28. *f.* 13. 14.
Martin. berl. Magaz. 2. *t.* 4. *f.* 42. a. b.
Favann. Conch. t. 63. *f.* F¹⁰.
Chemn. Conch. 9. *t.* 109. *f.* 919. 920.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 14. *f.* 11. 12.
β) *Liſt. Conch. t.* 83. *f.* 87.
γ) *Liſt. Conch. t.* 84. *f.* 84.
δ) *Liſt. Conch. t.* 87. *f.* 88?
Habitat rara in India? *teſta diametri interdum* 1½ *pollicis, ex fuſco lutea, vel cinerea aureo maculata, vel alba maculis ſubfuſcis, anfractibus* 6, *apertura oblongo-ovali, plicis vel dentibus* 4, 5, 6, 8.

ſinuata. 23. H. teſta imperforata ſubcarinata brunnea: carina candida: apertura transverſa dentata poſterius triplicata. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 18. *n.* 217.
Liſt. Conch. t. 97 *f.* 98. *et t.* 98. *f.* 99.
Klein oſtr. p. 11. *n.* 31. d. 1.
Argenv. Conch. t. 63. *f.* F. 8?
Chemn. Conch. 9. *t.* 126. *f.* 1110-1112.
β) *Liſt. Conch. t.* 96. *f.* 97.
Argenv. Conch. t. 63. *f.* F. 4.
γ) *Liſt. Conch. t.* 93. *f.* 93. 94.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 22.
Habitat in America, *teſta ſcabriuſcula, diametri* 9 *linearum utrinque planiuſcula: anfractibus* 5 *teretibus, labro reflexo.*

24. H.

Lucerna. 24. H. teſta imperforata alba ſupra planiuſcula ſubtus gibba: apertura transverſa bidentata. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 13. *n.* 212.

Chemn. Conch. 9. *t.* 126. *f.* 1108. 1109.

Habitat - - - facie placentae, at teſta decuplo minore, diametri 13 *linearum, alba, neutiquam ſtriata, anfractibus valde depreſſis.*

Lampas. 25. H. teſta imperforata ſupra planiuſcula ſubtus gibba: anfractibus cicatricoſis; extimo divaricato. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 12. *n.* 211.

Habitat rariſſima - - - Carocollae facie, at teſta diametri 31 *linearum, ſubtilius ſtriata, fulva, carina ſubalbeſcente, fauce luteſcente, labro aurantio glabro valde reflexo; anfractibus* 4 *latis planiuſculis.*

Carocolla. 26. H. teſta imperforata utrinque convexa. *Muſ. Lud. Ulr.* 664. *n.* 364.*

Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 77. *n.* 273. Helix teſta imperforata trochiformi carinata oblique ſtriata, labro transverſali albo.

Chemn. Conch. 9. *t.* 125. *f.* 1090-1092.

Favann. Conch. t. 63. *f.* 12.

α) *Liſt. Conch. t.* 1055. *f.* 5.

β) *Liſt. Conch. t.* 63. *f.* 61.

Argenv. Conch. t. 8. *f.* D.

Seb. muſ. 3. *t.* 40. *f.* 16. 17.

Knorr Vergn. 4. *t.* 5. *f.* 2. 3.

v. Born muſ. Caeſ. vind. teſt. t. 14. *f.* 9. 10.

Habitat terreſtris paulo rarior in India, *teſta utrinque ſtriata, diametri* 18 *linearum in* α) *brunnea, interdum ſubtus alba, vel ſupra pallide luteſcente ſubtus alba, carina interdum alba, nunc inferne nunc ſuperne faſcia cincta, anfractibus* 6 *ſubconvexis, labio albo, apertura triangulari; in* β) *teſta tota nigricante, praeter faucem pallidam, labrumque album; anfractibus* 5.

Lychnuchus. 27. H. teſta imperforata alba trochiformi faſciis fulvis: apertura transverſali bidentata. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 81. *n.* 278.

Liſt. Conch. t. 90. *f.* 90.

Habitat - - - inter Lucernam et Lychnum media, ab utraque tamen faſcia in ſuperiore anfractus parte duplici, ab illa etiam vertice, non anfractibus depreſſis, diſtincta.

Cepa. 28. H. teſta ſubgloboſa umbilicata ſubcarinata luteſcente faſcia albida: apertura transverſa bidentata pone ſinuata. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 74. *n.* 269.

 Liſt.

Liſt. Conch. t. 88. *f.* 89.

Habitat - - - teſta diametri circiter pollicaris utrinque convexa, anfractibus 5 contiguis, apertura lunata, labro vix reflexo, labio reflexo craſſo.

Cornu militare. 29. H. teſta ſubcarinata imperforata convexa: apertura patulo-marginata. *Muſ. Lud. Ulr.* 665. *n.* 365.

Gualt. teſt. t. 3. *f.* 1.

Knorr Vergn. 6. *t.* 32. *f.* 2.

Chemn. Conch. 9. *t.* 129. *f.* 1142. 1143?

Habitat terreſtris in India, *teſta glabra, ſatis magna, ſub epidermide fuſca alba, apertura fulva: limbo fuſco, anfractibus obtuſis.*

Pellis ſerpentis. 254. H. teſta ſubcarinata faſciis flammeis rubris albisque picta, ſubtus punctis quadrifariam cincta, apertura fimbriata. *Chemn. Conch.* 9. *p.* 79. *t.* 125. *f.* 1095. 1096.

Liſt. Conch. t. 66. *f.* 64.

Bonann. muſ. Kircher. 3. *n.* 349?

Petiv. gazoph. t. 156. *f.* 1.

Favann. Conch. t. 63. *f.* G³.

Habitat in America calidiore.

Vortex. 30. H. teſta ſupra concava: apertura ovali plana. *Fn. ſuec.* 2172.*

Müll. zool. dan. prodr. 2880. *hiſt. verm.* 2. *p.* 158. *n.* 345. Planorbis teſta flavo-fuſca ſubcarinata ſupra concava ſubtus plana.

Petiv. gazoph. t. 92. *f.* 6.

Liſt. Conch. t. 138. *f.* 43.

anim. angl. t. 2. *f.* 28.

Gualt. teſt. t. 4. *f.* GG.

Klein oſtr. t. 1. *f.* 9.

Martin. berl. Mag. 4. *p.* 257. *t.* 8. *f.* 19.

Schroeter Flusconch. t. 5. *f.* 16. 17.

Chemn. Conch. 9. *t.* 127. *f.* 1127. α. β.

Habitat in Europae aquis ſtagnantibus fluviisque, *plantis aquaticis crebro adhaerens, incola rufo, tentaculis albis, vitae, etiam in ſicco, tenaciſſimo, teſta pellucida diametri* $1\frac{1}{2}$-4 *linearum, minutiſſime transverſim ſtriata, dum vacua, flava, anfractibus* 5-7 *ſupra convexiuſculis, aperturae margine tenui acuto.*

ſcabra. 31. H. teſta ſubcarinata imperforata ovata acuminata ſtriata.

Habitat

Habitat - - teſta faſciis fuſcis diſſectis varia, in anfractu inferiore linea elevata.

gothica. 32. H. teſta utrinque convexa cornea: faſciis ſubferrugineis.
Habitat in Sueciae *nemoribus.*

Gualteriana. 33. H. teſta imperforata depreſſa decuſſatim ſtriata: apertura utrinque acuta.*
Gualt. teſt. t. 68. f. E.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 13. f. 12. 13.
Chemn. Conch. 5. p. 237. vign. 44. f. A. B. C.
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 136. t. 4. f. 2. 3.
Chemn. Conch. 9. t. 126. f. 1100. 1101.
Habitat terreſtris in India, *rariſſima, teſta ſordide cinerea, infra convexa, apertura triangulari canaliculata: limbo albo.*

tricarinata. 34. H. teſta trochiformi ſubumbilicata acuminata: ſtriis convexis carinaque triplici ſpiralibus: apertura dilatata. *Müll. hiſt. verm. 2. p. 84. n. 282.*
Chemn. Conch. 9. t. 126. f. 1103. 1104.
Habitat - - - teſta diametri 11 linearum, pallida, ſtrigis transverſis ſtriisque ſpiralibus obſolete luteis, anfractibus 5, apertura fere circulari, labro albo: margine acuto.

iſognomoſtomos. 158. H. teſta ſubfuſca depreſſa: anfractu primo tereti, apertura coarctata ſubtriangulari tridentata marginata.
Liſt. Conch. t. 93. f. 93. 94.
Klein oſtr. t. 1. f. 22.
Habitat in Virginia, Thuringia, Alſatia, *teſta ſubimperforata.*

Oculus communis. 159. H. teſta depreſſa umbilicata: anfractibus contiguis; primo maximo, apertura oblongo-ovata; limbo intus fulveſcente.
Seb. muſ. 3. t. 40. f. 3-5.
Martin. Naturf. 2. t. 79. f. 1.
Habitat - - - teſta magna ſolida incarnata, cana, aut alternatim ſubfuſca et lutea, faſciis utplurimum 6 aut pluribus fuſcis, rarius caeruleſcentibus picta, anfractibus 6, extimis mucronatis, apertura compreſſa, operculo extrinſecus rubro, nodoſo nitido occluſa.

affinis. 161. H. teſta umbilicata utrinque convexa albo ſpadiceoque varia: apertura alata ſubmarginata.

v. Born

v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 14. *f.* 1. 2. Helix lapicida.
Habitat - - - lapicidae accedens.

marginella. 162. H. teſta umbilicata oblique ſtriata ſupra convexa ſubtus depreſſiuſcula: anfractu primo carinato, apertura triangulari transverſa marginata.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 14. *f.* 7. 8.
Chemn. Conch. 9. *t.* 125. *f.* 1097.
Habitat - - - teſta 5 lineas ultra pollicem lata, 8 lineas alta, alba: faſcia fuſca.

ſinuoſa. 163. H. teſta ſubcarinata imperforata utrinque convexa excavato-punctata: anfractibus ſubconvexis contiguis, apertura transverſa ſeptem dentata.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 14. *f.* 13. 14. Helix ſinuata.
Habitat - - - ſpirae anfractibus 6.

maculoſa. 164. H. teſta umbilicata ſubcarinata oblique ſtriata depreſſiuſcula ſubtus convexa: apertura lunata; labio marginato.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 14. *f.* 15. 16.
Habitat - - - teſta alba fulvo maculata.

punctata. 165. H. teſta ſubumbilicata ſubcarinata depreſſiuſcula rotundata: anfractibus teretibus, apertura transverſa oblonga; labro marginato tridentato, columella incraſſata emarginata. *v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t.* 14. *f.* 17. 18.
Habitat - - - teſta fuſca: faſcia dorſi anguſta transverſa radiisque ſuturam verſus punctatis flavis, apertura rubella.

vitrea. 166. H. teſta ovata ſubumbilicata ſemipellucida glabra: anfractibus quinque, primo gibbo, reliquis carinatis, apertura oblongo ovata. *v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t.* 15. *f.* 15. 16.
Habitat - - - teſta ultra 2 pollices alta ex luteſcente fuſca: faſciis longitudinalibus undulatis ſulphureis.

annulata. 167. H. teſta umbilicata depreſſiuſcula alba: anfractibus quatuor: primo gibbo bicarinato. *Schroet. Flusconch. t.* 5. *f.* 30.
Habitat - - - teſta diametri 2 linearum, apertura ovata.

rhenana. 168. H. teſta umbilicata alba ſupra depreſſa: anfractibus carinatis conſperſim ſtriatis; ultimo fuſco. *Schroet. Fluſc. t.* 5. *f.* 31. a. b.
Habitat in Rheno.

naevia. 245. H. teſta ſubdepreſſa umbilicata alba ſupra longitudinaliter maculata: ſubtus faſciis quinque atris. *Chemn. Conch.* 9. *p.* 152. *t.* 133. *f.* 1207.
Gualt. teſt. t. 3. *f.* Q.
Habitat in inſula S. Crucis.

corrugata. 246. H. teſta umbilicata rugoſa cana oblique ſtriata: apertura lunata, labro incarnato intus reflexo. *Chemn. Conch.* 9. *p.* 152. b. 133. *f.* 1208.
Liſt. Conch. t. 55. *f.* 51.
Habitat in Jamaica.

Faba. 252. H. teſta imperforata laevi crocea, anfractuum margine baſique fuſcis, apertura caerulea. *Mart. univ. Conch.* 2. *t.* 67. *med.*
Habitat in Tahiti.

crenata. 254. H. teſta rotundata fuſca: anfractibus carinatis, apertura ſinuoſa. *Martyn univ. Conchol.* 2. *t.* 69.
Habitat in nova Seelandia.

*** Rotundatae *anfractibus et umbilicatae.*

cornea. 35. H. teſta ſupra umbilicata plana nigricante: anfractibus quatuor teretibus. *Fn. ſuec.* 2179.* *Muſ. Lud. Ulr.* 665. *n.* 366.*
Müll. zool. dan. prodr. 2878. *hiſt. verm.* 2. *p.* 154. *n.* 343. Planorbis (Purpura) teſta opaca ſupra umbilicata immaculata.
Liſt. Conch. t. 137. *f.* 41.
exerc. anat. 2. *p.* 59. *t.* 3. *f.* 1-4.
anim. angl. p. 143. *t.* 2. *f.* 26.
Petiv. gazoph. t. 92. *f.* 5.
Bonann. recr. 3. *f.* 316.
muſ. Kircher. 3. *f.* 312.
Leſſer teſtaceoth. p. 148. *f.* g.
Swammerd. bibl. nat. t. 10. *f.* 3. 4.
Gualt. teſt. t. 4. *f.* DD.
Ginann. op. poſt. 2. *p.* 50. *t.* 2. *f.* 12.
Argenv. Conch. t. 27. *f.* 2. *n.* 3. *et f.* 8.
zoomorph. t. 8. *f.* 7.
Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 17.
Knorr Vergn. 5. *t.* 22. *f.* 6.
Geoffr. teſt. 1.
Geve Conch. p. 27. 29. *t.* 3. *f.* 18. 19.
Chemn. Conch. 9. *t.* 127. *f.* 1113-1120.

Martin. berl. Mag. 4. *t.* 8. *f.* 17.
Schroet. Fluſconch. t. 5 *f.* 19-21. *et t.* 11. *min.* C. *f.* 7.
β) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 268. *n.* 319?
Habitat in Europae *et terrae* Coromandel *aquis dulcibus, incola timidiſſimo nigro, tentaculis ſordide cinereis, teſta pulla, fuſca, rufa, alba, ſublutea, vel caeruleſcente, diametri a lineari ad pollicarem fere glabra, nitida, ſubtiliſſime transverſim ſtriata, anfractibus* 4-5 *rariſſime contrariis.*

Spirorbis. 36. H. teſta utrinque concava plana albida: anfractibus quinque teretibus. *Fn. ſuec.* 2180.*
Müll. zool. dan. prodr. 2882. *hiſt. verm.* 2. *p.* 161. *n.* 347. Planorbis teſta flaveſcente utrinque concava aequali: anfractibus teretibus.
Geoffr. teſt. 2.
Martin. berl. Mag. 4. *p.* 258. *t.* 8. *f.* 20.
Habitat in Galliae, Germaniae, Scandinaviae *aquis ſtagnantibus, teſta pellucida vix ſtriata, diametri* ½-2 *linearum, anfractibus* 4-5, *apertura ſublabiata.*

polygyra. 233. H. teſta planiuſcula orbiculari, apertura ovali, labro fimbriato. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 127. *f.* 1124. 1125.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 14. *f.* 19. 20.
Habitat - - -

contorta. 37. H. teſta ſubumbilicata plana utrinque aequali: apertura lineari arcuata. *Fn. ſuec.* 2181.*
Müll. zool. dan. prodr. 2883. *hiſt. verm.* 2. *p.* 162. *n.* 348. Planorbis teſta fuſca ſupra plana ſubtus umbilicata, apertura arcuata.
Petiv. gazoph. t. 92. *f.* 8.
Geoffr. teſt. 3.
Martin. berl. Mag. 4. *p.* 260. 261. *t.* 8. *f.* 21.
Schroet. Fluſconch. t. 5. *f.* 29.
Chemn. Conch. 9. *t.* 127. *f.* 1126.
Habitat in Europae *ſtagnis, ſupra plantas, incola griſeo, tentaculorum margine albo, teſta opaca, diametri* 1-2 *linearum, fuſca, brunnea vel fulva, centro pellucida, anfractibus* 3-7 *arctiſſime nexis.*

nitida. 38. H. teſta polita flaveſcente: ſupra convexa umbilicata, ſubtus plana perforata.
Müll. zool. dan. prodr. 2884. *hiſt. verm.* 2. *p.* 163. *n.* 349. Planorbis nitidus.

Martin. berl. Magaz. 4. *p.* 262. *t.* 8. *f.* 22.
Schroet. Fluſconch. t. 5. *f.* 27.
Habitat in foſſis aquarum Daniae, *incola nigro, tentaculorum apice albo, juniori toto albo, teſta politiſſima, diametri* $\frac{1}{6}$-3 *linearum, diaphana, interdum fuſca, anfractibus* 3-5, *extimo interioribus ſimul ſumtis duplo latiori, apertura cordata.*

alba. 39. H. teſta alba utrinque umbilicata: apertura dilatata.
Müll. zool. dan. prodr. 2885. *hiſt. verm.* 2. *p.* 164. *n.* 350. Planorbis albus.
Petiv. gaz. t. 92. *f.* 7.
Martin. berl. Mag. 4. *p.* 253. *t.* 8. *f.* 23.
Schroet. Fluſconch. t. 5. *f.* 12.
Habitat in amnis Fridrichsdalenſis Daniae *plantis aquaticis, incola griſeo; tentaculis albis oculisque nigris, teſta pellucida, diametri* 1-2 *linearum, ſupra planiuſcula ſubtus convexa, anfractibus* 4 *teretibus ſubtiliſſime decuſſatim ſtriatis, extimo reliquis omnibus majore, apertura larga, obliqua.*

ſimilis. 40. H. teſta pellucida ſupra umbilicata punctis ſtriata.
Müll. zool. dan. prodr. 2887. *hiſt. verm.* 2. *p.* 166. *n.* 352. Planorbis ſimilis.
Martin. Berl. Mag. 4. *p.* 265. *t.* 11. *f.* 64. B.
Habitat in foſſis Berolinenſibus *et* Daniae Fridrichsdalenſibus, *juniori corneae ſimillimus.*

Cornu arietis. 41. H. teſta umbilicata planiuſcula: apertura ovali. *Muſ. Lud. Ulr.* 666. *n.* 367.*
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 152. *n.* 342. Planorbis (contrarius) teſta ſiniſtrorſa ſupra umbilicata: faſciis diverſicoloribus.
Liſt. Conch. t. 136. *f.* 40. Cochlea marina compreſſa.
Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 14. 15.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 7.
Knorr Vergn. 1. *t.* 2. *f.* 4. 5. *et* 2. *t.* 13. *f.* 4.
Geve Conch. p. 23. 24. *t.* 3. *f.* 9. 11.
Schroet. Fluſconch. t. 9. *f.* 13.
Chemn. Conch. 9. *t.* 112. *f.* 952. 953.
Habitat in Sina, *teſta diametri* 12-16 *linearum, utplurimum alba, faſciis* 3, 4, 5, 7, *rubris nunc aequalibus nunc inaequalibus picta, dura, minutiſſime transverſim ſtriata, anfractibus* 4 *convexis, labio dilatato.*

hiſpida. 42. H. teſta umbilicata convexa hiſpida diaphana: anfractibus quinis, apertura ſubrotundo-lunata. *Fn. ſuec.* 2182.*
Müll.

Müll. zool. dan. prodr. 2909. *hiſt. verm.* 2. *p.* 71. *n.* 268.
Helix teſta ſubgloboſa umbilicata hiſpidoſa.
Liſt. an. angl. p. 125. *t.* 2. *f.* 12.
Pet. gazoph. t. 93. *f.* 13.
Ginann. op. poſt. 2. *p.* 59. *t.* 3. *n.* 21.
Geoffr. teſt. 11.
Schlotterb. act. helv. 5. *t.* 3. *f.* 13.
Martin. berl. Mag. 2. *p.* 607. *t.* 3. *f.* 34.
Schroet. Erdconch. p. 186. *t.* 2. *f.* 21. a. b.
Chemn. Conch. 9. *t.* 122. *f.* 1057. 1558.
Habitat in Europae *campis, hortis, incola nigro, teſta pellucida, ſetis deciduis obſita, cornea, fuſca, fulva, flava aut cinereſcente, anfractibus* 5-6.

ampullacea. 43. H. teſta ſubumbilicata ſubgloboſa glabra: anfractibus ſupra ventricoſioribus, umbilico ſubobtecto, apertura ovato-oblonga. *Muſ. Lud. Ulr.* 666. *n.* 368.*
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 172. *n.* 359. Nerita teſta perforata ventricoſa ſupra depreſſa: apice obtuſo, apertura larga.
Liſt. Conch. t. 130. *f.* 30.
Rumpf Conch. t. 27. *f.* Q.
Pet. gaz. t. 12. *f.* 14.
Gualt. teſt. t. 1. *f.* R.
Geve Conch. t. 27. *f.* 289. a. b. *et f.* 291.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 1-7. 58. 59.
Knorr Vergn. 5. *t.* 5. *f.* 2.
Favann. Conch. t. 61. *f.* D[8].
Martin. berl. Mag. 3. *t.* 6. *f.* 68.
Schroet. Flusconch. t. 6. *f.* 2. *et t.* 9. *f.* 14.
Einl. in Verſt. 4. *t.* 9. *f.* 1.
Chemn. Conch. 9. *t.* 128. *f.* 1133-1135.
β) *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 174. *n.* 360. Nerita (Urceus) teſta ſubumbilicata ventricoſa rugoſa fuſca, apertura effuſa alba.
Liſt. Conch. t. 125. *f.* 25.
Chemn. Conch. 9. *t.* 128. *f.* 1136.
γ) *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 175. *n.* 361. Nerita (effuſa) teſta umbilicata ventricoſa faſciata ſupra depreſſa, apice acuto, apertura effuſa.
Liſt. Conch. t. 128. *f.* 28.
Seb. muſ. 3. *t.* 40. *f.* 3-5.
Geve Conch. t. 3. *f.* 20.
Chemn. Conch. 9. *t.* 129. *f.* 1144. 1145.
δ) *Argenv. Conch. t.* 17. *f.* B.

Habitat

Habitat in Aſiae *auſtralis* inſularumque *obverſarum paludoſis, teſta nitida, diametri* 8-19 *linearum, β)* 5 *pollicum, incola eduli.*

piſcinalis. 44. H. teſta globoſa perforata rufo-fuſca.
Müll. zool. dan. prodr. 2949. *hiſt. verm.* 2. *p.* 172. *n.* 358. Nerita piſcinalis.
Habitat frequens in horti Fridrichsdalenſis Daniae *piſcina, teſta duriuſcula, opaca, ſubtiliſſime transverſim ſtriata, fauce albida, anfractibus* 4.

puſilla. 45. H. teſta globoſa vireſcente perforata: apertura circinata.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 171. *n.* 357. Nerita puſilla.
Martin. berl. Mag. 4. *p.* 268. *t.* 8. *f.* 26.
Habitat in lacu ruppinenſi Marchiae, *piſcinali affinis, at teſta multò minore, diametri* 1 *lineae, columellae labio albido.*

ſphaerica. 46. H. teſta globoſa cornea: vertice obtuſo.
Müll. zool. dan. prodr. 2948. *hiſt. verm.* 2. *p.* 170. *n.* 356. Nerita ſphaerica.
Habitat minus frequens in Daniae paludoſis, *tentaculatae affinis, teſta alba vel cinerea immaculata glabra,* ⅔-2 *linearum: anfractibus* 4 *convexis; infimo ventricoſo.*

Pomatia. 47. H. teſta ſubumbilicata ſubovata obtuſa decolore: apertura ſubrotundo-lunata. *Fn. ſuec.* 1283.
Müll. zoool. dan. prodr. 2901. *hiſt. verm.* 2. *p.* 43. *n* 243. Helix teſta imperforata globoſa rufeſcente, faſciis obſoletis.
Geſn. aq. p. 244. 255. Pomatia.
Aldrov. exang. 389. Cochlea terreſtris gypſo obſerata.
Argenv. Conch. t. 28. *f.* 1. Pomatia.
zoomorph. t. 9. *f.* 4.
Liſt. Conch. t. 48. *f.* 46.
anim. angl. t. 2. *f.* 1.
exerc. anat. 1. *t.* 1. *f.* 1-6.
Bonann. recr. p. 221. *f.* 1. 2.
Gualt. teſt. t. 1. *f.* A.
Swammerd. bibl. nat. t. 4.
Leeuwenh. contin. arc. nat. p. 25-32.
act. angl. 1697.
Geve Conch. t. 29. *f.* 330-342.
Schlotterb. act. Helv. 5. *p.* 276.
Martin. berl. Mag. 2. *p.* 530. *t.* 1. *f.* 1. *et* 3. *t.* 2. *f.* 13.

Schroet. Erdconch. p. 145. *n.* 14. 15. *t.* 1. *f.* 10.
Chemn. Conch. 9. *t.* 128. *f.* 1138. a-c.
Schaeff. Verſ. mit Schnech. t. 3. *f.* 1-4. *t.* 5. *f.* 1-3. *t.* 6. *f.* 3. 4. *et t.* 7. *f.* 1. 4.
β) *Gualt. teſt. t.* 2. *f.* B.
γ) *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 45. *n.* 244. Helix (pomaria) teſta imperforata globoſa ſiniſtrorſa rufeſcente, faſciis obſoletis.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 5. *f.* 11.
Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 14. *f.* 21. 22.
δ) *Liſt. Conch. t.* 45. *f.* 43.
ε) *Liſt. Conch. t.* 47. *f.* 45.
ζ) *Liſt. Conch. t.* 49. *f.* 47.
η) *Liſt. Conch. t.* 51. *f.* 49.
ϑ) *Liſt. Conch. t.* 52. *f.* 50.
ι) *Liſt. Conch. t.* 1055. *f.* 2.
κ) *Gualt. teſt. t.* 1. *f.* D?
λ) *Martin. berl. Mag.* 2. *t.* 1. *f.* 7. 8.
μ) *Knorr Vergn.* 1. *t.* 21. *f.* 3?
ν) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 108. *f.* 908-910.
ξ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 108. *f.* 911. 912.
Habitat terreſtris in omni Europa, *incola hinc inde eduli, teſtam hiemem verſus operculo calcareo claudente, vitae tenaciſſimo, oviparo, teſta diametri* $9\frac{1}{2}$-16, *in* γ) 18 *linearum, ſordida, rugoſa, apice glabra.*

glauca. 48. H. teſta umbilicata ſubrotunda acuminata: labro marginato, apertura ovali. *Muſ. Lud. Ulr.* 668. *n.* 369.*
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 8?
Knorr Vergn. 5. *t.* 5. *f.* 3.
Habitat - - - teſta dilute fuſca; faſciis 4 *transverſis obſcurioribus, apertura flavicante.*

citrina. 49. H. teſta ſubumbilicata convexa obtuſa flaveſcente: faſcia fuſca. *Muſ. Lud. Ulr.* 667. *n.* 370.*
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 63. *n.* 260. Helix teſta perforata (imperforata) ſubgloboſa laevi nitida: faſcia diverſicolore.
Liſt. Conch. t. 54. *f.* 50. *et t.* 60. *f.* 57.
Gualt. teſt. t. 3. *f.* D. E.
Argenv. Conch. t. 28. *f.* 10.
Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 1. 2.
Knorr Vergn. 5. *t.* 22. *f.* 7.
Geve Conch. t. 26. *f.* 277-279. 281-283. 285.
Martin. berl. Mag. 2. *p.* 615. *t.* 4. *f.* 38.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 13. *f.* 14. 15. *et t.* 15. *f.* 1-10.

Favann.

Favann. Conch. t. 6. *f.* F¹.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 22.
Chemn. Conch. 9. *t.* 131. *f.* 1167-1175.
Habitat terreſtris in Jamaica *et* Sina, *teſta nitida, diametri* 12-18 *linearum, nunc ſulphurea, faſcia* 1-2 *lacteis, vel faſcia lineave purpurea lacteae ſuperne adnata vel innata, nunc lutea, faſcia baſique albis, linea inferne ſanguinea, nunc fulva, faſcia baſique albis, vel faſcia ſanguinea albae innata, nunc ex rufo fuſca: faſcia alba vel faſcia ſanguinea albae adnata, nunc ex atro fuſca, faſcia baſique albis, nunc pallide purpurea, faſcia ſulphurea. nunc pallide fuſca, faſcia baſique albis, nunc alba, faſcia* 1 *aut* 2 *ſanguineis, nunc ex luteo virente nigro punctata faſcia lineaque rufis, baſi alba, anfractibus* 5, *adultae umbilico clauſo.*

Rapa. 50. H. teſta perforata ſubgloboſa punctis pertuſa: faſcia ſanguinea, anfractu majore ſuperne introrſum deflexo. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 67. *n.* 261.
Chemn. Conch. 9. *t.* 131. *f.* 1176.
Habitat - - - *teſta diametri* 18 *linearum, alba, ſuperne luteſcente.*

Caſtanea. 51. H. teſta perforata ſubgloboſa obſcure caſtanea: faſcia rufa albae adnata, anfractibus ſtriatis. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 67. *n.* 262.
Chemn. Conch. 9. *t.* 131. *f.* 1177. 1178.
Habitat - - - *teſta pellucida, dura, craſſa: anfractibus* 7, *apertura lunata ſine labio.*

Globulus. 52. H. teſta globoſa ſubumbilicata alba: labro reflexo. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 68. *n.* 264.
Liſt. Conch. t. 44. *f.* 41.
Gualt. teſt. t. 2. *f.* C.
Chemn. Conch. 9. *t.* 130. *f.* 1159. 1160.
β) *Liſt. Conch. t.* 46. *f.* 44.
Habitat - - - *lucanae affinis, at teſtae umbilico non diſtincto et vertice non depreſſo diverſa, teſta immaculata, glabra, craſſiuſcula, diametri* 12 *linearum, ſaepe transverſim ſubcoſtata, anfractibus* 5.

lactea. 237. H. teſta imperforata depreſſa griſea lacteo-punctata: apertura fuſco ſanguinea, labro concolore dentato. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 19. *n.* 218.

 Liſt.

Liſt. Conch. p. 95. *n.* 96.
Chemn. Conch. 9. *t.* 130. *f.* 1161.
Habitat in Jamaica *et* Luſitania.

incisa. 238. H. teſta depreſſa umbilicata alba margine inciſa. *Chemn. Conch.* 9. *p.* 129. *t.* 130. *f.* 1166.
Favann. Conch. t. 64. *f.* S.
Habitat - - -

arbuſtorum. 53. H. teſta umbilicata convexa acuminata: apertura ſuborbiculari bimarginata; anterius elongata. *Fn. ſuec.* 2184.* *Muſ. Lud. Ulr.* 668. *n.* 371.*
Müll. zool. dan. prodr. 2904. *hiſt. verm.* 2. *p.* 55. *n.* 248. Helix teſta imperforata globoſa fuſca, lineolis luteis, labro albo.
Liſt. Conch. t. 56. *f.* 53.
an. angl. p. 119. *t.* 2. *f.* 4.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 68.
Geve Conch. t. 30. *f.* 345-356.
Martin. berl. Mag. 2. *t.* 3. *f.* 23.
Schlotterb. act. helv. 5. *t.* 3. *f.* 12?
Brit. zool. 4. *t.* 85. *f.* 130.
Da Coſta brit. Conch. t. 17. *f.* 6.
Chemn. Conch. 9. *t.* 133. *f.* 1202.
β) *Schranck Naturf.* 18. *p.* 72.
Habitat in Europae *potiſſimum ſepibus et arbuſtis, teſta diametri* $9\frac{1}{2}$ *linearum, fuſca lineis minutiſſimis flaveſcentibus, faſciaque pulla picta, juniore pellucida, anfractibus* $5\frac{1}{2}$, *incola interdum lacertae praeda.*

fulva. 54. H. teſta ſubimperforata globoſa pellucida fulva labro albo. *Müll. zool. dan. prodr.* 2905. *hiſt. verm.* 2. *p.* 56. *n.* 249.
Habitat rariſſima in palis humidulis et inter folia putrida fagina agri Fridrichsdalenſis Daniae, *incola hyalino: tentaculis nigris, teſta glabra, diametri* $\frac{1}{2}$-3 *linearum, ſubtiliſſime transverſim ſtriata, apertura arcuata anguſta, anfractibus* 7.

Epiſtylium. 55. H. teſta ſubimperforata ſubgloboſa ſtriata candida: anfractibus ſeptem. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 57. *n.* 250.
Liſt. Conch. t. 62. *f.* 60.
Habitat - - - *teſta diametri* 12 *linearum, hyalina, ſubtus planiuſcula laevi, apertura lunata, labro reflexo polito.*

cincta. 56. H. teſta ſubimperforata ſubgloboſa alba: faſciis labroque rufis. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 58. *n.* 251.

Habitat - - - ligatae affinis, at teſta majore diametri 18 linearum, ſtriis ſubtiliſſimis cum faſciis parallelis, anfractibus 5 diſtincta.

ligata. 57. H. teſta ſubimperforata ſubgloboſa alba: faſciis rufis, labro albo. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 58. *n.* 252.
Gualt. teſt. t. 1. *f.* E.
Chemn. Conch. 9. *t.* 128. *f.* 1137.
Habitat in Italia, *teſta diametri* 14 *linearum, faſciis* 5, *intus pellucentibus, anfractibus* 4, *apertura ſubovata.*

aſperſa. 58. H. teſta ſubimperforata ſubgloboſa lutea: faſciis quatuor rufis maculis albis interruptis, labro candido. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 59. *n.* 253.
Liſt. Conch. t. 49. *f.* 47.
Argenv. Conch. t. 28. *f.* XI.
Pet. gaz. t. 65. *f.* 4.
Knorr Vergn. t. 24. *f.* 3.
Geve Conch. t. 30. *f.* 344.
Martin. berl. Mag. 2. *t.* 2. *f.* 17.
Brit. zool. 4. *t.* 84. *f.* 129.
Coſta brit. Conchyl. t. 4. *f.* 1.
Favann. Conch. t. 63. *f.* D^2. D^3. D^4.
Chemn. Conch. 9. *t.* 130. *f.* 1156-1158.
Habitat in Italia, *teſta diametri* 12-18 *linearum, punctis minimis impreſſis ſubrugoſa, rarius alba, anfractibus* 4, *apertura elongata.*

extenſa. 59. H. teſta ſubimperforata ſubgloboſa pallida immaculata: apertura ampla. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 60. *n.* 254.
Habitat - - - pomatiae facie, at ſpira minus prominente, apertura repanda, anfractibus 4 *diſtincta, teſta diametri* 16 *linearum.*

piſana. 60. H. teſta perforata globoſa candida: faſciis ſubinterruptis rubris, labro roſeo. *Müll. hiſt. verm* 2. *p.* 60. *n.* 255.
Pet. gaz. t. 52. *f.* 12.
Gualt. teſt. t. 2. *f.* E.
Schroet. Erdconch. p. 188. *n.* 63. *t.* 2. *f.* 22. a.
Chemn. Conch. 9. *t.* 132. *f.* 1186. 1187.
Habitat in Barbaria, Italia, *et* Thuringia, *teſta diametri* 5-7½ *linearum, faſciis* 5-6.

ſtrigata. 61. H. teſta perforata vertice depreſſo alba: faſciis lineisque pluribus rufis, labro utrinque albo. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 61. *n.* 256.

Liſt Conch. t. 58. *f.* 55?

Habitat in Italia, *facie h. ericetorum, teſta polita, ſtriis ſubarcuatis exarata, diametri* 10 *linearum, anfractu infimo convexo.*

nemorenſis. 62. H. teſta perforata globoſa nitida alba: faſciis fuſcis. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 62. *n.* 257.

Chemn. Conch. 9. *t.* 129. *f.* 1146. 1147.

Habitat in India? *nemorali affinis, at teſta triplo majore, diametri* 15 *linearum, craſſiore, duriore, nitida, polita, paulisper in ſulphureum vergente.*

zonaria. 63. H. teſta umbilicata convexa depreſſiuſcula: apertura oblongiuſcula marginata.

Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 35. *n.* 237. Helix teſta umbilicata depreſſa: apertura transverſali; labro candido reflexo.

Gualt. teſt. t. 3. *f.* LL.

Seb. muſ. 3. *t.* 40. *f.* 52. 53. 55.

Knorr Vergn. 5. *t.* 21. *f.* 3. 4.

da Coſta brit. Conch. t. 4. *f.* 7.

Chemn. Conch. 9. *t.* 132. *f.* 1188. 1189.

Habitat in Barbaria *et* Europa, *magis auſtrali, teſta diametri* 11-13 *linearum, nunc alba, faſciis* 1, 2, 3, 4, 5 *vel* 6 *rufis, maculis praeterea interdum lacteis varia, nunc cinerea faſciis* 3 *rufis, nunc ſupra pallide incarnata ſubtus alba, faſciis albis rufisque alternis, nunc utrinque pallide incarnata, faſciis albis rufisque alternis, nunc lutea, aut faſcia rufa, aut maculis obſolete albidis lineisque obſcuris inſignita.*

ſtriata. 64. H. teſta umbilicata ſubdepreſſa ſtriata alba. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 38. *n.* 238.

Schroet. Erdconch. p. 183. *n.* 60. *t.* 2. *f.* 20.

Habitat in Thuringia, *teſta diametri* 6 *linearum, ſubtus convexa, anfractibus fere* 6 *rotundatis, apertura lunata.*

ericetorum. 65. H. teſta umbilicata depreſſa luteſcente: faſcia una vel pluribus fuſcis. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 33. *n.* 236.

Chemn. Conch. 9. *t.* 132. *f.* 1193-1195.

α) *Gualt. teſt. t.* 3. *f.* O.

Geoffr. teſt. 13.

β) *Liſt. an. angl. t.* 2. *f.* 13.

Martin.

Martin. berlin. Mag. 2. *p.* 613. *t.* 4. *f.* 46.
γ) *Gualt. teſt. t.* 2. *f.* M.
δ) *Gualt. teſt. t.* 2. *f.* L.
ε) *Gualt. teſt. t.* 3. *f.* P.
Habitat in Italia, *teſta diametri* δ) 4½, γ) 5, β) 7, α) 11 *linearum, faſcia una,* 3-4, *rarius alba* δ) *faſciisque* 9, *vel* 8.

nitens. 66. H. teſta umbilicata ſubdepreſſa fulvo cornea pellucida ſubſtriata: apertura larga. *Müll. zool. dan. prodr.* 2898. *hiſt. verm.* 2. *p.* 32. *n.* 234.
Petiv. gazoph. t. 93. *f.* 14.
Swammerd. bibl. nat. t. 8. *f.* 3.
Argenv. Conch. t. 28. *f.* 4.
Geoffr. teſt. 7.
Stroem. act. nidroſ. 3. *p.* 435. *t.* 6. *f.* 16.
Schroet. Erdconch. p. 201. *n.* 71.
Chemn. Conch. 9. *t.* 127. *f.* 1130. 1131.
Habitat in Galliae, Germaniae, Daniae, Norwegiae *muſcoſis humidis, incola pallide caeruleo, teſta nitida, diametri* 1-4 *linearum: anfractibus* 4-5, *apertura lunata: margine acuto.*

coſtata. 67. H. teſta ſubdepreſſa umbilicata cinerea: anfractibus coſtatis, apertura circulari; labio albo reflexo. *Müll. zool. dan. prodr.* 2897. *hiſt. verm.* 2. *p.* 31. *n.* 233.
Habitat rariſſima in Dania, *prope* Fridrichsdal *in loco elevato, teſta convexiuſcula opaca, diametri* 1 *lineae, anfractibus* 4 *transverſim plicatis.*

pulchella. 68. H. teſta umbilicata ſubdepreſſa alba glabra: apertura circinata, labro tereti reflexo. *Müll. zool. dan. prodr.* 2896. *hiſt. verm.* 2. *p.* 30. *n.* 232.
Geoffr. teſt. 6.
Habitat in Galliae *et* Daniae *humidis muſcoſis frequens, incola lactea, teſta ſubpellucida, diametri* 1 *lineae, ſtriis vix armato oculo conſpicuis, anfractibus vix* 4.

rotundata. 69. H. teſta umbilicata ſubdepreſſa: lineis transverſis elevatis maculisque ferrugineis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2895. *hiſt. verm.* 2. *p.* 29. *n.* 231.
Argenv. zoomorph. t. 9. *f.* 10.
Geoffr. teſt. 9.
Schroet. Erdconch. p. 199. *n.* 68. 69. *t.* 2. *f.* 25.

Habitat in Gallia, Germania, Scandinavia, *in* Daniae *palis putridis, truncis, muſcis, vulgaris, incola albo, ſupra obſcure punctato: capite cum tentaculis oculisque nigro, teſta alba, diametri* $2\frac{1}{4}$ *linearum, ſubtus convexa, maculis quadratis, interdum nullis, anfractibus* 4-6, *apertura arcuata: labio nullo.*

cellaria. 70. H. teſta umbilicata depreſſa luteſcente nitida ſubtus lactea: apertura larga. *Müll. zool. dan. prodr.* 2894. *hiſt. verm.* 2. *p.* 28. *n.* 230.

Schroet. Erdconch. p. 200. *n.* 70. *t.* 2. *f.* 26.

Chemn. Conch. 9. *t.* 127. *f.* 1129. *n.* 1. 2.

Habitat in Thuringia, *et copioſa in* Hafniae *cellis vinariis, incola albo, pellucido: oculo nigro, nervoque optico caeruleo, teſta glaberrima, pellucida, diametri* $3\frac{1}{2}$ *linearum, ſubtus convexa, anfractibus* 5, *apertura lunata.*

obvoluta. 71. H. teſta umbilicata utrinque depreſſa: anfractibus obvolutis. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 27. *n.* 229.

α) *Gualt. teſt. t.* 2. *f.* S.

Schlotterb. act. helv. 5. *p.* 280. *t.* 3. *f.* 16.

Martin. berl. Mag. 2. *t.* 3. *f.* 37.

Schroet. Erdconch. p. 196. *n.* 67. *t.* 2. *f.* 24. a.

Favann. Conch. t. 63. *f.* F*.

Chemn. Conch. 9. *t.* 127. *f.* 1128. a-c.

β) *Geoffr. teſt.* 12.

Schroet. Erdconch. p. 194. *n.* 66. *t.* 2. *f.* 24.

Habitat in Thuringia *et* Italia, *teſta diametri* 4-5 *linearum, labro reflexo, in* α) *albida, glabra, ſubtus convexa, ſubtiliſſime ſtriata, anfractibus* 6-7, *apertura triangulari; in* β) *fuſca, hiſpida, anfractibus* 5-6, *apertura lunari.*

ſtrigoſula. 72. H. teſta perforata ſubdepreſſa ſtriata alba faſcia rufa. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 24. *n.* 225.

Habitat in Gallia, *teſta pellucida, diametri* 5 *linearum, ſubtus convexa laeviuſcula, anfractibus fere* 6, *labio craſſiuſculo albo.*

adiata. 73. H. teſta perforata ſubdepreſſa ſtriata, ſubtus convexa radiata. *Müll. hiſt verm.* 2. *p.* 23. *n.* 224.

Liſt. Conch. t 70 *f.* 69.

Petiv. gaz. t. 104. *f.* 1.

Gualt. teſt. t. 2. *f.* 3.

Gronov. zooph. 3. *p.* 331. *n.* 1541.

Habitat

Habitat in Gallia meridionali, *et* Virginia, *teſta craſſa, albo ruſoque varia, intus tota alba, apertura lunata, ſine labio.*

cryſtallina. 74. H. teſta perforata depreſſa candida nitida diaphana. *Müll. zool. dan. prodr.* 2893. *hiſt. verm.* 2. *p.* 23. *n.* 223.
Habitat rara in Daniae *muſcis, teſta diametri lineae, ſubtus convexa, ab incola ex fuſco lutea, anfractibus* 4-5.

ungulina. 75. H. teſta umbilicata convexa: apertura marginata ſuborbiculata ſupra elongata. *Muſ. Lud. Ulr.* 668. *n.* 372.*
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 69. *n.* 265. Helix teſta globoſa utrinque umbilicata luteo rufa, apertura lunata, labro reflexo albo.
Rumpf muſ. t. 27 *f.* R. Lapillus.
Pet gazoph. t. 1 *f.* 6. Planorbis indica.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 11.
Seb. muſ. t. 40. *f.* 11.
Geve Beluſt. t. 3. *f.* 15.
Born Caeſ. muſ. Vind. ind. teſt. t. 15. *f.* 11. 12.
Chemn. Conch. 9. *t.* 125. *f.* 1098. 1099.
Habitat in India, *teſta figura pomi, diametri* 16 *linearum, glabra, nitida ſupra depreſſa, ſubtiliſſime transverſim ſtriata, fauce ſubpurpurea, labio albo.*

Varica. 76. H. teſta globoſa umbilicata flaveſcente albida: anfractibus contrariis, extimo divaricato. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 70. *n.* 266.
Habitat - - - *teſta dura, parum pellucida, diametri* 19 *linearum, anfractibus* 5 *rotundatis, infimo ventricoſo, aperturae margine acuto.*

fruticum. 77. H. teſta globoſa umbilicata: apertura elabiata. *Müll. zool. dan. prodr.* 2908. *hiſt. verm.* 2. *p.* 71. *n.* 267.
Schroet. Erdconch. p. 178. *n.* 55-59. *t.* 2. *f.* 19.
Chemn. Conch. 9. *t.* 133. *f.* 1203.
Habitat in Thuringiae, Daniae *fruticetis, ſepibus, limace incola albo, pallido, maculato, nigricante, cineraſcente vel atro: tentaculis ſemper nigris, teſta ad nemoralem accedens, at fragiliori, diametri* $7\frac{1}{2}$ *linearum magis pellucente, anfractibus ſex, nunc pallide lutea, punctis ſparſis aureis, vel punctis maculisque nigricantibus varia, nunc ſulphurea maculis punctisque nigris, aut maculis rarioribus nigris faſciaque purpurea varia, nunc luteſcente punctis nigris confertis faſciaque purpurea, nunc fuſca punctis*

ctis maculisque nigris, nunc ſaturata rubra, punctis maculisque nigris cum vel ſine faſcia purpurea.

Lucena. 78. H. teſta ſubgloboſa umbilicata ſubtus gibba: labro reflexo candido. *Müll. hiſt. verm. p. 75. n. 270.*
Argenv. Conch. t. 28. f. 7?
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 253. t. 4. f. 9.
Chemn. Conch. 9. t. 130. f. 1155.
Habitat - - - nemorali affinis, teſta pellucida glabra, nunc tota candida, nunc ſupra lutea, anfractibus 5, infimo valde convexo, apertura lunata.

vittata. 79. H. teſta ſubgloboſa ſubumbilicata alba: faſciis crebris brunneis, vertice caeruleo, labro reflexo albido. *Müll. hiſt. verm. 2. p. 76. n. 271.*
Chemn. Conch. 9. t. 132. f. 1190-1192.
Habitat in littore Coromandel, *nemoralis facie, teſta diametri 9 linearum, lignum exſiccatum cum venis concentricis referente, opaca, anfractibus 5, apertura ex nigro fuſca, labio acuto.*

roſacea. 80. H. teſta ſubgloboſa ſubumbilicata incarnata transverſim ſtriata: labro reflexo fuſco. *Müll. hiſt. verm. 2. p. 76. n. 272.*
Habitat - - - pomatiae affinis, at teſta majore diametri 19 linearum, ventricoſa, anfractibus 5, apertura lunata, roſea.

itala. 81. H. teſta umbilicata convexa obtuſa: anfractibus quinque teretibus, umbilico patulo, apertura ſuborbiculata.
Habitat terreſtris in Europa auſtrali, *teſta avellanae magnitudine, albida: faſcia fuſca.*

luſitanica. 82. H. teſta umbilicato-perforata convexa obtuſa: anfractibus quinque teretibus flaveſcenti-albidis, umbilico patulo.
Gualt. teſt. t. 2. f. T.
Murray teſtaceol. t. 1. f. 1.
Favann. Catal. t. 2. f. 107.
Chemn. Conch. 9. t. 108. f. 913. 914.
β) Chemn. Conch. 10. t. 173. f. 1684. 1685.
Habitat terreſtris in Europa auſtrali, *teſta magnitudine pomi minoris, unicolore.*

mammillaris. 83. H. teſta umbilica ovata: anfractibus tribus ſtriatis, apertura ovata apici adnata.

Argenv.

Argenv. Conch. t. 27. n. 6. f. 3.
Habitat in Africae fluviis, *neritae mammillae affinis, at teſta transverſe confertim ſubtiliſſime, longitudinaliter remotius ſtriata, apertura magna.*

hiſpana. 84. H. teſta umbilicata convexa: anfractibus quinque teretibus, umbilico tenui perforato, apertura ſuborbiculata.
Habitat in Europa auſtrali, *teſta coloris cornei.*

lutaria. 85. H. teſta umbilicata ovato-oblonga interne coloratiore: apertura ſubovata. *Muſ. Lud. Ulr.* 669. *n.* 373.*
Habitat - - - teſta ex ovato conica, ſubtiliſſime ſtriata, umbilico obliquo, apertura intus alba.

ovalis. 86. H. teſta perforata ovato-ventricoſa ſtrigata: apice coſtato labroque roſeis, columella candida. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 85. *n.* 283.
Chemn. Conch. 9. *t.* 119. *f.* 1020. 1021.
Habitat rariſſima in India, *oblongae affinis, teſta craſſa, ultra* 4 *pollices longa, lutea: claviculis roſeis, anfractibus ſex, apertura ovali.*

oblonga. 87. H. teſta perforata ovato-oblonga ſtriata: labro columellaque roſeis. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 86. *n.* 284.
Liſt. Conch. t. 23. *f.* 21.
Seb. muſ. 3. *t.* 71. *f.* 17-20.
Walch Naturf. 12. *t.* 1. *f.* 1-3.
Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 15. *f.* 21. 22.
Chemn. Conch. 9. *t.* 119. *f.* 1022. 1023.
Habitat - - - teſta craſſiuſcula pellucida, pallida vel ex albo luteſcente 3 *pollices et* 5 *lineas longa, anfractibus* 6, *apertura ovali, fauce albida.*

flammea. 88. H. teſta perforata oblonga alba: faſciis longitudinalibus rufis, columella reflexa recta. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 87. *n.* 285.
Adanſ. Seneg. 1. *p.* 14. *t.* 1. *f.* 1.
Martin. berl. Mag. 3. *p.* 119. *t.* 5. *f.* 49.
Chemn. Conch. 9. *t.* 119. *f.* 1024. 1025.
Habitat in Guinea, *teſta tenera, pellucida, glabra, undulatim faſciata,* 18-28 *lineas longa, anfractibus* 8-9 *aequaliter decreſcentibus, labro candido nitido, fauce caeruleſcente.*

Pileus. 89. H. teſta trochiformi alba: faſciis rufis, apertura transverſa ampla, labro ſubreflexo. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 80. *n.* 277.
Chemn.

Chemn. Conch. 9. *t.* 112. *f.* 1046-1048.
Habitat - - - *teſta pellucida glabra*, 15 *lineas longa, faſciis* 3-5, *anfractibus* 6 *ſimiliter faſciatis numero variabili; an hujus tribus? an eadem cum pileata?*

aculeata. 90. H. teſta trochiformi umbilicata utrinque convexa fuſca: coſtis aculeatis, labro albido. *Müll. zool. dan. prodr.* 2911. *hiſt. verm.* 2. *p.* 81. *n.* 279. *Naturf.* 19. *p.* 165. *t.* 2. *f.* I. II. III.
Chemn. Conch. 9. *t.* 133. *f.* 1209.
Habitat rara in Daniae *ramuſculis faginis aridis*, *incola hyalino: capite cum tentaculis nigricante, teſta ſubpellucida, diametri* $\frac{3}{4}$ *lineae, anfractibus* 4 *rotundatis: coſtis albidis in ſingulis* 28-30, *apertura ſubcircinata: labro ſubreflexo membranaceo.*

Volvulus. 91. H. teſta trochiformi umbilicata acuminata variegata: apertura circinata, labro reflexo. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 82. *n.* 280.
Liſt. Conch. t. 50. *f.* 48.
Petiv. gazoph. t. 77. *f.* 6.
Seb. muſ. 3. *t.* 40. *f.* 18. 19.
Chemn. Conch. 9. *t.* 123. *f.* 1064-1066.
Habitat - - - *teſta glabra ſubſtriata nitida, anfractibus* $5\frac{1}{2}$ *maxime convexis protuberantibus, diametri* 11-$14\frac{1}{2}$-22 *linearum, luteo rufoque varia ſubtus alba, lineis interdum concentricis obſoletis, aliquando rufo fuſcoque varia: faſcia lata ſaturatiori.*

Involvulus. 92. H. teſta trochiformi umbilicata acuminata alba: ſtriis ſpiralibus convexis, apertura circinata, labro reflexo. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 84. *n.* 281.
Liſt. Conch. t. 75. *f.* 75.
Seb. muſ. 3. *t.* 40. *f.* 56-58. 61. 63. 64.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 14. *f.* 23. 24.
Habitat - - - *volvulo affinis, at teſta minus nitida, diametri* 13 *linearum ſtriis ſubtiliſſimis longitudinalibus exarata, labro minus reflexo craſſoque, faſcia interdum maculisque rufis varia.*

neritina. 93. H. teſta glabra duriuſcula umbilicata ſpadicea albo faſciata: anfractibus infra planis, apertura ovato-oblonga. *Kaemmerer Conch. Rudolſt. p.* 185. *n.* 2. *t.* 11. *f.* 7.
Habitat - - - *teſta parum ultra pollicem longa, ampulliceae affini.*

169. H.

turturum. 169. H. teſta umbilicata rotundata tenui: apertura ſemilunari.
Liſt. an. angl. t. 2. *f.* 12.
Schlotterb. act. Helv. 5. *t.* 3. A. *f.* 13.
Martin. berl. Mag. 2. *t.* 3. *f.* 34.
Habitat in Helvetiae, Germaniae, Angliae *ſilvis, turturum eſca gratiſſima, nemorali affinis, at mucrone teſtae magis obtuſo, teſta griſea, achatina, rubella aut alba: limbo albo vel fuſco.*

olivetorum. 170. H. teſta umbilicata depreſſiuſcula flava: apertura compreſſa, anfractu primo ex terete planiuſculo.
Gualt. teſt. t. 3. *f.* G.
Habitat in Florentiae olivetis.

badia. 171. H. teſta umbilicata ſubgloboſa laevi ſupra depreſſa: apertura lunari.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 15. *f.* 11. 12. Helix ungulina.
Habitat - - - teſta ſpadicea, pollicem alta, et novem lineas ultra pollicem lata.

cretacea. 172. H. teſta ſubumbilicata laevi albida fuſco-faſciata: anfractibus convexis, apertura lunata.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 16. *f.* 1. 2.
Habitat - - - teſta 10 *lineas alta, et* 2 *lineas ultra pollicem lata.*

pileata. 173. H. teſta ſubumbilicata conica alba ſpadiceo faſciata: apertura ſemilunari.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 16. *f.* 11. 12. Helix Pileus.
Habitat - - - teſtae apice obtuſo.

fuſceſcens. 174. H. teſta rotundata ſubumbilicata tenui: apertura ſemilunari. *Schroet. Erdconch. t.* 1. *f.* 11.
β) *Schroet. Flusconch. t.* 6. *f.* 14?
Habitat in Thuringia, *teſta ſubfuſca, alba, margaritacea aut cerea ſaepius faſciata.*

terreſtris. 175. H. teſta umbilicata: ſpira obtuſe mucronata; anfractu primo maximo, reliquis ſenſim decreſcentibus, apertura ſemilunari marginata. *Schroet. Erdconch. t.* 2. *f.* 19.
Habitat - - - teſta alba, incarnata, aut achatina: anfractibus 6.

nivea. 176. H. teſta rotundata umbilicata tenui nitida alba, apertura ſemilunari. *Schroet. Erdconch. t.* 2. *f.* 20.

Habitat

Habitat - - - terreſtri affinis, at teſta minore breviore, magis rotundata.

media. 177. H. teſtâ utrinque plana umbilicata: anfractibus ſex; primo tereti, apertura ſuborbiculari.
Schroet. Erdconch. t. 2. *f.* 22. 22. a.
Einl. in Conch. 2. *p.* 241. *t.* 4. *f.* 8.
Habitat in Germania, *teſta variae magnitudinis, alba, interdum fuſco faſciata.*

tenella. 178. H. teſta umbilicata tenerrima plana nitida ſupra convexa: apertura ſemilunari compreſſa.
Schroet. Erdconch. t. 2. *f.* 26.
Habitat - - - terreſtris, anfractibus 5 contiguis, teſta alba, teſtacea, cornea, vel margaritacea.

crepuſcularis. 179. H. teſta umbilicata depreſſa alba: anfractibus ſex teretibus; tertio quartoque fuſcis, extimo apice rubello, apertura ſemilunari laevi.
Martin. n. Mannigf. 4. *p.* 422. *t.* 3. *f.* 20. 21.
Habitat ad Guineae *littora, teſta ſolida: ſpira ſubpyramidali.*

hyalina. 180. H. teſta umbilicata pellucida ſupra plana dilute fuſca ſubtus hemiſphaerice alba: anfractibus contrariis.
Martin. n. Mannigf. 4. *p.* 423. *t.* 3. *f.* 22. 23.
β) Martin. n. Mannigf. 4. *p.* 424. *t.* 3. *f.* 24.
Chemn. Conch. 9. *t.* 109. *f.* 921. 922.
Habitat terreſtris in Guineae *littore, nonne potius ſecundae tribui accenſenda?*

Avellana. 181. H. teſta ſubumbilicata obtuſe ſubtrigona aſpera plicata intus argentea: apertura laevi auriculata, anfractu primo circulo elevato.
Spengler Beſch. berl. Naturf. 1. *p.* 395. *t.* 9. *f.* 4. 5.
Chemn. Conch. 5. *t.* 188. *f.* 1919. 1920.
Habitat in Oceano auſtrali, *teſta avellanae magnitudine et colore, labio tamen albo; nonne potius ad neritas referenda?*

rufeſcens. 182. H. teſta inflata ſubumbilicata fragili: anfractibus quinque; primo maximo ſubcompreſſo, reliquis convexis, apertura ſemilunari.
Schroet. Flusconch. t. 5. *f.* 35.
Habitat Hamburgi *in fluviis, teſta diametri 6 linearum rufeſcente: faſcia ſpadicea.*

pervia. 183. H. teſta umbilicata obtuſe ſubpyramidali: anfractibus quatuor convexis, primo circulo elevato reliquis ſulco cinctis, apertura ſemilunari.

Schroet.

Schroet. Flusconch. t. 6. f. 10.
Habitat in - - - fluviis, teſta minuta.

laeviſſima. 184. H. teſta umbilicata oblonga: anfractibus teretibus laevibus, apertura orbiculari.
Schroet. Flusconch. t. 6. f. 12.
Habitat in - - - fluviis, perviae affinis.

faſcicularis. 185. H. teſta umbilicata pellucida: anfractibus tribus canaliculo diſcretis, apertura orbiculari non marginata.
Schroet. Flusconch. t. 6. f. 11.
Habitat rara Argentorati *et* Lutetiis *aquatica, incola praeter 2 tentacula criſtam erigente, teſta latiſſima, minus alta, obſcura.*

holoſericea. 186. H. teſta umbilicata depreſſa ſupra ſubconcava: anfractu primo villoſo plano, apertura triangulari marginata.
Gualt. teſt. t. 2. f. 5.
Schlotterb. act. Helv. 5. t. 3. A. f. 16.
Martin. berl. Mag. 2. t. 3. f. 37.
Schroet. Erdconch. t. 2. f. 24. et 24. a.
Habitat in Gallia, Helvetia, Thuringia, *teſta diametri ſemipollicaris fuſca, anfractibus 6, aperturae margine intus rufeſcente vel albo.*

turgida. 187. H. teſta tenui fragili alba umbilicata alba dilutius faſciata: anfractu primo tereti inflato, apertura ſuborbiculari non marginata.
Schroet. Flusconch. t. 5. f. 28.
Habitat Hamburgi *in aquis, teſta diametri fere ¾ pollicis, faſciis 8, anfractibus 6.*

tenuis. 188. H. teſta umbilicata pellucida cornea transverſim ſtriata convexa: anfractibus ſex ſenſim decreſcentibus, apertura ſemilunari.
Schroet. Flusconch. t. 5. f. 32.
Habitat - - - teſta diametri 4-5 linearum.

coriacea. 226. H. teſta cartilagineo-cornea luteſcente ſubpellucide gibba: ſpira ſimplici ſtriis circularibus exarata.
Pall. nov. act. Petrop. 2. p. 243. t. 7. f. 31-33.
Habitat in inſulis Kurilibus, *ſpira intus calcarea cruſta obducta.*

Cornu venatorium. 227. H. teſta depreſſa profunde umbilicata labro vendidiſſimo.
Chemn. Conch. 9. p. 104. t. 127. f. 1132. 1133.
β) *Chemn. Conch. 9. p. 85. t. 109. f. 317. 318.*
Habitat in Senegalia, *ramis foliisque arborum adhaerens.*

229. H.

elegans. 229. H. teſta pyramidali alba umbilicata: anfractibus ſex acutis planiuſculis marginatis. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 122. *f.* 1045. a-c.
Liſt. Conch. t. 61. *f.* 58.
Petiv. gaz. t. 22. *f.* 10.
Favann. Conch. t. 64. *f.* O.
Habitat terreſtris in Barbaria *et auſtrali* Europa.

Cookiana. 230. H. teſta pyramidali laevi alba obtuſa: baſi imperforata convexa. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 122. *f.* 1049. 1050.
Habitat in inſulis maris auſtralis.

bidentata. 231. H. teſta pyramidali ſubcarinata faſciata ſubtiliſſime ſtriata, labro bidentato reflexo. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 122. *f.* 1052. *α. β.*
Habitat in horto botanico Argentoratenſi.

Turbo. 232. H. teſta pyramidali ſubimperforata luteo rufoque varia. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 122. *f.* 1059.
Habitat in Coromandel.

trifaſciata. 247. H. teſta conico-ovata alba: anfractu primo faſciis tribus fuſceſcentibus, apertura fimbriata: labro dilatato albo. *Chemn. Conch.* 9. *p.* 155. *t.* 134. *f.* 1215.
Liſt. Conch. t. 33. *f.* 31.
Habitat terreſtris in Tranquebaria.

Bontia. 248. H. teſta conica ventricoſa perforata pellucida apice nigra: anfractu primo faſciis tribus flaveſcentibus, apertura ovata. *Chemn. Conch.* 9. *p.* 156. *t.* 134. *f.* 1216. 1217.
Favann. Conch. t. 65. *f.* L?
Habitat in Bengala, *teſta fragiliſſima.*

trochoides. 249. H. teſta trochiformi perforata nitida, longitudinaliter ſtriata: anfractibus contrariis; primo carinato, apertura angulata, columella brunnea. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 369. *t.* 173. *f.* 1686. 1687.
Habitat - - -

**** Rotundatae *imperforatae.*

perverſa. 94. H. teſta ſubumbilicata ovato-oblonga contraria ſulphurea. *Muſ. Lud. Ulr.* 699. *n.* 374.*
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 90 *n.* 288. Helix teſta conica ſulphurea ſiniſtrorſa: labro albo reflexo.
Argenv. Conch. 1. *t.* 9. *f.* G. Unique.
Grew. muſ. t. 10. *f.* 9.

Petiv. gaz. t. 76. f. 5.
Liſt. Conch. t. 9. f. 4. t. 34. f. 33. et t. 35. f. 34.
Bonann. recr. 3. f. 116?
muſ. Kircher. 3. f. 116? 401.
Gualt. teſt. t. 5. f. O. P.
Seb. muſ. 3. t. 40. f. 37.
Knorr delic. t. B. II. *f. 6.*
Knorr Vergn. 1. t. 16. f. 5. 4. t. 5. f. 1. et t. 28. f. 4. 5. et 5. t. 23. f. 4. 5.
Martin. berl. Mag. 3. t. 5. f. 50.
neue Mannigf. 4. p. 406. t. 1. f. 6-9. et t. 2. f. 10-13.
Schroet. Flusconch. t. 10. min. A. *f. 2. 3.*
Einl. in Conch. 2. p. 153. t. 4. f. 4.
Chemn. Conch. 9. t. 110. f. 928. 929.
β) *Chemn. Conch. 9. t. 110. f. 930. 931. 934-935.*
γ) *Chemn. Conch. 9. t. 110. f. 932. 933.*
δ) *Chemn. Conch. 9. t. 110. f. 936. 937.*
ε) *Chemn. Conch. 9. t. 112. f. 950. 951.*
ζ) *Kaemmerer Cab. Rudolſt. p. 125. t. 10. f. 3.*
Habitat terreſtris in India; *teſta 18-24 lineas longa, nunc tota ſulphurea, nunc maculis diverſicoloris et ambitus, nunc macula viridi faſciaque rufa, nunc ſtriga obliqua ſaturate fuſca varia, aliquando candida, macula rubra aut pluribus diverſi coloris notata, anfractibus 6-8, labro craſſo.*

dextra. 95. H. teſta conica flava: labro reflexo albo. *Müll. hiſt. verm. 2. p. 89. n. 287.*
Petiv. gazoph. t. 44. f. 7.
Liſt. Conch. t. 10. f. 5?
Martin. berl. Mag. t. 5. f. 49?
Chemn. Conch. 9. t. 134. f. 1210-1212.
Habitat - - - ſpirae anfractibus non contrariis a perverſa diſtincta, an diſtincta ſpecies? teſta glabra, anfractibus 6-7, apertura ovata, nunc citrina unicolore, fauce albiſſima, nunc ſulphurea, ſtriga obliqua ſaturate fuſca, fauce pariter nivea, nunc alba varie maculoſa, fauce caeruleſcente, 18½-22 lineas longa.

recta. 96. H. teſta conica ſubacuminata albida: ſtrigis et faſcia rufis, labro reflexo. *Müll. hiſt. verm. 2. p. 93. n. 289.*
Habitat - - - inverſae ſimilis, at anfractibus non contrariis 7, ſtrigis paucioribus, teſta 2 pollices et 5 lineas longa.

inverſa. 97. H. teſta conico-acuminata contraria albida: ſtrigis et faſcia rufis, labro reflexo. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 93. *n.* 290.
Gualt. Conch. t. 5. *f.* O.
Petiv. gaz. t. 76. *f.* 5.
Geve Conch. t. 10.
Liſt. Conch. t. 36. *f.* 35?
Chemn. Conch. 9. *t.* 110. *f.* 925. 926.
Habitat ad inſulas S. Mauritii *et* Borboniam, *teſta* 2 *pollices et* 4 *lineas longa, anfractibus* 8 *oblique ſtrigoſis, apertura ovata labioque albis.*

interrupta. 98. H. teſta conico-acuminata alba: ſtrigis fulvis, labro albo reflexo. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 94. *n.* 291.
Chemn. Conch. 9. *t.* 134. *f.* 1213. 1214.
Habitat - - - dextrae ſimilis, at teſta longiore, 22 *lineas longa, anguſtiore, anfractibus* 7, *lineis transverſis* 15 *ſupra fulvis, ſubtus rufis, medio obſoletis.*

contraria. 99. H. teſta conico-acuminata contraria alba: ſtrigis undulatis fuſcis interruptis, labro reflexo. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 95. *n.* 292.
Swammerd. bibl. nat. t. 7. *f.* 11.
Chemn. Conch. 9. *t.* 111. *f.* 938. 939.
Habitat rariſſima - - - teſta nitida, 15 *lineas longa, apice ſummo nigra, apertura ovata ſtrigis pellucentibus varia.*

laeva. 100. H. teſta ſubcylindrica glabra contraria faſciata; labro ſubreflexo, columella flava. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 95. *n.* 293.
Liſt. Conch. t. 33. *f.* 31.
Gualt. teſt. t. 4. *f.* M?
Knorr Vergn. 6. *t.* 29. *f.* 3.
Favann. Conch. t. 65. l. A3.
Chemn. Conch. 9. *t.* 111. *f.* 940-949.
Habitat rariſſima - - - teſta candida 12-16 *lineas longa, faſciis* 2-6 *ex rufo fuſcis, aperturae quoque inſcriptis.*

arenaria. 228. H. teſta albida nitente ſtriis tenerrimis longitudinaliter exarata: ſpira contraria hemiſphaerica.
Spengl. nov. act. ſoc. dan. 1. *t.* 1. *f.* 6.
Chemn. Conch. 9. *t.* 113. *f.* 972. 973.
Habitat in arena littoris Ariminenſis, *minima.*

jamaicenſis. 234. H. teſta globoſo-brunnea albo faſciata, labro fimbriato candido, vertice obtuſo. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 129. *f.* 1140. 1141.

Liſt.

Liſt. Conch. t. 42. 43. *f.* 43.
Knorr Vergn. 1. *t.* 21. *f.* 3.
Favann. Conch. t. 63. *f.* M.
Habitat in Jamaica.

rhodia. 239. H. teſta ſubgloboſa depreſſa baſi concava: apertura lunata.
Chemn Conch. 9. *p.* 136. *t.* 137. *f.* 1179. 1180.
Habitat in inſula Rhodo.

labioſa. 101. H. teſta oblonga polita candida: apertura edentula, labro dilatato. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 96. *n.* 294.
Gualt. teſt. t. 4. *f.* R?
Chemn. Conch. 9. *t.* 135. *f.* 1234?
Habitat in India, *teſta diaphana* 11 *lineas longa, anfractibus* 8, *apertura ovata, labri margine ſublacero.*

pudica. 102. H. teſta oblonga ruguloſa roſea: apertura edentula, labro dilatato candido. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 97. *n.* 295.
Chemn. Conch. 9. *t.* 121. *f.* 1042.
Habitat - - - *teſta nitida,* 20 *lineas longa: fauce alba, apertura ovato-oblonga, labro adnato ex roſeo flaveſcente, anfractibus vix* 6.

janthina. 103. H. teſta ſubimperforata ſubrotunda obtuſa diaphana fragiliſſima: apertura poſterius dilatata; labro emarginato. *Muſ. Lud. Ulr.* 670. *n.* 375.*
Act. angl. 301. *p.* 2051. Cochlea colore ſpecioſior.
Brown jam. 399. *t.* 39. *f.* 1. Cochlea purpurea tenuis, ore ampliore.
Sloan. jam. t. 1. *f.* 4. *et t.* 572. *f.* 23.
Columm. aq. 23. *t.* 22.
purp. t. 13. *f.* 2.
Liſt. Conch. t. 572. *f.* 24.
Rumpf muſ. t. 20. *f.* 2.
Gualt. teſt. t. 64. *f.* O.
Argenv. Conch. t. 6. *f.* S.
Knorr Vergn. 2. *t.* 30. *f.* 2. 3.
Chemn. Conch. 5. *t.* 166. *f.* 1577. 1578.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 5. *f.* 1.
Habitat in pelago, mari atlantico, mediterraneo, *aliisque* Europae, Aſiae, Africae, Americae, *incola vivo ſanie violacea vel purpurea manum vel leviſſime contrectantem inficiente, noctu lucente, teſta violacea, ad pollicem usque lata et alta, apertura ſubtriangulari.*

gigantea. 104. H. teſta imperforata ſubrotunda ſolida: ſpira depreſſa.
Scopol. del. inſubr. p. 66. t. 25. f. A.
Habitat - - - teſta maxima, laevi, alba, intus fuſceſcente, ſpira flaveſcente, anfractibus 6 contiguis non ſtriatis; primo intus badio, labio marginato.

vivipara. 105. H. teſta imperforata ſubovata obtuſa cornea: cingulis fuſcatis, apertura ſuborbiculari. *Fn. ſuec.* 2185.*
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 182. *n.* 370. Nerita teſta ovato-ventricoſa vireſcente: faſciis tribus lividis obſcuris.
Liſt. Conch. t. 126. *f.* 26. *et tab. anat.* 6.
anim. angl. t. 2. *f.* 18.
exerc. anat. 2. *t.* 2. *f.* 5. 12.
Pet. gaz. t. 99. *f.* 16.
Swammerd. bibl. nat. p. 73-78. *t.* 9. *f.* 5-13.
Gualt. teſt. t. 5. *f.* A.
Ginann. op. poſt. 2. *p.* 49. *t.* 2. *f.* 8.
Argenv. zoomorph. t. 8. *f.* 2.
Friſch inſ. 13. *t.* 1.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 12. *et t.* 39. *f.* 33. 34.
Knorr Vergn. 5. *t.* 17. *f.* 4.
Martin. berl. Mag. 4. *p.* 234-242. *t.* 7. *f.* 4-9.
Schroet. Flusconch. t. 8. *f.* 1. 2. *et t.* 11. *min.* C. *f.* 6.
β) *Liſt. Conch. t.* 1055. *f.* 6?
Brit. zool. t. 84. *f.* 132.
da Coſta brit. Conch. t. 5. *f.* 2.
Favann. Conchyl. t. 61. *f.* D9.
Chemn. Conch. 9. *t.* 132. *f.* 1182-1183.
Habitat in Europae (*neque tamen in* Daniae) *aquis dulcibus, potiſſimum ſtagnantibus, vivipara, teſta ad* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, tenera, pellucida, glabra, ſubtiliſſime longitudinaliter ſtriata, in juniori ſetis cryſtallinis obſita utplurimum faſciata, fauce albida vel caeruleſcente, anfractibus* 5-6 *valde convexis.*

faſciata. 106. H. teſta ovato-ventricoſa alba: faſciis tribus rubris ſplendidis.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 182. *n.* 369. Nerita faſciata.
Gualt. teſt. t. 5. *f.* M.
Ginann. op. poſt. 2. *p.* 49. *t.* 1. *f.* 6.
Habitat in Thuringia *et* Italia, *teſta pellucida, glabra,* $9\frac{1}{2}$-15 *lineas longa: faſciis in primo anfractu* 3, *in altero* 2. *Spira acuta, anfractibus* 5, *fauce ex albo caeruleſcente.*

107. H.

diſſimilis. 107. H. teſta ſubovato-acuminata luteo-albeſcente: labio nigro.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 184. *n.* 371. Nerita diſſimilis.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 253. *t.* 4. *f.* 10.
Habitat Tranquebariae *inter viviparam et tentaculatam quaſi media, teſta pellucida, glabra, anfractibus* 6, *operculo pellucido, nitido, ex luteo fuſco.*

nemoralis. 108. H. teſta imperforata ſubrotunda laevi diaphana faſciata, apertura ſubrotundo-lunata. *Fn. ſuec.* 2186. *It. oel.* 127.
Müll. zool. dan. prodr. 2902. *hiſt. verm.* 2. *p.* 46. *n.* 246. Helix teſta imperforata globoſa, labro fuſco.
Liſt. Conch. t. 57. *f.* 54.
anim. angl. t. 2. *f.* 3.
exercit. anat. t. 5. *f.* 1-3.
Swammerd. bibl. nat. t. 8. *f.* 6.
Argenv. Conch. t. 28. *f.* 8.
zoomorph. t. 9. *f.* 5.
Leſſer teſtaceoth. p. 88. *n.* 1.
Geve Conch. t. 32. *f.* 391-411.
Geoffr. teſt. 3.
Schaeffer Verſ. m. Schneck. t. 2. *f.* 4-6. *t.* 4. *f.* 4. *et t.* 6. *f.* 1. 2.
Favann. Conch. t. 63. *f.* H.
Chemn. Conch. 9. *t.* 132. *f.* 1196-1198.
α) *Petiv. gazoph. t.* 92. *f.* 10.
β) *Gualt. teſt. t.* 2. *f.* A.
γ) *Gualt. teſt. t.* 1. *f.* P.
δ) *Petiv. gazoph. t.* 92. *f.* 9.
ε) *Petiv. gazoph. t.* 91. *f.* 11.
ζ) *Petiv. gazoph. t.* 91. *f.* 12.
η) *Liſt. anim. angl. p.* 117. *n.* 1. 2.
Pet. gazoph. t. 91. *f.* 9.
Geve Conch. t. 32. *f.* 399.
ϑ) *Gualt. teſt. t.* 2. *f.* D.
Liſt. anim. angl. p. 117. *n.* 3. 4.
Petiv. gazoph. t. 91. *f.* 10.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 18.
Geve Conch. t. 32. *f.* 403.
Schroet. Erdconch. t. 1. *f.* 13. *et t.* 2. *f.* 28.
ι) *Geve Conch. t.* 32. *f.* 402.
κ) *Geve Conch. t.* 32. *f.* 401. *et* 411.
Schroet. Erdconch. t. 1. *f.* 14. *et t.* 2. *f.* 29.
λ) *Geve Conch. t.* 32. *f.* 410.
Schlotterb. act. Helv. 5. *t.* 3. *f.* 6.
Martin. berl. Mag. 2. *t.* 3. *f.* 25.

μ) *Liſt. an. angl. p.* 117. *n.* 5. 6.
Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 19.
ν) *Geve Conch. t.* 32. *f.* 397.
Mart. berl. Mag. 2. *t.* 3. *f.* 26.
Schroet. Erdconch. t. 1. *f.* 15. *et t.* 2. *f.* 30.
ξ) *Geve Conch. t.* 32. *f.* 409.
ο) *Geve Conch. t.* 32. *f.* 396.
π) *Schlotterb. act. Helv.* 5. *t.* 3. *f.* 2. 3.
Martin. berl. Mag. 2. *t.* 3. *f.* 27-29.
ρ) *Liſt. an. angl. p.* 117. *n.* 9.
Geve Conch. t. 32. *f.* 408.
Schlotterb. act. Helv. 5. *t.* 3. *f.* 9.
Martin. berl. Mag. 2. *t.* 3. *f.* 30.
Schroet. Erdconch. t. 1. *f.* 16.
σ) *Liſt. anim. angl. p.* 117. *n.* 7.
Gualt. teſt. t. 2. *f.* F.
Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 12.
Schlotterb. act. Helv. 5. *t.* 3. *f.* 10.
Martin. berl. Mag. 2. *t.* 3. *f.* 31. 32.
Schroet. Erdconch. t. 1. *f.* 17.
τ) *Argenv. Conch. t.* 28. *f.* 8.
υ) *Liſt. Conch. t.* 55. *f.* 51.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 28.
φ) *Liſt. Conch. t.* 58. *f.* 55.
χ) *Liſt. Conch. t.* 71. *f.* AA?
ψ) *Liſt. Conch. t.* 574. *f.* 20.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 4.
ω) *Liſt. Conch. t.* 574. *f.* 27.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 5.
αα) *Liſt. Conch. t.* 1655. *f.* 3.
ββ) *Gualt. teſt. t.* 1. *f.* N.
γγ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 40. *f.* 35.
δδ) *Schroet. Erdconch. t.* 1. *f.* 12.
εε) *Schroet. Erdconch. t.* 2. *f.* 18.
ζζ) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *t.* 4. *f.* 12.
ηη) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 109. *f.* 924.

Habitat vulgatiſſima in Europae *arboribus, varietate, ſive incolae ſive teſtae colorem et picturam ſpectes, innumera, incola hinc inde eduli albo, cinereo, nigro vel luteo, teſta diametri* 9-11 *linearum, rufa vel lutea, rarius badia, incarnata, vel albida, rariſſime unicolore, crebrius faſcia vel faſciis* 2, 3, 4, 5 *magis minusve latis, aequalibus aut inaequalibus, pallidis, fuſcis, luteſcentibus, incarnatis, ſanguineis, rarius albis, anfractibus* 5.

hortenſis. 109. H. teſta imperforata globoſa: labro albo. *Müll. zool. dan. prodr.* 2903. *hiſt. verm.* 2. *p.* 52. *n.* 247.
Chemn. Conch. 9. *t.* 133. *f.* 1199-1201.
Geve. Conch. t. 30. *f.* 357-367. *et t.* 31. *f.* 368-390.
α) *Muſ. Lud. Ulr.* 670. *n.* 376.* Helix major magis griſea, labris albis.
It. wgoth. p. 84. Cochlea teſta pellucida.
Geve Conch. t. 31. *f.* 381. 382.
β) *Liſt. anim. angl. p.* 117. *n.* 1.
Geve Conch. t. 31. *f.* 368. 370.
Schroet. Erdconch. t. 2. *f.* 27.
γ) *Geve Conch. t.* 30. *f.* 367. *et t.* 31. *f.* 380.
δ) *Geve Conch. t.* 31. *f.* 388.
ε) *Geve Conch. t.* 33. *f.* 366.
ζ) *Geve Conch. t.* 31. *f.* 387.
η) *Geve Conch. t.* 31. *f.* 374.
ϑ) *Gualt. teſt. t.* 1. *f.* M?
Habitat in Europae *hortis, nemorali tamen rarior, an vere diſtincta ab hac ſpecies? teſta minore diametri* $7\frac{1}{2}$-8 *linearum diſcrepat, teſta nunc tota albida, nunc tota flava, nunc lutea, vel maculis linearibus obſcuris, vel maculis punctisque nigris, vel faſcia faſciisve* 2, 3, 4, 5 *fuſcis, utplurimum inaequalibus picta.*

lucorum. 110. H. teſta imperforata ſubrotunda laevi faſciata: apertura oblonga fuſca.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 46. *n.* 245? Helix teſta imperforata rotundata alba, faſciis ſtrigisque rufis, labro fuſco.
Liſt. Conch. t. 1058. *f.* 1.
Gualt. teſt. t. 1. *f.* C.
Habitat in Europa, *potiſſimum auſtrali, nemorali affinis, at teſta majore alba.*

griſea. 111. H. teſta imperforata ſubovata obtuſa griſea: faſciis duabus pallidis, apertura oblongiuſcula.
Gualt. teſt. t. 1. *f.* B?
Schroet. Einl. in Conch. 2. *t.* 4. *f.* 7.
Knorr Vergn. 4. *t.* 27. *f.* 3.
Chemn. Conch. 9. *t.* 130. *f.* 1156-1158.
Habitat terreſtris in Europa, *praeſertim auſtrali, teſta in* Succia *triplo minori, pomatiae affinis.*

Haemaſtoma. 112. H. teſta imperforata ſubrotunda fuſca: faſcia longitudinali alba, apertura purpurea. *Muſ. Lud. Ulr.* 671. *n.* 377.*

 Müll.

Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 78. *n.* 274. Helix teſta imperforata trochiformi caſtanea: faſcia alba, apertura ovali, labro reflexo ſanguineo.
Bonann. muſ. Kirch. 3. *f.* 364.
Seb. muſ. 3. *t.* 40. *f.* 6. 7.
Geve Conch. t. 28. *f.* 328. 329.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 160. *t.* 4. *f.* 5. 6.
Chemn. Conch. 9. *t.* 130. *f.* 1050-1054.
Habitat terreſtris in inſula Zeylon, *teſta ad* 1½ *pollicem lata, et perinde fere alta, intus alba, obtuſa, anfractibus* 5 *teretibus, primo reliquis duplo majore, extimis rubellis.*

pulla. 113. H. teſta imperforata ſubovata fuſca faſciata: apertura obliqua marginata albicante.
Liſt. Conch. t. 42. 43.
Knorr Vergn. 1. *t.* 21. *f.* 3.
Habitat - - - pomatiae affinis, at teſta majore 2 *pollices lata,* 1½ *alta obtuſa, anfractibus* 4.

venuſta. 114. H. teſta imperforata ſubovata ſulphurea: faſcia alba rubro-marginata; labro reflexo marginato.
Kaemmer. Conch. Rudolſt. p. 176. *t.* 11. *f.* 4. 5.
Habitat - - - pullae affinis, teſta 10 *lineas lata,* 8½ *alta, tenui, levi, intus albida, anfractibus* 4.

picta. 189. H. teſta imperforata ſubgloboſa glabra: anfractibus quatuor teretibus; primo ventricoſo, reliquis depreſſis, apertura lunari.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 15. *f.* 17. 18. *ind.* 1. *p.* 397.
Chemn. Conch. 9. *t.* 130. *f.* 1162-1165.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 5.
Knorr Vergn. 1. *t.* 10. *f.* 2.
Habitat in Italia, *teſta nunc dilute cinerea, columella lineaque transverſa ad ſuturam fuſcis, nunc roſea, columella lineaque ad ſuturam transverſa fuſcis, nunc ſulphurea; columella fuſca, lineisque ad anfractuum marginem rubris.*

variegata. 190. H. teſta imperforata ſubovata ſub epidermide fuſceſcente faſciata apertura intus alba.
Knorr Vergn. 4. *t.* 27. *f.* 3.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 230. *t.* 4. *f.* 7.
Habitat in Italia, *in horto medico* Argentinenſi *quoque reperta, teſta nunc fuſca albo radiata faſciisque flavicantibus albo maculatis picta, nunc ex rufeſcente exalbida faſciis*

ciis 4 fuſcis albo undulatis, aliisque 2 ad anfractum ſecundum anguſtioribus albo maculatis.

ſolida. 191. H. teſta imperforata ſolida ovata laevi: anfractibus ſex teretibus contiguis, columella incraſſata.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. t. 13. *f.* 18. 19. *ind.* 1. *p.* 408.
Habitat - - - teſta 3 lineas ultra pollicem longa roſea lineis interruptis tenuiſſimis rubris albisque picta.

aperta. 192. H. teſta imperforata ſubgloboſa longitudinaliter ſubtiliſſime ſtriata; anfractibus tribus; primo ventricoſo, apertura lunari, columella ſpirali.
Chemn. Conch. 9. *t.* 133. *f.* 1204. 1205.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 15. *f.* 19. 20. *ind.* 1. *p.* 399.
Habitat - - - teſta fuſca.

verſicolor. 193. H. teſta imperforata ſubrotunda transverſim ſtriata: anfractibus teretibus; primo ventricoſo, apertura ovata.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 16. *f.* 9. 10. *ind.* 1. *p.* 398. 399.
Habitat - - - teſta pomatiae magnitudine, nivea, lineis transverſis parallelis fuſcis faſciisque intermediis croceis roſeisque, columella roſea.

afra. 194. H. teſta imperforata ovata: anfractibus ſex planiuſculis contiguis, apertura inaequali quinquedentata.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 1. Pietin.
Habitat in Senegal, *teſta 3 lineas longa, dilute fulva, aut exalbida, ſpirae anfractu primo reliquis multo majore.*

Nucleus. 255. H. teſta imperforata ovata glauca transverſim ſtriata: cingulis atris, apertura ſinuoſa. *Martyn univ. Conch.* 2. *t.* 67. *fig. exter.*
Habitat in Tahiti.

coccinea. 256. H. teſta ovata imperforata laevi rubra: apertura lutea.
Martyn univ. Conch. 2. *t.* 68. *f. ext.*
Habitat in nova Seelandia.

***** Turritae.

decollata. 115. H. teſta imperforata turrita: ſpira mutilato-truncata, apertura obovata. *Muſ. Lud. Ulr.* 671. *n.* 378.*
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 114. *n.* 314. Helix teſta turrita alba, vertice truncato, apertura edentula.
Liſt. Conch. t. 17. *f.* 12. *et t.* 18. *f.* 13.

 Petiv.

Petiv. gazoph. t. 66. f. 1.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. f. 56.
Gualt. teſt. t. 4. f. O. P. Q.
Ginann. op. poſt. 2. p. 59. t. 3. n. 22.
Knorr Vergn. 6. t. 32. f. 3.
Martin. berl. Samml. 7. t. 1. f. 6. 7.
Murray teſtaceol. t. 1. f. 3.
Argenv. Conch. t. 27. f. 5.
Favann. Conch. t. 65. f. B⁸.
Chemn. Conch. 9. t. 136. f. 1254. 1255.
β) *v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 16. f. 13?* Helix calcarea.
Chemn. Conch. 9. t. 135. f. 1226.
Liſt. Conch. t. 14. f. 9.
Gualt. teſt. t. 6. f. I.
Schroet. Flusconch. t. 10. min. A. *f. 1.*
γ) *Favann. Conch. t. 65. f.* B¹⁰.
Chemn. Conch. 9. t. 136. f. 1256. 1257.
δ) *Chemn. Conch. 9. t. 136. f. 1258.*
Habitat in Europa, Africa, Aſia*que auſtrali, teſta exalbida, oblonga, nitente, ſubſtriata, 6-15½ lineas longa, anfractibus 4-6, in juniori 5-7 teretibus, primo altero fere duplo majore.*

ſcalaris. 116. H. teſta conico turrita imperforata: anfractibus remotis, apertura ovata. *Müll. hiſt. verm. 2. p. 113. n. 313.*
Chemn. Conch. 9. t. 128. f. 1130. n. 1-3.
Habitat - - - pomatiae parumper affinis, at teſta oblique ſtriata, pallide rufeſcente: faſciis 2 albidis, ſpira obtuſa: anfractibus 5 ventricoſis.

circinata. 117. H. teſta hyalina transverſim coſtata perforata ſubturrita: anfractibus diſtantibus, apertura circulari.
Kaemmer. Conch. Rudolſt. p. 182. t. 8. f. 4. 5.
Habitat - - - ſtructura ad turbinem ſcalarem quodammodo accedens, teſta 6 lineas alta, 7½ lata, labiis acutis; an hujus tribus?

ſubcylindrica. 118. H. teſta imperforata turrita ſubcylindrica obtuſa: anfractibus quatuor, apertura ovali.
Chemn. Conch. 9. t. 135. f. 1235.
Habitat in Europae *borealis aquis dulcibus, teſta cornea, pallida, magnitudine grani ſecalini, apice obtuſiſſima, rotundata, aperturae margine interiori reflexo.*

ſtagnorum. 119. H. teſta ſubperforata ſubturrita: anfractibus quinque, apertura ovata.

Baſt. op. ſubſ. p. 77. *t.* 7. *f.* 4. Turbo ſtagnalis.

Habitat in aquis dulcibus, *teſta cornea, pallida, ovato-oblonga, acutiuſcula; magnitudine vix grani ſecalini, umbilico minimo, apertura marginata.*

octona. 120. H. teſta ſubperforata turrita: anfractibus octo, apertura ſubrotunda.

Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 150. *n.* 340. Buccinum (Acicula) teſta turrita glabra alba, axi inflexo acuto.

Gualt. teſt. t. 6. *f.* BB.

Geoffr teſt. 21.

Schroet. Fluſconch. t. 8. *f.* 6. a. b.

Schroet. Erdconch. p. 142.

β) *Chemn. Conch. t.* 136. *f.* 1264.

Habitat rara in Sueciae, Thuringiae, Galliae, Americae auſtralis *ſubpaludoſis et arena riparia, teſta glabra, fragiliſſima cornea vix* 4 *lineas longa, anfractibus interdum* 6, *planis, linea tenerrima disjunctis: primo altero duplo majore, umbilico inconſpicuo.*

tenera. 121. H. teſta turrita convexa ſtriata alba: ſtrigis raris fulvis, columella ſinuata inflexa.

Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 149. *n.* 339. Buccinum ſtriatum.

Chemn. Conch. 9. *t.* 120. *f.* 1028-1030.

Habitat - - - teſta tenera pellucida, 3-7 *lineas ultra* 2 *pollices longa, longitudinaliter ſtrigoſis, anfractibus* 7-8 *margine incumbentibus, apertura ovato-oblonga.*

Columna. 122. H. teſta turrita alba apice fulva: anfractibus maculatis contrariis, apertura oblonga.

Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 151. *n.* 341. Buccinum Columna.

Liſt. Conch. t. 38. *f.* 37. *et t.* 39.

Bonann. muſ. Kirch. 3. *f.* 400.

Favann. Conch t. 61. *f.* H². H¹³.

Chemn. Conch. 9. *t.* 112. *f.* 954. 955.

Habitat - - - teſta pellucida aluminis colore et nitore conſpicua, 27½ *lineas longa maculis fulvis quaſi radiata, anfractibus* 7-8 *ſingulariter tortis, utrinque gibbis, longitudinaliter et ſpiraliter ſtriatis,* 4to, 5 *et* 6to *fulvis: margine ſupremo albo, apertura maculis pellucentibus varia non labiata: interiori margine fulvo.*

pella. 193. H. teſta imperforata ovata acuminata transverſe ſtriata fuſca: faſciis flavis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2916.
Habitat in Islandia, *teſta ex fuſco ferruginea, decumbente, ovato-oblonga, magnitudine ſeminis lithoſpermi, faſcia in primo anfractu duplici, in reliquis ſimplici, apertura ſemiovata.* Zoega.

plicaria. 195. H. teſta ſubulata ſemipellucida longitudinaliter plicata: anfractibus teretibus, apertura ovata. *v. Born Caeſ. Vindob. teſt. t.* 16. *f.* 14.
Habitat - - - anfractibus 10.

undulata. 196. H. teſta ſubulata laevi ſubtiliſſime transverſim ſtriata: anfractibus teretibus, apertura ovata.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. t. 16. *f.* 15. Helix maculata.
Habitat - - - teſta pallida, longitudinaliter ſpadiceo undulata: anfractibus circiter 12, *columella glabra.*

fuſcata. 197. H. teſta ſubulata laevi ſubtiliſſime transverſim ſtriata: anfractibus planiuſculis, apertura ovata. *v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 16. *f.* 17.
Chemn. Conch. 9. *t.* 135. *f.* 1229.
Habitat - - - teſta exterius ex flavicante fuſca, fauce cinerea, anfractibus circiter 10, *columella laevi.*

Priapus. 198. H. teſta imperforata turrita glabra: columella inflexa, anfractibus depreſſiuſculis. *Gronov. zooph.* 3. *t.* 19. *f.* 10. 11.
Habitat rariſſima - - - teſta tenui, pellucida, badia: faſciis 4 *punctatis, anfractu primo reliquis triplo majore, apertura ovata.*

Folliculus. 199. H. teſta turrita pellucida, glabra: columella ſubplicata, labro tenui. *Gronov. zooph.* 3. *t.* 19. *f.* 15. 16.
Habitat ad Barbariae *littora, teſta grani avenae magnitudine, unicolore, alba, anfractibus teretibus, omnibus aequalibus* 5-6, *apertura ovata.*

ſepium. 200. H. teſta turrita lactea longitudinaliter ſtriata, anfractibus ſeptem contiguis, apertura ovata.
Martin. berl. Mag. 3. *t.* 5. *f.* 53.
Schroet. Erdconch. t. 1. *f.* 1.
Habitat in Thuringiae *ſepibus montanis, teſta vix ultra* ½ *pollicem longa, lineis griſeis longitudinalibus interdum picta.*

201. H.

ſplendidula. 201. H. teſta tenella nitida pellucida dilute fuſca: apertura oblonga.
Habitat in Gallia *et* Thuringia, *teſta vix* ¼ *pollicis longa, anfractibus* 6.

Mitra. 202. H. teſta turrita: anfractibus coſtatis diſtantibus; primo tereti, reliquis planiuſculis, apertura ovali.
Schroet. Flusconch. t. 9. *f.* 12.
Habitat - - - *teſta exalbida, tenui, ultra pollicem longa, anfractibus* 8-9.

atra. 210. H. teſta turrita atra minutiſſime ſtriata: anfractibus convexiuſculis, apertura oblongo-ovali.
Gualt. teſt. t. 6. *f.* GG.
Schroet. Flusconch. t. 10. *min.* A. *f.* 5.
Habitat - - - *teſta* 2 *pollices longa, anfractibus* 7.

cuſpidata. 240. H. teſta turrita cornea transverſim ſubtiliſſime ſtriata longitudinaliter plicata: apertura ovali, labro acuto. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 135. *f.* 1228.
Liſt. Conch. t. 118. *f.* 13.
Gualt. teſt. t. 6. *f.* H.
Habitat in Indiae *fluviis.*

crenata. 241. H. teſta turrita alba transverſim ſubſtriata, penes ſuturam cingulo crenulato cincta. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 135. *f.* 1230.
Habitat in Indiae *fluviis.*

Carinula. 242. H. teſta turrita ſubumbilicata alba: anfractu primo ſubcarinato; faſcia nigricante. *Chemn. Conch.* 9. *p.* 190. *t.* 136. *f.* 1262. *n.* 1-4.
Habitat - - -

crocea. 243. H. teſta cylindrica glabra ex aurantio flaveſcente apice obtuſa. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 135. *f.* 1233.
Habitat rarior - - -

lanſchaurica. 244. H. teſta ſubturrita glaberrima brunnea obſcurius maculata: fauce albicante. *Chemn. Conch.* 9. *p.* 174. *t.* 135. *f.* 1243. a. b.
Habitat in Coromandel *aquis dulcibus.*

obtuſata. 250. H. teſta alba denſe ſtriata ſubcylindrica: anfractibus convexiuſculis, labro marginato. *Kaemm. Cab. Rudolſt. p.* 151. *n.* 9. *t.* 11. *f.* 3.
Habitat - - - *teſta* 3 *fere pollices longa.*

257. H.

purpurea. 257. H. teſta ovato-oblonga purpuraſcente purpureo teſſellata intus irideſcente. *Martyn univ. Conchol.* 2. *t.* 68. *f. med.*
Habitat in nova Seelandia.

****** Ovatae *imperforatae.*

Pupa. 124. H. teſta ſubimperforata ovato-oblonga rudi: anfractibus ſenis, apertura lunato-oblonga.
Habitat in Mauritania. E. Brander.

barbara. 125. H. teſta imperforata oblonga rudi: anfractibus octonis, apertura ſubrotundo-lunata.
Habitat Algiriae; *teſta ad pupam accedens, dimidio tamen minori, vel hordei ſemine paulo majori: apertura infima ſubtus ſaepe faſcia griſea cincta.* Brander.

Amarula. 126. H. teſta imperforata oblonga: anfractibus ſpinoſo-dentatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 672. *n.* 379.*
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 137. *n.* 330. Buccinum teſta ſubovata nigra: anfractibus ſurſum muricatis.
Rumpf muſ. t. 33. *f.* FF. Voluta fluviatilis.
Liſt. Conch. t. 133. *f.* 33. *et t.* 1055. *f.* 8.
Gualt. teſt. t. 6. *f.* B.
Argenv. Conch. t. 27. *n.* 6. *f.* f.
Petiv. gaz. t. 4. *f.* 3.
Klein oſtr. p. 36. *n.* 13.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* 24. 25.
Martin. berl. Mag. 4 *t.* 9. *f.* 38. *et t.* 11. *f.* 64. C.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 16. *f.* 21.
Schroet. Flusconch. t. 9. *f.* 8 11.
inn. Bau Conch. t. 1. *f.* 4.
Chemn. Conch. 9. *t.* 134. *f.* 1218. 1219.
β) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 134. *f.* 1220. 1221.
Habitat in Indiae *fluviis, teſta nigra immaculata ſtriis ſpiralibus ſubconvexis exarata,* 9-19 *lineas longa, anfractibus* 5-6, *ſingulis in ſuperiori parte ſpinis* 10 *acutis armatis, apertura ampla biante alba, labio exteriori acuto, interiori craſſo.*

naevia. 251. H. teſta transverſim ſulcata alba nigricante ſtriata: ſpira acuminata; anfractibus planiuſculis, primo majore tereti.
Kaemm. Cab. Rudolſt. p. 146. *n.* 10. *t.* 8. *f.* 3.
Habitat in Oceano auſtrali, *teſta parum ultra pollicem longa.*

aſpera. 127. H. teſta acuminata cinerea transverſim ſtriata: anfractibus muricato dentatis ſtrigisque ſanguineis.

Müll.

Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 136. *n.* 329. Buccinum ſcabrum.
Chemn. Conch. 9. *t.* 136. *f.* 1259. 1260.
Habitat in paludoſis littoris Coromandel, *teſta ovata pellucida* $5\frac{1}{2}$ - $8\frac{1}{2}$ *lineas longa, interdum ſqualida ex cinereo fuſca: ſtriis convexis ſpiralibus, ſtrigis undulatis longitudinalibus per anfractus tuberculatis, anfractibus* 7 - 8, *ſingulis* 12 *ſpinis armatis, apertura ovata, labio exteriori acuto, interiori fuſco nitido, fauce pallida ſtrigis ſanguineis punctatis pellucentibus picta.*

ſtagnalis. 128. H. teſta imperforata ovato - ſubulata ſubangulata: apertura ovata. *Fn. ſuec.* 2188.*
Müll. zool. dan. prodr. 2935. *hiſt. verm.* 2. *p.* 132. *n.* 327. Buccinum teſta oblonga ſubulata ventricoſa, apertura ovato - repanda.
Liſt. Conch. t. 123. *f.* 21.
anim. angl. t. 2. *f.* 21.
exerc. anat. t. 2. *f.* 3. 4.
Petiv. muſ. 82. *n.* 85.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 55.
Gualt. teſt. t. 5. *f.* I. L.
Ginann. op. poſt. 2. *t.* 1. *f.* A. B. C.
Argenv. Conch. t. 27. *n.* 6. *f.* 1. 2.
zoomorph. t. 8. *f.* 5. b.
Klein oſtr. t. 3. *f.* 69.
Geoffr. teſt. 1.
Schlotterb. act. helv. 5. *t.* 3. *f.* 25. 26.
Leſſer teſtaceoth. p. 88. *n.* 11.
Friſch. inſ. 8. *t.* 7.
Seba muſ. 3. *t.* 39. *f.* 52. 53.
Swammerd. bibl. nat. p. 9. *f.* 4.
Hanov. Seltenh. 1. *t.* 1. *f.* 5.
Martin. berl. Mag. 4. *t.* 9. *f.* 33. a. b.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 16. *f.* 16.
Schroet. Flußconch. t. 7. *f.* 1 - 4. *et t.* 11. *min.* C. *f.* 1.
Brit. zool. 4. *t.* 86. *f.* 136.
da Coſta Brit. Conch. t. 5. *f.* 11.
Favann. Conch. t. 61. *f.* 16.
Chemn. Conch. 9. *t.* 135. *f.* 1237 - 1240.
β) *Bonann. muſ. Kirch.* 3. *f.* 392?
Habitat in Europae *ſtagnis, teſta ad* $2\frac{1}{2}$ *pollices longa, tenui, fragili, exalbida, flavicante aut cinerea, rarius cornea, alba aut nigra, nunc glaberrima, nunc tenuiter ſecundum longitudinem aut transverſim ſtriata, anfractibus* 6 - 7,

6-7, primo turgido reliquis ſimul ſumtis aequali; apertura ampla, labro repando non marginato.

fragilis. 129. H. teſta imperforata ovato-ſubulata tereti pellucida: apertura ovato-oblonga. *Fn. ſuec.* 2187.*
Liſt. Conch. t. 8. *f.* 3?
Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 41-46.
Martin. berl. Mag. 4. *t.* 9. *f.* 35.
Schroet. Flusconch t. 7. *f.* 8.
β) *Argenv. Conch. t.* 27. *n.* 6. *f.* 4.
Habitat in Europae *aquis ſtagnantibus, ſtagnali ſimilis, utrum vere diſtincta, an aetate modo minore diverſa? teſta tamen duplo minore,* 11 *lineis utplurimum breviore, nunc alba, nunc aurea et interdum albo-faſciata, ſpira acuta, anfractibus 5-7 lineola diſcretis, primo ſubventricoſo, labio non marginato.*

glabra. 130. H. teſta cylindrica acuminata cornea: apertura ovata.
Müll. zool. dan. prodr. 2936. *hiſt. verm.* 2. *p.* 135. *n.* 328.
Buccinum glabrum.
Schroet. Flusconch. t. 7. *f.* 15.
Habitat rara in Daniae *pratis humidis, ubi aquae ſtagnant, lubricae affinis, at teſta longiore,* $4\frac{1}{2}$ *lineas longa pellucida, anfractibus fere* 8 *teretibus, ſat parum decreſcentibus, primo cingulo reniformi nigro transparente ornato: Incola niger, tentaculis albidis,*

paluſtris. 131. H. teſta oblonga acuminata fuſca: apertura ovata.
Müll. zool. dan. prodr. 2934. *hiſt. verm.* 2. *p.* 131. *n.* 326.
Buccinum paluſtre.
Liſt. an. angl. t. 2. *f.* 22.
Gualt. teſt. t. 5. *f.* E.
Geoffr. teſt. 2.
Ginann. op. poſt. 2. *t.* 1. *f.* 2.
Martin. berl. Magaz. 4. *t.* 9. *f.* 37.
Schroet. Flusconch. t. 7. *f.* 9. 10.
β) *Schroet. Flusconch. t.* 7. *f.* 7.
γ) *Schroet. Flusconch. t.* 7. *f.* 11.
Habitat frequens in Europae *paludoſis, ſtagnali affinis, at incola cinereo albido-punctato, teſta minus fragili, nec apice ſubulata, nec baſi ventricoſa, ſtriis ſubtiliſſimis confertis transverſis et ſpiralibus exarata, a prima aetate obſcure fuſca, 2-9 lineas longa, faſcia ad aperturam ſaturate ſanguinea, interdum duplici, labio reflexo albo, anfractibus 5-6.*

truncatula. 132. H. teſta ovato-oblonga; anfractibus detruncatis, apertura ovata.

Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 130. *n.* 325. Buccinum truncatulum.

Schroet. Flusconch. t. 7. *f.* 13.

Habitat in Thuringia, *teſta* 1½-5 *lineas longa, atra, ſubpellucida, anfractibus* 5 *ſurſum truncatis, labio incumbente ſqualido.*

peregra. 133. H. teſta cornea ſubconica: mucrone acuto, apertura ovata.

Müll. zool. dan. prodr. 2933. *hiſt. verm.* 2. *p.* 130. *n.* 324. Buccinum peregrum.

Gualt. teſt. t. 5. *f.* e. e.

Chemn. Conch. 9. *t.* 135. *f.* 1244. *n.* 1. 2.

Habitat in Thuringiae, Daniae *aquis ſtagnantibus, tempore brumali in tiliarum truncis et ramis, inter Auriculam et paluſtrem media, teſtae forma non ventricoſa, anfractibus ſubabruptis et magis elongatis, ab illa, teſtae forma ſubconica ab hac discernenda, teſta* 2-8 *lineas longa, nunc albida pellucida, nunc atra opaca.*

glutinoſa. 134. H. teſta ventricoſa diaphana: mucrone obtuſo, apertura ampla.

Müll. zool. dan. prodr. 2932. *hiſt. verm.* 2. *p.* 129. *n.* 323. Buccinum glutinoſum.

Habitat rarior in Dania, *nymphaeae praeſertim luteae foliis inſidens, limace incola albo cinereo-punctato, pallio gelatinoſo totam teſtam obvolvente, teſta tenerrima fragiliſſima flava,* 1½ 4 *lineas longa, anfractibus* 2-3, *apertura repanda, rotundata.*

putris. 135. H. teſta imperforata ovata obtuſa flava: apertura ovata.

Fn. ſuec. 2189.*

Müll. zool. dan. prodr. 2912. *hiſt. verm.* 2. *p.* 97. *n.* 296. Helix (ſuccinea) teſta oblonga fulva diaphana, anfractibus tribus, apertura ovata.

Tulp. obſ. 210. *t.* 201.

Liſt. Conch. t. 123. *f.* 23.

anim angl. t. 2. *f.* 24.

Gualt. teſt. t. 5. *f.* H.

Ginann. op. poſt. 2. *t.* 1. *f.* 3. 4.

Swammerd. bibl. nat. t. 8. *f.* 4.

Klein oſtr. t 3. *f.* 70.

Argenv. Conch. t. 27. *f. ult. n.* 6. *et t.* 28. *f.* 3.

Geoffr. teſt. 22.

Schlotterb. act. helv. 5. *t.* 3. *f.* 22.
Martin. berl. Mag. 3. *t.* 5. *f.* 66. b. *et* 4. *t.* 11. *f.* 60.
Schroet. Erdconch. t. 1. *f.* 2. 3.
Chemn. Conch. 9. *t.* 135. *f.* 1248.
Habitat frequens in Europae plantis ripariis, *rarius aliis, incola nigerrimo, torpido prominente, Auguſti menſe medio coeunte; tentaculis* 4 *inſtructo, teſta pellucidiſſima* 1-8 *lineas longa, tenerrima, leviſſima, membranacea, fragiliſſima, ſtriis intus et extrinſecus confertis exarata, anfractibus* 3 *quaſi contortis, apertura non labiata.*

acuta. 136. H. teſta conico-acuminata alba: faſcia rubra, apertura edentula.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 100. *n.* 297.
Liſt. Conch. t. 19. *f.* 14.
Gualt. teſt. t. 4. *f.* N.
Chemn. Conch. 9. *t.* 134. *f.* 1224. *n.* 1. 2.
Habitat in Italia, *teſta* 4 *lineas longa, faſciis raro* 2 *in majori anfractu picta, anfractibus* 7, *apertura ovata.*

Papilla. 137. H. teſta conica perforata: ſtriis rugoſis, apertura transverſali; labro reflexo. *Müll. hiſt. verm* 2. *p.* 100. *n.* 298.
Chemn. Conch. 9. *t.* 122. *f.* 1053. 1054.
Habitat - - - teſta diametri 10½ *linearum, rugis albis et ex rufo fuſcis varia, anfractibus convexis fere* 6, *apertura ovata, labro albo craſſo.*

minuta. 138. H. teſta ſubcylindrica: apertura ovali edentula. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 101. *n.* 299.
Habitat in Thuringia, *turbini muſcorum parumper affinis, at teſta breviore, vix ultra* ⅔ *lineas longa, triplo anguſtiore et acuminata diſtincta, anfractibus* 5.

detrita. 139. H. teſta conica alba: lineis transverſis rufis, apertura ovata. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 101. *n.* 300.
Gualt. teſt. t. 5. *f.* N.
Leſſer teſtaceoth. p. 224.
Martin. berl. Mag. 3. *t.* 5. *f.* 53?
Schroet. Erdconch. t. 1. *f.* 1?
Flusconch. t. 19. *min.* A. *f.* 4.
Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 37.
Chemn. Conch. 9. *t.* 134. *f.* 1225. a-d.
Habitat in Italia *et* Saxonia, *teſta polita, obſolete ſtrigoſa,* 8½ *lineas longa, anfractibus* 6, *labro ad columellam aliquantum reflexo.*

ventricoſa. 140. H. teſta conica pallida ſtriata: apertura edentula. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 102. *n.* 301.

Habitat rara in Thuringia, *teſta* 2 *lineas longa, helici trocho affini, at ventricoſiore, anfractibus* 7, *extimis* 4 *latitudine quam minime diverſis.*

obſcura. 141. H. teſta conica fuſca: apertura edentula; labro albo. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 103. *n.* 302. *zool. dan. prod.* 2913.

Liſt. an. angl. t. 2. *f.* 8.

Argenv. Conch. t. 28. *f.* 15.

Geoffr. teſt. 15.

Habitat in Europa, *in fagi truncis, incola albo, ſupra obſcuro: oculis ſolis nigris, teſta acuminata, oculo armato tenuiſſime ſtriata, anfractibus* 6, *apertura ovali: margine acuto, labro candido nitido.*

lubrica. 142. H. teſta conica fulva nitida pellucida acuta: apertura edentula; labro rubente. *Müll. zool. dan. prodr.* 2914. *hiſt. verm.* 2. *p.* 104. *n.* 303.

Liſt. an. angl. t. 2. *f.* 7.

Geoffr teſt. 17.

Martin. berl. Mag. 3. *t.* 5. *f.* 59. a. b.

Schroet. Erdconch. t. 1. *f.* 9.

Habitat in Europae *muſcis ac trabibus paliſque putreſcentibus, humidis, incola nigro, ſubtus albo, aquam ſe‸ente, teſta glaberrima, nitidiſſima, rarius candida,* 2½ *lineas longa, anfractibus* 5-6, *apertura ovata.*

limoſa. 143. H. teſta imperforata oblongiuſcula pellucida acuta: apertura ovata. *Fn. ſuec.* 2190.

Brit. zool. t. 86 *f.* 137.

Chemn. Conch. 9. *t.* 135. *f.* 1246. 1247.

Habitat in Europae *paludibus.*

contorta-plicata. 144. H. teſta turbinata cinerea ſubimperforata: vertice truncato. *Müll. zool. dan. prodr.* 2951. *hiſt. verm.* 2. *p.* 187. *n.* 374. Nerita contorta.

Argenv. Conch. t. 8. *f.* 5.

Habitat rariſſima in Galliae? Daniae *foſſis limoſis, teſta pyramidali, ſqualida, opaca,* 2½ *lineas longa, anfractibus vix* 5, *apertura circinata.*

angularis. 145. H teſta imperforata vireſcente: anfractibus ſpiraliter angulatis, fauce alba.

Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 187. *n.* 373. Nerita angularis.

Liſt. Conch. t. 127. *f.* 27.
Gronov. zoophyl. 3. *p.* 331. *n.* 1547?
Chemn. Conch. 9. *t.* 134. *f.* 1222. 1223.
Habitat in flumine Sinenſi, *emporium* Canton *alluente, teſta conica; ſubtiliſſime transverſim ſtriata,* 12 *lineas longa, anfractibus* 5 *fere perpendicularibus, apertura rotundata.*

tentaculata. 146. H. teſta imperforata ovata obtuſa impura: apertura ſubovata. *Fn. ſuec.* 2191.*
Müll. zool. dan. prodr. 2950. *hiſt. verm.* 2. *p.* 185. *n.* 372. Nerita (jaculator) teſta oblonga cornea, vertice acuto.
Liſt. Conch. t. 132. *f.* 32.
anim. angl. t. 2. *f.* 19.
Gualt. teſt. t. 5. *f.* B.
Geoffr. teſt. 3.
Schlotterb. act. helv. 5. *t.* 3. *f.* 19. 20.
Martin. berl. Mag. 4. *t.* 7. *f.* 12-14.
Schroet. Flusconch. t. 7. *f.* 19-22. b.
Brit. zool. 4. *t.* 86. *f.* 140.
da Coſta brit. Conchol. t. 5. *f.* 12.
Chemn. Conch. 9. *t.* 135. *f.* 1245.
Habitat vulgaris in Europae *aquis ſtagnantibus et rivis, incola nigro aureo-punctato, globulos ejaculante, teſta* $\frac{1}{6}$-$4\frac{1}{4}$ *lineas longa, cornea, diaphana acuta glabra, ſaepius limo obducta fuſca aut brunnea; anfractibus* 4, 5, *rarius* 6, *teretibus convexis, operculo ovato, corneo, pellucido, albo.*

Auricularia. 147. H. teſta imperforata ovata obtuſa, ſpira acuta breviſſima, apertura ampliata. *Fn. ſuec.* 2192.
Müll. zool. dan. prodr. 2931. *hiſt. verm.* 2. *p.* 126. *n.* 322. Buccinum (Auricula) teſta ampullacea cornea, mucrone acuto brevi, apertura ampliſſima.
Liſt. Conch. t. 123. *f.* 22.
anim. angl. t. 2. *f.* 23.
exerc. anat. t. 2. *f.* 3. 4.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 54.
Ginann. op. poſt. 2. *t.* 1. *f.* 3.
Gualt. teſt. t. 5. *f.* F. G.
Argenv. Conch. t. 27. *f.* 7. *et t.* 28. *f.* 22.
zoomorph. t. 8. *f.* 6.
Geoffr. teſt. 3.
Schlotterb. act. Helvet. 5. *t.* 3. *f.* 27. 28.

Hofmann act. Mogunt. 2. *p.* 1-15.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 4.
Martin. berl. Mag. 3. *t.* 5. *f.* 66. *f.* aa. *et* 4. *t.* 11. *f.* 59. A. B. *coll.*
v. Born. muſ. Caeſ. vindob. teſt. t. 16. *f.* 20.
Schroet. Fluſconch. t. 6. *f.* 3-6. *et t.* 11. *min.* C. *f.* 2.
Brit. zool. 4. *t.* 86. *f.* 138.
da Coſta brit. Conch. t. 5. *f.* 17.
Chemn. Conch. 9. *t.* 135. *f.* 1241. 1242.
β) *Schroet. Fluſconch. t.* 6. *f.* 7. *et t.* 11. *min.* c. *f.* 3.
γ) *Schroet. Fluſconch. t.* 7. *f.* 12?
Habitat vulgaris in Europae *aquis ſtagnantibus et rivis, teſta tenui, fragili, pellucida a 2 ad 15 lineas longa, alba, interdum nitente, exalbida, cornea, cerea, cinerea aut ſubfuſca, rarius coſtata, anfractibus 3-5, primo ventricoſo turgido reliquis omnibus triplo majore, incola albo cinereo-punctato; oculis nigris.*

laevigata. 148. H. teſta imperforata obovata obtuſiſſima pellucida laeviſſima.
Habitat - - - teſta cornea longitudinaliter obſolete ſtriata, piſi magnitudine, apertura magna ſublunata poſterius elongata, labio interiore albo.

balthica. 149. H. teſta imperforata ovata acuminata: rugis elevatis, apertura ovata ampliata. *Fn. ſuec.* 2193.* *It. goth.* 261.
Habitat ad maris balthici *littora, incola nigro: tentaculis* 2, *teſta pellucida: anfractibus* 4.

neritoidea. 150. H. teſta imperforata convexa longitudinaliter ſtriata: rima umbilicali, apertura ſubrotunda. *Muſ. Lud. Ulr.* 672. *n.* 380.*
Habitat - - - teſta livida, ſtriis pluribus quam 40 *exarata.*

Perſpicua. 151. H. teſta imperforata convexo ovata: labro nullo, apertura ad apicem usque hiante. *Muſ. Lud. Ulr.* 673. *n.* 381.*
Habitat in mari mediterraneo, *inter bullas et helices intermedia, teſta lactea, ad apicem usque perſpicua, fragiliſſima.*

heliotoidea. 152. H teſta imperforata depreſſo-planiuſcula ſtriis undatis: apertura ovali dilatata usque in apicem. *Muſ. Lud. Ulr.* 673. *n.* 382.* *Müll. zool. dan. prodr.* 2900. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 390. *n.* 387.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 2. *f.* 2. Sigaret.
Müll. zool. dan. 3. *p.* 32. *t.* 101. *f.* 1-4. Bulla velutina.

 Rumpf

Rumpf muſ. t. 40. *f.* R.
Petiv. gazoph. t. 12. *f.* 4.
Gualt. teſt. t. 69. *f.* F.
Bonann. muſ. Kirch. 3. *f.* 404.
Argenv. Conch. t. 3. *f.* C.
Klein. oſtr. t. 7. *f.* 114.
Knorr Vergn. 4. *t.* 17. *f.* 5? *et* 6. *t.* 39. *f.* 5.
Martin. Conch. 1. *t.* 16. *f.* 151-154.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 165. *f.* 1598. 1599.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, mari mediterraneo, atlantico, indico, *nonne potius ad haliotides referenda, incola parvo albo; tentaculis 2 brevibus, operculo nullo, teſta plana, elliptica, tenui, pellucida, alba, aut rubella faſcia alba, aut aurantia faſciis 2 dilutioribus, extrinſecus ſubcancellata, anfractibus 4 lateralibus, labro acutiſſimo.*

muralis. 153. H. teſta imperforata ſubdepreſſa ſtriata albida: maculis fuſcis, labro albo. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 14. *n.* 213.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 1. *f.* 2. Pouchet.
Liſt. Conch. t. 74. *f.* 74.
Gualt. teſt. t. 3. *f.* F.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 18.
Habitat in Italia *et* Africa, *teſta diametri 7 linearum interdum fuſco punctata, frequentius ſupra albida ſtriis obliquis confertis profundis ſtrigisque fuſcis inſignita, ſubtus alba, glabra, minus ſtriata, anfractibus 4, apertura fuſca, labro acuto ſubreflexo.*

Cartuſiana. 154. H. teſta imperforata, ſubdepreſſa alba: anfractibus ſex. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 15. *n.* 214.
Schroet. Erdconch. t. 2. *f.* 27?
Geoffr. teſt. 4.
Habitat in Thuringia? *et* Gallia, *teſta pellucida, diametri 6 linearum, utrinque convexa, labio candido craſſiuſculo, ore tenuiore.*

Vertigo. 155. H. teſta cylindrica glabra obſcure fulva: anfractibus teretibus contrariis, apertura ſubquadrata ſexdentata.
Müll. zool. dan. prodr. 2919. *hiſt. verm.* 2. *p.* 124. *n.* 320. Vertigo puſilla.
Habitat rara in Daniae *truncis putridis, incola pellucido, ſupra caeruleſcente ſubtus albo, tentaculis modo 2 linearibus, apice oculatis, teſta lineam longa, anfractibus 4-5, aperturae margine ſummo arcuato cum dentibus albo, ad anfractum oppoſitum transverſo.*

Carychium. 156. H. teſtâ hyalina ſubconica glabra: apertura ovata dentibus intus ſesquitribus munita.

Müll. zool. dan. prodr. 2920. *hiſt. verm.* 2. *p.* 125. *n.* 321. Carychium minimum.

Habitat in Daniae *aſſeribus humidis fagique foliis putreſcentibus, incola flavo: tentaculis modo* 2 *truncatis quaſi bulbigeris ad baſin poſterius oculatis, teſta* ½ - ¾ *lineam longa: anfractibus* 5 *teretibus.*

ambigua. 157. H. teſta ſubimperforata convexa: ſulcis remotis compreſſis, apertura ſemiorbiculari.

Adanſ. Seneg. 1. *t.* 13. *f.* 1? Foſſus.

Habitat in mari mediterraneo, *teſta parva, alba, neritam referente, ut tamen labium interius non reflexum ſit, umbilico in junioribus aperto, in adultis clauſo, ſpira laterali obtuſa, ſulcis* 6 *elevatis cincta.*

Corvus. 203. H. teſta imperforata ovata nigra: apertura ovata.

Martin. berl. Mag. 4. *t.* 9. *f.* 36.

Schroet. Fluſconch. t. 7. *f.* 3. 4.

Habitat in Thuringiae *aquis ſtagnantibus, ſtagnali proxime affinis, at teſta duplo minore minus acumin ta, anfractu primo minus convexo, labroque minus prominulo diſtincta.*

Pyrum. 204. H. teſta ſubcylindrica decuſſatim ſtriata hyalina ſpadiceo varia apice fuſca: anfractibus contrariis: tribus maximis medio impreſſis.

Martin. n. Mannigfalt. 4. *p.* 421. *t.* 2. *f.* 15. 16.

Habitat in Guinea, *ſpirae anfractibus ſeptem.*

marmorata. 205. H. teſta albo cinereo caeruleoque varia obtuſa: anfractus teretibus; primo reliquis duplo longiori medio inflato longitudinaliter ſtriato, apertura ovata.

Schroet. Fluſconch. t. 6. *f.* 9.

Habitat Argentorati *in fluviis teſta* ¾ *pollicis longa, anfractibus* 5.

achatina. 206. H. teſta ſpadicea pellucida tenera: apertura ovata.

Schroet. Fluſconch. t. 6. *f.* 15. a. b.

Habitat - - - marmoratae affinis, at teſta minori, anfractibus modo 4 *anguſtioribus.*

lugubris. 207. H. teſta ovato-acuminata pellucida transverſim ſtriata ſub epidermide nigra ochroleuca ſpadiceo undulata: anfractu primo reliquis duplo majore, apertura oblongo-ovata.

Schroet.

Schroet. Fluſconch. t. 6. *f.* 13.
Habitat - - - teſta vix 9 lineas longa, anfractibus 7.

minima. 208 H. teſta ovato-conica ſubimperforata: apertura orbiculari: anfractu primo reliquis duobus in centro ejus poſitis majore.
Schroet. Fluſconch. t. 7. *f.* 18.
Habitat - - - teſta obtuſa, vix 1½ *lineas longa.*

inflata. 209. H. teſta alba ſolida opaca: anfractu primo reliquis omnibus duplo majore, apertura ampla marginata.
Schroet. Fluſconch. t. 7. *f.* 5.
Habitat in Thuringiae *fluvio* Unſtrut.

albicans. 210. H. teſta alba opaca acuminata: apertura ovali.
Schroet. Fluſconch. t. 7. *f.* 6.
Habitat Hamburgi, *aquatica, inflata magis elongata.*

repanda. 211. H. teſta ovato acuminata ſubimperforata: anfractu primo ventricoſo omnibus reliquis majore, apertura ſemicirculari.
Schroet. Fluſconch. t. 7. *f.* 16.
Habitat in Thuringiae *aquis ſtagnantibus*, 6-7 *lineas longa.*

212. H.

Difficillimi helicum *generis, ſive definitionem ſpecierum et varietatum omni numero abſolutam ſpectes, ſive limites, quibus a proximis generibus diſtat, multae adhuc occurrunt apud auctores, utrum ſpecies, an varietates, utrum huic, an illi tribui inſerendae; ita e. g. apud* Liſterum *Conch t.* 8. *f.* 1. 2. *t.* 11. *f.* 6. *t.* 13. *f.* 8. *t* 22 *f.* 20. *t.* 24. *f.* 22. *t.* 28. *f.* 26. *t.* 33. *f.* 32. *t.* 44. *f.* 42. *t* 59. *f.* 56. *t.* 61. *f* 59. *t.* 65 *f.* 63. *t.* 66. *f.* 64. *t.* 67. *f.* 65. 66. *t.* 68. *f.* 67. *t* 72. *f* 70. *t.* 73. *f.* 71. 72. *t.* 74. *f.* 73. *t.* 76. *f.* 76. *t.* 77. *f.* 77. *t.* 78. *f.* 78. 79. *t.* 79. *f.* 80. 80. a. *t.* 81. *f.* 82. *t.* 82. *f.* 83. *t.* 84. *f.* 84. *t.* 85 *f* 85 *t.* 87. *f.* 88. *t.* 91 *f.* 91. *t.* 92. *f.* 92. *t.* 94. *f.* 95. *t.* 95. *f.* 96. *t.* 108 *f.* 1 *t.* 109. *f.* 2. a, b. *t.* 110. *f.* 3. 4. *t* 111. *f.* 5. *t.* 112. *f.* 6. *t.* 113. *f.* 7. *t.* 114. *f.* 8. 9. *t.* 115. *f.* 10. *t.* 116. *f.* 11. *t.* 117. *f.* 12. *t.* 119. *f.* 14. *t.* 129. *f.* 29. *t.* 131. *f.* 31. *t.* 135. *f.* 35. *t.* 139. *f.* 44. 45. *t.* 140. *f* 46. 47. *t.* 576. *f.* 30. *t.* 581. *f.* 35. *t.* 582. *f.* 35. a. *t.* 1055. *f.* 4. 6. *t.* 1058. *f.* 3. 4 7. 8. *t.* 1059 *f.* 4. 5 Klein *oſtrac. t.* 1. *f.* 12 16. 17. 18. 22. Bonanni *recr. et muſ. Kircher.* 3. *f.* 44. 148. 333. 378. *recr.* 3. *f.* 358. 371 *muſ. Kircher.* 3. *f.* 351. 364. 378. 392 393. 395. Gualtieri *teſt. t.* 1. *f.* F G. H. I. L. M. O. *t.* 2 *f.* AA. BB. CC. G. H. I. N. O. Q. R. *t.* 3. *f.* A. B. C. H. L. M. N. O. R. FF. *et t.* 6. *f.* E. F. G. H. Argenville *Conch. t.* 8 *f.* E. *t.* 27. *n.* 2 *f* 1. 2. 4. 5. *n.* 6. *f.* 4. 5. *t* 28. *f.* 2. 3. 6-9. 21. *et zoomorph.* 1-3. 6-8. *t.* 10. *f.* C. Seba *muſ.* 3. *t.* 38. *f.* 25. 67. *t.* 39. *f.* 9-12. 31. 32. 35. 36. 39. 49. 50. 58. *t.* 40. *f* 8-10. 20 22-24. 26-29. 30. 31. 33-35. 40. 43. 48. 59-61. 63. 64. 67. *et t.* 41. *f.* 3. Knorr *Vergn.* 4. *t.* 12. *f* 4. *et* 5. *t.* 26. *f.* 5-7. Martini *berlin. Magaz.* 2. *t.* 1. *f.* 5. *t.* 2. *f* 11. 12. 17. 35. *t* 3. *f.* 35 *t.* 4 *f.* 41. 43-45. 47. 48. *et* 4. *t.* 7. *f.* 8-11. 15. 16. *t.* 8. *f.* 24-26. 32. *t.* 8. *f.* 51. *t.* 10. *f.* 46-51. 53. a. b. Adanſon *Seneg.* 1. *t.* G. III. Schroeter *Fluſconch. t.* 5. *f.* 33.

opaca. 212. H. teſta ovato-acuminata ſolida exalbida opaca: apertura ovato-oblonga, anfractu primo reliquis majore.
Schroet. Flusconch. t. 7. f. 17.
Habitat - - - aquatica, anfractibus 5.

turgida. 213. H. teſta obtuſa: anfractibus quatuor medio inflatis diſtantibus, apertura orbiculari marginata.
Schroet. Flusconch. t. 8. f. 7. a. b.
Habitat - - - teſta 2 lineas longa.

caeruleſcens. 214. H. teſta caeruleſcente ovato-acuminata: anfractibus ſubventricoſis, apertura oblongo rotundata.
Schroet. Flusconch. t. 8. f. 8. a. b.
Habitat frequens Francofurti *ad* Moenum, *prope pontem* Sachſenhuſanum, *teſta 2 lineas longa, anfractibus 4.*

cinerea. 215. H. teſta inflata: anfractibus quatuor brevibus; duabus inferioribus diſtantibus, apertura orbiculari non marginata.
Schroet. Flusconch. t. 8. f. 9. a. b.
Habitat in valle Alſatiae Steinthal, *teſta 2 lineas longa.*

undata. 216. H. teſta imperforata oblonga alba longitudinaliter rubro undulata: ſpirae anfractu primo altero triplo majore, apertura ovata.
Gualt. teſt. t. 5. f. N.
Schroet. Flusconch. t. 10. min. A. *f. 4.*
Habitat - - - teſta $1\frac{1}{4}$ pollicis longa, anfractibus 6-7.

teres. 217. H. teſta imperforata oblonga tenui fuſca: anfractu primo altero triplo majore aperturaque ovatis.
Gualt. teſt. t. 5. f. NN.
Schroet. Flusconch. t 10. min. A. *f. 7.*
Habitat - - - anfractibus 4.

ſubſtriata. 218. H. teſta ſubimperforata oblonga minutiſſime ſtriata albo: anfractu primo altero duplo majore, apertura ovali marginata.
Gualt. teſt. t. 5. f. SS.
Schroet. Flusconch. t. 10. min. A. *f. 6.*
Habitat - - - teſta $\frac{1}{4}$ pollicis longa, anfractibus 5.

trigonoſtoma. 220. H. teſta laevi fuſca: apertura triangulari marginata.
Gualt. teſt. t. 5. f. C.
Schroet. Flusconch. t. 10. min. A. *f. 9.*
Habitat - - - teſta minuta.

tumida. 221. H. teſta ventricoſa acuminata cinerea: anfractu primo reliquos omnes ſuperante, apertura ovali ampla altero latere marginata.
Gualt. teſt. t. 5. f. Q.
Schroet. Fluſconch. t. 10. *min.* B. *f.* 2.
Habitat - - - teſta $1\frac{3}{4}$ *pollicis longa, faſcia ad columellam alba.*

Acicula. 222. H. teſta oblonga acuminata longitudinaliter coſtata transverſim ſtriata: apertura ovali.
Schroet. Fluſconch. t. 8. *f.* 14.
Habitat in Coromandel, *teſta* $\frac{3}{4}$ *pollicis longa ſub epidermide nigra inter coſtas ſpadiceo virgata, anfractibus* 10 *aequabiliter decreſcentibus.*

peregrina. 223. H. teſta ovata imperforata: anfractibus teretibus diſtantibus aequabiliter decreſcentibus: apertura ovali.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 254. *t.* 4. *f.* 11.
Habitat in inſulis Americae *obverſis, teſta dimidium pollicem longa hyalina, interdum teſtacea opaca, anfractibus* 8-9.

danubialis. 224. H. teſta oblonga imperforata: anfractibus ventricoſis diſtantibus, apertura orbiculari.
Marſigl. danub. 4. *p.* 91. *t.* 31. *f.* 1.
Schroet. Fluſconch. t. 10. *min.* B. *f.* 5.
Habitat in Danubio, *teſta* $2\frac{1}{2}$ *pollices longa.*

turbinata. 225. H. teſta oblonga imperforata laevi acuminata: anfractibus inflatis; primo multo majore, reliquis aequabiliter decreſcentibus, apertura ſubovali marginata.
Marſigl. danub. 4. *p.* 89. *t.* 31. *f.* 2.
Schroet. Fluſconch. t. 10. *min.* B. *f.* 1.
Habitat in Danubio, *teſta* $3\frac{1}{4}$ *pollicis longa, minus ventricoſa, quam in danubiali.*

curvata. 226. H. teſta oblonga curvata ſubimperforata: apertura ovali marginata.
Marſigl. danub. 4. *p.* 89. *t.* 31. *f.* 4.
Schroet. Fluſconch. t. 10. *min.* B. *f.* 3.
Habitat in Danubio, *teſta diametri* $2\frac{1}{3}$ *pollicis, an ab origine curvata?*

exilis. 252. H. teſta tenui alba ſpadiceo faſciata laevi: ſpira obtuſa; anfractibus planiuſculis. *Kaemm. Cab. Rudolſt. p.* 124. *n.* 7. *t.* 12. *f.* 3.

β) Kaemm.

β) Kaemm. Cab. Rudolſt. p. 124. *t.* 12. *f.* 2.
γ) Kaemm. Cab. Rudolſt. p. 125. *t.* 10 *f.* 2.
Habitat - - - *teſta* 6-8 *lineas, γ) pollicem longa.*

329. NERITA. *Animal* Limax.

Teſta univalvis, ſpiralis, gibba, ſubtus planiuſcula.

Apertura ſemiorbicularis vel ſemilunaris: labio columellae tranſverſo, truncato planiuſculo.

* *Umbilicatae.*

Canrena. 1. N. teſta laevi: ſpira ſubmucronata, umbilico gibbo bifido. *Muſ. Lud. Ulr.* 674. *n.* 383.*
α) Liſt. Conch. t. 560. *f.* 4.
Bonann. recr. 3. *f.* 372.
Bonann. muſ. Kircher. 3. *f.* 365.
Gualt. teſt. t. 67. *f.* V.
Argenv. Conch. t. 7. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 27. 51. 52. *et t.* 40. *f.* 65. 66.
Knorr Vergn. 3. *t.* 15. *f.* 4. *et t.* 20. *f.* 4.
Chemn. Conch. 5. *t.* 186. *f.* 1860. 1861.
β) Liſt. Conch. t. 564. *f.* 11.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 228.
Gualt. teſt. t. 67. *f.* S.
Argenv. Conch. t 7. *f.* C.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 60. 61.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 23.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 13. *f.* 3. Fanel.
Chemn. Conch. 5. *t.* 186. *f.* 1862. 1863.
γ) Liſt. Conch. t. 559. *f.* 1.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 17. *f.* 1. 2.
Chemn. Conch. 5. *t.* 186. *f.* 1864. 1865.
δ) Liſt. Conch. t. 560. *f.* 3.
Seb. muſ 3. *t.* 38. *f.* 29 64. 65.
Knorr Vergn. 1. *t.* 10. *f.* 5.
Chemn. Conch. 5. *t.* 186. *f.* 1868-1871.
ε) Gualt. teſt. t. 67. *f.* Q.
Chemn. Conch. 5. *t.* 187. *f.* 1876. 1877.
ζ) Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 224.

Gualt.

Gualt. teſt. t. 67. *f.* R.
Chemn. Conch. 5. *t.* 187. *f.* 1878-1880.
η) *Liſt. Conch. t.* 568. *f.* 19.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 13. *f.* 2. Natice?
Chemn. Conch. t. 187. *f.* 1895. a. b.
ϑ) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 188. *f.* 1921.
ι) *Liſt. Conch. t.* 563. *f.* 10.
κ) *Liſt. Conch. t.* 566. *f.* 16.
λ) *Liſt. Conch. t.* 572. *f.* 25.
μ) *Bonann. recr. et muſ. Kircher.* 3. *f.* 165.
ν) *Bonann. recr. et muſ. Kircher.* 3. *f.* 227.
ξ) *Gualt. teſt. t.* 67. *f.* E.
ο) *Gualt. teſt. t.* 67. *f.* I.
π) *Gualt. teſt. t.* 67. *f.* X.
ρ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 38. *f.* 28.
σ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 38. *f.* 53.
τ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 40. *f.* 62?
υ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 41. *f.* 14. 15.
φ) *Knorr Vergn.* 2. *t.* 10. *f.* 5?
χ) *Liſt. Conch. t.* 561. *f.* 7.
Rumpf muſ. t. 22. *f.* G.
Gualt. teſt. t. 67. *f.* O.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 26.
Chemn. Conch. 5. *t.* 187. 1885. 1886.
ψ) *Rumpf muſ. t.* 22. *f.* C.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 62. 63.
Chemn. Conch. 5. *t.* 187. *f.* 1887. 1891.
ω) *Liſt. Conch. t.* 560. *f.* 5.
Gualt. teſt. t. 67. *f.* N.
Argenv. Conch. t. 7. *f.* 4.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 70.
Knorr Vergn. 1. *t.* 10. *f.* 3.
Chemn. Conch. 5. *t.* 187. *f.* 1892. 1893.
αα) *Seb. muſ.* 3. *t.* 38. *f.* 57.

Habitat innumera coloris, picturae, ipſius magnitudinis varietate in mari Indiam, Africam *undecunque,* Americam, *alluente, teſta nivea, flavicante, caeruleſcente, punctis, maculis, lineis, aliquando punctatis, nebulis, faſciis diverſi coloris picta, fauce ſaepius violacea.*

cancellata. 2. N. teſta decuſſatim ſtriata impreſſo punctata: ſpira ſubelavata, umbilico gibbo bifido. *Hermann Naturf.* 16. *p.* 55. *t.* 2. *f.* 8. 9.
Chemn. Conch. 5. *t.* 188. *f.* 1911-1914.

β) *Chemn.*

β) Chemn. Conch. 10. *t.* 165. *f.* 1596. 1597?
Habitat ad inſulas Americae *mediae obverſas, teſta alba, maculis obſoletis, interdum radiis fulvis faſciaque picta.*

glaucina. 3. N. teſta laevi: ſpira obtuſiuſcula, umbilico ſemiclauſo, labio gibbo bicolore. *Fn. ſuec.* 2197.* *Muſ. Lud. Ulr.* 674. *n.* 384.*
Liſt. Conch. t. 562. *f.* 9?
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. *f.* 225.
Gualt. teſt. t. 67. *f.* A. B.
Argenv. Conch. t. 7. *f.* V.
Seb. muſ 3. *t.* 39. *f.* 16.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 3. *f.* 34.
Knorr Vergn. 2. *t.* 11. *f.* 1. *et* 6. *t.* 13. *f.* 7.
Chemn. Conch. 5. *t.* 186. *f.* 1856-1859.
β) *Bonann. recr. et. muſ. Kirch.* 3. *f.* 226?
γ) *Gualt. teſt. t.* 67. *f.* P?
δ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 38. *f.* 31?
ε) *Schroet. Einl. in Verſt.* 4. *t.* 9. *f.* 5.
ζ) *v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t.* 13. *f.* 20. 21?
Habitat frequens Tranquebariae, *et in* Barbaria, *teſta ad* 2. *pollices longa, inflata nunc cinerea caeruleſcente obumbrata: faſcia ſupra caeruleſcente aut fuſca, ſubtus alba: umbilico fuſco alboque vario, nunc ſupra rufeſcente: faſcia ex luteo fuſca, ſubtus alba, umbilico et fauce ſpadiceis ſpirae apice caeruleo aut ſpadiceo.*

Vitellus. 4. N. teſta ſubgloboſa: umbilico perforato aequali.
Liſt. Conch. t. 565. *f.* 12.
Rumpf muſ. t. 22. *f.* A.
Gualt. teſt. t. 67. *f.* I.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 30.
Knorr delic. t. B. II. *f.* 9.
Vergn. 1. *t.* 7. *f.* 2. *et* 2. *t.* 8. *f.* 5.
Chemn. Conch. 5. *t.* 186. *f.* 1866. 1867.
Habitat paulo rarior in Oceano indico, *teſta vitellina hinc inde obumbrata maculisque albis in ſeries digeſtis, ſuperne faſcia obſcuriori picta, intus et in ambitu umbilici alba.*

Albumen. 5. N. teſta convexa: umbilico ſubcordato; lobo explanato. *Muſ. Lud. Ulr.* 675. *n.* 385.*
Rumpf muſ. t. 22. *f.* B. Vitellus compreſſus.
Seb. muſ. 3. *t.* 41. *f.* 9-11.
Knorr Vergn. 4. *t.* 7. *f.* 4. 5.
Chemn. Conch. 5. *t.* 189. *f.* 1924. 1925.

β) *Argenv. Conch. t.* 7. *f.* T?

Habitat rariſſima ad caput bonae ſpei, *ad* Barbarjae *littora inſulas* nicobaricas *et* moluccas, *teſta laevi lata, ſatis magna, hepatica vel lutea, ſubtus alba plana.*

Mammilla. 6. N. teſta ovata glabra: umbilico obtecto, apertura ovata. *Muſ. Lud. Ulr.* 675. *n.* 386.*
Columm. aq. t. 52. *f. ult.* Cochlea nivea.
Rumpf muſ. t. 22. *f.* F. Valvata 7: Albula.
Argenv. Conch. t. 7. *f.* X. Uber tenue.
Liſt. Conch. t. 566. *f.* 14. *et t.* 571. *f.* 22.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 9. 10. 32. *et t.* 41. *f.* 22.
Knorr Vergn. 1. *t.* 6. *f.* 6. 7. *et* 4. *t.* 8. *f.* 4. *et* 6. *t.* 40. *f.* 2. 3.
Meuſchen Naturf. 13. *p.* 85. *t.* 5. *f.* 5.
Chemn. Conch. 5. *t.* 189. *f.* 1928-1933.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 189. *f.* 1922. 1923.
γ) *Gualt. teſt. t.* 67. *f.* T.
δ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 41. *f.* 12. 13.

Habitat in mari, Indiam, *et mediam auſtralemque* Americam *alluente, teſta ad* 2¼ *pollices longa nivea aut ochroleuca rarius fuſca, glaberrima, ſolida, anfractibus* 4-5 *extimis maxime approximatis.*

leucozonias. 7. N. teſta ſubgloboſa ſolida badia albo faſciata: ſpira depreſſiuſcula. *Kaemmer. Conch. Rudolſt. p.* 187. *t.* 12. *f.* 5. 6.
Habitat - - - vitello affinis, at lobo teſtae evidentiori diſtincta, teſta ultra pollicem alta, at paulo latiori, anfractibus 4-5.

ſpadicea. 8. N. teſta ſubgloboſa ſolida ſpadicea ſubtus alba, apice caeruleſcente, faucis faſciis lateritiis, dorſi alba.
Chemn. Conch. 5. *t.* 187. *f.* 1872. 1873.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 188. *f.* 1896. a. b. 1897.
Habitat ad littora inſulae S. Mauritii, *teſta ſolida ſatis magna.*

rufa. 9. N. teſta tenui rufa: umbilico obſcuriori: limbo, dorſi baſeosque ſpirae faſcia albis, faucis faſcia rufeſcente, columellae vitta fuſca.
Rumpf muſ. t. 22. *f.* D.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 17. *f.* 3. 4.
Chemn. Conch. 5. *t.* 187. *f.* 1874. 1875.
Habitat ad inſulam S. Mauritii, *ſpadiceae affinis.*

fulminea. 10. N. teſta ſubgloboſa lineis angulatis ſpadiceis picta, lobo explanato.

Adanſ.

Adanſ. Seneg. 1. *t.* 13. *f.* 4. Gochet.
Liſt. Conch. t. 567. *f.* 17.
Gualt. teſt. t. 67. *f.* M.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 33.
Knorr Vergn. 1. *t.* 10. *f.* 4.
Chemn. Conch. 5. *t.* 187. *f.* 1881-1884.
β) *Liſt. Conch. t.* 567. *f.* 18?
γ) *Gualt. teſt. t.* 67. *f.* H?
Habitat ad Africae *littora, rara, teſta alba aut flavicante.*

Stercus muſcarum. 11. N. teſta laevi nivea maculis punctisque ſubtiliſſimis rufis varia; umbilico gibbo bifido.
Chemn. Conch. 5. *t.* 187. *f.* 1894.
Habitat in mari mediterraneo *et* americano, *an vere diſtincta a canrena ſpecies?*

orientalis. 12. N. teſta ſubgloboſa nitida laeviſſima: ſpirae baſi ſubrugoſa, columella nivea.
Chemn. Conch. 5. *t.* 188. *f.* 1898. 1899.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 188. *f.* 1904.
Habitat rara in maribus orientalibus, *teſta utrinque cervina: faſcia media anguſta alba; in* β) *tota teſta nivea.*

cruentata. 13. N. teſta ſubgloboſa alba ſanguineo maculata et punctata apice obtuſo intusque caeruleſcente: umbilico ſpirali.
Chemn. Conch. 5. *t.* 188. *f.* 1900. 1901.
Habitat - - -

rugoſa. 14. N. teſta rugoſa intus glaberrima dilute teſtacea: umbilici ambitu albo.
Chemn. Conch. 5. *t.* 188. *f.* 1902. 1903.
Habitat ad inſulas Americae mediae *obverſas, teſtae rugis oblongis confertis.*

marochienſis. 15. N. teſta ſubgloboſa laevi praſina intus ſubfuſca apice livida, ad angulum anfractuum ſubrugoſa.
Chemn. Conch. 5. *t.* 188. *f.* 1905-1910.
Habitat ad Africae, *praeſertim* Marochii, Antillarum *quoque littora, teſta interdum faſciis plumoſis varia, juniore tenui et pellucida.*

ſulcata. 16. N. teſta ſubgloboſa oblique plicata: ſpira mucronata, umbilico bifido.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 17. *f.* 5. 6.
Habitat - - - *ſpirae anfractibus* 4.

17. N.

arachnoidea. 17. N. teſta alba lineis ruſeſcentibus reticulata apice nigricante: anfractibus convexis, umbilico ſubobtecto.
Chemn. Conch. 5. *t.* 188. *f.* 1915. 1916.
Habitat - - - an vere diſtincta ſpecies?

vittata. 18. N. teſta ſubgloboſa fuſca: vitta duplici alba medio reticulata utrinque denticulata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 188. *f.* 1917. 1918.
Habitat ad Marochii *littora.*

melanoſtoma. 19. N. teſta tenui pellucida laevi oblonga: anfractu primo ventricoſo plano maximo reliquis compreſſis, umbilico ſemiclauſo.
Liſt. Conch. t. 142. *f.* 36. *et t.* 566. *f.* 15.
Gualt. teſt. t. 67. *f.* D.
Seb. muſ. 3. *t.* 41. *f.* 20. 21?
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 15. *f.* 13. 14.
Chemn. Conch. 5. *t.* 189. *f.* 1926. 1927.
Schroet. inn. Bau Schneck. t. 5. *f.* 3.
β) *Liſt. Conch. t.* 565. *f.* 13.
Knorr Vergn. 4. *t.* 6. *f.* 3. 4.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 5. *f.* 54.
Chemn. Conch. 5. *t.* 189. *f.* 1934. 1935.
γ) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 189. *f.* 1936. 1937.
δ) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 189. *f.* 1938.
ε) *Liſt. Conch. t.* 559. *f.* 2.
Chemn. Conch. 5. *t.* 190. *f.* 1940. 1941.
ζ) *Rumpf muſ. t.* 22. *f.* E.
Habitat in mari indico, *β, γ, et ε rara, magis adhuc δ, teſta ad* 2 *pollices longa, alba, aurantia vel fuſca, crebro faſciis vittisve interdum interruptis, ſubfuſcis, ſpadiceis vel albis, in δ) canis venis lineisque angulatis fuſcis pictis, utplurimum* 2 *exornata umbilici, ambitu columellaque nigris, aut obſcuris, hac in β) margine aurantia.*

20. N.

Huic neritarum tribui videntur inſerendae utrum vere diſtinctae ſpecies, an potius varietate depictae a Liſtero *Conch. t.* 561. *f.* 8. *t.* 569. *f.* 20. *t.* 570. *f.* 21. *t.* 572. *f.* 23. *et t.* 573. *f.* 28. *a* Bonanni *recreat. et muſ. Kircher.* 3. *f.* 7. 8. 164. 168. 169. 198. 203. *et* 334. *recreat.* 3. *f* 387. *muſ. Kircher.* 3. *f.* 375. *et* 388. *a* Rumpf *muſ. t.* 22. *f.* 1. *a* Valentyn *Abh. t.* 8. *f.* 72. *a* Gualtieri *teſt. t.* 64. *f.* N. *t.* 66. *f.* A. *et t.* 67. *f.* F. G. *ab* Argenville *Conch. t.* 6. *f.* M. *t.* 7. *f.* D. T. Y. Z. 1. 3. *et t.* 29. *f.* 3. *et zoomorph. t.* 3. *f.* B. *et t.* 10. *f.* E. Seba *muſ.* 3. *t.* 38. *f.* 54. 55. 66. *et* 69. *t.* 39. *f.* 21-24. *et* 30. *et t.* 41. *f.* 1. 7. 8. 16. *et* 17. *et* Knorr *Vergn.* 2. *t.* 13. *f.* 5.

Papilla. 20. N. teſta pellucida tenui oblonga decuſſatim ſtriata ſordide lutea: apertura ſubovali, columella alba, umbilico ſemiclauſo.
Chemn. Conch. 5. *t.* 189. *f.* 1939.
Habitat frequens ad Tranquebariae *littora, anfractibus* 4.

clathrata. 21. N. teſta depreſſa ovata transverſim undulata longitudinaliter coſtata: coſtis planis obliquis ſemilunaribus, ſpira papillari.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 332. *t.* 4. *f.* 15.
Habitat - - - *foſſilis in* Campania Gallica.

Valvata. 22. N. teſta planiuſcula: apertura circinata.
Müll. zool. dan. prodr. 2891. Valvata criſtata.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *an hujus generis et tribus? incola tentaculis* 2 *ſetaceis, oculum ad angulum poſteriorem gerentibus gaudet.*

islandica. 23. N. teſta globoſo-ſubacuta craſſiore: anfractibus quatuor per ſulcos profundiſſimos diſcretis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2955.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *an hujus tribus?*

affinis. 24. N. teſta globoſa craſſiore: ſpira ſubmucronata; anfractibus tribus. *Müll. zool. dan. prodr.* 2956.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *an hujus tribus?*

auſtralis. 25. N. teſta ſub epidermide ex flavicante, vireſcente et caeruleſcente varia lineis angulatis viridibus picta: ſpirae anfractibus novem ſulco diſtinctis.
v. Zorn Naturf. 7. *p.* 160. *t.* 2. *f.* B. 1. *et* B. 2.
Habitat in nova Seelandia, *nonne potius ad trochos releganda? teſta mediae magnitudinis, ochroleuca, apice aurantia, apertura ſubargentea.*

** Imperforatae.

† *labiis edentulis.*

Corona. 26. N. teſtae anfractibus ſpinis coronatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 676. *n.* 387.*
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 197. *n.* 383. Nerita teſta dilatata convexa ſtriata fuſca: aculeis longis nigris.
Rumpf muſ. t. 22. *f.* O. Valvata ſpinoſa.
Petiv. amb. t. 3. *f.* 4.
Argenv. Conch. t. 7. *f.* 2.

Martin. berl. Mag. 4. *t.* 8. *f.* 30.
Walch Naturſ. 4. *p.* 52. *t.* 1. *f.* 1. 2.
Favann. Conch. t. 61. *f.* D7.
Chemn. Conch. 9. *t.* 124. *f.* 1083. 1084.
Habitat in Indiae, *inſulae* S. Mauritii, Americae *auſtralis*, inſularumque *obverſarum fluviis, teſta minuta, interdum tota nigra ſpinis longioribus vel brevioribus armata extrinſecus tenuiter ſtriata: ſpirae anfractu primo magno, reliquis convexis.*

Radula. 27. N. teſta ſulcata tuberculis aequalibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 676. *n.* 388.*
Rumpf muſ. t. 22. *f.* M.
Gualt. teſt. t. 64. *f.* I?
Seb. muſ. 3. *t.* 41. *f.* 18. 19.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 17. *f.* 7. 8.
Chemn. Conch. 5. *t.* 190. *f.* 1946. 1947.
Habitat rarior in India inſulisque *obverſis, teſta tenui pellucida juglandis magnitudine, nunc alba nunc cinerea, coſtata: coſtis tuberculatis, ſulcis ſtriatis, ſpira prominente acuta.*

cornea. 28. N. teſta obſolete ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 677. *n.* 389.*
Argenv. Conch. t. 7. *f.* M?
Habitat in mari indico *et* rubro? *teſta fragili, nunc fuſca, nunc alba, nunc ſubviolacea faſciis longitudinalibus albis vel teſtaceis picta, nunc violacea albo-punctata, interdum faſcia longitudinali alba exornata.*

fluviatilis. 29. N. teſta rugoſa. *Fn. ſuec.* 2194.*
Müll. zool. dan. prodr. 2952. *hiſt. verm.* 2. *p.* 194. *n.* 381.
Nerita teſta dilatata convexa albis maculis reticulata.
Liſt. Conch. t. 141. *f.* 38.
anim. angl. t. 2. *f.* 20.
Pet. muſ. 67. *n.* 718.
Gualt. teſt. t. 4. *f.* LL.
Argenv. Conch. t. 27. *f.* 3.
zoomorph. t. 8. *f.* 3.
Martin. berl. Mag. 4. *t.* 8. *f.* 27. 28.
Schroet. Flusconch. t. 5. *f.* 5-10. *t.* 9. *f.* 4. 5. a. b. *et t.* 11. *min.* C. *f.* 8.
Chemn. Conch. 9. *t.* 124. *f.* 1088. α-γ
Swammerd. bibl. nat. t. 10. *f.* 2.
Geoffr. teſt. 5.
Geve Conch. t. 24. *f.* 258-265.

β) *Liſter.*

β) *Liſter. Conch. t.* 607. *f.* 43.
γ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 124. *f.* 1086. 1087. a-l.
δ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 124. *f.* 1080. 1081.
Habitat in Europae *et* Barbariae fluviis *et* rivis, *potiſſimum ad cataractas, et lacuum oſtia, teſta* 4 *circiter linea longa, utplurimum maculis ſquamoſis varia, ovata, anfractibus* 3, *minoribus* 2 *lateralibus, columella alba.*

littoralis. 30. N. teſta laevi: vertice carioſo. *Fn. ſuec.* 2195.* *It. oel.* 261. *Müll. zool. dan. prodr.* 2953. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 402. *n.* 404.
Liſt. Conch. t. 607. *f.* 39. 40.
anim. angl. t. 3. *f.* 11. 12.
Petiv. muſ. 67. *n.* 717.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 25. 26.
Habitat innumera varietate in Europae maribus, *an diverſa à fluviatili, aut turbine neritoide ſpecies? vertice fortuito carioſo.*

lacuſtris. 31. N. teſta laeviuſcula cornea: apice exquiſito. *Fn. ſuec.* 2196.
Gualt. teſt. t. 4. *f.* MM.
Habitat in Europae *aquis ſtagnantibus fontibusque calidis, littorali ſimilis, at teſta cornea aut nigricante, interdum albo-punctata.*

Magdalenae. 32. N. teſta late ſulcata nigra intus alba: labio flavicante, operculo laevi bidentato.
Adanſ. Seneg. 1. *p.* 190. *t.* 13. *f.* 5. Kiſet.

 Habitat

Huic alteri tribui adſcribendae videntur cochleae a Liſter *Conch. t* 606. *f.* 34. *t.* 607. *f.* 44. *a* Bonanni *recr. et muſ. Kirch.* 3. *f.* 197. 200. 205. 206. 217. 219. *recr.* 3. *f.* 388. 389. 391. 392. 399. 401. *a* Rumpf *muſ. t.* 22. *f.* 2. *a* Gualtieri *teſt. t.* 66. *f.* E. M. N. *et* T. *ab* Argenville *Conch. t.* 7. *f.* E. N. S. *et t.* 29. *f.* 4. *nr.* 4. 1. *a* Klein *oſtr. t.* 7. *f.* 115. *a* Seba *muſ.* 3. *t.* 40. *f.* 32. *et* 46. *t.* 41. *f.* 28-30. *t.* 59. *f.* 11. 12. 17. *et* 21-24. *a* Knorr *Vergn.* 1. *t.* 13. *f.* 5. *a* Marſigli *Danub.* 4. *t.* 31. *f.* 6. *et a* Schroeter *Flusconch. t.* X. *min.* 13. *f.* 4. *depictae; primae ejus familiae cochleae a* Bonanni *recr. et muſ. Kircher.* 3. *f.* 218. *recr.* 3. *f.* 402. *muſ. Kircher.* 3. *f.* 384. *a* Liſtero *Conch. t.* 607. *f.* 41. 42. *et t.* 1056. *f* 6. 7. *a* Klein *oſtrac. t.* 2. *f.* 33. 34 *a* Gualtieri *teſt. t.* 66. *f.* AA. *et a* Knorr *Vergn.* 6. *t.* 17. *f.* 8. *alteri autem familiae teſtae a* Liſtero *Conch. t.* 595. *f.* 2 *t.* 596. *f.* 4. 6 *et* 8. *t.* 597 *f.* 9. *et* 10. *t.* 598. *f.* 12-14. *t.* 601. *f.* 18. *et* 19. *t.* 603. *f.* 22. 23. *t.* 604. *f.* 28-30. *t.* 605. *f* 31-33. *et t.* 606. *f.* 38. *a* Klein *oſtr. t.* 2. *f* 33. *a* Bonanni *recr. et muſ. Kircher.* 3. *f.* 216. *a* Gualtieri *teſt t.* 66. *f.* B. O. Q. R S. *ab* Argenville *Conch. t.* 7. *f.* B. H. L. *et t.* 29. *f.* 4. *n.* 4 2. *et zoomorph. t.* 3. *f.* C. *a* Seba *muſ.* 3. *t.* 59. *f.* 19. *et a* Regenſus *Conch.* 1. *t.* 3. *f.* 26. *et t.* 10. *f.* 39. *depictae.*

Habitat rarior circa inſulas Magdalenae, *teſta 6 lineas longa; ſpirae anfractibus 3, operculi dentibus recurvis approximatis.*

marginata. 33. N. teſta tenui decuſſatim ſtriata tuberculata nigra ochroleuco-maculata ſubgloboſa: apertura extrinſecus marginata.

Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 371. *t.* 4. *f.* 16.

Habitat - - - *teſta intus glaberrima, aperturae margine externo cancellato, columella plana, rugoſa, tuberculata.*

dubia. 34. N. teſta tenui pellucida ovata nitida obſcurius flava nigro varia: labio exteriori acuto, interiori glaberrimo.

Chemn. Conch. 5. *t.* 193. *f.* 2019. 2020.

Habitat rariſſima - - - *vertice prominente.*

†† *labiis dentatis.*

pulligera. 35. N. teſta laevi rudi: ſpirula excavato-oculata, labio interiori laevi crenulato.

Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 195. *n.* 382. Nerita (rubella) teſta dilatata convexa nigricante, labio interiore crenulato.

Rumpf muſ. t. 22. *f.* H. Valvata fluviatilis ſive rubella.

Petiv. gaz. t. 11. *f.* 4.

Liſt. Conch. t. 143. *f.* 37.

Gualt. teſt. t. 4. *f.* HH.

Seb. muſ. 3. *t.* 41. *f.* 23-26.

Knorr Vergn. 6. *t.* 13. *f.* 3.

Martin. berl. Mag. 4. *t.* 8. *f.* 31.

v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 17. *f.* 9. 10.

Favann. Conch. t. 61. *f.* D 1 2.

Chemn. Conch 9. *t.* 124. *f.* 1078. 1079.

Habitat in Indiae *fluviis, incola indis eduli, pullos ovales, convexos, exterius ochroleucos, intus albos, ad* 235 *in teſtae dorſo gerente, teſta* 14-16 *lineas longa, dura, ſubtiliſſime transverſim ſtriata, pellucida, nigra, vel fuſceſcente, anfractibus* 2, *altero maximo in dentem acutum terminato, fauce glabra nitida fundo laete caerulea vel albida, juxta marginem faſcia lata fulva cincta, labio interiori adſcendente nitido.*

undulata. 36. N. teſta tenui laevi undulata: vertice obtuſo, labio exteriori ſubſtriato edentulo, interiori ſubdenticulato.

Chemn. Conch. 5. *t.* 191. *f.* 1970. 1971.

Habitat rara in India.

aterrima. 37. N. teſta craſſa opaca globoſa nigerrima lineis picta, intus alba: labio exteriore glabro, interiori tuberculato rugoſo.
Chemn. Conch. 5. *t.* 192. *f.* 1985. 1986.
Habitat - - - teſta minutiſſime ſtriata.

Larva. 38. N. teſta laevi ſubgloboſa alba faſciis ex fuſco luteis varia: vertice obtuſo, labio ſubdenticulato.
Rumpf muſ. t. 22. *f.* 6.
Chemn. Conch. 5. *t.* 193. *f.* 2017.
Habitat rariſſima ad Amboinam, *teſta mediae magnitudinis.*

Pupa. 39. N. teſta laevi ſubrotunda lactea: anfractuum ſtriis transverſis nigris parallelis.
Habitat - - - inter virgineam et littoralem media, hujus magnitudine, labio plano laeviſſime dentato.

bidens. 40. N. teſta laevi: labio interiori bidentato. *Muſ. Lud. Ulr.* 677. *n.* 309.*
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 165. *f.* 1594. 1595.
Habitat - - - teſta nigra aut rubella, obſolete ſtriata, unicolore, piſi magnitudine; β) lutea albido nebuloſa: faſciis tribus nigris.

viridis. 41. N. teſta laevi viridi: labio interiori medio crenulato.
Brown jam. 399 Nerita minima viridis.
Schroet. Flusconch. t. 5. *f.* 11. a. b.
Chemn. Conch. 9. *t.* 124. *f.* 1089. α. β.
Habitat ad Minorcam *et* Jamaicam, *fluviatili affinis, at teſta magis oblonga et ovali, plus quam duplo minori, cingulis interdum moniliformibus albis, aut lineis longitudinalibus undulatis fuſcis picta, apertura ovata ampla, labio interiori pallidiori, vertice vix conſpicuo laterali.*

virginea. 42. N. teſta laevi ovata: labio interiori denticulato. *Muſ. Lud. Ulr.* 678. *n.* 391.*
Liſt. Conch. t. 606. *f.* 35-37.
Pet. gaz. t. 11. *f.* 3.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 204.
Bonann. recr. 3. *f.* 176-181?
muſ. Kircher. 3. *f.* 176-178. 180-182?
Argenv. Conch. t. 7. *f.* P.
Klein oſtr. t. 2. *f.* 32.
Seb. muſ. 3. *t.* 41. *utrinque ad n.* 1. 6. 5.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 292. *t.* 4. *f.* 14.
β) *Liſt. Conch. t.* 604. *f.* 24?

γ) *Liſt. Conch. t. 604. f. 25?*
δ) *Liſt. Conch. t. 604 f. 26?*
ε) *Liſt. Conch. t. 604 f. 27?*

Habitat in Indiae *et auſtralis* Americae *fluviis, teſta a piſi magnitudine ad pollicem usque longa alba, cineraſcente aut flavicante, punctis, maculis, lineis angulatis vel undulatis faſciisve nigris, faſciis, caeruleſcentibus, violaceis aut rubellis varia, vertice obtuſiſſimo elongato, apertura ovata, labio interiori nonnunquam laevi.*

polita. 43. N. teſta laevi: vertice obliterato, labio utroque dentato. *Muſ. Lud. Ulr. 678. n. 392.**
Liſt. Conch. t. 600. f. 17. et t. 602. f. 20.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. f. 221?
Rumpf muſ. t. 22. f. I. K. Nerita alpina.
Gualt. teſt. t. 66. f. D. F. G. H?
Argenv. Conch. t. 7. f. K.
Klein oſtr. t. 1. f. 29.
Seb. muſ. 3. t. 38. f. 56. et t. 59. f. 1-3.
Regenſ. Conch. 1. t. 4. f. 43.
Knorr Vergn. 3. t. 1. f. 4.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 17. f. 11-16.
Chemn. Conch. 5. t. 193. f. 2001-2014.
β) *Liſt. Conch. t. 603 f. 21?*
γ) *Gualt. teſt. t. 66. f.* E?
δ) *Gualt. teſt. t. 66. f.* I?
ε) *Gualt. teſt. t. 66. f.* L?
ζ) *Gualt. teſt. t. 66. f.* M?
η) *Seb. muſ. 3. t. 41. f. 27.*
ϑ) *Seb. muſ. 3. t. 59. f. 13.*
ι) *Seb. muſ. 3. t. 59. f. 14.*
κ) *Seb. muſ. 3. t. 59. f. 15.*
λ) *Seb. muſ. 3. t. 59. f. 17.*

Habitat in India, *in* Oceano *quoque auſtrali, teſta ovato ſolida, intus et exterius nitida, maculis, plumis, nebulis, faſciis cinereis, his quoque roſeis aut albis picta, vel ex albo nigroque varia, labio utroque eburneo, fauce utplurimum flava.*

Peloronta. 44. N. teſta ſtriata: labiis dentatis: interiore planiuſculo rugoſo. *Muſ. Lud. Ulr. 679. n. 393.**
Liſt. Conch. t. 595. f. 1.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 3. f. 214.
Gualt. teſt. t. 66. f. Z.

Argenv.

Argenv. Conch. t. 7. f. G. O.
Knorr Vergn. 5. t. 3. f. 2.
Mauſch. Naturf. 13. *p.* 84. *t.* 5. *f.* 4. *et* 4. h.
Chemn. Conch. 5. *t.* 192. *f.* 1977-1984.
Schroet. Journ. 5. *p.* 462. *f.* 16.
Habitat ad inſulas Americae *mediae et auſtrali obverſas, groſſae affinis, at teſtae colore rubro, ſulcis minus profundis, labio exteriore non crenato, interiore non convexo facile diſtinguenda, teſta rotundata alba, flavicante vel ſanguinea, maculis radiisve rubris, ſpadiceis, caeruleſcentibus vel nigris varia intus alba: apertura repanda, columella impreſſa: macula fauceque croceis.*

Albicilla. 45. N. teſta ſtriata: labiis ſubdentatis; interiore tuberculato. *Muſ. Lud. Ulr.* 679. *n.* 394.*
Liſt. Conch. t. 600. *f.* 16.
Rumpf muſ. t. 22. *f.* 8.
Argenv. Conch. t. 7. *f.* F.
Seb. muſ. 3. *t.* 41. *ſupra f.* 23. *et t.* 59. *f.* 16.
Knorr Vergn. 6. *t.* 13. *f.* 4.
Chemn. Conch. 5. *t.* 193. *f.* 2000. a-h.
Habitat ad caput bonae ſpei, *et in* mari indico, *teſta ſolida, oblonga, alba, rubella vel ſordide lutea, maculis nebulisve interdum faſciis nigris, flavicantibus aut rubellis varia, vertice laterali plano, apertura ampliſſima: fauce anguſta.*

Hiſtrio. 46. N. teſta ſulcata transverſeque ſtriata: labio interiore dentato. *Muſ. Lud. Ulr.* 680. *n.* 395.*
Liſt. Conch. t. 598. *f.* 11.
Knorr Vergn. 6. *t.* 13. *f.* 2.
Chemn. Conch. 5. *t.* 190. *f.* 1948. 1949. *et t.* 191. *f.* 1960. 1961.
Habitat - - - teſta coſtis 30 *inaequali, nunc pallide cinerea, faſciis* 3 *longitudinalibus fuſcis nunc rubicunda aut flaveſcente: faſciis transverſis flexuoſis albis, vertice obtuſiſſimo, labio exteriori glaberrimo.*

plicata. 47. N. teſta ſulcata: labiis dentatis: exteriore utrinque dentibus acutis conicis. *Muſ. Lud. Ulr.* 680. *n.* 396.*
Liſt. Conch. t. 595. *f.* 3.
Bonann. recr. 3. *f.* 386.
muſ. Kircher. 3. *f.* 371.
Gualt. teſt. t. 66. *f.* V.
Klein oſtr. t. 5. *f.* 100.

Seb. muſ. 3. *t.* 59. *f.* 18.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 17. *f.* 17. 18.
Schroet. inn. Bau Schneck. t. 1. *f.* 5.
β) *Mantiſſ. alt. p.* 551. Nerita lactaria.
Habitat in India, *teſta rotundata ſolida lactea interdum maculata, vertice utplurimum flavo, coſtis transverſis* 17-20, *apertura anguſta, labio exteriore intus dentibus* 5-6, *interiore convexo rugoſo tuberculato, dentibus praeter aliquot minores* 3 *longis, validis.*

groſſa. 48. N. teſta ſulcata: labiis dentatis; interiore convexo rugoſo. *Muſ. Lud. Ulr.* 681. *n.* 397.*
Rumpf muſ. t. 22. *f.* N.
Seb. muſ. 3. *t.* 41. *ad f.* 15.
Chemn. Conch. 5. *t* 191. *f.* 1968. 1969.
Schroet. Journ. 5. *p.* 465. *f.* 17.
Habitat rara ad inſulas Moluccas, *teſta rotundata alba venis nigris cinereisque varia, vertice prominulo, anfractu primo coſtis* 13-14, *labio exteriore exterius crenulato, intus dentato, interiore albo macula flava dentibus* 3-4.

Chamaeleon. 49. N. teſta ſulcata ſulcis viginti: labiis dentatis; interiore rugoſo tuberculato. *Muſ. Lud. Ulr.* 681. *n.* 398.
Rumpf muſ. t. 22. *f.* L. Nerita 3 undulata.
Gualt. teſt t. 66. *f.* X.
Argenv. Conch. t. 7. *f.* Q.
Knorr Vergn. 5. *t.* 15. *f.* 4.
Chemn. Conch. 5. *t.* 192. *f.* 1988-1991.
Habitat in mari indico, *teſta mediae magnitudinis, radiis undulatis nigris albisque alternis varia, aut flavicante nigro alboque undulata, ſubgloboſa, lineis ſubtiliſſimis coſtas inaequales decuſſantibus, vertice depreſſo laterali.*

undata. 50. N. teſta ſulcata ſulcis triginta: labiis dentatis; interiore rugoſo tuberculato. *Muſ. Lud. Ulr.* 682. *n.* 399.*
Liſt Conch. t. 596. *f.* 7.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 215.
Gualt. teſt. t. 66. *f.* P.
Chemn. Conch 5. *t.* 190. *f.* 1950. 1951.
Habitat in mari indico, *Chamaeleonti affinis, at teſtae ſolidae exalbidae cinereae aut rufeſcentis nigro cinereove maculatae faſciis hinc inde interruptis latioribus, vertice magis acuminato prominulo, coſtis complanatis circiter* 30 *cum ſulcis intermediis laevibus, columella alba.*

51. N.

exuvia. 51. N. teſta ſulcata: labiis dentatis; interiori tuberculato.
Muſ. Lud. Ulr. 682. *n.* 400.*
Liſt. Conch. t. 596. *f.* 5? *et t.* 599. *f.* 15.
Pet. gaz. t. 100. *f.* 6.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 220?
Gualt. teſt. t. 66. *f.* CC.
Argenv. Conch. t. 7. *f.* 1?
Seb. muſ. 3. *t.* 59. *f.* 4. 6-10.
Knorr Vergn. 3. *t.* 1. *f.* 5.
Chemn. Conch. 5. *t.* 191. *f.* 1972. 1973.
Habitat rarior in India, *teſta dilatata, ſolida, magna alba, maculis nigris, interdum caeruleſcentibus varia, coſtis latis complanatis* 15-19 *apertura ampla, columella plana.*

maxima. 52. N. teſta ſolida craſſa glaberrima radiis undulatis atris et flavicantibus picta: labio exteriore edentulo, interiore ſubconcavo quadridentato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 190. *f.* 1942. 1943.
Habitat - - - teſta inter congeneres maxima, intus et ad aperturam nivea, labio interiori laevi latiſſimo.

textilis. 53. N. teſta alba lineis angulatis nigris varia: coſtis ſulcisque ſedecim crenatis: labio exteriore exterius crenato intus dentato, interiore ſuperne rugoſo inferne tuberculato; palato dentato.
Rumpf muſ. t. 22. *f.* 3.
Chemn. Conch. 5. *t.* 190. *f.* 1944. 1945.
Habitat rariſſima - - -

atrata. 54. N. teſta aterrima glabra ſupra tenuiſſime ſtriata: labio utroque albo, exteriore intus ſubtiliter ſulcato ſubdentato, interiore concavo rugoſo tuberculato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 190. *f.* 1954. 1955.
Habitat in mari atlantico, americano, auſtrali.

aſcenſionis. 55. N. teſta ſulcis albis coſtisque albo maculatis ſedecim, vertice prominulo, labio exteriore utrinque glabro, interiore ſubconcavo flavicante dentato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 191. *f.* 1956. 1957.
Habitat ad inſulam aſcenſionis, *teſta ſatis magna, vertice utplurimum detrito, rarius nigro, operculo tenui pellucido.*

Lineata. 56. N. teſta intus labioque utroque albis, anfractibus teretibus ſtriis nigris parallelis cinctis: interſtitiis ſtriarum violaceis, labio exteriore intus ſtriato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 191. 1958. 1959.
Habitat rara in freto malacceuſi.

verſicolor. 57. N. teſta maculis quadratis nigricantibus, caeruleſcentibus, rubris albisque et faſciis rubro alboque maculatis varia: labio interiore intus ſtriato utrinque dentato.
Argenv. Conch. t. 7. *f. et* &c.
Chemn. Conch. 5. *t.* 191. *f.* 1962. 1963.
Habitat ad inſulas Antillas, *anfractibus teretibus, vertice prominulo, labio interiore ſuperne rugoſo, inferne quadridentato, dentibus mediis majoribus.*

Pica. 58. N. teſta alba exterius nigro radiata ſtriis transverſis rotundatis laevibus inaequali; labio interiore rugoſo quadridentato.
Rumpf muſ. t. 22. *f.* 4.
Chemn. Conch. 5. *t.* 191. 1964. 1965.
Habitat in mari indico, *vertice parum prominulo, labio exteriori extrinſecus crenato, intus ſtriato.*

coſtata. 59. N. teſta intus flavicante ſubgloboſa ſtriis craſſioribus cincta: interſtitiis niveis, labio utroque dentato, exteriore exterius crenato, interiore ſubconvexo rugoſo tuberculato.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 17. *f.* 19. 20.
Chemn. Conch. 5. *t.* 191. *f.* 1966. 1967.
Habitat rara ad inſulas Indiae nicobaricas, *teſta pulla aut picea: vertice obtuſiſſimo utplurimum detrito flavicante, aut albo, labiis albis.*

quadricolor. 60. N. teſta ſubviolacea apice flavicante intus alba ſtriis elevatis nigris: labio utroque dentato, exteriore intus ſulcato; interiore rugoſo.
Chemn. Conch. 5. *t.* 191. *f.* 1974. 1975.
Habitat in mari rubro, *teſta nonnunquam intus cum utroque labio flavicante.*

malaccenſis. 61. N. teſta ſulcata intus flavicante: vertice prominulo, labio exteriori inermi exterius crenulato, interiore flavicante laevi.
Chemn. Conch. 5. *t.* 192. *f.* 1976.
Habitat in freto malacceuſi.

62. N.

antillarum. 62. N. teſta ſubgloboſa nigra intus alba ſulcata ſtriataque: vertice obtuſo, labio utroque rugoſo denticulato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 192 *f.* 1987.
Habitat frequens ad inſulas Antillas.

flammea. 63. N. teſta ſubgloboſa confertim transverſe ſtriata alba: radiis undulatis purpuraſcentibus, labio utroque dentato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 192. *f.* 1992. 1993.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 192. *f.* 1994.
γ) *Chemn. Conch* 5. *t.* 192. *f.* 1995.
Habitat ad inſulas Americae mediae *obverſas, vertice prominulo, labio exteriori intus ſulcato, interiori ſuperne rugoſo, teſta in β) rubro obumbrata: radiis in atrum vergentibus, in γ) faſciata, faſciis partim lividis, partim rubro-punctatis.*

fulgurans. 64. N. teſta ſubgloboſa confertim transverſe ſtriata nigerrima: radiis ochroleucis: labio utroque ſubdenticulato; interiore medio tuberculato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 192. *f.* 1996. 1997.
Habitat ad inſulas Americae *obverſas, vertice vix prominulo, labio exteriore intus ſulcato; margine crenato albo nigroque vario, ad latus denticulato, altero ſubconcavo, medio tuberculato, inferne ſubdentato.*

teſſellata. 65. N. teſta obtuſa transverſim ſtriata: ſtriis maculis ſubquadratis albis nigrisque, labio utroque denticulato.
Adanſ. Seneg. 1. *p.* 190 *t.* 13. *f.* 2. Tadin?
Chemn. Conch. 5. *t.* 192. *f.* 1998. 1999.
Habitat ad inſulas *inter* Africam *et mediam* Americam *interſitas, teſta mediae magnitudinis, labio exteriori intus vix ſtriato dentibus* 1-2, *interiore concava glabra inferne denticulata.*

bifaſciata. 66. N. teſta nigricante; faſciis duabus canis, vertice albo.
Rumpf muſ. t. 22. *f.* 7.
Chemn. Conch. 5. *t.* 193. *f.* 1015.
Habitat in India, *an diſtincta hujus tribus ſpecies?*

litterata. 67. N. teſta ſubgloboſa alba characteribus inſcripta; labio interiori crenulato dentato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 193. *f.* 2016.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 193. *f.* 2018.
Habitat rara in India, *β) teſta faſciata, faſciis ex lineis parallelis conſtatis.*

68. N.

violacea. 68. N. teſta ovata violacea albo punctata ſolida laevi: labio interiori inferne denticulato.
Meuſchen Naturf. 13. *p.* 81. *t.* 5. *f.* 2. 2. c. d. e. f.
Martin. Conch. 1. *t.* 13. *f.* 133. 134.
β) *Meuſch. Naturf.* 13. *p.* 84. *t.* 5. *f.* 3. 3. g.
Habitat rara - - - teſta rarius rubra vel exalbida, in β) alba maculis ſpadiceis nigro variis, ſubtus obſcuriore, nonnunquam ex atro cinerea aut alba.

ſenegalenſis. 69. N. teſta ovata obtuſa ſolida nigerrima intus alba ſulcata: labio utroque dentato.
Adanſ. Seneg. 1. *p.* 188. *t.* 13. *f.* 1. Dunar.
Habitat in Senegalia, *teſta pollicem lata, dimidio breviori, anfractibus tribus, primo turgido ſulcis* 25-30 *exarato,* 2 *reliquis minimis.*

promontorii. 70. N. teſta atra ovato acuminata: ſulcis triginta.
Adanſ. Seneg. 1. *p.* 191. *t.* 13. *f.* 3. Lagar.
Habitat rarior ad littus Africae *inter promontoria* Manuel *et* viride, *teſta duplo latiori, quam longa, interdum albo varia, vertice anfractibus* 3 *conſtato, labio ſiniſtro rugoſo.*

tricolor. 71. N. teſta rubro nigro albidoque varia: anfractu primo ſtriis quindecim elevatis, labio utroque dentato.
Adanſ. Seneg. 1. *p.* 191. 192. *t.* 13. *f.* 4. Selot.
Habitat ad Africae *littus occidentale, teſta* 9 *lineas longa, labio dextro dentibus* 10, *ſiniſtro glabro magnis* 3 *emarginatis ſubbifidis exaſperata.*

perverſa. 72. N. teſta cingulata: ſpira contraria, apertura octodentata.
Walch Naturf. 6. *p.* 165.
Schmidel Vorſt. v. Verſt. Fortſ. p. 41. *t.* 23. *f.* 1-3.
Chemn. Conch. 9. *t.* 114. *f.* 975. 976.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis.

turrita. 71. N. teſta alternatim albo nigroque faſciata intus alba: vertice valde elata, labro acuto. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 124. *f.* 1085.
Habitat in inſularum antillarum *aquis dulcibus, anfractibus quatuor.*

aculeata. 72. N. teſta nigreſcente transverſim ſtriata: ſtriis ſpinoſis, labio planiuſculo laevi ſubdentato. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 305. *t.* 169. *f.* 1642.
Habitat in Indiae *fluviis, pulligerae affinis.*

330. HALIOTIS. *Animal* Limax.
Teſta auriformis, patens: ſpira occultata laterali; diſco longitudinaliter poris pertuſo.

Midae. 1. H. teſta ſubrotunda utrinque nitida. *Muſ. Lud. Ulr.* 683. *n.* 401.*
Liſt. Conch. t. 613. *f.* 5.
Gualt. teſt. t. 69. *f.* B.
Valent. Abh. t. 12. *f.* 102.
Knorr Vergn. 5. *t.* 20. *f.* 3?
Martin. Conch. 1. *t.* 14. *f.* 136. *et t.* 15. *f.* 141.
Habitat in mari indico *et ad* caput bonae ſpei, *teſta ad* 7 *et* 9 *pollices longa craſſa intus eximie margaritacea, exterius dorſo longitudinaliter undulatim rugoſa, ſordide viridi, utplurimum ſordibus marinis obducta, poris* 8-10.

tuberculata. 2. H. teſta ſubovata: dorſo transverſim rugoſo tuberculato. *Fn. ſuec.* 2. 2198. *Müll. zool. dan. prodr.* 2876.
Fn. ſuec. 1. 1326. Haliotis ſtriata rugoſa.
Rondel. piſc. 5. Auris marina.
Geſn. aq. 807. 808. Patella major ſ. fera.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 2. *f.* 1. Ormier.
Bellon. aq. 395.
Aldrov. exang. 551. *f.* 1. 2.
Liſt. Conch. t. 611. *f.* 2.
an. angl. t. 3. *f.* 16.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 1. *f.* 10. 11.
Rumpf muſ. t. 40. *f.* H.
Gualt. teſt. t. 69. *f.* I.
Ginann. adr. 2. *t.* 3. *f.* 27.
Argenv. Conch. t. 3. *f.* A. F.
zoomorph. t. 1. *f.* C.
Bytem. app. t. 11. *f.* 42.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 20.
Martin. Conch. 1. *p.* 174. *vign.* 6. *et t.* 15. 16. *f.* 145-149.
β) *Regenſ. Conch.* 1. *t.* 10. *f.* 42.
γ) *Argenv. zoomorph. t.* 1. *f.* D.
δ) *Argenv. Conch. t.* 3. *f.* D.
Habitat frequens in Oceano europaeo, mari adriatico, atlantico, indico, *teſta* 4-5 *pollices longa, dorſi rugis undula-*

dulatis, poris circiter 28, *quorum* 4 *aut plures aperti, tuberculis inaequalibus, interdum obſoletis.*

ſtriata. 3. H. teſta ovata ferruginea transverſim rugoſa longitudinaliter ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 684. *n.* 403.*
Knorr Vergn. 1. *t.* 17. *f.* 2. 3.
Martin. Conch. 1. *t.* 14. *f.* 138.
β) *Gualt. teſt. t.* 69. *f.* E.
γ) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 387. *t.* 4. *f.* 17.
Habitat in Aſia, *et* Barbaria *tuberculatae affinis, at teſta utplurimum minore rugis non tuberculatis et magis regularibus exarata, albo maculata ferruginea, rubra, viridi, aut rubro viridique varia, poris circiter* 38, *elevatis, quorum* 4-5 *aperti.*

varia. 4. H. teſta ovata: ſtriis longitudinalibus; majoribus tuberculatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 684. *n.* 404.*
Liſt. Conch. t. 612. *f.* 4?
Rumpf muſ. t. 40. *f.* G.
Gualt. teſt. t. 69. *f.* L. M.
Klein oſtr. t. 7. *f.* 113?
Martin. Conch. t. 15. *f.* 144.
Habitat rara in India, *teſta alba vel flaveſcente fuſco vel ſordide viridi-nebuloſa, ſtriis elevatis arcuatis parallelis ſpiram verſus majoribus inaequali, poris* 20-30, 4-5 *apertis, margine inaequali.*

marmorata. 5. H. teſta ovali: ſtriis longitudinalibus; transverſis obſoletis. *Muſ. Lud. Ulr.* 685. *n.* 405.*
Liſt. Conch. t. 614. *f.* 6.
Gualt. teſt. t. 69. *f.* A. C.
Argenv. Conch. t. 3. *f.* B.
Knorr Vergn. 2. *t.* 17. *f.* 4. 5.
Martin. Conch. 1. *t.* 14. *f.* 139.
Habitat in mari africano *et* indico, *teſta utplurimum* 2½, *interdum* 4 *pollices longa infra poros circiter* 30, *quorum* 4-5 *aperti, excavata, fuſco, alboque, vel fuſco albo viridique, vel fuſco albo viridi rubroque varia, ſtriis longitudinalibus ſemilunaribus ſubtilibus.*

aſinium. 6. H. teſta laeviuſcula oblonga: margine ſubfalcato, dorſo nervis elevatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 685. *n.* 406.*
Liſt. Conch. t. 610. *f.* 1.

Rumpf

Haliotides *ſibi valde ſimilis, hinc ſynonyma obſcuriora.*

Rumpf muſ. t. 40. f. E. F.
Gualt. teſt. t. 69. f. D.
Argenv. Conch. t. 3. f. E.
Regenſ. Conch. 1. t. 9. f. 29.
Knorr Vergn. 3. t. 15. f. 1.
Martin. Conch. 1. t. 16. f. 150.
Habitat rara in India, *teſta vix ultra 3 pollices longa, ſtriis longitudinalibus ſubtiliſſimis notata exterius viridi fuſco alboque varia, intus ex viridi margaritacea ſtriata, poris circiter 30 elevatis, quorum 5-7 aperti, ſtriis omnibus ſpirae propinquis granulatis, ſaepius rubro-punctatis.*

parva. 7. H. teſta ovata rubra: ventre angulo elevato. *Muſ. Lud. Ulr. 686. n. 407.**
Knorr Vergn. 1. t. 20. f. 5.
Murray teſtac. t. 1. f. 25?
Martin. Conch. 1. t. 14. f. 137? 140.
Habitat in mari africano *et* indico, *teſta interdum flavicante, decuſſatim ſtriata, poris 30 approximatis, 5-6 apertis, plicis transverſis rarioribus planioribus, ſtriis obliquis crebrioribus magis elevatis.*

biſtriata. 8. H. teſta ovata vireſcente fuſco maculata: ſtriis transverſis elevatis duplicibus.
Liſt. Conch. t. 612. f. 3?
Martin. Conch. 1. t. 15. f. 142.
β) *Martin. Conch. 1. t. 15. f. 143.*
Habitat rara in mari africano, *teſta intus argentea, exterius ſub ſpira macula dilute purpurea, ex qua radii quidam arcuati ejusdem coloris per dorſum decurrunt, margine dextro acuto ſinuoſo, poris apertis 6.*

auſtralis. 9. H. teſta cano caeruleſcente rubroque varia ovata convexa cancellata: ſpira prominente inflata.
Spengl. Naturf. 9. p. 150. t. 5. f. 1. a. b.
Abh. n. danz. Geſ. 1. p. 264. n. 27.
Chemn. Conch. 10. t. 166. f. 1603. 1604.
Habitat ad novam Seelandiam, *teſta* $3\frac{1}{4}$ *pollicem longa,* $2\frac{1}{4}$ *lata, intus ex flavo rubroque margaritacea poris apertis 7-9 approximatis, orbicularibus, plicis transverſis elevatis.*

guineenſis. 10. H. teſta ovata ſubconvexa ſolida decuſſatim ſtriata.
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 388. t. 4. f. 18.
Habitat rara ad Guineae littora, *teſta* $2\frac{1}{4}$-$2\frac{3}{4}$ *pollicis longa,* $1\frac{1}{2}$-2 *lata obſcure viridi albo maculata ad ſpiram ſpadicea,*

cea, interdum viridi rubro alboque varia, intus ex rubro viridique margaritacea, ſtriis longitudinalibus arcuatis aequalibus, transverſis binis ternisve parallelis margine acuto recto, poris complanatis, 6 apertis.

imperforata. 11. H. teſta ovata imperforata coſtata: coſtis aculeatis, ſpira exſerta.
Meuſchen Naturf. 18. *p.* 19. *t.* 2. *f.* 18. 18. e.
Helblins Abh. boehm. Privatg. 4. *p.* 124. *t.* 2. *f.* 34. 35? Stomatia Phymotis.
Chemn. Conch. 10. *t.* 166. *f.* 1600. 1601.
Habitat rariſſima in India, *teſta ultra pollicem longa, et ultra dimidium lata, cinerea, coſtarum ſpinis mediis validioribus, margine ſatis tenui acuto.*

perverſa. 12. H. teſta ovata imperforata: margine ſuperne obliquo, interius tuberculato, ſpira perverſa.
Martin. n. Mannigf. 4. *p.* 404. *t.* 1. *f.* 3.
Gualt. teſt. t. 69. *f.* M?
Habitat - - - foſſilis, teſta ¾ pollicis longa, ½ lata, minore ad latus acuta; an vere hujus generis et ordinis?

plicata. 13. H. teſta dorſo transverſim plicato, margine lato craſſo longitudinaliter ſubtiliſſime ſtriato.
Schroet. Einl. in Verſtein. 4 *p.* 278. *t.* 3. *f.* 9.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis reperta prope Hildeſiam, *teſta violenter compreſſa, ¼ pollicis longa, ½ lata, ſpirae anfractibus* 3-4.

glabra. 14. H. teſta ovata laeviuſcula ſolida viridi alboque varia: ſpira humili. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 311. *t.* 166. *f.* 1602.
Habitat - - - teſta 5 lineas ultra 2 pollices longa, 9 ultra pollicem lata, labio interiori latiſſimo, foraminibus perviis 6, ſtriis nonnullis transverſis prope ſpiram, aliisque longitudinalibus pone poros.

pulcerrima. 15. H. teſta ſubrotunda roſeo alboque varia: ſtriis granulatis, ſpira exſerta. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 313. *t.* 166. *f.* 1605. 1606.
Martyn univ. Conch. 2. *t.* 62.
Habitat rariſſima ad inſulas Oceani auſtralis, *teſta ultra 7 lineas longa, intus argentea, margine interiori latiſſimo, labio exteriori crenato, poris* 30, *quorum 6 pervii.*

virginea. 16. H. teſta ovata decuſſatim undulato-ſtriata, obſcure viridi maculis faſciisque albidis varia, intus coloribus iridis ſplendente. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 314. *t.* 166. *f.* 1607. 1608.

Habitat

Habitat ad novam Seelandiam, *teſta pollicem lata, et 6 lineas longiore, poris perviis 6.*

ovina. 17. H. teſta ſuborbiculari depreſſa rugoſa albo ſpadiceo et flavicante varia: medio poris pertuſo, ſpira aperta. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 315. *t.* 166. *f.* 1609.

Habitat - - - circulo triplici elevato, ſimilique tuberculis obſeſſo pone rugas, labio interiore lato.

gigantea. 18. H. teſta ovali rugoſa rubro alboque varia maculata intus margaritacea: ſpira depreſſa. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 315. *t.* 167. *f.* 1610. 1611.

Martyn Conchol. 2. *f.* 63. Frechled Ear.

Habitat rariſſima ad novam Hollandiam, *teſta* $4\frac{1}{2}$ - 6 *pollices longa*, $3\frac{1}{2}$ *lata, plicis undulatis ſtriisque longitudinalibus rugas transverſas decuſſantibus, vittis quaſi arcuatis albis varia, poris perviis* 3 - 7, *labii interni margine latiſſimo.*

Iris. 19. H. teſta ventricoſa ex fuſco fluvida rugis transverſis plicisque tuberoſis longitudinalibus ſcabra, intus iridis coloribus coruſcante. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 317. *t.* 167. *f.* 1612. 1613.

Favann. Conchyl. 1. *p.* 585. *t.* 79. *f.* D. Oreille de mer de la nouvelle Zelande.

Martyn Conchol. 2. *t.* 61. Iris Ear.

Habitat ad novam Seelandiam, *pretioſa, teſta* $4\frac{1}{2}$ *pollices longa*, 3 *lata, intus coloribus pulcherrimis variantibus rutilante, poris perviis* 6.

331. PATELLA. *Animal* Limax. *Teſta* univalvis ſubconica absque ſpira.

* Labiatae *ſ. labio interno inſtructae, teſta integra.*

equeſtris. 1. P. teſta orbiculata exterius perfoliata: labio fornicali perpendiculari. *Muſ. Lud. Ulr.* 687. *n.* 408.*

Argenv. Conch. t. 2. *f.* K. Cabochon.

Liſt. Conch. t. 546. *f.* 38.

Rumpf muſ. t. 40. *f.* P. Q.

Gualt. teſt. t. 9. *f.* 7.

Knorr Vergn. 6. *t.* 22. *f.* 1. *et t.* 35. *f.* 4. 5.

Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 5.

Spengl. Naturf. 9. *t.* 3. *f.* 1. 2.
Martin. Conch. 1. *t.* 13. *f.* 117-120. 125. 126.
β) *Chemn. Conch.* 10. *p.* 337. *t.* 168. *f.* 1630. 1631. Patella Teotum ſinenſe.
Argenv. Conch. t. 2. *f.* 5.
da Coſta Conchol. t. 6. *f.* 9.
Knorr Vergn. 6. *t.* 35. *f.* 4.
Favann. Conch. 1. *t.* 4. *f.* B¹.
Habitat in mari indico *et* Americam mediam *alluente, teſta diametri rarius pollicem ſuperantis conica oblique quaſi truncata, hyalina, plicis, rugis, ſtriis huc illuc decurrentibus potiſſimum verſus marginem inferiorem inaequali, labio libero pauliſper obliquo altera parte aperto in centro verticis poſito, altera* ¼ *pollicis longo, canalem referente.*

neritoidea. 2. P. teſta ovata apice ſubſpirali: labio laterali. *Muſ. Lud. Ulr.* 688. *n.* 409.*
Liſt. Conch. t. 545. *f.* 36?
Walch Naturf. 10. *p.* 75. *t.* 1. *f.* 1? 2?
Meuſchen Naturf. 13. *p.* 79. *t.* 5. *f.* 1? 1a? 1b?
Schroet. n. Litterat. 2. *p.* 301.
Habitat - - - aliis teſtaceis adhaerens incola rubro, teſta ceraſi magnitudine, utplurimum minore, exalbida, glabra, adultiori, rugis nonnullis transverſis inaequali, vertice valvulaque interna ſubrepanda lateralibus.

ſinenſis. 3. P. teſta ſubconica laevi: labio ſublaterali. *Muſ. Lud. Ulr.* 688. *n.* 410.*
Argenv. Conch. t. 2. *f.* F. Mitella chinenſis.
Liſt. Conch. t. 546. *f.* 39.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 1. *f.* 12.
Gualt. teſt. t. 9. *f.* X.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. p. 414. *vign. f.* a. b.
Martin. Conch. 1. *t.* 13. *f.* 121-124.
β) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 22. *f.* 1.
Habitat in mari mediterraneo, atlantico, indico, *rarior, teſta tenuiſſima, pellucida, glabra, latiori quam alta, vertice acuto ſubflexuoſo, labio concavo depreſſo, teſta utplurimum alba: maculis, rarius radiis fuſcis, interdum ſpadicea, hinc inde quaſi cinere conſperſa.*

Porcellana. 4. P. teſta ovali apice recurva: labio poſteriori plano. *Muſ. Lud. Ulr.* 689. *n.* 411.*
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 2. *f.* 8. Sulin.
Liſt. Conch. t. 545. *f.* 34.

Rumpf muſ. t. 40. *f.* O.
Martin. Conch. t. 13. *f.* 27. 28.
Chemn. Conch. 9. *t.* 124. *f* 1082.
Habitat rara in India *et ad* inſulam Goream, *teſta convexa intus alba, exterius rubra maculis ſquamoſis albis et lineis transverſis undulatis caeruleis varia, nonne potius ad neritas amandanda?*

fornicata. 5. P. teſta ovali poſterius oblique recurva: labio poſteriori concavo.
Liſt. Conch. t. 545. *f.* 33. 35.
Argenv. Conch. t. 2. *f.* N.
Muſ. Gottwald. t. 40. *f.* 275. a. b.
Knorr Vergn. 6. *t.* 21. *f.* 3.
Walch Naturf. 10. *p.* 78. *t.* 1. *f.* 3. 4.
Martin. Conch. 1. *t.* 13. *f.* 129. 130.
β) *Kaemmer. Cab. Rudolſt. p.* 25. *t.* 2. *f.* 9.
γ) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 504. *t.* 6. *f.* 10.
δ) *Liſt. Conch. t.* 545. *f.* 37.
Klein oſtr. t. 8. *f.* 8.
ε) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 11. *f.* 5?
Habitat ad Barbados, Iliam *et alibi in* mari mediterraneo, *teſta utplurimum alba margine ſpadicea, interdum exalbida: radiis dorſalibus maculisque lateralibus ex luteo fuſcis, rarius unicolore rubella aut ſpadicea, margine acuto, labio prominente, anterius ſemilunari.*

aculeata. 6. P. teſta ovali fuſca ſtriis aculeatis exaſperata: vertice recurvo.
Chemn. Conch. 10. *p.* 334. *t.* 168. *f.* 1624. 1625.
da Coſta Conchol. t. 6. *f.* 1.
Elem. of Conch. t. 2. *f.* 2.
Favann. Conch. 1. *t.* 4. *f.* 3.
Walch Naturf. 10. *t.* 1. *f.* 5.
β) *Favann. Conch.* 1. *t.* 4. *f.* 2?
Habitat paulo rarior ad inſulas Americae mediae *obverſas, fornicatae affinis, teſta utplurimum parva ſpadicea, aut alba, ſtriis per longitudinem decurrentibus, labio albo cavitatem internam in partes aequales diſpeſcente.*

trochiformis. 7. P. teſta conica longitudinaliter plicata: labio interno laterali.
Chemn. Conch. 10. *p.* 335. *t.* 168. *f.* 1626. 1627.
da Coſta Conchol. t. 6 *f.* 2.
Knorr Vergn. 3. *t.* 29. *f.* 1. 2?
Favann. Conch. 1. *p.* 551. *t.* 4. *f.* A. 1.
Meuſch. Naturf. 18. *t.* 2. *f.* 16. 17.

β) Argenv. Conch. t. 2. f. L.
Martin. Conch. 1. *t.* 13. *f.* 135.
Habitat ad Tranquebar *et* inſulas Falkland, *teſta utrinque alba, tenui, ad baſin latiori quam alta, plicis obliquis.*

Auricula. 8. P. teſta ſubrotunda radiatim ſulcata et ſtriata apice recurva: cavitate interna auriculari. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 336. *t.* 168. *f.* 1628. 1629.
Pet. gaz. 1. *t.* 21. *f.* 11.
da Coſta Conchol. t. 6. *f.* 10.
Favann. Conch. 1. *p.* 559. *t.* 4. *f.* C. 2.
Habitat ad inſulas Borneo, S. Crucis *et* Thomae, *teſta nivea, nunc circa verticem violacea, nunc nigro radiata, nunc intus fuſca, margine modo alba, vertice fuſco, limbo flavicante.*

inaequalis. 9. P. teſta ovata tenui hyalina obſolete transverſim rugoſa: margine inaequali: labio inaequaliter repando hyalino.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 6. *t.* 1. *f.* 1. 2.
Habitat ad Sinam, *buccino ſpirato innidularis, teſta ſiniſtrorſum ultra dimidium pollicem longa, vertice obſoleto.*

goreenſis. 10. P. teſta ovali plana tenui alba nitida, exterius lamelloſa.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 2. *f.* 10. Jenac.
Martin. Conch. 1. *t.* 13. *f.* 131. 132.
Habitat rara ad rupes maritimas inſulae Goreae, *teſta diametri* 5-6 *linearum.*

contorta. 11. P. teſta albo-granulata ſubtiliſſime perpendiculariter oblique coſtata: labio tenuiſſimo dimidiato obliquo.
Walch Naturf. 9. *p.* 199. *t.* 3. *f.* 3. 4.
Meuſch. Naturf. 18. *p.* 16. *t.* 2. *f.* 14.
Martin. neueſt. Mannigf. 1. *p.* 405. *t.* 1. *f.* 3. 4.
β) Martin. neueſt. Mannigf. 1. *p.* 406. *t.* 1. *f.* 5. 6.
Habitat rariſſima - - - teſta ex albo coriacea, intus nitide dilute fuſca.

depreſſa. 12. P. teſta alba ſubtiliſſime ſtriata pone verticem cernuum dilatatum depreſſa.
Meuſch. Naturf. 18. *p.* 14. *t.* 2. *f.* 11. *et* 11. c.
Habitat - - -

plicata. 13. P. teſta conica ochroleuca intus ferrugineo radiata: plicis longitudinalibus transverſim ſtriatis.
Meuſch. Naturf. 18. *p.* 15. *t.* 2. *f.* 12. 12. a.
Habitat - - - vertice medio, margine tenui, acuto.

14. P.

ſtriata. 14. P. teſta alba conica ſtriata undulatim ſulcata: vertice ſublaterali.
Meuſch. Naturf. 18. *p.* 16. *t.* 2. *f.* 13.
Habitat - - - plicatae affinis.

Solea. 15. P. teſta ſubtortuoſa pellucida ferrugineo maculata tenuiter plicata ſupra transverſim ſulcata, labio undulatim repando.
Meuſch. Naturf. 18. *p.* 14. *t.* 2. *f.* 15. *et* 15. b.
Habitat - - - teſta dimidio pollice paulo longiore.

echinata. 16. P. teſta conica echinata intus glaberrima.
Martin. neueſt. Mannigf. 1. *p.* 407. *t.* 1. *f.* 7. 8.
Habitat - - - foſſilis hactenus modo prope Crignon *reperta, teſta calcarea albida, tota exterius aculeis horrida.*

** Dentatae *baſi ſ. margine angulatae.*

Crepidula. 17. P. teſta ovali planiuſcula laevi: labio poſterius plano. *Muſ. Lud. Ulr.* 689. *n.* 412.*
Gualt. teſt. t. 69. *f.* H. Crepidula Michelii.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 2. *f.* 9? Garnot.
Habitat in mari mediterraneo, *potiſſimum ad* Barbariam, *fornicatae affinis, teſta hyalina ſubdepreſſa, labio ſemilunari.*

laciniosa. 18. P. radiis elevatis inaequalibus: extrinſecus craſſioribus obtuſis.
Rumpf muſ. t. 40. *f.* C.
Knorr Vergn. 6. *t.* 30. *f.* 2-4. 7. 8.
Argenv. Conch. t. 2. *f.* O.
Martin. Conch. 1. *t.* 10. *f.* 81.
Habitat in maris indici *ſcopulis, teſta fuſca inter radios transverſim ſtriata: radiis ipſis albis, margine repando, vertice lato, oculos quaſi binos albos referente.*

ſaccharina. 19. P. teſta angulata: coſtis ſeptenis carinatis obtuſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 690. *n.* 413.*
Argenv. Conch. t. 2. *f.* M. Aſterolepas.
Liſt. Conch. t. 532. *f.* 10.
Rumpf muſ. t. 40. *f.* B.
Petiv. amb. t. 3. *f.* 3.
Klein oſtr. t. 8. *f.* 4.
Murray teſtac. t. 1. *f.* 6.
Martin. Conch. 1. *t.* 9. *f.* 70. 75? 76. 77.
Habitat ad inſulas Javam *et* Barbados, *teſta intus alba, ceterum nunc unicolore, nunc radiata, nunc maculata, nunc*

faſciata, ſolida, nunc magis, nunc minus depreſſa, vertice obtuſo ſublaterali, radiis utplurimum marginem ſuperantibus, inter majores ſeptem utplurimum 4 minoribus.

barbara. 20. P. teſta dentata: coſtis novemdecim elevatis fornicato-muricatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 690. *n.* 414.*
Knorr Vergn. 5. *t.* 13. *f.* 5.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 405. *t.* 5. *f.* 1.
Habitat ad inſulas Falkland, *teſta alba, extrinſecus interdum fuſcata late radiisque fuſcis picta, convexa, inter coſtas* 19 *majores minoribus interſitis.*

granularis. 21. P. teſta dentata: ſtriis elevatis angulatis imbricatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 691. *n.* 415.*
Liſt. Conch. t. 536. *f.* 15.
Bonann. muſ. Kircher. 1. *f.* 22.
Gualt. teſt. t. 8. *f.* D.
Argenv. Conch. t. 2. *f.* H.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 24.
Martin. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 61.
Schroet. n. Litterat. 3 *p.* 19-24. *n.* 42-50. 53.
Habitat ad littora Europae *auſtralis, et ad* promontorium bonae ſpei, *teſta ad* 2 *usque pollices longa utplurimum lactea vertice fuſco, interdum fuſca radiis albis vertice dilutius fuſco ochroleuco marginato, rarius caeruleſcente faſciis* 2 *albis et vertice fuſco, teſta ceterum oblonga, convexa, antrorſum latiori, inter binas ſtrias laeves tribus granulatis interſitis: granulis cinereis, fuſcis aut nigris.*

granatina. 22. P. teſta angulata: ſtriis numeroſis muricatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 691. *n.* 416.*
Liſt. Conch. t. 533. *f.* 12. *et t.* 534. *f.* 13.
Bonann. muſ. Kircher. 1. *f.* 27. 28. 30.
Gualt. teſt t. 9. *f.* F.
Argenv. Conch. t. 2. *f.* G.
Knorr delic. t. B. V. *f.* 8.
Vergn. 1. *t.* 30. *f.* 2.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 9. *f.* 31.
Martin. Conch. 1. *t.* 9. *f.* 71-74.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 26-40. *n.* 54-78.
Habitat ad Jamaicae *et auſtralis* Europae *littora, teſta tenui extrinſecus alba, fuſceſcente, cornea, luteſcente maculis, lineis, ſquamis obſcurius vel dilutius fuſcis, rarius ſpadiceis, nunc confertis, nunc rarioribus, nunc ſparſis, nunc ordi-*

ordinatis picta, vertice fuſco, intus eburnea margine fuſco luteoque maculato vertice fulvo, ferrugineo vel fuſco flavicante marginato, aut variegata, 1¼-3 pollices longa, antrorſum latiore, ſtriis tenuiſſimis transverſis undulatis, coſtis inaequalibus ad 60 usque.

vulgata. 23. P. teſta ſubangulata: angulis quatuordecim obſoletis, margine dilatato acuto. *Fn. ſuec.* 2199.*
Liſt. anim. angl. t. 5. *f.* 40.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 1. *f.* 4.
Knorr Vergn. 6. *t.* 27. *f.* 8.
Gualt. teſt. t. 8. *f.* Q.
Ginann. adr. 2. *t.* 2. *f.* 17.
Martin. Conch. 1. *t.* 5. *f.* 38.
β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 62. *n.* 117.
γ) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 27. *f.* 8.
Habitat in Oceani indici *et* europaei maris *quoque* mediterranei *ſcopulis, teſta cinerea aut nivea: faſciis* 4 *ferrugineis picta, fundo plumbeo vel ſanguineo-maculato, ultra* 2 *pollices alta, diametri* 4 *interdum pollices ſuperantis, coſtis numero et altitudine inaequalibus.*

caerulea. 24. P. teſta eroſo-ſubangulata: ſtriis numeroſis inaequalibus, ſubtus caerulea.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 18. *f.* 2?
Habitat in mari mediterraneo, *teſta ovata, convexa, exterius nigricante.*

tuberculata. 25. P. teſta ſubdentata conica tuberculata poſterius retuſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 692. *n.* 417.*
Habitat - - - teſta flaveſcente: tuberculis albis ſeriatis.

Lepas. 26. P. teſta ſubrotunda pectinata: radiis imbricatis tuberculatis transverſim ſtriatis, vertice incurvato.
Argenv. Conch. t. 2. *f.* D.
da Coſta Conchol. p. 12. *t.* 2. *f.* 7. *et t.* 5. *f.* 9.
Favann. Conchyl. 1. *p.* 543. *t.* 4. *f.* H².
Chemn. Conch. 10. *p.* 322. *vign.* 25. *f.* A. B.
β) *Bronze Limpet. Martyn univ. Conch.* 1. *t.* 17.
Habitat rariſſima ad Chili *littora,* β) *ad* inſulas Falkland, *teſta ſolida, exterius ex flavicante ſubſpadicea, ad* 2 *pollices* 2 *lineas longa, et* 3 *pollices* 8 *lineas lata, marginis altera parte laevi, altera tumida, inaequaliter dentata.*

tricoſtata. 27. P. teſta ovali tricoſtata alba ad latera ſtriata: margine interno planiuſculo ſublacero.

Chemn. Conch. 10. *p.* 333. *t.* 168. *f.* 1622. 1623.

β) *v. Born muſ. Caeſ Vindob. teſt. t.* 18. *f.* 6?

γ) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 495. *n.* 130?

Habitat rara in mari indico, *tricarinatae affinis, teſta ſolida; vertice mucronato, recurvo.*

mytilina. 28. P. teſta carinata antrorſum rotundata undulatim ſtriata fuſca intus margaritacea: margine poſteriori crenato.

Favart d'Herbign. dictionn. 2. *p.* 238. 239.

Martin. neueſt. Mannigf. 1. *p.* 417. *t.* 2. *f.* 13. 14.

Helbling Abh. boehm. Privatgeſ. 4. *p.* 104. *t.* 1. *f.* 5. 6.

Habitat ad Americae *auſtralis littora, teſta* 2 *lineas ultra pollicem longa.*

depreſſa. 29. P. teſta dentata ovali compreſſo-conica coſtata alba inter coſtas fuſca intus fuſca ſulcis albis.

Helbling Abh. der boehm. Privatgeſ. 4. *p.* 108. *t.* 1. *f.* 9. 10.

Habitat - - - teſta 9 *lineas longa,* 6 *lata, coſtis circiter* 40 *inaequalibus.*

ſtellata. 30. P. teſta angulata ovata depreſſa: radiis decem elevatis; intermediis coſtis brevioribus.

Helbling Abh. boehm. Privatg. 4. *p.* 109. *t.* 1. *f.* 11.

Habitat rarior - - - ſaccharinae affinis, teſta tenui, 8 *lineas longa,* 6 *lata, fuſca coſtis albis, intus nivea, fundo fuſco.*

islandica. 31. P. teſta ſolida ovata gibba inaequaliter coſtata intus glabra radiis alternis cinereis et corneis picta margine crenata.

Kaemmer. Cabin. Rudolſt. p. 15. *t.* 3. *f.* 6.

Habitat ad Islandiae *littora, teſta* 4 *lineas ultra pollicem longa, vertice fere medio intus caeruleo albo marginato, coſtis imbricatis.*

cypria. 32. P. teſta ovali ſubpellucida coſtata: coſtis hinc inde tuberculatis extrorſum foliaceis.

Bonann. recr. et muſ. Kirch. 1. *f.* 5.

Gualt. teſt. t. 9. *f.* H.

Martin. Conch. 1. *t.* 9. *f.* 79.

β) *Argenv. Conch. t.* 2. *f.* B.

Martin. Conch. 1. *t.* 10. *f.* 85.

Habitat ad Cypri *littora, barbarae proxime affinis, teſta* $1\frac{1}{4}$-$2\frac{1}{4}$ *pollicis longa, alba, margine interno cinereo, aliquando*

quando faſcia lata alba, vertice annulo fuſco cincto, coſtis 16-20 *et ultra.*

coſtata. 33. P. teſta ovata ſubgibba alba coſtata: coſtis confertis inaequalibus tuberculato rugoſis.

Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 12. *n.* 27.

β) *Schroet. n. Litter.* 3. *p.* 12. *n.* 28.

γ) *Schroet. n. Litter.* 3. *p.* 13. *n.* 29.

Habitat - - - teſta 2-2½ *pollices longa, coſtis elevatis carinatis* 20-40, *faſcia interdum interna fundo propinqua cana, aut luteſcente ferrum equinum referente, ſulcis inter coſtas intermediis in γ) fuſcis.*

leucopleura. 34. P. teſta ovata obſcura: coſtis confertis albis laevibus inaequalibus.

Liſt. Conch. t. 539. *f.* 22.

Knorr Vergn. 6. *t.* 28. *f.* 9.

Martin. Conch. 1. *t.* 7. *f.* 56. 57.

β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 13. *n.* 30.

γ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 15. *n.* 32.

δ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 15. *n.* 33.

ε) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 15. *n.* 34.

ζ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 16. *n.* 35.

η) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 17. *n.* 37.

Habitat - - - teſta minuta, ½-1 *pollicem longa, nigra, fuſca, ſubfuſca, rarius ſpadicea, interdum albo varia, vertice utplurimum fuſco.*

ſtriatula. 35. P. teſta ſubrugoſa alba ſtriis fuſcis flexuoſis extrorſum ramoſis varia, fundo maculis duabus fuſcis.

Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 16. *n.* 36. *t.* 1. *f.* 3.

Habitat - - - teſta pollicem longa.

octoradiata. 36. P. teſta convexa: coſtis tuberculatis praeter minores majoribus octo.

v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 18. *f.* 62. Patella tricarinata.

β) *Liſt. Conch. t.* 532. *f.* 11.

Klein oſtr. t. 8. *f.* 5.

Martin. Conch. 1. *t.* 10. *f.* 82. 83.

γ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 18. *n.* 40.

δ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 19. *n.* 41. *t.* 1. *f.* 4.

Habitat ad inſulas Americae mediae *obverſas, teſta* ½-1¾ *pollicis longa, nunc utrinque tota alba, nunc extrinſecus cinerea, intus colore ardeſiae macula ſpatulata cana albomarginata, nunc ſubſpadicea, vertice coſtisque, intusque*

praeter marginem fuſceſcentem alba, nunc ſubfuſca, intus, coſtis et vertice alba, hoc tamen faſcia fuſca cincto, nunc ex livido alba, intus coſtisque alba, coſtis in β) 11, in γ) 16, in δ) 12.

rubra. 37. P. teſta dentata ſub epidermide cinerea rubra: ſtriis elevatis rotundatis; minoribus imbricatis, intus alba.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 489. *n.* 112.
Habitat - - - granulari affinis, teſta ovali 1½ *pollicem fere longa, vertice ſpadiceo, faſcia lata alba cincto, margine intus faſcia fundoque ſpadiceis.*

hepatica. 38. P. teſta ovata gibba tenui dentata hepatica: ſtriis elevatis carinatis obtuſe ſpinoſis.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 489. *t.* 5. *f.* 15.
Habitat rara - - - teſta 1½ *pollicem longa, vertice ejusque ambitu albo, fundo et margine interno ſubfuſcis.*

badia. 39. P. teſta ſubconvexa fuſca intus badia: radiis duodecim majoribus utrinque coſta cinctis totidemque minoribus.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 484. *t.* 5. *f.* 9.
β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 41. *n.* 80.
γ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 41. *n.* 81.
δ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 42. *n.* 82.
ε) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 43. *n.* 83.
ζ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 43. *n.* 84.
η) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 44. *n.* 85.
ϑ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 44. *n.* 86.
ι) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 45. *n.* 87.
κ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 45. *n.* 88.
λ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 46. *n.* 89.
μ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 47. *n.* 90.
ν) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 47. *n.* 91.
ξ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 48. *n.* 92.
ο) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 49. *n.* 93.
π) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 49. *n.* 94.
Habitat - - - teſta 2¾ *pollicis longa nunc magis nunc minus plana, mediae craſſitiei rarius pellucida, ſaepius punctis viridibus conſperſa nunc per totum ſuperficiem externam, nunc per radios, nunc per marginem externum diſperſis, rarius in ſeries digeſtis, rarius punctis cinereis varia, crebrius cinereo varia aut undulata, interdum in luteum aut hepaticum colorem vergente, vel nigro maculata, margine et vertice utplurimum, radiis ſaepe variis aut*

aut colore alieno tinctis, vertice nonnunquam quinquefariam caeruleo punctato, fundi macula ſpatulata hepatica vel vireſcente: faſcia ſimplici aut duplici utraque diverſi utplurimum dilutioris coloris cincta, interna ſuperficie interdum in fuſcum, luteum, hepaticum, canum colorem vergente.

fuſceſcens. 40. P. teſta planiuſcula fuſceſcente: ſtriis elevatis decem, vertice diverſicolore, fundi macula ſpatulata dilutius hepatica glauco et aureo marginata, margine interno fuſco.

Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 50. *n.* 95.

β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 51. *n.* 96.

γ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 51. *n.* 97.

δ) *Schroet. n. Litterat* 3. *p.* 52. *n.* 98.

ε) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 53. *n.* 99.

ζ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 53. *n.* 100.

Habitat - - - teſta 2½ 3½ *pollices longa, nunc magis nunc minus convexa, ſaepius perpendiculariter ſtriata, utplurimum nigro-varia vel undulata, vel dilutius lineato-faſciata vertice nigro cano-marginato, vel hepatico lineis angulatis fuſceſcentibus nigriſque vario, albo-marginato, vel cinereo glaucoque vario exalbido marginato; nunc vireſcente exalbido marginato, radiis, praeter interſitos minores, rarius in altero latere deficientes,* 10-11 *nunc acutioribus nunc magis obtuſis, nunc magis complanatis, interdum aureis, margine externo nonnunquam exalbido, ſuperficie interna maculis interdum aureis fugacibus picta, fundi macula rarius vireſcente exalbido marginata.*

maculoſa. 41. P. teſta complanata anterius anguſta et rotundata flavicante fuſco-maculata: vertice albo, radiis planis rotundatis aequalibus.

Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 54. *n.* 101.

β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 54. *n.* 102.

Habitat - - - teſta ¾-1 *pollicem longa, ovali, intus alba fuſco maculata, radiis* 10-11, *fundi macula ſpatulata dilutius et obſcurius fuſca, varia.*

rotundata. 42. P. teſta ſubovali complanata fuſca varia: coſtis rotundatis, planis, vertice fundoque diverſicoloribus.

Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 55. *n.* 103.

β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 55. *n.* 104.

Habitat - - - teſta 1¾-2¼ *pollicis longa, dilutius fuſca luteo radiata,* β) *maculata, vertice ex fuſceſcente cinereo: limbo*

limbo albo, in β) hepatico limbo lacteo, margine in β) cinereo fuſco-lineato, fundo obſcure hepatico, ſupra albicante, corona calcarea alteraque candidiore cincta, in β) fundo cinereo fuſceſcente vario corona exalbida cincto.

Pecten. 43. P. teſta ovata obſcure marginata albo radiata: ſtriis diſtantibus extrorſum pectinatis, vertice griſeo, fundi macula ſubſpatulata corona alba cincta.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 56. *n.* 105.
β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 56. *n.* 106.
γ?) *Martyn univ. Conch.* 1. *t.* 16.
Habitat ad littus occidentale Americae borealis - - - *teſta* $1\frac{1}{4}$-$1\frac{3}{4}$ *pollicis longa, cinerea hinc inde fuſceſcente varia, β) alba fuſco-radiata, margine fuſco, in β) nigro interiori cano fuſco radiato, fundo dilutius et obſcurius fuſco, in β) cano.*

corrugata. 44. P. teſta ovata rugoſa ſpadicea: verticis corona alba, intus cinerea albo radiata, fundo dilute fuſco albo marginato.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 57. *n.* 107.
Habitat - - - *teſta* $\frac{1}{2}$ *pollicem longa.*

alboradiata. 45. P. teſta ovali utrinque fuſca albo-radiata: ſtriis elevatis pectinatis, fundo flavicante, vertice albo.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 57. *n.* 108.
Habitat - - - *teſta* $\frac{3}{4}$ *fere pollicis longa.*

olivacea. 46. P. teſta ovata olivacea intus fuſca albo varia: ſtriis elevatis inaequalibus margine bifariam obtuſe ſpinoſis, vertice luteo, fundo argenteo, centro fuſco.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 490. *t.* 6. *f.* 1.
Habitat - - - *teſta* $\frac{1}{2}$ *pollicem circiter longa, fundo corona alba cincto.*

cerea. 47. P. teſta ovata utrinque cerea perpendiculariter ſtriata: coſtis tredecim complanatis, fundo albo.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 59. *n.* 110.
β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 59. *n.* 111.
Habitat - - - *teſta* $\frac{1}{2}$ *pollicem longa, in β) luteola vertice argenteo duplici punctorum nigrorum ſerie cincto, margine punctis fuſcis ſeriatis notato, fundo argenteo in β) albo.*

impreſſa. 48. P. teſta ovata: ſtriis elevatis dimidiatis transverſim ſtriatis fuſceſcentibus obſcurius alboque maculatis, verticis ambitu impreſſo albo.

Schroet.

Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 60. *n.* 112.
Habitat - - - teſta $\frac{3}{4}$ *pollicis longa, vertice maculis* 3 *fuſceſcentibus fundo exalbido, margine interno fuſceſcente.*

aurantia. 49. P. teſta ovata ſolida citrina fuſco undulata: ſtriis elevatis confertis rugoſis, fundo albo.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 60. *n.* 113.
Habitat - - - teſta pollicem longa.

melanozonias. 50. P. teſta ovata denticulata cinerea cingulis tribus nigris varia intus lactea; ſtriis elevatis inaequalibus extrorſum nodulofis margine ſpinoſis.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 61. *n.* 114. *f.* 5.
β) *Schroet. n. Litterat. p.* 61. *n.* 115.
Habitat - - - teſta pollicem longa, in β) cinerea alba varia vertice acuto rufeſcente, in β) exalbido, margine interno cinereo fuſceſcente vario, fundo luteo.

oculata. 51. P. teſta ovata alba inter coſtas complanatas longitudine inaequales fuſceſcente: verticis cingulo fuſco.
Schroet. Einl. in. Conch. 2. *p.* 494. *n.* 127.
Habitat - - - teſta $\frac{1}{2}$ *pollicem longa, vertice obtuſo.*

magellanica. 52. P. teſta tenui ovata alba margine noduloſa, intus margaritacea: ſtriis elevatis ſpadiceis, vertice acuminato fundoque fuſcis.
Gualt. teſt. t. 9. *f.* E.
Martin. Conch. 1. *t.* 5. *f.* 40. a. b.
Habitat in freto Magellanico, *teſta* 1$\frac{1}{2}$ *pollicem longa, ultra pollicem alta, epidermide fuſca, flava, aut alba fuſco radiata veſtita.*

ochroleuca. 53. P. teſta ochroleuca faſciis tribus flavis picta: ſtriis elevatis acutis inaequalibus, vertice albo, fundo argenteo.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 64. *n.* 120.
Habitat - - - teſta pollicem alta, 1$\frac{1}{4}$ *pollicis longa.*

denticulata. 54. P. teſta alba denticulata: ſtriis elevatis acutis inaequalibus, vertice duplici punctorum cinereorum ſerie faſciaque ex atro cinerea cincto.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 64. *n.* 121.
Habitat - - - teſta pollicem longa, $\frac{3}{4}$ *fere lata et alta.*

noduloſa. 55. P. teſta flava fuſco radiata: ſtriis elevatis noduloſis inaequalibus, vertice fundoque albis.

Schroet.

Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 65. *n.* 122.
β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 65. *n.* 123.
Habitat - - - teſta ad $1\frac{1}{2}$ *pollices longa.*

cinerea. 56. P. teſta dentata cinerea inter ſtrias elevatas inaequales fuſca rugoſa; vertice acuminato lacteo.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 66. *n.* 124.
β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 66. *n.* 125.
Habitat - - - teſta ultra pollicem longa, vertice et fundo in β) *argenteis, margine in* β) *citrino fuſceſcente radiato.*

exalbida. 57. P. teſta exalbida intus ochroleuca inter ſtrias elevatas rotundatas inaequales rugoſa: vertice obtuſo albo; faſcia lata, interrupta alteraque marginali fuſca.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 67. *n.* 126.
Habitat - - - teſta $1\frac{1}{4}$ *pollicis longa.*

cancellata. 58. P. teſta cinerea fuſco varia decuſſatim ſtriata: callo bifariam tuberculato, vertice flavicante, fundi macula ſpatulata alba.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 67. *n.* 127.
β) *Martin. Conch.* 1. *t.* 5. *f.* 37.
Habitat in Jamaica, *teſta* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, exterius punctis ſparſis, intus radiis fuſcis varia, fundi margine ex cinereo argenteo,* β) *teſta cana obſcurius radiata, ſtriis nonnullis flavis, intus ſordide flava: fundo albo.*

laevis. 59. P. teſta rotundata laevi flavicante: marginis faſcia lata alteraque anguſta citrina fuſco-maculata: margine dilatato acuto ſubrugoſo.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 68. *n.* 129.
Habitat - - - teſta ultra $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, intus annulis 2 obſcurioribus notata, vertice caeruleſcente cinereo alboque varia, fundo glauco.*

argentea. 60. P. teſta laevi craſſa ſubargentea: radiis undecim fuſcis, margine argentato, vertice luteolo, fundo eburneo duplici annulo albo cincta.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 69. *n.* 130.
Habitat rara - - - teſta 2 fere pollices longa.

cuprea. 61. P. teſta alba: coſtis validis rotundatis fuſcis, intus margaritacea, vertice fundoque cupreis.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 488. *t.* 5. *f.* 14.
β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 70. *n.* 132.

Habitat

Habitat - - - teſta 2 pollices longa, inter coſtas majores nigro limbatas minoribus hinc inde interſitis.

ſanguinea. 62. P. teſta utrinque dilute hepatica: coſtis carinatis majoribus minoribusque alternis, vertice plano albo.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 71. n. 133.
Habitat - - - teſta $1\frac{1}{4}$ *pollicis longa.*

inaequalis. 63. P. teſta fuſca ſuperne glabra: infra ſtriis elevatis confertis albis, vertice obtuſo albo; nimbo fundoque fulvis.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 71. n. 134.
Habitat - - - teſta $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa: ſtriis vix* $\frac{1}{3}$ *altitudinis aſſequentibus.*

flaveola. 64. P. teſta flavicante fuſco-varia: coſtis complanatis inaequalibus, vertice obtuſo, fundo albo rufeſcente vario.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 72. n. 135.
Habitat - - - teſta pollicem longa.

Infundibulum. 65. P. teſta denticulata compreſſa utrinque rotundata flava perpendiculariter ſtriata; coſtis carinatis, fundo albo cinereoque varia.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 72. n. 136.
Habitat rara - - - teſta $1\frac{1}{4}$ *pollicis longa.*

Cyathus. 66. P. teſta rotundata glaberrima alba.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 73. n. 137.
Habitat - - - teſta lentis magnitudine.

ſinica. 67. P. teſta ovata tota flava undulatim ſulcata intus perpendiculariter ſtriata: margine hinc inde repando.
Davil. Catal. t. 2. f. A.
Martin. Conch. 1. t. 6. f. 44.
Habitat in Sina, *teſta 4 lineas ultra 3 pollices longa.*

punctulata. 68. P. teſta alba ſubrotunda punctis multicoloribus conſperſa ad baſin radiata annulisque duobus ſulcis cincta: margine ſubrepando.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 1. f. 7.
Martin. Conch. 1. t. 7. f. 55.
Habitat - - -

lugubris. 69. P. teſta ovata annulatim ſtriata nigra: ſtriis elevatis inaequalibus, margine crenato, vertice fundoque albis.
Martin. Conch. 1. t. 8. f. 60.
Habitat - - -

ulyſſiponenſis. 70. P. teſta ovata dentata flaveſcente: ſtriis elevatis complanatis, vertice acuminato aurantio.
Martin. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 62.
Habitat prope Ulyſſiponem.

Umbella. 71. P. teſta oblonga rubra: ſtriis elevatis inaequalibus albis, margine crenato.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 2. *f.* 1. Libot.
Liſt. Conch. t. 538. *f.* 21.
Knorr Vergn. 1. *t.* 19. *f.* 2. 3. *et* 5. *t.* 19. *f.* 3.
Martin. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 63.
Schroet. Journ. 6. *p.* 453.
n. Litterat. 3. *p.* 109. *n.* 212-215.
Habitat ad Africae *littora, varietate innumera, teſta ſatis ſpectabili, rarius ſtraminea, interdum maculata aut nebuloſa.*

crenata. 72. P. teſta tenui pellucida ſtriata nigricante olivaceo radiata intus glauca vel cinerea: vertice acuminato, margine crenato, fundo lacteo.
Liſt. Conch. t. 537. *f.* 16.
Bonann. muſ. Kircher. 1. *f.* 25.
Gualt. teſt. t. 9. *f.* G.
Martin. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 64. 65.
Habitat ad Africae, Malagae, Ulyſſiponis *littora.*

ferruginea. 73. P. teſta ferruginea lineis pullis angulatis undulatisve cingulisque albis picta intus lactea; ſtriis elevatis nodoſis, margine plicato.
Martin. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 66.
Habitat - - - teſta ſatis magna, nunc magis ovali, nunc potius pyramidali, coſtis alternatim elevatis et depreſſis, vertic acuminato utplurimum albo lineis undulatis pullis cincto, fundo ex colore lacteo in pullum vergente.

melanogramma. 74. P. teſta ovali ochroleuca: ſtriis elevatis nigris, intus argentea maculata, vertice acuminato albo, fundi macula ſtraminea.
Martin. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 67.
Habitat - - - vertice laevi, margine crenato.

75. P.

Huic tribui inſerendae videntur teſtae a Liſtero *Conch. t.* 535 *f.* 14. *et t.* 540. *f.* 24. *a* Bonanni *muſ. Kircher.* 1. *f.* 24. *et* 26. *a* Gualtieri *teſt. t.* 8. *f.* G. H. I. O. *et.* R. *et t.* 9. *f.* D. *et* L. *a* Knorr *Vergn.* 3. *t.* 29. *f.* 3. *et* 4. *et* 6. *t.* 27. *f.* 8. *et t.* 30. *f.* 2-4. *et* 7. *delineatae.*

repanda. 75. P. teſta ovali tenui intus argentea fuſceſcente-radiata: ſtriis teneris undulatis badio granulatis, margine repando.

Martin. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 68.

Habitat in freto magellanico, *vertice acuminato.*

anguloſa. 76. P. teſta ovali alba tenuiſſime ſtriata, maculis punctisque rubris varia; margine octangulari.

Liſt. Conch. t. 538. *f.* 21. b.

Martin. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 69.

β) *Martin. Conch.* 1. *t.* 10. *f.* 88. 89.

Habitat - - - teſta in β) aurantia ſtriis punctisque elevatis albis, fundo luteo: annulo centrali aurantio, marginali albo.

tigrina. 77. P. teſta ovali laevi nitida pellucida ex olivaceo caeruleſcente fuſco punctata ſtriata; coſtis ſeptem flavicantibus, margine ſeptangulari.

Martin. Conch. 1. *t.* 9. *f.* 78.

Habitat - - - teſta intus margaritacea, verticis acuminati fundique macula aurantia.

monopis. 78. P. teſta oblonga planiuſcula badia albo ſtriata intus lactea: ſtriis elevatis undecim inaequalibus, vertice rotundato albo.

Bonann. muſ. Kirch. 1. *f.* 32.

Leſſer teſtaceoth. f. 86.

Martin. Conch. 1. *t.* 9. *f.* 80.

β) *Liſt. Conch. t.* 532. *f.* 11.

Klein oſtrac. t. 8. *f.* 5.

Martin. Conch. 1. *t.* 10. *f.* 82. 83.

Habitat ad inſulas Americae mediae *oppoſitas, teſta interdum fuſca albo varia, in β) alba vel ſpadicea, ſtriis nonnunquam albis et fuſcis alternis.*

chloroſticta. 79. P. teſta ovata dentata fuſca viridi punctata: ſtriis elevatis cavis undecim latioribus totidemque anguſtioribus inaequali; vertice albo.

Martin. Conch. 1. *t.* 10 *f.* 84.

Habitat - - - fundi litura centrali flava vel fuſca.

margaritacea. 80. P. teſta tenui inaequaliter ſtriata alba intus margaritacea: verticis litura aurantia annulo flaveſcente cincta, margine crenato.

Gualt. teſt. t. 8. *f.* L.

Mart. Conch 1. *t.* 10. *f.* 85. A. B.

Fff fff fff ff β) *Kaemmer.*

β) Kaemmer. Conch. Rudolſt. p. 16. *n.* 11.
Habitat ad Islandiam, *teſta fulvo vel aurantio nebuloſa, margine radiis translucentibus picto.*

tenuis. 81. P. teſta ovali tenui ochroleuca lineis ſpadiceis angulatis varia: ſtriis elevatis obtuſis cavis inaequalibus.
Martin. Conch. 1. *t.* 10. *f.* 87.
Habitat - - - inter tenuiſſimas et maxime complanatas hujus generis, ſtriis 10-12.

Mitrula. 82. P. teſta ſolida ſubconica transverſim plicata: margine repando.
Liſt. Conch. t. 544. *f.* 31.
Klein oſtr. t. 8. *f.* 11. 12.
Martin. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 11. 12.
Habitat ad inſulam Barbados, *utrum hujus generis et ordinis, an ad oſtreas releganda, teſta anguſta alba, rarius fuſca, nunc magis nunc minus oblonga.*

plicaria. 83. P. teſta ovata dentata: ſtriis elevatis obtuſis triginta undulatis transverſim rugoſis.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 18. *f.* 1.
β) Knorr Vergn. 3. *t.* 30. *f.* 1.
Habitat ad freti magellanici *littora, rarior, vertice obtuſo, marginis dentibus* 30-34.

pentagona. 84. P. teſta albida obtuſe pentagona: margine dilatato crenato, vertice obtuſo, fundo rubello.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 18. *f.* 4. 5.
Habitat - - -

aenea. 85. P. teſta ovata tenera pellucida ſub epidermide albida argentea pullo-radiata elevato-ſtriata: vertice fundoque cupreis.
Martin. neueſt. Mannigf. 1. *p.* 408. *t.* 1. *f.* 9.
Habitat in freto magellanico, *teſta* 1½ *pollicem circiter longa, vertice nitidiſſimo.*

conchacea. 86. P. teſta tenui oblongo-ovata tenuiſſime undulatim ſtriata ex cinereo flaveſcente: radiis elevatis obſcurioribus, vertice recurvo.
Martin. neueſt. Mannigf. 1. *p.* 417. *t.* 2. *f.* 13. 14.
Habitat in mari Americam auſtralem *alluente, teſta, excepto cardine, conchae v. g. mytilo eduli ſimillima, intus glabra margaritacea, vertice fuſco, margine repando.*

ſtannea. 87. P. teſta ovata argentea: ſtriis elevatis complanatis, vertice obtuſo cupreo, fundi litura ovali badia, margine repando.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 489. *n.* 114.
Habitat - - - teſta ultra pollicem longa, intus nitente.

candidiſſima. 88. P. teſta ſuborbiculata ſtriata alba: faſcia fuſceſcente fuſco punctata, intus cana: ſtriis inaequalibus, margine transverſim rugoſo.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 130. *n.* 254.
Habitat - - - vertice obtuſo ſubcentrali, fundi macula ſpatulata cretacea.

*** Mucronatae, *vertice acuminato recurvo.*

ungarica. 89. P. teſta integra conico-acuminata ſtriata: vertice hamoſo revoluto.
Liſt. Conch. t. 544. *f.* 32.
Bonann. muſ. Kirch. 1. *f.* 23.
Gualt. teſt t. 9. V. VV.
Ginann. adr. 2. *t.* 3. *f.* 24.
Leſſer teſtaceoth. f. 85.
Klein oſtrac. t. 8. *f.* 10.
Argenv. Conch. t. 2. *f.* R.
zoomorph. t. 10. *f.* 8.
Knorr Vergn. 6. *t.* 16. *f.* 3.
Verſtein. 2. *t.* N. *f.* 3. 4.
Schroet. Einl. in Verſt. 4. *t.* 3. *f* 8.
v. Born ind. muſ. Caeſ. Vind. teſt. p. 414. *vign. f.* d.
Martin. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 107. 108.
Habitat in mari mediterraneo, adriatico, Americam *mediam alluente, teſta ad* 2 *pollices lata et alta, tenui, ſubtiliſſime longitudinaliter ſtriata, interdum transverſim plicata aut margine denticulata, utplurimum albida rubro nebuloſa, intus alba laevi: fundo roſeo, non raro foſſili.*

antiquata. 90. P. teſta integra oblonga imbricata: vertice poſteriori.
Habitat - - - teſta opaca lactea, apertura ovata.

mammillaris. 91. P. teſta integra conica ſtriata ſubdiaphana: vertice reflexo laevi.
Liſt. Conch. t. 537. *f.* 17.
Klein oſtr. t. 8. *f.* 1.
Martin. Conch. 1. *t.* 7. *f.* 58. 59.
Habitat in mari mediterraneo *et ad* Africae *littus occidentale, teſta ſolida mediae magnitudinis pulla, albo ſtriata: faſciis*

ciis interdum transverſis flavicantibus aut albis, vertice albo.

tricarinata. 92. P. teſta ſubſtriata anterius tricarinata.
Schroet. n. Litterat. 2. *p.* 170. *f.* 8. a. b.
Einl. in Conch. 2. *p.* 417. *t.* 5. *f.* 2.
Habitat rara - - - teſta ſubovata, ½ pollicem alta, ¾ longa, dilute viridi ſolida, margine ſubdenticulata intus laevi, inferne laete viridi, ſupra lactea, ſubdiaphana, inaequaliter ſtriata, ad verticem obtuſum poſteriorem cancellata.

pectinata. 93. P. teſta integra ovata: ſtriis rugoſis ſubramoſis, vertice ſubcentrali reflexo mucronato.
Knorr Vergn. 6. *t.* 28. *f.* 9.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 418. *t.* 5. *f.* 3.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta ad 2 pollices longa, opaca, tenui, cinerea, ſtriis numeroſis longitudine inaequalibus exarata, intus laevi, ſpadiceo plumbeoque varia, fundo plumbeo, vertice ſpadiceo alboque vario.*

lutea. 94. P. teſta integra ovali convexa ſtriata: vertice ſubmarginali reflexo mucronato. *Muſ. Lud. Ulr.* 692. *n.* 418.*
Rumpf muſ. t. 40. *f.* I.
Martin. Conch. 1. *t.* 17. *f.* 154. 155.
Habitat in India, *teſta magnitudine ſeminis peponis fulva: vertice annulo rufeſcente cincto.*

Unguis. 95. P. teſta integerrima oblonga margine anteriori retuſa: vertice mucronato carinato. *Muſ. Lud. Ulr.* 693. *n.* 419.*
Rumpf muſ. t. 40. *f.* L.
Pet. gaz. t. 32. *f.* 9.
da Coſta Conch. t. 2. *f.* 2.
Favann. Conch. 1. *t.* 4. *f.* G.
Humphr. Conch. t. 2. *f.* L.
Chem. Naturf. 22. *t.* 3. *f.* A-E. *Conch.* 10. *t.* 172. *f.* 1675-1677.
Habitat ad Amboinam, *teſta alba; an pinnae potius ſpecies?*

criſtata. 96. P. teſta vertice revoluto, dorſo criſtato carinato.
Habitat - - - teſta compreſſa tenuiſſima diaphana ſulcis numeroſis transverſis exarata, dorſi membrana duplici tenuiſſima in crenulas exciſa, limbo ſinuato, aperturae angulo dorſali acuto.

lacuſtris. 97. P. teſta integerrima ovali membranacea: vertice mucronato reflexo. *Fn. ſuec.* 2200.*

Müll.

Müll. zool. dan. prodr. 2861. *hiſt. verm.* 2. *p.* 199. *n.* 385.
Ancylus teſta membranacea, mucrone verticis ſubcentrali, apertura oblonga.
Geoffr. teſt. 1. Ancylus.
Argenv. Conch. t. 27. *f.* 1.
zoomorph. t. 8. *f.* 1.
Ginann. op. poſth. 2. *p.* 50. *t.* 2. *f.* 11.
Martin. berl. Magaz. 4. *t.* 7. *f.* 2. 3.
Habitat in Europae *rivis et lacubus, plantis aquaticis adhaerens, rarior in* mari balthico, *incola tentaculis* 2 *truncatis occultis, angulo interiori oculatis inſtructo, teſta* $1\frac{1}{2}$-$2\frac{1}{3}$ *lineas longa, tenerrima, pellucida alba, ſupra convexa, ſubtus concava, verticis mucrone minimo.*

fluviatilis. 98. P. teſta integerrima ovali ſubcornea: verticis mucrone marginali, apertura ovali.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 201. *n.* 386. Ancylus fluviatilis.
Liſt. Conch. t. 141. *f.* 39.
an. angl. t. 2. *f.* 32.
Gualt. teſt. t. 4. *f.* AA. *et f.* BB.
Argenv. Conch. 1. *t.* 27. *f.* 1.
Martin. berl. Mag. 4. *t.* 7. *f.* 1.
Schroet. Fluſconch. t. 5. *f.* 1. 2. 3. *et t.* X. *min.* A. *f.* 10.
Habitat in Europae *fluviis, lacuſtri affinis, teſta tenui, fragili, minuta,* $2\frac{1}{2}$ *lineas longa, pellucida, praeter raras ſtrias concentricas glabra, mucrone magis obtuſo.*

caeca. 99. P. teſta integra punctis elevatis ſtriata vertice acuto recto.
Müll. zool. dan. 1. *p.* 45. *t.* 12. *f.* 1-3. *rar.* 1. *p.* 25. *prodr.* 2866.
Habitat rara in ſinus Norwegiae Droebacenſis *ſaxis, incola albo ovato, oculi veſtigiis nullis inſtructo, teſta alba: ſtriis* 60-80.

virginea. 100. P. teſta integerrima alba: faſciis rubris. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 43. *t.* 12. *f.* 4. 5. *rar.* 1. *p.* 26. *prodr.* 2867.
Habitat ad ſinum maris norwegici *fucos, minuta, teſta faſciis* 18, *ſtriisque ſubtiliſſimis concentricis varia, intus flavicante, incola albo: pallio ſpadiceo latiſſimo, oculis nigris.*

teſſellata. 101. P. teſta integerrima albida: teſſeris rubris. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 45. *t.* 12. *f.* 6-7. *rar.* 1. *p.* 27. *prodr.* 2868.
Olaſſ. it. isl. t. 11. *f.* 11.
Habitat ad Norwegiae *fucos et ſaxa maritima, teſta ſubtiliſſime ſtriata, ſubtus ſordide flava, intus (ſi recens) lactea,*

ctea, vertice obtuſo, incola albo: oculis nigris pallioque obſcuro albo fimbriato.

fulva. 102. P. teſta integerrima aurantia: vertice mucronato ſubverticali *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 82. *t.* 24. *f.* 1-3. *rar.* 1. *p.* 49. *prodr.* 2869.

Habitat rarior in Norwegiae ſinu Droebacenſi, *fucis et teſtaceis affixa, teſta ſolida, laevi, immaculata, ſtriis vix armato oculo conſpicuis; incola albo: capite rotundato, anterius plano, utrinque ſubtus cuſpidato, pallio albido.*

ſubſpiralis. 103. P. teſta ovata: apice ſubſpirali obtuſo. *Müll. zool. dan. prodr.* 2873.

Habitat in mari Norwegico.

ambigua. 104. P. teſta ovata margine ſubdentata: mucrone ſubacuto reflexo. *Müll. zool. dan. prodr.* 2874.

Habitat in mari Norwegico.

rubella. 105. P. teſta integerrima ſubconica laeviuſcula rubicunda. *Fabr. Fn. groenl. p.* 386 *n.* 383.

Habitat rarior in maris Groenlandiam *circumfluentis profundis inter alvarum radices et teſtaceorum fiſſuras, incola rubicundo, teſta longitudine vix* $2\frac{1}{2}$ *lineas ſuperante, laeviuſcula, ſtriis tamen ſubtiliſſimis longitudinalibus confertis extrinſecus exarata, vertice ſubcentrali antrorſum verſo, apertura oblongo-orbiculari.*

Borniana. 106. P. teſta ovata integerrima ſubtiliſſime longitudinaliter ſtriata alba: venis ſanguineis.

Helbling Abh. boeh. Privatg. 4. *p.* 106. *t.* 1. *f.* 7.

Habitat - - - teſta 6 *circiter lineas longa, intus glabra.*

Calyptra. 107. P. teſta integra: coſtis ſubimbricatis, vertice hamoſo, margine ſinuato.

Chemn. Conch. 10. *p.* 340. *n.* 169. *f.* 1643. 1644.

Martyn Conchol. 1. *f.* 18.

Habitat ad Americae ſeptentrionalis *littus occidentale, teſta ex ſpadiceo dilute fuſca, intus alba, rubello et caeruleſcente obumbrata.*

108. P.

Patellae *ſcopulis, ſaxis, teſtaceis, fucis aliisque aquaticis tenaciſſime adhaerent, non niſi vi divellendae: Incola tentaculis duobus, excepta lacuſtri et forſan fluviatili, ſetaceis, et oculis binis inſtructus, in angulo tentaculorum exteriori, ſi utramque modo memoratam ſpeciem exceperis, poſitis, in ſola caeca, ut videtur, deficientibus, ut tamen incola anomalae a reliquarum omnium multum diſcrepet.*

melanoleuca. 108. P. teſta ſtriata alternatim nigra albaque integerrima.
Martin. Conch. 1. *t.* 7. *f.* 56. 57.
β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 74. *n.* 142.
Habitat - - - teſta ¾ - 1 *pollicem longa, vertice nunc fuſceſcente nunc albo, limbo interdum caeruleſcente, fundo albo.*

Pectunculus. 109. P. teſta oblonga convexa ſtriis elevatis noduloſis exaſperata ſubdenticulata intus nitida: vertice antrorſum curvato.
Martin. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 115. 116.
β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 75. *n.* 144.
γ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 76. *n.* 145.
δ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 76. *n.* 146.
ε) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 76. *n.* 147.
ζ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 77. *n.* 148.
η) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 77. *n.* 149.
ϑ) *Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t.* 18. *f.* 7.
Habitat - - - teſta ¾ - 1 *pollicem longa, ſtriis nonnunquam alterne minoribus nodulis non raro in ſpinas abeuntibus, colore et pictura quam maxime varius; teſta nunc tota nigra, nunc exterius nigra intus alba vel flavicante nigro radiata, nunc cinerea, ſtriis modo aliquando et vertice et radiis interioris ſuperficiei flavae nigris, nunc nigra ſtriarum interſtitiis, faſcia transverſa, et vertice flavicantibus, nunc ochroleuca intus exalbida maculis obſoletis fuſceſcentibus varia, ſtriarum nodulis dilute fuſcis, nunc lutea maculis ex atro cinereis varia, nunc albo fuſcoque varia intus ex cinereo flaveſcente, ſtriarum nodulis nigris.*

faſciata. 110. P. teſta ovata alba: faſcia fuſca, ſtriis elevatis acutis, margine dilatato crenato intus cinereo.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 77. *n.* 150.
Habitat - - - teſta ultra ¾ *pollicis longa, fundo albo et fuſceſcente vario.*

elegans. 111. P. teſta decuſſatim ſtriata alba rubro radiata denticulata: vertice cano.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 78. *n.* 151.
Habitat - - - teſta 2 *pollices longa, ſtriis inaequalibus, transverſis ſubtilioribus, fundi macula ſpatulata eburnea.*

ſquamoſa. 112. P. teſta ſtriis elevatis extrorſum transverſim undulatis aſpera fuſca, verticem verſus argentea, vertice ipſo aeneo adunco.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 81. *n.* 155.

 β) *Knorr*

β) Knorr Vergn. 6. *t.* 9. *f.* 1. 2.
γ) Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 82. *n.* 157.
Habitat - - - teſta 3½ *pollicem longa, intus argentea, margine dilute fuſco albo maculato extrinſecus cinereo repando, coſtis circiter* 38, *vertice obtuſo.*

ſqualida. 113. P. teſta integra fuſca intus exalbida: fundo fuſceſcente, margine caeruleſcente fuſco radiato, vertice nodoſo, ſtriis elevatis obſoletis.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 83. *n.* 158.
Habitat - - - teſta 1½ *pollicem longa.*

crocea. 114. P. teſta laevi ſubangulata flava fuſco radiata; vertice obtuſo albo, fundi macula ſpatulata albida.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 83. *n* 159.
Habitat - - - teſta pollicem fere longa.

candida. 115. P. teſta ovata laevi utrinque candida: cingulo externo roſeo.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 494. *t.* 6 *f.* 6.
Habitat - - - teſta ½ *pollicem longa, vertice laterali.*

trigona. 116. P. teſta compreſſa medio convexa cancellata alba: faſcia exterius et margine intus fuſceſcente, vertice marginali obtuſo.
Schroet. n. Litterat. 3 *p.* 84. *f.* 6.
Habitat - - - teſta ſolida ½ *pollicem longa.*

minima. 117. P. teſta rotundata convexa tenui laevi exalbida rufeſcente maculato: vertice obtuſiſſimo albo marginali.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 85 *n.* 162.
Habitat ad inſulam Feroë, *zoophytis adhaerens, teſta* ¼ *pollicis longa, integerrima.*

tranquebarica. 118. P. teſta ovata tenui pellucida confertim tenuiſſime ſtriata ſpadicea, ſquamis albis varia, intus lactea, verticis litura cyanea, fundi fuſca.
Liſt. Conch. t. 530. *f.* 8.
Martin. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 114.
Habitat Tranquebariae.

perverſa. 119. P. teſta oblonga cornea tenerrima pellucida glaberrima: baſi ferruginea.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 2. *f.* 2. Liri.
Martin. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 114. A. B.

Habitat

Habitat in Africae *littore, teſtae mucrone intolae poſteriora verſus recurvo.*

cernua. 120. P. teſta decuſſatim ſulcata pallide incarnata tenui: apertura oblonga.
Meuſch. Naturf. 18. *p.* 13. *t.* 2. *f.* 9. *et* 9. a.
Habitat - - -

incurva. 121. P. teſta tota alba plana: verticis mucrone tortuoſo.
Meuſch. Naturf. 18. *p.* 12. *t.* 2. *f.* 10. *et* 10. b.
Habitat - - -

interrupta. 170. P. teſta ovali depreſſa glabra ſubfuſca: punctis viridibus in radios obliquos interruptos digeſtis, vertice adunco obtuſo.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 490. *n.* 116.
β) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 490. *n.* 117.
Habitat - - - teſta vix pollicem longa hepatica, in β) *ſubfuſca, punctis quoque nigris interſitis, intus ſordide cinerea, in* β) *ſubolivacea margine acuto, fundo hepatico, in* β) *faſcia cana cincto.*

**** Integerrimae *absque vertice mucronato.*

afra. 122. P. teſta conica praeter verticem album obtuſum medium et marginem ſtriata vireſcente aut dilute fuſca intus alba.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 2. *f.* 4. Gadin.
Gualt. teſt. t. 9. *f.* 10.
Martin. Conch. 1. *t.* 5. *f.* 34.
Habitat frequens in inſula Gorea Africae.

luſitanica. 123. P. teſta conica alba praeter verticem acutum annulo ſpadiceo cinctum radiata: radiis fuſcis ſtriis nigro granulatis exaratis.
Gualt. teſt. t. 8. *f.* N. *et t.* 9. *f.* A.
Martin. Conch. 1. *t.* 5. *f.* 35. a. b.
β) *Gualt. teſt. t.* 8. *f.* M.
Martin. Conch. 1. *t.* 5. *f.* 36. a. b.
γ) *Gualt. teſt. t.* 8. *f.* P.
Martin. Conch. 1. *t.* 6. *f.* 43. a. b.
Habitat frequens ad maris luſitanici *ſcopulos; teſta minuta, fundo utrinque flavo maculato, in* β) *immaculato, cui etiam radii alternatim albi et ſpadicei.*

jamaicenſis. 124. P. teſta rotundata convexa griſea decuſſatim ſtriata: vertice acuminato medio lineis duodecim aurantiis radiatim picto, fundo corneo.

 Martin.

Martin. Conch. 1. *t.* 5. *f.* 37.
Habitat in Jamaica.

areolata. 125. P. teſta pyramidali ex griſeo rubella: ſtriis tenerrimis circularibus longitudinales decuſſantibus, vertice violaceo.
Argenv. Conch. t. 2. *f.* A.
Martin. Conch. 1. *t.* 5. *f.* 41.
Habitat - - - magellanicae affinis, at teſta magis depreſſa: baſi latiore, per ſtriarum decuſſationes in areas triangulares diviſa, ſtriis longitudinalibus 21.

flammea. 126. P. teſta ovata ſubtiliſſime annulatim ſtriata ex rubello cinerea: radiis undulatis fuſcis, vertice acuto centrali medio albo.
Argenv. Conch. t. 2. *f.* Q.
Martin. Conch. 1. *t.* 5. *f.* 42.
Habitat - - - fundi litura fuſca.

indica. 127. P. teſta ex rubello griſea radiatim ſtriata glabra altero latere anguſtiori: vertice acuto laevi, annulo rubello cincto.
Gualt. teſt. t. 8. *f.* E.
Martin. Conch. 1. *t.* 7. *f.* 49.
Habitat in India, *ruſticae affinis*, 3¾ *pollicis longa.*

ſurinamenſis. 128. P. teſta craſſa ſubovata flavicante atro-radiata: ſtriis longitudinalibus inaequalibus, cingulis nodoſis, vertice obtuſo, laevi albo.
Martin. Conch. 1. *t.* 7. *f.* 50.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 127. *n.* 247-250.
Habitat frequens ad Surinam.

vitellina. 129. P. teſta ovata flava: baſi inaequaliter ſtriata, vertice obtuſo albido.
Martin. Conch. 1. *t.* 7. *f.* 51.
Knorr Vergn. 1. *t.* 20. *f.* 2.
Habitat - - -

ſanguinolenta. 130. P. teſta ovata convexa alba ſolida: ſtriis longitudinalibus elevatis capillaribus et flexuoſis interſperſis, vertice annulo lato rubro punctato cincto.
Liſt. Conch. t. 537. *f.* 18?
Martin. Conch. 1. *t.* 7. *f.* 52.
β) *Martin. Conch.* 1. *t.* 7. *f.* 53.
Habitat in Africa, *vertice laterali, fundo interdum flavicante.*

131. P.

laevigata. 131. P. teſta ovata flava intus ex caeruleſcente alba: ſtriis complanatis alternatim craſſioribus et tenuioribus obliquis, vertice albo laevi nitido.
Martin. Conch. 1. *t.* 7. *f.* 54.
Habitat - - - fundi litura flavo fuſcoque varia.

punctulata. 132. P. teſta rotundata alba punctis multicoloribus conſperſa baſin verſus radiata annulisque duobus fuſcis cincta.
Bonann. recr. et muſ. Kirch. 1. *f.* 7.
Martin. Conch. 1. *t.* 7. *f.* 55.
Habitat - - - vertice lineis nonnullis fuſcis cincto.

pellucida. 133. P. teſta integerrima obovata gibba pellucida: radiis quatuor caeruleis. *Stroem. act. Nidr.* 4. *p.* 98. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 37. *t.* 104. *f.* 1-4. *prodr.* 2862.
Liſt. Conch. t. 543. *f.* 27.
an. angl. app. t. 2. *f.* 10.
Petiv. gaz. t. 75. *f.* 3.
Borl. Cornu. t. 28. *f.* 1.
Walch Naturf. 10. *p.* 82. *t.* 1. *f.* 7.
Martin. neueſt. Mannigf. 1. *p.* 410. *t.* 1. *f.* 12.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 18. *f.* 9.
Brit. zool. 4. *t.* 90. *f.* 150.
Knorr Vergn. 6. *t.* 28. *f.* 6.
da Coſta Conchol. t. 4. *f.* 4.
brit. Conchol. t. 1. *f.* 5. 6.
Chemn. Conch. 10. *t.* 168. *f.* 1620. 1621.
β) *Helbling Abh. boehm. Privatg.* 4. *t.* 1. *f.* 8.
Habitat in mari mediterraneo *et* ſeptentrionali, *lacuſtri affinis, nonne ad priorem ordinem referenda, teſta avellanae utplurimum magnitudine, forma ovi in medio diſſecti, glaberrima, ex olivaceo cornea, radiis* 2, 4, 6, 8, 12 *punctorum caeruleorum.*

teſtudinaria. 134. P. teſta integerrima acuta laevi glaberrima. *Muſ. Lud. Ulr.* 693. *n.* 420.* *Stroem. act. Nidr.* 4. *p.* 99. *Müll. zool. dan. prodr.* 2871.
Argenv. Conch. t. 2. *f.* P. Clypeus teſtudinarius.
Liſt. Conch. t. 531. *f.* 9.
Bonann. muſ. Kirch. 1. *f.* 31.
Rumpf muſ. t. 40. *f.* A.
Gualt. teſt. t. 8. *f.* B.
Knorr Vergn. 1. *t.* 21. *f.* 1. *et* 3. *t.* 30. *f.* 2-5.
Walch Naturf. 8. *p.* 161. *t.* 4. *f.* 2. 3.

Martin.

Martin. Conch. 1. *t.* 6. *f.* 45-48.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 88. *n.* 169-179.
Habitat in mari indico *et* norwegico, *innumera colorum et picturae varietate, teſta utplurimum ferruginea radiis maculisque ſpadiceis et luteis picta, ſtriis ſubtilibus longitudinalibus circulares tenerrimas decuſſantibus exarata intus argentea, alias teſta alba maculis quadratis fuſcis vel cinereis radios ſimulantibus picta, intus praeter fundum fuſcum marginemque fuſco maculatum lactea.*

teſtudinalis. 135. P. teſta integerrima ovata ſtriata. *Müll. zool. dan. prodr.* 2872. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 385. *n.* 382.
Chemn. Conch. 10. *t.* 168. *f.* 1614. 1615.
Favann. Conch. 1. *t.* 1. *f.* Q. 2.
Kaemmer. Rudolſt. Conch. t. 2. *f.* 4. 5.
β) *Müll. zool. dan. prodr.* 2875. Patella teſta ovato-conica, apice prope centrum obtuſo.
Habitat vulgatiſſima inter fucos ad Groenlandiae *littora, an diverſa a teſtudinaria ſpecies? teſta ad* 14 *lineas longa, antrorſum anguſtiori vireſcente, ſub violaceo vel albo maculis quadratis vel undulatis brunneis varia, intus candida, incolae diſco pauci laete viridi, limbo albido, ceterum verme albo.*

compreſſa. 136. P. teſta integerrima ovali oblonga ſtriata laevi: dorſo compreſſa.
Liſt. Conch. t. 541. *f.* 25.
Bonann. muſ. Kirch. 1. *f.* 21.
Knorr Vergn. 6. *t.* 28. *f.* 1.
Walch Naturf. 8. *p.* 159. *t.* 4. *f.* 1.
Martin. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 106.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 93-98. *n.* 180-191.
β) *Knorr Vergn.* 2. *t.* 26. *f.* 4.
γ) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 492. *n.* 122.
Habitat in India, *teſta ad* 4 *pollices longa, tenui, flava, ſpadicea, cinerea aut albida, interdum maculata, ſtriis planiuſculis latis, transverſis vix conſpicuis.*

ruſtica. 137. P. teſta integerrima conica: ſtriis quinquaginta obtuſis.
Muſ. Lud. Ulr. 694. *n.* 421.*
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 428. *t.* 5. *f.* 4.
n. Litterat. 3. *p.* 108. *n.* 208-211.
Habitat - - - teſta magna, non raro ultra $3\frac{1}{2}$ *pollices longa, poſterius anguſtiori exalbida, interdum fuſceſcenti aut ſpadiceo faſciata, vertice margini poſteriori propiore.*

138. P.

fuſca. 138. P. teſta integerrima ovata obtuſa: ſtriis elevatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 691. *n.* 422.*
Habitat - - - teſta ſubconica ex nigricante cinerea: ſtriis cinereis filiformibus circiter 39, *vertice ſubcentrali, ſubobtuſo, ſaepius faſcia cincto.*

notata. 139. P. teſta integra ſtriata: vertice ſubmucronato erecto, intus alba: macula atra cordata medio alba.
da Coſta Conchol. t. 5. *f.* 1.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 431. *t.* 5. *f.* 5.
n. Litterat. 3. *p.* 124. *n.* 242-244.
Kaemmer. Rudolſt. p. 13. *n.* 4. *t.* 2. *f.* 3. 7.
Chemn. Conch. 10. *p.* 324. *vign.* 25. *f.* C. D.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta minuta tenui, ovali, ſaepius cinerea: ſtriis tenerrimis, elevatis, fuſcis vel nigris ſubtiliſſime granulatis, inaequalibus vertice annulo nigricante cincto, margine interno ſubtiliſſime crenato fuſco vel nigro maculato, fundi macula interdum ſpatulata.*

cruciata. 140. P. teſta integerrima ovali ſubconvexa fuſca cruce alba picta. *Muſ. Lud. Ulr.* 695. *n.* 423.*
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 432. *t.* 5. *f.* 6.
Habitat - - - teſta pollicem longa, ¾ lata, retrorſum anguſtiori tenui laevi, intus lactea, fundo fuſco, vertice diſcolore.

reticulata. 141. P. teſta integra conica compreſſa venoſo-reticulata. *Muſ. Lud. Ulr.* 695. *n.* 424.*
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 433. *t.* 5. *f.* 7.
Habitat - - - teſta tota lactea, poſterius multo anguſtiori, ſtriis elevatis confertis ſeſe decuſſantibus, vertice ſubcentrali obtuſo.

deaurata. 142. P. teſta ovali integra quaſi deaurata intus argentea ſtriata: ſtriis ſubimbricatis, margine plicato-dentato.
Chemn. Conch. 10. *p.* 327. *t.* 168. *f.* 1616. a. b. Scutum deauratum.
Martyn Conchol. 2. *t.* 65? Lepas denticulata.
N. Danz. Abh. 1. *p.* 253. *t.* 3. *f.* 11. A. B.
Favann. Conchyl. 1. *t.* 1. *f.* D. 1. *et t.* 3. *f.* D. 3.
Habitat in freto magellanico *et ad inſulas* Falkland, *teſta radiis albis exterius picta, ſtriis ſatis craſſis vertice quaſi deaurato.*

ſtellifera. 143. P. teſta ovali integra ex atro fuſca ſtriata albo radiata intus argentea. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 329. *t.* 168. *f.* 1617.
N. Danz.

N. Danz. Abh. 1. *p.* 262. *n.* 56?
Habitat ad inſulas amicas *et* novam Seelandiam, *teſta decuſſatim ſtriata, vertice fundoque albis.*

radians. 144. P. teſta integra ovali pellucida depreſſa ſtriata cornea maculis nigris radiata.
Chemn. Conch. 10. *p.* 329. *t.* 168. *f.* 1618. Patella radiata novae Zeelandiae.
Habitat ad terram ignis *et* novam Seelandiam, *teſta intus ſubargentea, verticis margine flavicante.*

Rota. 145. P. teſta ſubrotunda intus ſubargentea exterius ſtrigis rufeſcentibus, limbo flaveſcente. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 330. *t.* 168. *f.* 1619.
Habitat in mari indico *et* americano.

umbellata. 146. P. teſta integra ſubrotunda diaphana integra depreſſa intus radiata flaveſcente: vertice luteo, margine acutiſſimo.
Muſ. Teſſin. p. 116. *t.* 6. *f.* 5.
da Coſta Conchol. p. 4. *t.* 1. *f.* 5. *et t.* 5. *f.* 5.
Favann. Conch. 1. *t.* 3. *f.* H.
Chemn. Conch. 10. *p.* 341. *t.* 169. *f.* 1645. 1646.
Davil. catal. raiſ. p. 78. *n.* 1. *t.* 2. *f.* A.
Habitat in Oceano indico, *teſta ad* 4 *pollices et* 3 *lineas longa, intus punctis elevatis aſpera, rarius margine denticulata.*

puſtulata. 147. P. teſta tenui ovali depreſſa radiata alba ſanguineo-punctata intus laevi. *Helbling Abh. Privatg. in Boehm.* 4. *p.* 110. *t.* 1. *f.* 12.
Habitat - - - *teſta* 6 *lineas longa.*

ſymmetrica. 148. P. teſta ovato-conica ſolida fuſca per lineas perpendiculares albas in areolas partita intus laevi alba: margine arcuatim exciſo. *Helbling Abh. der boehm. Privatg* 4 *p.* 111. *t.* 1. *f.* 13. 14.
Habitat - - - *teſta* 6 *lineas longa, lineis diverſae et triplicis quidem magnitudinis, vertice centrali, margine interno punctis albis fuſcisque alternis vario.*

citrina. 149. P. teſta ovata convexa tenerrime decuſſatim ſtriata alba: faſciis duabus latis flavis, intus exalbida: fundo lacteo vertice ſubfuſco.
Kaemmer. Conch. Rudolſt. p. 12. *t.* 2. *f.* 6.
Habitat - - - *teſta ſolida,* 10 *lineas ultra pollicem longa.*

capenſis. 150. P. teſta ovali decuſſatim ſtriata: ſtriis longitudinalibus fuſcis albisque alternis, intus ſubmargaraticea: fundo albo.

Argenv.

Argenv. Conch. t. 1. f. O.
Kaemmer. Conch. Rudolſt. p. 13. t. 2. f. 1. 2.
Habitat ad caput bonae ſpei, *raro teſta 7 lineas ultra pollicem longa intus laevi, ſtriis fuſcis 9-11 latioribus intus violaceis, albis intus flavis.*

anomala. 151. P. teſta rudi fuſca orbiculari: vertice ſubmarginali. *Müll. zool. dan. 1. p. 14. t. 5. f. 1-7. prodr. 2870.*
Habitat in fundo maris Norwegici, *ſaxis teſtaceisque emortuis affixa et quaſi continua, utrum hujus, an diſtincti generis, teſta minuta, punctis elevatis ſubtiliſſimis aſpera, interdum cinerea, ſubtus caerulea, incola ex maſſis 2 rubellis, tenucibus, intortis, per totam longitudinem fimbriatis conflato, fimbriis ex pilis confertis, flavis, rigidis quaſi criſpatis compoſitis, tendine caeruleo cum reliquo corpore cohaerentibus, ovariis ramoſis aurantiis: ovis globoſis.*

guttata. 152. P. teſta ſubtiliſſime ſtriata punctis diverſi coloris varia: fundo obſcuro.
Schroet. Einl. in Conch. 2. t. 6. f. 2. 3.
n. Litterat. 3. p. 98. n. 192-197.
Habitat - - - compreſſae affinis, teſta $\frac{1}{2}$*-1 fere pollicem longa, utplurimum cinerea, interdum florum perſicî more tincta, aut hepatica, albo variegata, punctis crebrius viridibus, quam albis aut caeſiis, rarius ſparſis, quam in radios aut ſeries digeſtis, faſciis ſaepe cingulisve 2-3 utplurimum obſcurioribus picta, nonnunquam decuſſatim ſtriata.*

mytiliformis. 153. P. teſta glaberrima plumbea: faſcia intus alba figura ferri equini.
Schroet. Einl. in Conch 2. p. 494. t. 6. f. 5.
Habitat ad inſulam Feroë, *zoophytis adhaerens teſta paulo ultra* $\frac{1}{4}$ *pollicis longa, mytilum mentiente, a dorſo ad verticem obſcuriori: fundo dilutiori.*

ſcutiformis. 154. P. teſta ovali tenui atra: ſtriis perpendicularibus complanatis albis.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 103. n. 199-201.
Habitat - - - teſta $\frac{1}{2}$*-*$\frac{3}{4}$ *pollicis longa, intus exalbida, rarius ſpadicea, vertice utplurimum cano, fundi macula ſubfuſca.*

Cochlear. 155. P. teſta alba planiuſcula: altera parte anguſta intus canaliculata callo caeruleſcente ferri equini forma notata, altera rotundata.

Knorr

Knorr Vergn. 2. *t.* 26. *f.* 3.
β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 105. *n.* 204.
γ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 106. *n.* 206.
δ) *Schroet. n. Litterat.* 3 *p.* 107. *n.* 207.
ε) *v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 18. *f.* 3.
Habitat - - - teſta 1, $1\frac{1}{2}$-2 *pollices longa, utplurimum ſolida, interdum transverſim faſciata et ſtriata: ſtriarum interſtitiis ſpadiceis, margine ſaepius extrinſecus ſtriato.*

craticulata. 156. P. teſta tenui ovali depreſſa cancellata radiata.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 111. *n.* 216-220.
Habitat - - - teſta 1-$1\frac{3}{4}$ *pollicis longa, ſaepius cana, intus alba, radiis nunc ſpadiceis, nunc ex cinereo rubris, nunc ex luteo fuſcis, nunc ſanguineis, nunc alternis rubris et albis, faſciis interdum* 2 *transverſis obſcurioribus, vertice cano, cinereo, ochroleuco, albo, ſaepius rubro guttato fundo utplurimum candido.*

cruentata. 157. P. teſta ovali convexiuſcula rubro varia ſubdentata: ſtriis elevatis inaequalibus aſperis.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 113. *n.* 221-225.
Habitat - - - teſta 1-2 *pollices longa rarius cinerea, quam alba, maculis guttisve interdum etiam albis, cinereis fuſcis intermiſtis, rarius in coronae ſpeciem digeſtis, fundo et vertice albis, hujus limbo interdum nigro maculato aut cinereo.*

papyracea. 158. P. teſta depreſſa tenui hyalina rubro punctata extrorſum ſpadiceo radiata: ſtriis confertis tenuioribus et granulatis craſſioribus.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 487. *t.* 5. *f.* 12.
Habitat - - - vertice obtuſo, teſta 1 *pollicem longa.*

cylindrica. 159. P. teſta ovali plana confertim longitudinaliter ſtriata: ſtriis craſſitie inaequalibus omnibus granulatis.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 488. *t.* 5. *f.* 13.
β) *Schroet. Einl. in Conch. p.* 487. *n.* 108.
γ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 118. *n.* 229.
δ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 118. *n.* 230.
ε) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 119. *n.* 232.
ζ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 120. *n.* 234?
η) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 122. *n.* 237?
Habitat - - - teſta $\frac{3}{4}$-1 *pollicem longa, diametri ſaepe aequalis, nunc ſanguineo alboque varia intus alba fundo cinereo, vertice ſpadiceo, nunc maculis radiisque roſeis, intus*

intus quoque albo rubroque varia: vertice albo, nunc alba punctis, maculis radiisque rubellis varia, fundo et vertice lacteis, hoc corona fuſco maculata cincto, nunc albo confertim rubello punctata, vertice corona quaſi floribunda fuſca cincto, nunc lutea ſpadiceo maculata vertice fundoque flavicantibus.

decuſſata. 160. P. teſta ſubconvexa alba confertim rubro maculata intus albo rubroque radiata decuſſatim ſtriata: ſtriis glabris; longitudinalibus nonnullis craſſioribus albis.

Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 119. *n.* 231.

Habitat - - - teſta 1¼ *pollicis fere longa, vertice obtuſo albo, fundi macula ſpatulata albida.*

haematoſticta. 161. P. teſta tenui depreſſa alba rubro punctata, intus fuſceſcente maculata ſtriata: vertice cinereo fuſceſcente vario.

Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 486. *t.* 5. *f.* 11.

Habitat - - - teſta ultra ¾ *pollicis longa, fundi macula ex teſtaceo cinerea.*

aſteroides. 162. P. teſta planiuſcula cancellata cinerea: ſtella radiisque marginem verſus ſpadiceis, vertice laevi cano punctis fuſcis circumſcripto.

Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 121. *n.* 235.

Habitat - - - teſta ultra pollicem longa, tenui: fundo teſtaceo.

ovalis. 163. P. teſta ovali convexiuſcula tenui confertim ſtriata cana: radiis maculisque nigricantibus.

Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 406. *t.* 5. *f.* 10.

Habitat - - - teſta ultra ¾ *pollicis longa: vertice obtuſo flavicante faſcia punctorum lacteorum cincto, fundo cinereo faſcia lactea cincto.*

rubella. 164. P. teſta convexiuſcula ſtriata rubella: vertice rubro maculato fundoque albidis.

Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 122. *n.* 238. 239.

Habitat - - - teſta ultra ½ *pollicem longa, nunc craſſiore, nunc tenuiore.*

ſpectabilis. 165. P. teſta planiuſcula ſubrugoſa ex rufeſcente alba ſtriata: faſcia verſus verticem ſpadicea, altera marginis interni badia.

Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 124. *n.* 241.

Habitat

Habitat - - - teſta 3 pollices longa, ſtriis circiter 18 majoribus, tenerioribus pluribus interjectis, vertice plano cinereo, fundi litura ſpatulata alba limbo cinereo, alteroque rubello notata.

conſpurcata. 166. P. teſta ſolida planiuſcula ſtriata nigra cinereo-punctata intus caeruleſcente: vertice ſordide luteo.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 497. n. 133.

Habitat - - - teſta ultra 1½ pollicem longa, altero latere anguſtiori, ſtriis complanatis, margine interno argenteo, fundi macula ovali hepatica faſcia alba ferri equini forma cincta.

melanoſticta. 167. P. teſta ſolida planiuſcula ſtriata exalbida, cinereo radiata nigro punctata, intus caeruleſcente: vertice ſubacuminato albido.

Schroet. Einl. in Conch. 2. t. 6. f. 9.

Habitat - - - conſpurcatae affinis, at teſta minore ſubpellucida, punctis nigris in 5-6 cingula digeſtis, fundo ſqualido, faſcia cana ferri equini forma cincto.

atra. 168. P. teſta nigra ſtriata: vertice dilutiore, fundi litura ſubfuſca, faſcia alba articulata ferri equini forma cincta.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 129. n. 251.

Habitat - - - teſta 1¼ pollicis longa, vertice nunc albo, nunc fuſceſcente ſtramineoque vario, margine interno nunc cinereo, nunc caeruleo, fundi litura ſpatula nunc alba et fuſceſcente varia, nunc fuſca.

ſpecularis. 169. P. teſta ovali convexa ſolida glaberrima hepatica intus et vertice fuſceſcente, hoc limbo albo faſciaque interrupta fuſceſcente cincto.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 129. n. 252.

Habitat - - - fundi macula faſcia cretacea ferri equini forma cincta.

caneſcens. 170. P. teſta ovali nigra intus caeruleſcente ſtriata: ſtriis majoribus complanatis canis, verticis obtuſi, ſubfuſci area exalbida.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 131. n. 255.

Habitat - - - teſta ultra 2 pollices longa, fundi litura ovali fuſceſcente, margine ſubcrenato.

vireſcens. 171. P. teſta oblonga planiuſcula utrinque dilatata ſtriata olivacea albo radiata maculataque intus caerulea.

Schroet.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 496. t. 6. f. 8.

Habitat rara - - - teſta 1¼ pollicis longa, altero latere anguſtiore, ſtriis longitudinalibus aequalibus, paucioribus transverſis, vertice obtuſo macula ex hepatico lutea notato, fundi macula ſpatulata aurantia: limbo albido.

pulla. 172. P. teſta rotundata convexa longitudinaliter ſtriata tranſverſim rugoſa fuſceſcente intus pulla albido et fuſceſcente radiata: faſciis ſupra duabus lacteis.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 132. n. 257.

Habitat - - - teſta 1¼ pollicis longa, ſtriis inaequalibus, vertice ſubacuminato exalbido fundi macula albo fuſcoque varia.

revoluta. 173. P. teſta ſubovali crenata ſtriata ochroleuca rubro maculata radiataque altero latere latiore: margine revoluto.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 496. t. 6. f. 7.

Habitat - - - teſta pollicem longa, intus alba, ſtriis inaequalibus, majoribus complanatis, vertice ſtramineo.

ſquamata. 174. P. teſta ovata convexa albo nigroque varia ſtriata: ſtriis ſquamoſis, vertice ſubcentrali cano.

Schroet. Einl. Conch. 2. p. 492. t. 6. f. 4.

Habitat - - - teſta pollicem fere longa, latere anguſtiore nigro radiata, ſtriis longitudinalibus ſubtilibus confertis, fundo ex albo hepatico.

teſtacea. 175. P. teſta ovata ſubtiliſſime ſtriata teſtacea: annulis tribus transverſis fuſceſcentibus, intus lutea: fundo albido.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 135. n. 261.

Habitat - - - teſta ultra ¾ pollicis longa, vertice obtuſo.

capillaris. 176. P. teſta ovata tenui fuſca obſcurius faſciata dilutius ſtriata, intus ſubfuſca, vertice fundoque albis.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 136. n. 262.

Habitat - - - teſta fere ¾ pollicis longa, ſtriis perpendicularibus tenerrimis.

glauca. 177. P. teſta ovata altero latere anguſtiore ſubtiliſſime ſtriata caeruleſcente faſcia marginem verſus alba, alteraque caeruleſcente, vertice et margine albis.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 136 n. 263.

Habitat - - - teſta ¾ pollicis fere longa perpendiculariter ſtriata intus alba faſcia ex luteo fuſca alteraque propiore alba fundum luteum cingente.

obſcura. 178. P. teſta ovata planiuſcula ſtriata fuſco et luteſcente varia viridi punctata intus fuſca: vertice badio.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 137. *n.* 264.
Habitat - - - teſta vix ½ pollicem longa.

exoleta. 179. P. teſta ovali ſubconvexa inaequaliter ſtriata exalbida: lineis nonnullis dimidiatis nigris, fundi macula ſpatulata ochroleuca.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 493. *n.* 124.
Habitat - - - teſta parum ultra ¾ pollicis longa, intus nitida alba.

affinis. 180. P. teſta ovali planiuſcula ſolida: radiis quibusdam nigris dimidiatis, fundi macula ſpatulata alba.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 138. *n.* 266.
Habitat - - - teſta ¾ pollicis longa.

fuſcata. 181. P. teſta ovata convexa ſubtiliſſime ſtriata fuſco varia.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 493. *n.* 126.
β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 138. *n.* 267.
γ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 139. *n.* 269.
Habitat - - - teſta nonnullas lineas-½ pollicem longa, maculis, punctis, faſciis atris, ſpadiceis vel fuſcis varia.

mellea. 182. P. teſta rotundata ſolida glaberrima mellea intus alba: vertice fuſceſcente, margine fuſco maculato intus argenteo, fundi litura ſpatulata hepatica.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 493. *n.* 125.
Habitat - - - teſta ultra ¾ pollices longa.

anceps. 183. P. teſta ſolida glaberrima ſubacuminata dilutius ſpadicea, intus ex incarnato alba.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 139. *n.* 271.
Habitat - - - an hujus generis?

guineenſis. 184. P. teſta ovata convexa laeviſſima altero latere latiore ſpadiceo, altero cum vertice luteo: margine utrinque incarnato.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 140. *n.* 272.
Habitat rara in Guinea, *teſta ¾ fere pollicis longa.*

complanata. 185. P. teſta depreſſo hemiſphaerica obſolete cancellata albo et fuſceſcente varia.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 141. *n.* 274.
Habitat - - - teſta minuta, vertice complanato, fundo fuſceſcente, margine altero latere albo.

186. P.

virgata. 186. P. teſta ovata longitudinaliter ſtriata albida: vertice radiisque fuſcis, intus margaritacea.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. 1. *p.* 443. *t.* 18. *f.* 10.
Habitat - - -

nivea. 187. P. teſta ſubconica ſolida glabra transverſim concentrice annulata nivea.
Adanſ. Seneg. 1. *p.* 32. *t.* 2. *f.* 3. Soron.
Habitat in Africa, *teſta diametri* 4 *circiter linearum, annulis* 7-8, *vertice rotundato.*

griſea. 188. P. teſta ovali confertim radiatimque ſulcata intus nitida: vertice ſubcentrali.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 2. *f.* 5.
Habitat in Africa, *teſta pollicem fere longa, recente utplurimum griſea aut ex viridi cinerea, interdum albida aut vinacea fuſco faſciata: ſulcis fuſcis fundo albido.*

Navicula. 189. P. teſta anguſta decuſſatim ſtriata roſea: cingulo calloſo in altero latere medio et fundo exalbidis, margine utrinque revoluto.
Meuſch. Naturf. 18. *p.* 9. *t.* 2. *f.* 6.
β) *Meuſch. Naturf.* 18. *p.* 9. *t.* 2. *f.* 5.
Habitat - - - *teſta pollicem circiter longa: margine acutiſſimo.*

cingulata. 190. P. teſta ſubovali ferruginea obſolete ſtriata: cingulis duobus elevatis obſcure faſciatis, vertice ſubcentrali.
Meuſch. Naturf. 18. *p.* 8. *t.* 2. *f.* 7.
Habitat - - - *teſtae margine utrinque revoluto.*

Scapha. 191. P. teſta candidiſſima undulatim ſtriata anguſta: latere latiore callo acuto obſeſſa, anguſtiore repanda.
Meuſch. Naturf. 18. *p.* 10. *t.* 2. *f.* 8.
Habitat - - - *teſta* $1\frac{1}{4}$ *pollicis longa, vertice verſus latus anguſtius verſo.*

Huic tribui adſcribendae videntur teſtae a Liſtero *Conch. t.* 537. *f.* 19. 20. *a* Kleinio *oſtr. t.* 8. *f.* 2. *a* Rumphio *muſ. t.* 40. *f.* M. *a* Gualtieri *teſt. t.* 8. *f.* A. C. F. *t.* 9. *f.* B. D. et L. *ab* Argenville *zoomorph. t.* 1. *f.* 1-3 *a* Knorrio *Vergn.* 3. *t.* 9. *f.* 1. 2. 4. *t.* 29. *f.* 3. *et t.* 30. *f.* 5. 5. *t.* 19. *f.* 2. *et* 6. *t.* 28. *f.* 6. *t.* 30. *f.* 5. 6. *et t.* 33. *f.* 7. *depictae, tertiae autem tribui teſtae a* Liſtero *Conch. t.* 542. *f.* 26. *et t.* 544. *f.* 29. *a* Kleinio *Oſtrac. t.* 8. *f.* 6. 7. *et a* Bonanni *muſ. Kircher.* 1. *f.* 29. *delineatae.*

***** Perforatae *vertice.*

Fiſſura. 192. P. teſta ovali ſtriato-reticulata: vertice recurvo, anterius fiſſa.
Müll. zool. dan. 1. *p.* 83. *t.* 24. *f.* 7-9. *rar.* 1. *p.* 51. *prodr.* 2864. Patella teſta ſulcato-reticulata, vertice recurvo, margine antice ſurſum fiſſo.
Klein oſtr p. 116. Patella reticulata exigua alba, fiſſura notabili in margine.
Liſt. Conch. t. 543. *f.* 28.
Pet. gaz. t. 75. *f.* 2.
Act. Nidroſ. 4. *p.* 471.
Brit. zool. t. 90 *f.* 151.
da Coſt. brit. zool. p. 11. *t.* 1. *f.* 4.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 18. *f.* 12.
Martin. Conch 1. *t.* 12. *f.* 104. 110.
Habitat ad Angliae, Norwegiae, Barbariae *littora, ſaxis, madreporae quoque pertuſae adhaerens, inter tertiam et hanc tribum media, incola albo: oculis magnis nigris palliòque cinereo albo fimbriato, teſta conica ſolida flaveſcente, intus alba laevi.*

Fiſſurella. 193. P. teſta ſulcata: vertice recurvo, anterius perforata.
Fabr. Fn. groenl. p. 384. *n.* 381. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 82. *t.* 24. *f.* 4-6. *rar.* 1. *p.* 50. *prodr.* 2865.
Habitat ad Islandiae *littora in fundo maris lapidibus adhaerens, fiſſurae affinis, at incola flaveſcente, teſta minore non reticulata, cana, intus laevi, vix ultra* $3\frac{1}{2}$ *lineas longa.*

Puſtula. 194. P. teſta ovali gibboſo-convexa ſtriato-reticulata: margine crenulato.
Liſt. Conch. t. 528. *f.* 3.
Klein oſtr. p. 116 *n.* 5.
Pet. gaz. t. 3. *f.* 12.
da Coſta Conchol t. 7. *f.* 12.
Chemn. Conch. 10. *p* 338. *t.* 168. *f.* 1632. 1633.
Schroet. Einl. in Conch 2. *t.* 5. *f.* 8.
β) *Martin. Beſch berl. Naturf.* 2. *t.* 12. *f.* 4. 5. Patella Unguis.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 173. *t.* 1. *f.* 9.
γ) *Mer ſch. Naturf.* 18. *t.* 2 *f.* 1.
Habitat in mari mediterraneo, atlantico, indico, *teſta alba, prope marginem poſteriorem perforata, ſtriis inaequalibus radiatim decurrentibus decuſſatis.*

graeca. 195. P. teſta ovata convexa: margine introrſum crenulato.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 2. *f.* 7. Gival.

Liſt.

Liſt. Conch. t. 527. *f.* 1. 2.
Tournef. it. 1. *t.* 94.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 1. *f.* 6.
Gualt. teſt. t. 9. *f.* N.
Argenv. Conch. t. 2. *f.* I.
Klein oſtr. t. 8. *f.* 3.
Knorr Vergn. 1. *t.* 30. *f.* 3.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 23.
Martin. Conch. 1. *t.* 11. *f.* 98-101. 104.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 143. *n.* 276-279.
Habitat in mari mediterraneo *et* atlantico, *teſta antrorſum latiore alba, cinerea vel lutea, frequentius maculata, radiata aut variegata, ſtriis elevatis decuſſatis, in ſectionis angulis tuberculatis.*

nimboſa. 196. P. teſta ovata ſtriata rugoſa fuſca: vertice oblongo-perforato. *Muſ. Lud. Ulr.* 696. *n.* 425.*
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 2. *f.* 6. Dalan.
Liſt. Conch. t. 528. *f.* 4.
Columm. aq. 11. *t.* 12. *f.* 3.
Ginann. adr. 2. *t.* 2. *f.* 19.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 1. *f.* 3.
Gualt. teſt. t. 9. *f.* P? Q. R. S. T.
Argenv. Conch. t. 2. *f.* C.
Martin. Conch. 1. *t.* 11. *f.* 91. 92.
Habitat in mari mediterraneo *et* atlantico, *teſta ad* 2 *pollices longa alba, griſea vel ſanguinea, interdum violaceo radiata et fundum verſus viridi nebuloſa, ſtriis ſubtilibus nunc ſquamoſis, nunc noduloſis.*

Nubecula. 197. P. teſta ſubovata rugoſa, alba rubro radiata: vertice ovato-perforato.
Habitat frequens in mari mediterraneo, *nimboſae affinis, at teſta minore: fundo fuſco.*

picta. 198. P. teſta ovata ſolida albo et vireſcenti nebuloſa: radiis obliquis undulatis alternis violaceis et albis.
Davil. Catal. t. 3. *f.* C.
Martin. Conch. 1. *t.* 11. *f.* 90.
Habitat in freto magellanico, *teſta* $3\frac{1}{2}$ *pollices longa, annulis* 6 *duplicibus circumſcripta, verticis foramine rotundo.*

barbadenſis. 199. P. teſta oblonga inaequaliter ſtriata, intus laevi lactea vireſcente faſciata, margine crenulato.
Liſt. Conch. t. 528. *f.* 7.

 Martin.

Martin. Conch. 1. *t.* 11. *f.* 93. 96. 97.
Habitat ad inſulam Barbados, *teſta nunc griſea, nunc ex luteo vireſcente crebro maculata aut radiata, ſtriis granulatis aut ſquamoſis, verticis foramine circulari annulo ſpadiceo cincta.*

jamaicenſis. 200. P. teſta albida transverſim annulata: ſtriis longitudinalibus tuberculis foliaceis extrorſum majoribus obſeſſis.
Liſt. Conch. t. 528. *f.* 6.
Martin. Conch. 1. *t.* 11. *f.* 94.
β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 146. *n.* 282.
Habitat ad inſularum Jamaicae *et* Barbados *littora, verticis foramine oblongo.*

caffra. 201. P. teſta ovata compreſſa ſtriata ſubtiliſſime annulata nigro radiata: margine dentato intus nigro, fundo lacteo, verticis foramine ſubcentrali.
Martin. Conch. 1. *t.* 11. *f.* 95.
Habitat rara ad caput bonae ſpei, *teſta cinerea aut alba, nonnunquam verticem verſus viridi.*

perforata. 202. P. teſta convexiuſcula transverſim rugoſa fuſceſcente ſtramineo-radiata maculataque: ſtriis longitudinalibus alternatim majoribus ſquamoſis.
Martin. Conch. 1. *t.* 11. *f.* 97.
Habitat - - - teſta $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, fuſceſcente intus alternatim albo vireſcente faſciata, vertice dilutiore annulo ſtramineo cincto, margine ſubdenticulato intus crenato, fundo rubeſcente.*

porphyrozonias. 203. P. teſta oblonga compreſſa inaequaliter ſtriata alba: cingulis quinque purpureis interruptis, intus ex albo vireſcente.
Martin. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 102. 103.
β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 155. *n.* 299.
Habitat rarior in America *ſeptentrionali, foramine verticis minuto orbiculari, intus circulo ſanguineo cincto.*

roſea. 204. P. teſta tenerrime ſtriata, radiis alternis roſeis albisque picta, verticis foramine ovali.
Liſt. Conch. t. 529. *f.* 22.

Martin.

Ad hanc tribum pertinent teſtae a Liſtero *Conch. t.* 528. *f.* 5. *ab* Argenville *Conch. t.* 2. *f.* E. *et a* Knorrio *Vergn.* 4. *t.* 29. *f.* 4. *depictae.*

Martin. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 105.
Schroet. n. Litterat 3. *p.* 166. *n.* 316. 317. 284.
Habitat - - teſta minuta alba faſcia interdum transverſa roſea picta intus nonnunquam vireſcente, nunc oblonga compreſſa, nunc rotundata convexa: verticis foramine intus annulo rubro circumſcripto.

Scutellum. 205. P. teſta utrinque repanda compreſſa: verticis foramine ſulcis radiato.
Meuſch. Naturf. 18. *p.* 11. *t.* 2. *f.* 3.
β) *Meuſch. Naturf.* 18. *p.* 11. *t.* 2. *f.* 2.
γ) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 512. *t.* 6. *f.* 11.
δ) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 512. *n.* 167.
ε) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 511. *n.* 165.
ζ) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 511. *n.* 164.
η) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 172 *n.* 325.
ϑ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 173. *t* 1. *f.* 8.
Habitat - - - teſta 1 - 1½ *fere longa, interdum cingulis magis minusve elevatis notata, crebrius longitudinaliter ſtriata, aut ſulcata, ex flaveſcente exalbida radiis undulatis anguſtis violaceis, aut cinereſcentibus picta, vel dimidiato alba et caerulea, vel cinereo alboque varia, vel alba ſulcis rubris radiata, aut extrorſum radiis roſeis picta, vel cinerea, intus utplurimum alba.*

Avellana. 206. P. teſta tenera alba tenerrime ſtriata: verticis foramine oblongo per ligamentum interjectum bipartito.
Meuſch. Naturf. 18. *p.* 10. *t.* 2. *f.* 4.
β) *Argenv. Conch. t.* 2. *f.* E?
Habitat - - - rariſſima, teſtae margine utrinque ſubrevoluto.

ſpinoſa. 207. P. teſta ovata convexa alba: ſtriis elevatis extrorſum craſſioribus quadrifariam tuberculatis; tuberculis exterioribus ſpinoſis.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 513. *t.* 6. *f.* 12.
Habitat - - - teſta intus exalbida, vertice roſeo: apertura oblonga, margine interno crenato.

denticulata. 208. P. teſta ovata gibba exalbida fuſco radiata, intus viridi: ſtriis elevatis ſubrugoſis alternatim majoribus, margine denticulato intus crenato.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 513. *n.* 169.
Habitat - - - teſta pollicem circiter longa, verticis foramine parallelogrammo, fundo albo.

nodulosa. 209. P. teſta ovata convexiuſcula intus alba: ſtriis elevatis nodulosis transverſas teneriores decuſſantibus, vertice nigro.
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 514. n. 170.
β) Schroet. n. Litterat. 3. p. 160. n. 306.
Habitat - - - teſta interdum cineraſcente: ſtriis albis, intus nonnunquam cineraſcenti-radiata, margine repando.

anguſta. 210. P. teſta depreſſa alba: ſtriis elevatis; quaternis majoribus, verticis foramine anguſtiſſimo, faſcia ſpadicea intus viridi cincto.
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 514. t. 6. f. 13.
Habitat - - - teſta ¾ circiter pollicis longa.

inaequalis. 211. P. teſta ovata convexa decuſſatim ſtriata alba latere latiore ſubtriangula: verticis foramine annulo elevato linea rubra circumſcripta cincto.
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 145. n. 172.
Habitat - - - teſta pollicem longa, margine intus faſcia vireſcente.

minuta. 212. P. teſta ovali-pyramidata rubella: ſtriis elevatis duodecim fundoque albis, verticis medii foramine ovali, margine denticulato.
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 515. n. 173.
Habitat - - - teſta dimidium pollicem longa.

conſperſa. 213. P. teſta ovata convexa ſtriata flavicante rubro punctata: radiis tribus obliquis, intus laevi alba.
Schroet. Einl. in Conch 2. p. 515. n. 174.
Habitat - - - teſta vix ¾ pollicis longa, vertice ſubcentrali, foramine lineari, margine integro.

rubeſcens. 214. P. teſta ovali ſtriata rubella: faſcia media intusque alba: margine integro, verticis foramine lineari.
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 515. n. 175.
Habitat - - - teſta parum ultra ¾ pollicis longa, tenui, margine lateris latioris repando, ceterum integro.

ſanguinea. 215. P. teſta ovali tenera ſanguinea intus ex albo vireſcente: ſtriis longitudinalibus ſubtiliores transverſas extrorſum rugoſas decuſſantibus.
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 516. n. 176.

Habitat

Ad hanc tribum ſpectant, an diſtinctae ſpecies? teſtae a Liſtero *Conch. t. 528. f. 5. et a* Knorrio *Vergn. 4. t. 29. f. 4. depictae.*

Habitat - - - teſta vix ½ pollicem longa, anguſta: margine integro, fundo rubello.

ventricoſa. 216. P. teſta ovali ventricoſa ſtriis decuſſatis rubris exarata, intus alba: verticis depreſſi foramine orbiculari, margine integro.
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 516. t. 6. f. 14.
Habitat - - - teſta fere pollicem longa.

triradiata. 217. P. teſta ovali planiuſcula ſtriata alba: radiis tribus fuſcis, intus exalbida: verticis foramine lineari, margine integro.
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 517. t. 6. f. 15.
Habitat - - - teſta parum ultra ½ pollicem longa, vertice ſubcentrali.

tenuis. 218. P. teſta ovali convexiuſcula pellucida longitudinaliter ſtriata alba: radiis quinque dimidiato fuſcis, intus flavicante.
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 517. n. 179.
Habitat - - - teſta parum ultra ¼ pollicis longa, verticis foramine ambitu cinereo intus punctato.

melanozonias. 219. P. teſta convexa roſea: faſcia interrupta nigra ſtriisque elevatis inaequalibus albis, intus alba laevi, margine denticulato.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 148. n. 286.
Habitat - - - teſta 1¼ pollicis longa, ſtriis majoribus ſquamoſis, vertice acuminato: foramine orbiculari, intus annulo elevato cineraſcente cincto.

effuſa. 220. P. teſta convexa roſea: ſtriis elevatis noduloſis alternatim majoribus albis, intus alba laevi, verticis foramine orbiculari amplo.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 149. n. 287.
β) *Schroet. n. Litterat. 3. p. 149. n. 288.*
γ) *Schroet. n. Litterat. 3. p. 150. n. 289.*
Habitat - - - teſta 1¼ pollicis longa, margine ſubcrenato intus vireſcente.

punicea. 221. P. teſta convexa ſpadicea inaequaliter confertim et decuſſatim ſtriata, intus laevi faſciis alternis viridibus albisque picta, verticis foramine orbiculari.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 150. n. 290.
β) *Schroet. n. Litterat. 3. p. 151. n. 291.*
Habitat - - - teſta ultra pollicem longa, verticis foramine annulo ſpadiceo, intus albo elevato cincta, margine integro.

222. P.

rufeſcens. 222. P. teſta convexa alba rubello obumbrata, hinc inde rubro ſtriata, ſtriis granulatis exarata, intus laevi alba.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 151. n. 292.
Habitat - - - margine integro transverſim ſtriato, verticis foramine ovali.

dimidiata. 223. P. teſta convexa ſupra candidiſſima cancellata, marginem verſus longitudinaliter ſtriata: faſcia roſea.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 152. n. 293.
Habitat - - - teſta pollicem longa, intus laevi alba, margine ſubintegro, verticis foramine orbiculari.

lactea. 224. P. teſta convexa alba, ſtriis inaequalibus acutis glabris exarata, intus laevi: vertice roſeo; foramine amplo orbiculari.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 152. n. 294.
Habitat - - - teſta ultra pollicem longa.

pyramidalis. 225. P. teſta convexa roſea ſtriata: coſtis duodecim laevibus, intus laevi ex vireſcente alba.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 153. n. 295.
Habitat - - - teſta 1¼ pollicis fere longa.

bicolor. 226. P. teſta anguſta alternatim ſpadiceo alboque radiata: ſtriis inaequalibus craſſis denſe lamellatis, intus laevi alba, margine crenulato.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 153. n. 296.
Habitat - - - teſta 1¼ pollicis longa, margine inflexo, verticis foramine oblongo.

erythrocephala. 227. P. teſta convexa alba exterius rubro lineata: ſtriis elevatis rugoſis contrariis: decem majoribus margine repando inflexo.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 154. n. 297.
Habitat - - - teſta 1¼ pollicis longa, vertice rubello.

verrucoſa. 228. P. teſta ſupra fuſca ſtriata cingulo nodoſo terminata, infra rubro radiata, coſtis acutis noduloſis inaequali, margine denticulato repando.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 156. n. 300.
Habitat - - - teſta ¾ pollicis longa convexiuſcula, intus laevi ex albo vireſcente, verticis foramine orbiculato.

contaminata. 229. P. teſta convexa coſtis noduloſis inaequalibus, majoribus ex luteo fuſcis aſpera, guttis atris in circulos interruptos digeſtis picta, intus ex vireſcente alba: vertice cinereo.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 156. t. 1. f. 7.

Habitat

Habitat - - - margine teſtae repando, intus integro gramineo, verticis foramine intus annulo elevato gramineo, alteroque circulo fuſco cincto.

atrata. 230. P. teſta convexiuſcula anguſta alba rubello lineata, extrorſum nigro maculata: ſtriis elevatis convexis inaequalibus: verticis foramine oblongo; ambitu ſpadiceo.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 158. n. 103.
Habitat - - - teſta ¾ fere pollicis longa, margine crenato, verticis foramen intus ambiente, annulo rubello.

candicans. 231. P. teſta alba verſus marginem repandum ſpadicea: coſtis viginti alternatim majoribus, verticis rubelli foramine oblongo.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 158. n. 304.
Habitat - - - teſta ultra ¾ pollicis longa.

ſuccincta. 232. P. teſta ovato-acuminata alba ſupra laevi cingulo medio elevato, verſus marginem denticulatum ferrugineo punctatum ſtriis elevatis inaequalibus laevibus.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 160. n. 307.
Habitat - - - teſta ¾ pollicis longa, verticis foramine anguſto orbiculato.

puſilla. 233. P. teſta planiuſcula alba ſuborbiculata: ſtriis elevatis viginti: alternatim minoribus brevioribus, verticis foramine rotundo utrinque circulo rubello cincto.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 161. n. 308.
Habitat - - - teſta ½ pollicem longa lataque.

flaveſcens. 234. P. teſta tenuiſſima effuſa acuminata ſubtiliter ſtriata flavicante: radiis ſex fuſcis margine denticulato, verticis cinerei foramine oblongo.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 165. n. 315.
Habitat - - - teſtae longitudine ½ pollicem non aſſequente.

antiquata. 235. P. teſta convexiuſcula, obſolete ſtriata alba: exterius radiis ſanguineis ſtriatis, verticis foramine oblongo inaequali.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 167. f. 319.
Habitat - - - teſta pollicem longa, margine integro.

galeata. 236. P. teſta ſolida ovata compreſſa intus alba: verticis ſubrecurvi obtuſi foramine lineari, margine crenato.
Helbling Abh. der boehm. Privatg. 4. p. 103. t. 1. f. 3. 4.
Habitat - - - teſta 6 lineas longa ſtriata: margine intus ochroleuco.

perſonata. 237. P. teſta convexa decuſſatim lineata: radiis atris. *Martyn univ. Conch.* 2. *t.* 64.
Habitat ad inſulas Falkland.

332. DENTALIUM. *Animal* Terebella.

Teſta univalvis, tubuloſa, recta, monothalamia utraque extremitate pervia.

elephantinum. 1. D. teſta decemangulata ſubarcuata ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 699. *n.* 426.*
Rumpf muſ. t 41. *f.* 1. Denticulus elephanti.
Argenv. Conch. t. 3. *f.* H. Dentalis.
zoomorph. t. 1. *f.* H.
Liſt. Conch. t. 547. *f.* 1.
Pet. amb. t. 16. *f.* 33.
gaz. t. 13. *f.* 9.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 1. *f.* 8.
Gualt. teſt. t. 10. *f.* I.
Ginann. adr. 2. *t.* 1. *f.* 1.
Knorr Vergn. 1. *t.* 29. *f.* 3.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. p. 430. *vign.*
Martin. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 5. A.
β) *Argenv. Conch. t.* 3. *f.* I.
Habitat in mari indico, ſiculo *aliisque* europaeis, *teſta ad* 4 *fere pollices longa viridi, obſcurius exterue annulata, apice alba, intus laevi.*

aprinum. 2. D. teſta decemangulata ſubarcuata laevi.
Martin. Conch. 1. *t.* 4. B.
Habitat in mari indico, *nonne varietas elephantini? teſta alba, profundius ſulcata, utplurimum anguſtiori, inter angulos, interdum* 8-12, *aut laeviſſima, aut ſubtiliſſime ſtriata.*

Dentalis. 3. D. teſta viginti ſtriata ſubarcuata interrupta.
Rumpf muſ. t. 41. *f.* 6.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 18. *f.* 13.
Habitat rarum in mari mediterraneo, *teſta aut tota, aut apice acuminato rubro.*

Entalis. 4. D. teſta tereti ſubarcuata continua laevi. *Fn. ſuec.* 2201. *Muſ. Lud. Ulr.* 699. *n.* 427.* *Müll. zool. dan. prodr.* 2852.
Argenv.

Argenv. Conch. t. 3. f. K. *et t.* 29. *f.* 2. **Antalis.**
Liſt. Conch. t. 547. *f.* 2. *et t.* 1056. *f.* 4.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 1. *f.* 9.
Gualt. teſt. t. 10. *f.* E.
Ginann. adr. 2. *t.* 1. *f.* 2.
Knorr Vergn. 1. *t.* 29. *f.* 4.
Martin. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 1. 2.
Habitat ad Indiae, Perſiae, Europae littora, *teſta ad* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, alba, apice interdum rubella aut flavicante, nunc ſolidiore; nunc tenuiore, nunc anguſtiore, nunc ampliore, nunc acuminata, nunc obtuſa, quaſi polita; ſtriis tamen interdum nudo oculo vix conſpicuis exarata.*

arietinum. 5. D. teſta tereti arcuata continua laevi. *Müll. zool. dan. prodr.* 2853.
Habitat ad Scandinaviae *littora, Entali proxime affine, teſta tamen magis arcuata octuplo minori.*

corneum. 6. D. teſta tereti ſubarcuata interrupta opaca.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 523. *t.* 6. *f.* 16.
Habitat rarum in Oceano africano, *Entali affine, teſta ad* $1\frac{1}{4}$ *pollicis longa, laevi, cornea, aut ex luteo fuſca, apice obtuſa, rotundata.*

politum. 7. D. teſta tereti ſubarcuata continua: ſtriis annularibus confertiſſimis.
Rumpf muſ. t. 41. *f.* 5.
Gualt. teſt. t. 10. *f.* F.
Martin. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 3. A.
Habitat rarum in mari indico *et* ſiculo, *Entali affine, teſta* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, polita, valde acuminata, lactea, rarius roſea: ſtriis annularibus albis aut viridibus.*

eburneum. 8. D. teſta tereti ſubarcuata continua: annulis remotis.
Habitat in India, *Entali ſimillimum, teſta candidiſſima laeviſſima, nitida, ſtriis annularibus convexis numeroſis.*

minutum. 9. D. teſta tereti erectiuſcula laevi minuta.
Planc. Conch. t. 2. *f.* 2.
Habitat in mari mediterraneo, *at tam exile, ut niſi armatis oculis diſcerni non poſſit, ſetam potius aut echini aculeum referens.*

faſciatum. 10. D. teſta ſubtiliſſime ſtriata ſubarcuata griſea obſcurius faſciata.
Martin. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 3. B.

Habitat

Habitat in mari ſiculo, *teſta minuta ſolida, pennae corvinae craſſitie, faſciis* 4-5 *obſcure cinereis aut fuſcis*

nebuloſum. 11. D. teſta arcuata laeviſſima alba fulvo maculata nebuloſaque.
Habitat in mari ſiculo, *faſciato affine, at teſta magis arcuata, longiore et tenuiore.*

rectum. 12. D. teſta recta duplicato ſtriata annulata.
Gualt. teſt. t. 10. *f.* H.
Martin. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 4. A.
Schroet. Einl. in Verſt t. 3. *f.* 5.
Habitat - - - elephantino ſimile, at teſta minus acuta: apertura ampliore magis obtuſa, praeter longitudinales, rarius triplicatas, annularibus quoque exarata, ex albo vireſcente annulis viridibus varia, aut alba, aut teſtacea.

ſtriatulum. 13. D. teſta octangulata octoſtriata acuminata viridi apice alba.
Liſt. Conch. t. 547. *f.* 1. b.
Martin. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 5. B.
Habitat rarius in mari ſiculo, *elephantino affine, at teſta longiore, anguſtiore, apertura altera angulata, altera anguſtiſſima orbiculata.*

foſſile. 14. D. teſta ſubtereti obtuſiuſcula ſtriata: ſtriis ſubtilibus aequalibus.
Schroet. Einl. in Verſt. 4. *t* 3. *f.* 7.
Habitat - - - hactenus modo foſſile prope Loretto *in* Italia *repertum, ſtriatulo affine, at teſta non angulata, minus acuminata, amplius aperta.*

annulatum. 15. D. teſta tereti oblique ſtriata.
Guettard mineral. Beluſtig. 4. *t.* 5. *f.* 3.
Habitat - - - hactenus modo foſſile repertum.

arcuatum. 16. D. teſta angulata arcuata ſubulata unicolore.
Gualt. teſt. t. 10. *f.* G.
Habitat - - - teſta vireſcente.

pellucidum. 17. D. teſta cornea flexili rectiuſcula terete laevi.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 529. *t.* 6. *f.* 17.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *teſta dilute mellea, anguſtiſſima, tenui, ad* $2\frac{1}{4}$ *pollicis longa, cum acidis non efferveſcente.*

Radula. 18. D. teſta ſubarcuata obtuſiuſcula decuſſatim ſtriata: ſtriis longitudinalibus granulatis.

Schroet.

Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 530. *n.* 9.

Habitat - - - hactenus modo foſſile in Pedemontio *inventum: teſta ad pollicem usque longa.*

interruptum. 19. D. teſta decuſſatim ſtriata: ſtriis omnibus laevibus; longitudinalibus ſubtilioribus interruptis.

Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 530. *n.* 10.

Habitat - - - hactenus modo foſſile in Pedemontio *inventum.*

vitreum. 20. D. teſta hyalina glaberrima ſubarcuata.

Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 531. *n.* 11.

Habitat - - - hactenus modo foſſile in Pedemontio *repertum, teſta ſolida,* $\frac{3}{4}$ *pollicis longa, diametri* $\frac{1}{4}$ *pollicis, apicem verſus ſenſim decreſcentis.*

ſexangulum. 21. D. teſta ſexangulata ſtriata.

Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 531. *n.* 12.

Habitat - - - hactenus modo foſſile prope Loretto *in* Italia *deprehenſum.*

333. SERPULA. *Animal* Terebella.

Teſta univalvis, tubuloſa, adhaerens, (ſaepe iſthmis integris paſſim intercepta).

nautiloides. 1. S. teſta planiuſcula minuta confluente verrucoſa ſpirali iſthmis intercepta: ſeptis ſemilunaribus tenerrimis.

Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 283. *t.* 3. *f.* 22. 33.

Habitat in mari norwegico, *madreporae proliferae adhaerens, teſta utplurimum ſeminis milii magnitudine, ut tamen interdum diameter* $\frac{1}{4}$ *pollicis aequet, fuſceſcente aut alba, figurae inconſtantis, nunc magis oblonga, nunc magis orbiculari, ſeptis parallelis, apertura anguſtiſſima.*

Seminulum. 2. S. teſta regulari ovali libera glabra. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 376. *n.* 370.

Gualt. teſt. t. X. *f.* S.

Planc. Conch. t. 2. *f.* 1?

Martin. Conch. 1. *t.* 3. *f.* 22. a. b.

Habitat in mari adriatico *et* rubro, *foſſilis in ſtrato conchaceo prope* Caſſellas *frequens, grani arenae magnitudine,*

 teſta

teſta alba vel flavicante, anfractibus ſibi appreſſis, apertura anguſta, compreſſa.

planorbis. 3. S. teſta orbiculata regulari plana aequali. *Fn. ſuec.* 2102.
Habitat in conchis *pelagicis, teſta primo intuitu ſquamulam orbiculatam ante adnatam referente, ſpirarum rudimento externo nullo, at fracta horizontaliter diſcedente, intusque oſtendente ſpiram peregrinae teſtae, vix inſidebat, inſculptam, tanquam circulos concentricos.*

Spirillum. 4. S. teſta regulari ſpirali orbiculata pellucida: anfractibus teretibus ſenſimque minoribus. *Fn. ſuec.* 2203. *Müll. zool. dan. prodr.* 2854. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 376. *n.* 371.
Planc. Conch. t. 1. *f.* 8.
Ginann. adr. 2. *t.* 1. *f.* 7.
Martin. Conch. 1. *t.* 3. *f.* 20. C. D.
Pallas nov. act. Petrop. 2. *p.* 236. *t.* 5. *f.* 21. (*animal*)
Habitat in Oceano, *et* mari mediterraneo, *ſertulariis aliisque zoophytis, teſtaceis quoque inſidens, at teſta triplo minori, ſubtus et anfractuum latere centrum reſpiciente ſulcis oculo nudo non uſurpandis inaequali.*

Spirorbis. 5. S. teſta regulari ſpirali orbiculata: anfractibus ſupra introrſum ſubcanaliculatis ſenſimque minoribus. *Fn. ſuec.* 2204. *It. wgoth. t.* 170. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 8. *t.* 86. *f.* 1-6. *prodr.* 2855. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 377. *n.* 372.
Liſt. Conch. t. 553. *f.* 5.
Petiv. gaz. t. 35. *f.* 8.
Gualt. teſt. t. 10. *f.* O.
Ginann. adr. 2. *t.* 1. *f.* 8.
Klein tubul. t. 1. *f.* 8.
Baſter op. ſubſec. 1. *p.* 79. *t.* 9. *f.* 3.
Planc. Conch. 18. *n.* 3.
Martin. Conch. 1. *t.* 3. *f.* 21. A. B. *et f.* 21. O.
β) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 116. *f.* 999.
Habitat in Oceani, *potiſſimum ſeptentrionalis, et* pelagi *fucis, zoophytis, teſta variae magnitudinis, apertura fere circulari: limbo albo.*

triquetra. 6. S. teſta repente flexuoſa triquetra. *Fn. ſuec.* 2206.* *Muſ. Lud. Ulr.* 698. *n.* 428.* *It. wgoth.* 170. *Müll. zool. dan. prodr.* 2856. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 379. *n.* 374.
Gualt. teſt. t. 10. *f.* P.
Ephem. Ac. Nat. Curioſ. 1727. *p.* 315. *t.* 10.
Baſter opuſc. ſubſ. 1. *t.* 9. *f.* 2. A. B. C.

Stroem.

Stroem. act. Nidroſ. 4. *p.* 53. *t.* 2. *f.* 14.
act. Havn. 10. *p.* 17. *t.* 6. *f.* 1-5.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 18. *f.* 14.
Martin. Conch. 1. *t.* 3. *f.* 25.
Habitat in Oceano, mari *etiam* caſpio, *teſtaceis, fucis, lapidibus, navibus inſidens, teſta alba, pellucida, figurae variabilis,* $\frac{1}{2}$-$\frac{3}{4}$ *pollicis longa, non raro longiore, dorſo carinato, interdum denticulato, apertura anguſta circulari.*

intricata. 7. S. teſta filiformi ſcabra tereti flexuoſa.
Guettard. mineral. Beluſt. 3. *t.* 6. *f.* 12. 13.
Habitat in mari mediterraneo, atlantico, indico, *pinnis aliisque teſtaceis inſidens, teſta ex cineraſcente alba ſubrugoſa, oculo armato rudi et valde ſcabra, fili tenuioris inſtar flexa.*

filograna. 8. S. teſtis capillaribus faſciculatis ramoſo glomeratis cancellatisque.
Raj. hiſt. 1. *p.* 65. Reticulatum tophaceum.
Bocc. muſ. 228. *t.* 2. *f.* 13. *et t.* 7. *f.* 2. Rete marinum.
Act. petrop. 7. *p.* 374. *t.* 16. *f.* 3. Tubipora.
Planc. Conch. add. ad p. 18. Tubularia filograna.
Pallas elench. zooph. p. 239. Serpula corallifica.
Seb. muſ. 3. *t.* 100. *f.* 8.
Guettard mineral. Beluſt. 4. *t.* 6. *f.* 14.
Schroet. Einl. in Verſt. 4. *t.* 2. *f.* 12.
Habitat rara in mari mediterraneo, *teſta ad* 4 *pollices longa, ſingulis teretibus utrinque laevibus.*

granulata. 9. S. teſta tereti ſpirali glomerata: latere ſuperiore ſulcis tribus elevatis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2857. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 380. *n.* 375.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *gregaria, lapidibus et teſtaceis adhaerens, teſta alba, ſeminis coriandri magnitudine, ſubumbilicata.*

contortuplicata. 10. S. teſta ſemitereti rugoſa glomerata carinata. *Fn. ſuec.* 2205. *Muſ. Lud. Ulr.* 698. *n.* 429.* *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 381. *n.* 376.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 1. *f.* 20. G.
Argenv. Conch. t. 4. *f.* B. C. D.
zoomorph. t. 1. *f.* L.
Martin. Conch. 1. *t.* 3. *f.* 24. A.
β) *Argenv. Conch. t.* 4. *f.* E.

 Habitat

Habitat frequens in mari adriatico *et* americano, *teſta alba, cinerea, aut ex luteo fuſca intus laevi, calami ſcriptorii craſſitiem interdum aſſequente, transverſim ſtriata*, 3, 4 *et plures pollices longa.*

glomerata. 11. S. teſta tereti decuſſato-rugoſa glomerata. *Fn. ſuec.* 2207. *Muſ. Lud. Ulr.* 699. *n.* 430.* *Müll. zool. dan. prodr.* 2858. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 381. *n.* 377.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 11. *f.* 2. Liſpe.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 1. *f.* 20. E.
Gualt. teſt. t. 10. *f.* T.
Argenv. Conch. t. 4. *f.* G.
Martin. Conch. 1. *t.* 3. *f.* 23.
Habitat in Oceano *ſeptentrionali*, mari ſiculo, atlantico, caſpico, *teſta alba, fuſceſcente, cinerea, fuſca vel alba, intus laevi, ad* 23 *usque libras interdum pondere aequante.*

lumbricalis. 12. S. teſta tereti flexuoſa: apice ſpirali acuto. *Muſ. Lud. Ulr.* 699. *n.* 431.*
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 11. *f.* 1. Vermet.
Liſt. Conch. t. 548. *f.* 1.
Bonann. muſ. Kircher. 1. *f.* 20. M.
Rumpf muſ. t. 41. *f.* 1.
Gualt. teſt. t. 10. *f.* Q. V.
Ginann. adr. 2. *t.* 2. *f.* 14.
Argenv. Conch. t. 4. *f.* I.
Knorr Vergn. 2. *t.* 13. *f.* 1. *et* 4. *t.* 17. *f.* 2.
Martin. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 12. B. *et t.* 3. *f.* 24. B.
β) *Bonann. recr. et muſ. Kircher.* 1. *f.* 20. A?
Rumpf muſ. t. 41. *f.* 4.
Martin. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 15.
γ) *Bonann. recr. et muſ. Kirch.* 1. *f.* 20. C?
Knorr Vergn. 1. *t.* 29. *f.* 5?
Martin. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 16?
Habitat rarior in mari adriatico, atlantico, indico, *utplurimum gregaria, teſta transverſim coſtata, longitudinaliter rugoſa*, 3-4, *et plures pollices longa; an hujus generis? certe incola differre videtur.*

polythalamia. 13. S. teſta tereti diaphana laevi rectiuſcula polythalamia.
Rumpf muſ. t. 41. *f.* D. E. Solen arenarius.
Martin. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 6.
Habitat rarior in mari mediterraneo *et* indico, *in arena latens, teſta exterius alba, transverſim rugoſa et annulata, finem*

finem latiorem verſus ſordidula, intus ſeptis transverſis hinc convexis inde concavis non perforatis diſtincta, ex pluribus quaſi coalitis tubulis conſtata.

arenaria. 14. S. teſta articulata integra diſtincta ſubtus planiuſcula. *Muſ. Lud. Ulr.* 700. *n.* 432.*
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 11. *f.* 5. Muſier.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 1. *f.* 20. B.
Gualt. teſt. t. 10. *f.* L. N.
Argenv. Conch. t. 4. *f.* H.
Martin. Conch. t. 3. *f.* 19. A. B. C.
β) *Rumpf muſ. t.* 41. *f.* L?
Martin. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 10?
Habitat rara in mari Indiam *et occidentalem* Africam *alluente, teſta alba radiis undulatis dilute fuſcis picta, aut exalbida intus laevi, exterius cancellata: ſtriis interdum nodulofis, circa centrum ſpiraliter contorta: an potius teredinis ſpecies?*

anguina. 15. S. teſta teretiuſcula ſubſpirali: fiſſura longitudinali ſubarticulata. *Muſ. Lud. Ulr.* 701. *n.* 433.*
Liſt. Conch. t. 548. *f.* 2.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 1. *f.* 20. F?
Rumpf muſ. t. 41. *f.* H. *et* 2.
Gualt. teſt. t. 10. *f.* Z.
Guettard. miner. Beluſt. 4. *t.* 5. *f.* 36.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 18. *f.* 15.
Martin. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 13. A. B. C. *et f.* 14.
β) *Liſt. Conch. t.* 1056. *f.* 3?
Klein tub. t. 1. *f.* 3?
Seb. muſ. 3. *t.* 94?
Martin. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 11?
γ) *Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 18. *f.* 16. Serpula muricata.
Habitat rarior in mari indico, *teſta polymorpha, nunc tereti, nunc angulata, nunc porrecta, nunc magis minusve flexuoſa, nunc glabra, nunc ſcabra, fiſſurae articulis interdum obſoletis; an hujus generis?*

vermicularis. 16. S. teſta tereti ſubulata curvata rugoſa. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 9. *t.* 86. *f.* 7-9.
Ellis corall. t. 38. *f.* 2. Tubus vermicularis.
Klein tubul. t. 1. *f.* 1?
Habitat in Oceano Europaeo; *animalis inhabitantis proboſcide interiori e fundo exterioris pro lubitu exſerenda, lichenem pyxidatum referente.* Skene.

Penis. 17. S. teſta tereti recta extremitate radiata: diſco poris cylindricis. *Muſ. Lud. Ulr.* 702. *n.* 434.*
Argenv. Conch. t. 3. *f.* G. Penicillus marinus.
Liſt. Conch. t. 548. *f.* 3.
Bonann muſ. Kirch. 1. *f.* 38.
Rumpf muſ t. 41. *f.* 7.
Valent Abh. t. 10. *f.* 87.
Gualt. teſt. t. 10. *f.* M.
Knorr Vergn. 4. *t.* 28 *f.* 1. *et* 6. *t.* 40. *f.* 1.
Muſ. Leeſſ p. 3. *n.* 4. *f.* 1.
Muſ Gronov. p. 136. *n.* 1447.
Mazéas act. pariſ. extrans. 9. *p.* 299. *t.* 1-3. *et p.* 317? *t.* 1. 2.
Martin. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 7.
Beſch. berl. Naturf. 2. *t.* 11. *f.* 1-5.
Habitat pretioſa in mari indico, *teſta alba, aut cineraſcente rubro obumbrata, laeviuſcula, ſenſim attenuata, fine tenuiori aperta, ad* 6 *pollices longa, fine convexo; nonne potius ad teredinem releganda?*

echinata. 18. S. teſta teretiuſcula flexuoſa roſea multifariam aculeata fine obtuſa.
Gualt teſt. t. 10. *f.* R.
Martin. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 8.
Habitat - - - teſta pennae corvinae craſſitie, apertura marginata.

Ocrea. 19. S. teſta teretiuſcula ſtriata fuſca.
Rumpf muſ t. 41. *f.* K.
Martin. Conch 1. *t.* 1. *f.* 9.
Habitat in mari indico, *coralliis affixa.*

protenſa. 20. S. teſta nitida laeviuſcula annulatim plicata finem verſus parum attenuata.
Rumpf muſ. t. 41 *f.* 3.
Martin Conch 1. *t.* 2. *f.* 12. A.
Habitat in mari indico *et* Americam *alluente, lactea, exalbida aut caeruleſcente, calami anſerini craſſitie aut tenuiori, tota porrecta, aut partim flexuoſa.*

21. S.

Huic generi adnumerandae videntur teſtaceae a Bonanni *recr. et muſ Kircher.* 1. *f.* 20. D. *a* Gualtieri *teſt. t.* 10. *f.* W. *et* X. *ab* Argenville *Conch. t.* 4. *f.* F. *a* Seba *muſ.* 3. *t.* 93. *f* 3. 4. 6-9. *a* Knorr *Vergn* 5. *t.* 22. *f.* 1. *et a* Guettard *mineral. Beluſtig.* 4. *p.* 306. *t.* 5. *f.* 37. *depictae.*

decuſſata. 21. S. teſta tereti decuſſatim ſtriata ſubrugoſa flexuoſa ſanguinea, intus laevi alba.
Liſt. Conch. t. 547. *f.* 4.
Martin. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 17.
Habitat - - -

proboſcidea. 22. S. teſta laevi alba: latiori parte recta transverſim plicata.
Martin. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 18. B.
β) *Martin. Conch.* 1. *t.* 2. *f.* 18. A.
Habitat - - - *teſta diametri ad finem latiorem vix* $\frac{1}{2}$ *pollicem ſuperantis*, 4, *in β*) 2 *pollices longa*, *in hac extrinſecus quaſi infumata.*

afra. 23. S. teſta ſubſtriata ex luteo fuſca in tres anfractus contorta terete: apice centrali.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 11. *f.* 4. A. B. Datin.
Martin. Conch. 1. *t.* 3. *f.* 20. A. B.
Habitat ad inſulam Goream.

Cereolus. 24. S. teſta tereti laevi flavicante multoties contorta.
Davil. catal. raiſ. 1. *t.* 4. *f.* E.
Martin. Conch. 1. *t.* 3. *f.* 20. E.
Habitat ad Americae littora, *teſta longa*, *anguſta ſupra* 11*es*, *ad latera* 5*ies contorta.*

Cornu copiae. 25. S. teſta conica turrita flavicante fuſco faſciata bruſca, medium torta terete: apertura orbiculata.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. vign. p. 163. *et t.* 13. *f.* 10. *ind.* 1. *p.* 371. *f.* 1. 2.
Habitat - - - *teſta apice obtuſa.*

goreenſis. 26. S. teſta tereti cancellata flava intus cornea.
Adanſ. Seneg. 1. *p.* 164. *t.* 11. *f.* 3. Doſan.
Habitat ad inſulae Goreae *littora*, *teſtaceis lignique fruſtis affixa*, *teſta* 8-9 *pollices longa: ſtriis elevatis; longitudinalibus confertis.*

inteſtinalis. 27. S. teſta triquetra tortuoſa fragili, tuberculata excavato punctata.
Adanſ. Seneg. 1. *p.* 166. *t.* 11. *f.* 6. Jelin.
Habitat rara ad promontorium Africae Manuel, *teſta exalbida*, 8-9 *pollices longa*, *mire contorta*, *ſubumbilicata*, *intus glaberrima.*

Infundibulum. 28. S. teſta tereti alba transverſim ſtriata ter contorta: gyro primo ex quinque quaſi infundibulis ſeſe recipientibus conflato.

Martin. Beſch. berl. Naturf. 2. *p.* 357. *t.* 12. *f.* 1.
Habitat in mari indico, *topho affixa.*

pyramidalis. 29. S. teſta cinerea ſupra convexa ſubtus plana pyramidali multoties contorta: gyris introrſum decreſcentibus.
Spengl. Beſch. berl. Naturf. Fr. 2. *p.* 569. *t.* 9. A. *f.* 3-5. *catal. raiſ. t.* 5. *f.* 12-17.
Habitat in mari indico, *teſtaceis variis adhaerens, aliaque includens, teſta fine anguſtiori aperta, ad pollicem usque longa, interdum porrecta aut ſubflexuoſa.*

denticulata. 30. S. teſta alba terete ſubulata ad latera dentata recta: coſta longitudinali media glabra: apice incurvulo glabro.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 569. *t.* 6. *f.* 18.
Habitat in lepade tintinnabulo, *teſta* ¾ *pollicis longa.*

melitenſis. 31. S. teſta teretiuſcula contorta umbilicata decuſſatim ſtriata: coſtis longitudinalibus noduloſis, intus laevi polythalamia.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 570. *t.* 6. *f.* 19.
Habitat - - - foſſilis in Melita *inventa, gyris* 2 *primis recta ſibi impoſitis.*

norwegica. 32. S. teſta tereti laevi incurva: baſi anfractuoſa ſubobſoleta, ore oblique truncato. *Müll. zool. dan. prodr.* 2859.
Act. Nidr. 4. *p.* 51. *t.* 2. *f.* 11-13.
Habitat in mari norwegico.

porrecta. 33. S. teſta tereti e baſi ſpirali flexuoſe adſcendente laevi nitente. *Müll. zool. dan. prodr.* 2860. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 378. *n.* 373.
Habitat cum ſpirillo, cui proxime affinis, in Oceano ſeptentrionali, *teſta tamen candidiore, pellucida, neutiquam rugoſa, verme inhabitante brevi, dorſo ſanguineo, ad latera pallidiore.*

vitrea. 34. S. teſta tereti regulari ſpirali orbiculata pellucida ſplendente rugoſa: apertura incraſſata. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 382. *n.* 378.
Habitat rarior in maris Groenlandiam *alluentis ſertulariis, teſtaceis, fucis, lapidibus, glomeratae affinis, teſta craſſa, umbilicata, diametri* $\frac{1}{3}$ - 1 *lineae, interdum rubicunda.*

cancellata. 35. S. teſta ſpirali glomerata triſulcata: ſulco inferiore coſtis transverſis interrupto. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 383. *n.* 379.

Habitat

Habitat ſatis frequens cum granulata, cui ſimilis, in mari Groenlandiam *alluente, teſta alba, cineraſcente aut vireſcente: apertura bidentata.*

ſtellaris. 36. S. teſta ſuborbiculari umbilicato-convexa rugis radiata. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 383. *n.* 380.

Habitat in maris Groenlandiam *alluentis ſertulariis, rarius teſtaceis et lapidibus adhaerens, teſta magnitudinem capituli acus minoris vix aſſequente, teſta violacea, brunnea vel flavicante, albo radiata, ſubtus plana, gyro ſolitario, apertura minutiſſima.*

gigantea. 37. S. teſta ſubtriquetra ſubflexuoſa lente attenuata violacea, intus laevi lutea: apertura alba undulatim ſtriata dente conico munita.

Pallas miſcell. zool. p. 139. *t.* 9. *f.* 2-10.

Seb muſ. 1. *t.* 29. *f.* 1. 2? Urtica marina ſingularis.

Habitat in mari, Americam *mediam inter et* Africam *intermedio, rupibus coralliisque affixa, teſta ſemipedali, digiti minimi craſſitie, incola albido.*

cinerea. 38. S. teſta filiformi glabra, conglomerata, perforata. *Forsk. Fn. arab. p.* 128. *n.* 77.

Habitat ad Maſſiliae *littora, intricatae affinis, at teſta glabra ex cinereo albida, ceterum flexuoſa.*

334. TEREDO. *Animal* Terebella: valvis duabus calcareis hem ſphaericis anterius exciſis, et duabus lanceolatis.

Teſta teres flexuoſa lignum penetrans.

navalis. 1. T. teſta tenuiſſima cylindrica laevi.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1267. *n.* 1. Teredo.

Vallisn. nat. 2. *t.* 4.

Rumpf muſ. t. 41 *f.* F. G.

Sellius hiſt. natur. tered. 1733. *Ultraj.* 4. *t.* 1.

Teredines *intra vegetabilia habitantes, quae deſtruunt, vitae genere, victu, et habitatione,* navalis *certe, ipſa valvarum vermi adhaerentium fabrica, propius ad* pholades *accedunt, quam ad ſerpulas.*

Planc. Conch. 17. *n.* 2.
Adanſ. Seneg. t. 19. *f.* 1.
β) *Slabber act. Vliſſing.* I. *p.* 387. *t.* 2.
Habitat intra lignum *navium et palorum marinorum, quod miſere deſtruit, fertiliſſima, calamitas navium ex* India *in* Europam *allata, arſenico cum oleo cocto domanda et arcenda, teſta mira, interdum parum flexuoſa, apice nunc magis nunc minus obtuſa,* 4-6, *nonnunquam plures pollices longa.* *)

Utriculus. 2. T. teſta ſolida cylindrica undulata.
Kaemmer. Conch. Rudolſt. p. 7. *t.* 1.
Habitat intra lignum - - - *teſta alba ſubpellucida, valde flexuoſa, toruloſa, ſenſim attenuata,* 7 *circiter pollices longa: apertura ovali ſepto medio bipartita.*

Clava. 3. T. teſta altero fine clavata, altero incurva anguſtiori obtuſa medio perforata.
Walch Naturf. 10. *p.* 38. *t.* 1. *f.* 9. 10.
Spengler Naturf. 13. *p.* 53. *t.* 1. *f.* 1-11. *et t.* 2. *f.* 12-14.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 574. *t.* 6. *f.* 20
Habitat in Xylocarpi granati *pericarpiis, teſta exterius ſcabra fuſceſcente, ad* 2 *usque pollices longa, vix dimidium ampla intus laevi, nunc magis nunc minus flexuoſa.*

*) Fundin h. n. p. 738. Lesk. h. n. 601.

335. SABELLA. *Animal* Nereis, ore ringente, tentaculis duobus craſſioribus pone caput.

Teſta tubuloſa contexta ex arenulis confertim membranae vaginali inſertis.

ſcrupoſa. 1. S. teſta ſolitaria libera ſimplici curvata: granis lentiformibus nitidis.
Habitat in India, America *auſtrali inſulisque obverſis, teſta ſubulata, apice tamen obtuſa, pennae cygneae craſſitie et ultra, arenae granulis aequalibus albis.*

ſcabra. 2. S. teſta ſolitaria baſi fixa ſimplici curvata: granis radiato ſcabris.
Act. Petrop. 1766. *p.* 353. *t.* 9. *f.* 1. 2. Dentalium arcuatum ſpongioſum, ſuperficie tuberculis contiguis exaſperata.
Habitat in Oceano americano.

alveolata. 3. S. teſta compoſita concamerationibus numeroſis poro communicantibus.
Syſt. nat. X. I. *p.* 790. Tubipora arenoſa.
Ellis corall. 90. *t.* 36. Tubularia arenoſa indica.
Habitat gregaria in Oceano britannico, *ex arenulis nidum communem ſtruens.*

Chryſodon. 4. S. teſta ſubcylindrica teſtaceo-papyracea.
Berg. act. Stockh. 1765. *p.* 228. *t.* 9. *f.* 1-3. Teredo Chryſodon.
Klein tub. t. I. *f.* 4.
B. ſt. op. ſubſ. t. 9. *f.* 4.
Martin. Conch. I. *t.* 4. *f.* 29. 30.
Habitat in mari europaeo, indico, *ad* caput bonae ſpei, *teſta pennae anſerinae craſſitie ad ½ pedem longa, acuminata, ex muco incolae compacta, ſordide flava, dum humet, flexili, teſtaceorum ruderibus conſperſa.*

belgica. 5. S. teſta conica.
Klein tub. t. I. *f.* 5.
echinod. t. 33. *f.* A. B.
Martin. Conch. I. *t.* 4. *f.* 27.
Habitat ad Belgii *littora, teſta vix ad* 3 *pollices usque longa.*

rectangula. 6. S. teſta fuſca annulis alternis albis nigrisque varia recta: fine rectangulo gibboſo.
Gualt. teſt. t. 10. *f.* D.
Martin. Conch. I. *t.* 4. *f.* 31.
Habitat - - - teſta 9 *pollices longa, diametri vix ½ pollicis.*

capenſis. 7. S. teſta cylindrico-conica utrinque aperta membranacea, aſpera transverſim interruptim ſtriata.
Müller Linn. Naturf. 6. *t.* 19. *f.* 6. 7.
Habitat ad promontorium bonae ſpei.

nigra. 8. S. teſta cylindrica nigra extrinſecus laeviuſcula: granis arenae ſubtiliſſimis.
Schroet. Flusconch. t. 11. *min.* D. *f.* 1.
Habitat in Thuringiae *rivulo prope* Thangelſtedt, *teſta ½ pollicem longa, diametri ½ lineae.*

9. S.

Sabellae *genus ambiguum, inter* Spiones, Amphitritas, Terebellas, Brachiones, Serpulas, Teredines *quaſi medium; quae praeterea in aquis dulcibus repertae huc referuntur teſtae, inſectorum potius, potiſſimum larvarum phryganearum opera conſtructae, quam vermium nativa eſſe habitacula videntur.*

ſtagnalis. 9. S. teſta recta utrinque aperta terete ſenſim attenuata laevi: apertura marginata, arenae granis ſubtiliſſimis.
Schroet. Fluſconch. t. 11. *min.* C. *f.* 13. *et t.* 11. *min* D. *f.* 9.
Habitat in Thuringiae fluvio Sala *prope* Kahla, *nunc ſolitaria teſta nigra, nunc gregatim ranunculo aquatico adhaerens teſta cinerea, hac ſemper ultra* $\frac{3}{4}$ *pollices longa.*

conica. 10. S. teſta anguſta conica laevi recta cinerea apice nigricante aperto; granis ſubtiliſſimis.
Schroet. Fluſconch. t. 11. *min.* C. *f.* 14.
Habitat prope Jenam, *teſta vix* $\frac{1}{2}$ *pollicem longa, apertura non marginata.*

uncinata. 11. S. teſta laevi terete ſenſim attenuata apice aperto adunco.
Schroet. Fluſconch. t. 11. *min.* D. *f.* 8.
Habitat ſolitaria in rivulo Thuringiae *prope* Thangelſtedt, *teſta ad* $\frac{3}{4}$ *pollicis usque longa ex arena ſubtiliſſima ſtructa, nunc cinerea, nunc nigra, nunc ſupra cinerea, infra nigra.*

ſabuloſa. 12. S. teſta cylindrica apice clauſo ſubclavata pertuſa: granis arenae majoribus.
Schroet. Fluſconch. p. 416. *n.* 7. *t.* 11. *min.* D. *f.* 4.
Habitat in Thuringia *et* Belgio, *teſta vix pollicem longa, diametri fere* $\frac{3}{4}$ *pollicis, nunc recta, nunc medio ſubinflexa, nunc cinerea, nunc nigra, nunc ſupra cinerea infra nigra.*

vegetabilis. 13. S. teſta depreſſa ex ſurculis, caulibus, corticibus et tellinis corneis compacta.
Schroet. Fluſconch. t. 11. *min.* C. *f.* 9.
Habitat in Thuringiae aquis, *teſta pollicem longa.*

ammonita. 14. S. teſta polygono-cylindrica intus laevi ex cornubus ammonis ſtructa.
Schroet. Fluſconch. t. 11. *min.* C. *f.* 10.
Habitat in rivis Cellenſibus.

helicina. 15. S. teſta intus laevi tereti ex teſtis helicis puſillae ſtructa.
Schroet. Fluſconch. t. 11. *min.* C. *f.* 11.
Habitat frequens in Thuringiae *aquis ſtagnantibus prope* Thangelſtedt, *teſta vix pollicem longa, rarius longiore, diametri paulo ultra* $\frac{1}{4}$ *pollicis.*

dimidiata. 16. S. teſtae altera parte ex arena ſabulove, altera craſſiore clavata ex teſtaceorum rudimentis compacta.

Schroet.

Schroet. Flusconch. t. 11. *min.* D. *f.* 3.
Habitat frequens in Thuringiae *aquis prope* Thangelſtedt.

fixa. 17. S. teſta ex lapillis majoribus minoribusque conflata apicem verſus attenuata.
Schroet. Flusconch. t. 11. *min.* C. *f.* 12.
Habitat prope Vinariam *et* Thangelſtedt Thuringiae, *ſaxis ſubaquaticis affixa, gregaria, latere, quo affigitur, aperto, teſta ad pollicem usque longa.*

clavata. 18. S. teſta e lapillis conflata: fine aperto clavato e lapillis majoribus compacto.
Schroet. Flusconch. t. 11. *min.* D. *f.* 2.
Habitat ſolitaria in Thuringia, *prope* Vinariam.

corticalis. 19. S. teſta ex corticum fragmentis, ad finem ex caulibus conflata.
Schroet. Flusconch. t. 11. *min.* D. *f.* 5.
Habitat frequens in rivulo Thuringiae *prope* Thangelſtedt, *varietate innumera.*

arundinacea. 20. S. teſta ſubconica utrinque aperta ex fragmentis corticis arundinis ſibi impoſitis ſtructa.
Schroet. Flusconch. t. 11. *min.* D. *f.* 6.
Habitat prope Vinariam, *teſta vix ultra pollicem longa.*

aculeata. 21. S. teſta teretiuſcula ex culmis cauliculisque prominulis conflata.
Schroet. Flusconch. t. 11. *min.* D. *f.* 7.
Habitat frequens prope Thangelſtedt *in* Thuringia, *teſta vix ultra pollicem longa, nunc magis conica, nunc magis cylindrica.*

marſupialis. 22. S. teſta nigra; fine aperto cylindrico anguſtiori, altera parte turgida ovata.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 591. *t.* 6. *f.* 21.
Habitat in mari - - - *teſta ultra* 2 *pollices longa, ex arena nigra compoſita, intus laevi.*

norwegica. 23. S. teſta teretiuſcula utrinque aperta fragili membranacea exterius granulis arenae minutiſſimis conſita.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 591. *n.* 20.
Habitat in Norwegia, *teſta ultra* 4 *pollices longa, pennae cervinae craſſitie.*

lumbrica- 24. S. teſta rudi repente fragili utrinque aperta, incolae ore
lis. non tentaculato, corpore aculeato articulato. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 374. *n.* 369.

Habitat gregaria in maris Groenlandiam *alluentis profundo, lapidibus praeſertim in fiſſuris adhaerens, teſta griſea ex arenulis membranae convexiuſculae agglutinatis conflata, intus lubrica nitida; incola verme rufo albo-annulato, ſubtus pallidiore, praeter articulos 2 terminales inermes, 21 aliis, ſingulis in dorſo diacanthis conſtante.*

indica. 25. S. teſta cylindrica ex capillaribus ſubcylindricis quarti cryſtallis coagmentatis conflata. *Abildg. Schr. berl. Naturf.* 9. *p.* 144. *t.* 4.

Habitat in mari indico.

IV. ZOOPHYTA.

Animalia compoſita, animalium more effloreſcentia.

336. TUBIPORA. *Animal* Nereis?

Corallium tubis cylindricis cavis erectis parallelis aggregatis.

muſica. 1. T. tubis faſciculatis combinatis: diſſepimentis transverſis membranaceis diſtantibus.
Hort. Cliff. 481. Tubipora membranis transverſis tubos perpendiculares connectens.
Pallas zooph. 199. Tubipora purpurea.
Imper. nat. 821. Tubularia purpurea.
Aldrov. muſ. 291. Pſeudo-Corallium rubrum.
F. Bauh. hiſt. 3. *p.* 808. *f.* 2. Alcyonium fiſtuloſum rubrum.
Bonann. muſ. Kirch. t. 289. *f.* 14. Tubularia purpurea.
Besl. muſ. Lochn. t. 23. Alcyonium maris rubri.
Welſch hecaſt. t. 44. Tubularia coralloides.
Moriſ. hiſt. 3. *ſ.* 15. *t.* 10. *f.* 22. Alcyonium fiſtuloſum rubrum.
Petiv. gaz. t. 67. *f.* 10. 11. Tubularia purpurea vulgaris.
Tournef. inſt. t. 342. Tubularia purpurea.
Valent. ind. litt. t. 8. *f.* 5. Tubularia coralloides.
Büttn. corall. p. 18. *t.* 1. *f.* 3. Tubularia coralloides.
Mercat. metalloth. arm. 6. *c.* 9. *p.* 107. Alcyonium petroſum.
Shaw afr. app. p. 48. *n.* 37. Madrepora tubis eleganter coagmentatis ruberrima.
Rumpf amb. 6. *p.* 236. *t.* 85. *f.* 2. Alcyonium rubrum indicum.
Seb. muſ. 3. *t.* 110. *f.* 89.
Argenv. Conch. t. 26. *f.* A.
Edw. av. t. 93.
Martin. Conch. 1. *p.* 21. *vign.* 2.
Knorr delic. t. A. *f.* 3.
β) *Pallas zooph. ed. belg. t.* 10. *f.* 2. Tubipora flexuoſa.
Habitat in mari americano, indico, rubro, *aliis coralliis rupibusve affixa, purpurea, ab Indis contra ſtranguriam et vulnera a venenatis animalibus inflicta adhibita.*

catenulata. 2. T. tubis parallelis connatis in laminam contortu plicato-anaſtomozantem.

Amoen.

Amoen. acad. 1. *p.* 103. *t.* 4. *f.* 20. Millepora tubis ovatis longitudinaliter reticulatim concatenatis.
Bromel lithogr. ſp. 2. *t.* 23-27. Tubularia gothlandica.
Helv. lithogr. t. 5. *f.* 1-6. *et t.* 6. *f.* 1. Lapis albidus catenula corallina.
Büttn. corallogr. t. 1. *f.* 2. Corallium catenulatum.
Volkam. ſileſ. ſubt. t. 58. *f.* 7. *et t.* 20. *f.* 3.
Habitat - - - frequens ad littora maris Balthici *projecta, conſtans membrana erecta nullis ſeptis diſtincta, varie contortuplicata, conjuncta in maeandros margine faſtigiata pororum ſerie ſimplici, catenae more digeſtorum, tubuli enim plurimi paralleli, aequales, filiformes lateribus oppoſitis connexi, confecere parietes.*

ſerpens. 3. T. tubulis cylindricis erectis breviſſimis diſtantibus axillaribus: baſi repente dichotoma divaricata. *O. Fabr. Fn. groenl.* 428.
Amoen. acad. 1. *p.* 105. *t.* 4. *f.* 26. Millepora dichotoma repens teres: poris axillaribus ſolitariis eminentibus.
Muſ. Teſſin. t. 3. *f.* 3. Millepora repens teres, poris ſolitariis eminentibus.
Pallas elench. zooph. p 248. *n.* 152. Millepora liliacea.
Ellis corall. p. 74. *n.* 6. *t.* 27. *f.* c E.
Marſ. hiſt. mar. p. 153. *t.* 134. *f.* 168.
Planc Conch. t. 18. *f.* n N.
Habitat in mari mediterraneo, *et* Oceano ſeptentrionali, *ad littora* maris Balthici *ſaepe rejecta, alba, rarius rubens, proſtrata, laciniata, laciniis linearibus ſupra quaſi lamellatis criſtis transverſis duplici ordine, tubulis erectis quaſi pectinatis; an hujus generis?*

faſciculafaſcicularis. 4. T. tubis filiformibus faſciculatis: lateribus paſſim anaſtomoſantibus. O. *Fabr. Fn. groenl.* 429.
Habitat - - - paſſim ad Gotlandiae *littora obvia, in montibus quoque calcareis foſſilis, pennae paſſerinae craſſitie, alba minus recta, anaſtomoſibus transverſis anguſtioribus tubos ipſos connectentibus.*

ramoſa. 5. T. interſtitiis ſubrotundis diſtincta, tubulis ramorum confluentium ſimplicibus flexuoſis aggregatis conglutinatis. *Koelreuter act. Petrop.* 7. *p.* 374. *t.* 16. *f.* 3.

Habitat

Lithophyta *animalcula materiam corallinam deponere et pro cellulis uti, et* madreporarum *animalcula ſtellis incumbentia ſibi continuo ſubſtruendo materiam lapideam elevare et habitaculum ſuum augere recte ſtatuit* Peyſſonel.

Habitat in mari albo, *acaulis, baſi anguſtiore, ramis undequaque diffuſis, fragiliſſima, exalbida, intus candida, teſtaceis fucove adhaerentibus ſaepe ornata.*

pinnata. 6. T. dichotoma erecta, tubulis pinnulatim digeſtis.

Pallas el. zooph. p. 247. *n.* 151. Millepora pinnata.

Marſ. hiſt. mar. p. 152. *et* 153. *t.* 34. *f.* 167. *n.* 1. 3. 4. *et* 2. 3. 5. *et f.* 168. *n.* 1-3. Madreporae muſciformes.

Habitat in mari mediterraneo, *cineraſcens aut virideſcens, pollicem circiter alta, fragilis, fili groſſioris craſſitie, quaſi bipectinata, ramis aequalibus, patulis.*

penicillata. 7. T. cauleſcens, cacumine incraſſato ex tubulis baſin verſus connexis formato. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 429. *n.* 430.

Habitat in mari Groenlandiam *alluente, teſtaceis affixa,* 3 *lineas longa,* $1\frac{1}{2}$ *lata, alba, erecta, faſciculari affinis.*

flabellaris. 8. T. depreſſa flabelliformis adnata tubulis parallelis connatis radiata. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 430. *n.* 431.

Habitat frequens in mari Groenlandiam *alluente, ulvae maximae folio ad paginam inferiorem adnata, cineraſcens,* $1\frac{1}{2}$ *lineam lata, ſubtus laevis, radiatim ſtriata, circuli ſegmentum referens.*

ſtellata. 9. T. tubis diſcretis tabulato-combinatis: tabulatis plurimis remotis horizontaliter tubuloſis ſuperficie ſtriato-radiatis. *Modeer n. act. Stockh.* 1788. 3. *n.* 10. *t.* 7. *f.* 1.

Habitat - - - hactenus modo inter foſſilia reperta.

Strues. 10. T. tubis diſtantibus divergentibus liberis poſterius ſaepius flexis: tubulis minoribus ſimplicibus horizontalibus combinatis *Ad. Modeer n. act. Stockh.* 1788. 4. *n.* 1.

Helwing lithogr. p. 52. *t.* 5. *f.* 7.

Buttner coralliogr. p. 22. *t.* 2. *f.* 9. Corallium fiſtuloſum ac luridum.

Habitat - - - hactenus modo inter foſſilia reperta.

337. MADREPORA. *Animal* Meduſa. *Ellis corall. t.* 32. *Donat. mar. t.* 6. *f.* F.

Corallium cavitatibus lamelloſo-ſtellatis.

* Simplices *ſtella unica.*

verrucaria. 1. M. ſtella orbiculari planiuſcula ſeſſili: diſco cylindris floſculoſo, limbo radiato. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 430. *n.* 432. *Forsk. ic. rer. nat. t.* 26. dD.

Pallas el. zooph. p. 280. *n.* 164. Madrepora ſimplex ſeſſilis ſubundulata marginataque, diſco poris inaequalibus pectinatis radiato.

Soland. et Ellis corall. p. 137. *n.* 13. Millepora limbo concavo tenui explanato ſubſtriato, diſco convexo tubulis confertis radiato.

Ginann. adr. 10. *t.* 4. *f.* 10. Fungus marinus.

Habitat in mari rubro, mediterraneo *et* ſeptentrionali, *algis marinis et zoophytis mollioribus adhaerens, inter madreporas, tubiporas et milleporas quaſi media, piſi dimidiati magnitudine, alba vel flavicans, diſci tubis aggregatis, inſtar diſci florum compoſitorum, limbo explanato ſtriato, radium horum florum mentiente.*

turbinata. 2. M. turbinata laevis, ſtella hemiſphaerico-concava. *Amoen. acad.* 1. *p.* 87. *t.* 4. *f.* 1-4. 7.

Pallas el. zooph. p. 305. *n.* 176. *β.* Madrepora (trochiformis) ſimplex turbinata acaulis ſtriata, ſtellae lamellis integris.

Bromel. lithogr. p. 32. 33. 36. 38. 40. *Lang lap. figur. p.* 52. *t.* 12. Fungites major orbicularis gothlandicus.

Helw. lithogr. t. 5. *f.* 9-11. 13. 15. 17. *Wolff haſſ. t.* 10. *f.* 3. 4. Columellus turbinatus.

Habitat - - - hactenus modo foſſilis inventa, copioſiſſime in Gothlandia, *et* Campania gallica.

Porpita. 3. M. acaulis, ſtella convexa: centro depreſſo orbiculari, ſubtus plana marginata laevi.

Amoen. acad. 1. *p.* 91. *n.* 2. *t.* 4. *f.* 5. Madrepora ſimplex orbiculata plana, ſtella convexa.

Calceol. muſ. p. 328. Lapillus numismalis.

Scheuchz. lithogr. helv. f. 43. 44. Lens lapidea ſtriata utrinque convexa.

Buttn. corall. p. 24. *t.* 3. *f.* 5. Fungi marini capitulum.

Lhwyd

Lhwyd lith. p. 151. Porpita minor numularis.
Brom. lith. ſp. 2. *p.* 33. *f.* a - h.
Habitat in mari indico *et* rubro, *frequens inter* Europae *petrefacta, ſeminis lupini magnitudine, an mera fungitae detriti varietas?*

Fungites. 4. M. acaulis orbiculata, ſtella convexa: lamellis ſimplicibus longitudinalibus, ſubtus concava. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 134. *n.* 10. *ic. rer. nat. t.* 42.
Hort. Cliff. 481. Madrepora ſimplex acaulis orbiculata convexa: lamellis denticulatis.
Pall. el. zooph. p. 281. *n.* 165. Madrepora ſimplex acaulis, ſtella convexa lamelloſa, lamellis inaequalibus crenatis
Soland. et Ellis corall. p. 149. *n.* 2. *t.* 28. *f.* 5. 6. Madrepora ſimplex acaulis convexa, lamellis latere ſubaſperis indiviſis: alternis minoribus ſubincompletis.
Besl. muſ. Lochn. t. 26. *f.* 3.
Cluſ. exot. l. 6. *p.* 125. *t.* 10. *f.* 1. Fungus lapideus major.
Valent. ind. litt. p. 568. *t.* 9. *f.* 2. Fungus lapidoſus.
J. Bauh. hiſt. 3. *p.* 801. *f.* 1. 2. Fungus lapideus.
Bonann. muſ. Kircher. p. 289. *n.* 17. Fungus petrificatus.
Olear. muſ. p. 68. *n.* 2. *t.* 34. *f* 2. Fungites quartus.
Boerh. ind. hort. lugdb. 1. *p.* 2. Fungus coralloides pileatus lamellatus.
Shaw afr. app. p. 47. *n.* 6. Fungus coralloides lamellatus maris rubri.
Rumpf amb. 6. *p.* 247. 249. *t.* 88. *f.* 1. 4. Fungus ſaxeus.
Seb. muſ. 3. *t.* 110. *f.* 6. b. *t.* 111. *f.* 1. 2. *et t.* 112. *f.* 28-30.
Knorr delic. t. A. III. *n.* 4.
β) *Pallas elench. zooph. p.* 284. *n.* 165. β. Madrepora echinata.
Habitat in mari rubro *et* indico, *utplurimum libera, centro concava, ſubtus ſcabra, lamellis acutis inaequalibus baſin verſus per iſthmos connexis.*

Patella. 5. M. acaulis, lamellis latere muricatis ſubtrichotomis: tertiis indiviſis majoribus. *Soland. et Ellis corall. p.* 148. *n.* 1. *t.* 28. *f.* 1-4.
Habitat in mari mediterraneo, $\frac{1}{4}$ *pollicis craſſa, diametri* $1\frac{1}{2}$ *pollicis, junior plana, adultior convexa, lamellis omnibus margine denticulatis.*

Cyathus. 6. M. clavato-turbinata baſi attenuata: ſtella obconica; centro prominulo exeſo duplicato. *Soland. et Ellis corall. p.* 150. *n.* 3. *t.* 28. *f.* 7.
Marſ. hiſt. mar. t. 28. *f.* 128. *n.* 11.

Planc. conch. ad. 2. *p.* 128. *tab. app.* 18. *f.* M.
Habitat frequens in mari mediterraneo, *ad* Galliae *et* Italiae *littora, iſidi nobili utplurimum affixa, alba, duriſſima,* 2 *pollices longa, lamellis majoribus circiter* 40.

** Compoſitae *ſtellis pluribus.*

† Concatenatae, *ſtellis disjunctis: lamellis continuis.*

Pileus. 7. M. acaulis oblonga, ſtella convexa conglomerato-lamelloſa: lamellis abbreviatis ſubtus concava.
Pallas el. zooph. p. 285. *n.* 166. Madrepora concatenata acaulis gibba, ſtellis ſubpinnatis conſertis concatenatis, lamellis inaequalibus.
Tournef. act. pariſ. 1700. *p.* 30. Mitra Neptuni.
Rumpf amb. 6. *p.* 248. *t.* 88. *f.* 2. 3. Mitra polonica.
Seb. muſ. 3. *t.* 111. *f.* 3. 5. Pileus Neptuni.
Soland. et Ellis corall. p. 159. *t.* 45.
β) *Rumpf amb.* 6. *p.* 248. Limax laxea.
Seb. muſ. 3. *t.* 111. *f.* 6. *et t.* 112. *f.* 31. Talpa marina.
Habitat in Oceano indico, *diſco compoſito e ſtellulis excavatis: radiis palmatis centrum et ambitum reſpicientibus, alternis humilioribus depreſſioribus, et altioribus; margine bifariam crenato, centro oblonge ſulcato.*

criſtata. 8. M. foliaceo-criſtata: ſtellis ſerialibus centro impreſſis, ambulacris explanatis planiuſculis. *Soland. et Ellis corall. p.* 158. *n.* 27. *t.* 31. *f.* 3. 4.
Pallas el. zooph. p. 288. *n.* 167. *β.*
Habitat in Oceano auſtrali *et* indico.

Lactuca. 9. M. ſeſſilis, ſtellis magnis conſertis frondeſcentibus: frondibus laciniofis criſpatis. *Pall. el. zooph. p.* 289. *n.* 168. *Soland. et Ellis corall. p.* 158. *n.* 28. *t.* 44.
Seb. muſ. 3. *t.* 89. *f.* 10. Concha fungiformis.
Habitat rara in Oceano americano?

ficoides. 10. M. foliaceo-criſtata, ſtellis ſparſis: ambulacris lateralibus planiuſculis; marginalibus acute carinatis, lamellis foliaceis. *Soland. et Ellis corall. p.* 159. *n.* 29.
Habitat in Oceano auſtrali.

aceroſa. 11. M. foliaceo-criſtata, ſtellis ſparſis: ambulacris lateralibus planis; terminalibus ſubcarinatis, lamellis aceroſis. *Soland. et Ellis corall. p.* 159. *n.* 30.
Habitat - - -

12. M.

Lichen. 12. M. foliaceo-criſtata, ſtellis ſerialibus obconicis rotundatis, ambulacris carinato-foliaceis acutiſſimis ſubflexuoſis obliquatis. *Solander et Ellis corall. p.* 160. *n.* 33.
Habitat in Oceano auſtrali.

Agaricites. 13. M. acaulis ſulcata: ſulcis carinatis, ſtellis concatenatis. *Pall. el. zooph. p.* 287. *n.* 167. Madrepora concatenata cruſtacea polymorpha transverſim ſulcata, ſtellis per ſulcos crebris concatenatis.
Soland. et Ellis corall. p. 159. *n.* 32. Madrepora foliaceo-criſtata concatenata, ſtellis flexuoſo ſubſerialibus obconicis ſubangulatis, ambulacris acute carinatis rectiuſculis hinc coaleſcentibus.
Seb. muſ. 3. *t.* 110. *f.* 6. CC.
Argenv. oryct. p. 367. *t.* 22. *f.* 7.
Knorr del. 1. *p.* 25. *t.* A. X. *f.* 1.
Habitat in mari inſulas Americae obverſas *interfluente, cinerea, diametri ad* 5-6 *pollices aſſequentis, lamellis variis divergentibus ſemiorbiculatis conſtans, ſulcis plurimis repandis exarata, in quorum fundo ſtellae.*

Elephantotus. 14. M. ſubturbinata, intus lamellis granuloſis parallelis ſtellisque lacero-prominulis ſparſis. *Pallas el. zooph. p.* 290. *n.* 168. *β.*
Habitat in Oceano indico, *inter M. lactucam et agariciten quaſi media laminam tenuem ſeſſilem undulato criſpam mentiens; ſtellis fere in quiucunce poſitis.*

cruſtacea. 15. M. cruſtacea, ſuperficie plana ſtellata: radiis craſſis dentatis concatenatisque. *Pallas el. zooph. p.* 291. *n.* 170.
Habitat in mari americano. *rarioris texturae, obverſe conica, ſtellis minus ordinata in quincunces diſpoſitis.*

incruſtans. 16. M. inaequalis, ſtellis prominentibus conico truncatis cavis apice diſtantibus intus lamellatis. *Forsk. Fn. aegypt. arab. p.* 135. *n.* 16.
Habitat in mari rubro, *ſtellis diametro baſeos piſum, ſupra lentem aequantibus, an diſtincta ſpecies?*

exeſa. 17. M. cruſtacea, ſtellis anfractuoſis interſtitiis conicis. *Pallas el. zooph. p.* 290. *n.* 169. *Soland. et Ellis corall. p.* 101. *n.* 38. *t.* 49. *f.* 3.
Habitat in Oceano indico *et* auſtrali, *mytilo margaritifero ſuperinducta, alba, verrucis conicis vertice laevigatis, ceterum lamellis ſcabris inaequalibus undique porcatis aſpera.*

Filograna. 114. M. acaulis ſimplex, ſtella tenuiſſima repando labyrinthiformi: ſutura acuta, areolis planis perforatis. *Eſper Pflanzenth.* 3. *p.* 139. *n.* 20. *t.* 23. *f.* 1. 2.
Gualt ind. teſt t. 97.
Habitat in mari indico.

natans. 115. M. ſimplex acaulis, ſtella repando-labyrinthiformi, pulvillis latiſſimis, ſutura obtuſa, corallio poroſo laeviori. *Eſper Pflanzenth.* 3 *p.* 140. *n.* 21. *t.* 23.
Seb. muſ. 3. *p.* 201. *t.* 99. *f.* 9. 10.
Habitat in mari Indiam *et* Americam *alluente.*

Anthophyllum. 116. M. ſimplex caulescens, caule ovato ſtella terminali hemiſphaerica concava: fundo lamellis craſſioribus radiatis. *Eſper Pflanzenth.* 3. *p.* 143 *n.* 22. *t.* 24. *f.* 1-5.
Battarra hiſt. rer. nat. 1. *p.* 176. *t.* 44. *f.* 6.
Habitat in mari mediterraneo.

†† Conglomeratae, *ſtellis conjunctis.*

labyrinthica. 18. M. acaulis, ſtella repando-labyrinthiformi: ſutura obtuſa.
Hort. Cliff. 481. Madrepora compoſita, labyrinthiformis hemiſphaerica, lamellis duplicato ordine integris obtuſis, ſinubus aequalibus.
Pallas el. zooph. p. 292. *n.* 171. Madrepora (maeandrites) conglomerata ſeſſilis, ſtellis anfractuoſis, lamellis denticulatis.
Soland. et Ellis corall. p. 160. *n.* 34. *t.* 46. *f.* 3. 4. Madrepora conglomerata, anfractibus baſi dilatatis longis, diſſepimentis excelſis aequalibus latis, ambulacris ſimplicibus.
Boët. gemm. l. 2. *c.* 146. *f.* B. *Sloane cat. p.* 2. *hiſt.* I. *p.* 54. *n.* 7. Lapidis aſtroitidis ſive ſtellaris tertium genus.
Besl. muſ. t. 26. *f.* 1. 2. Muſſa corallina alba poroſa, maris fluctus egregie repraeſentans.
Valent. ind. litt. p. 509. *n.* 2. *t.* 9. *f.* 1. Batu-purudan, fluctus lapidei.
Boccon. epiſt. 17. *tab. p.* 142. Aſtroites undulatus major, et Fungus maritimus coralloides undulatus.
Petiv. gaz t. 68. *n.* 11. Corallium cerebri facie.
Boerh. ind. hort. Lugdb. p. 1. *Shaw afr. app. p.* 47. *n.* 8. Fungus coralloides encephaloides, gyris in medio ſulcatis, lamellis ſerratis.
Mercat. metall. arm. 6. *c.* 16. *p.* 124. Lapis corallites.
Gualt. teſt. t. 10. 29. b. 97. b. Maeandrites.
Brown jam. p. 392. Mycedium 1-3.

Olear.

Olear. muſ. Gott. t. 34. *f.* 1. 3.
Seb. muſ. 3. *t.* 111. *f.* 7. 8. *et t.* 112. *f.* 1. 4-7.
Knorr delic. t. A. IV. *n.* 1.
Habitat in mari Indiam, *et auſtralem* Americam *alluente, formae quam maxime variabilis, et diametri aliquot pedes nonnunquam aequantis, in inſulis* Caribaeis *calci urendae adhibita.*

ſinuoſa. 19. M. anfractibus patulis flexuoſis brevibus, diſſepimentis inaequalibus exeſis, ambulacris ſubduplicatis, lamellis denticulatis.
Soland. et Ellis corall. p. 160. *n.* 35.
Habitat in Oceano, Americam *auſtralem alluente.*

macandrites. 20. M. acaulis, ſtella repando-labyrinthiformi, ſutura acuta.
Pallas el. zooph. p. 297. *n.* 172. Madrepora (labyrinthica) conglomerata ſeſſilis, ſtellis anfractuoſis, lamellis craſſiuſculis integris.
Soland. et Ellis corall. p. 161. *n.* 37. *t.* 48. *f.* 1. Madrepora conglomerata, diſſepimentis ſimplicibus ſubſolutis, lamellis incraſſatis aequalibus remotis intus attenuatis ſubintegris.
Gualt. teſt. t. 51. b. Maeandrites coſtis planis amplioribus, acutis et rarioribus lamellis.
Hill plant. 2. Mycedium convexum, gyris ſulcatis.
Seb. muſ. 3. *t.* 109. *f.* 9. 10. *t.* 112. *f.* 2. 3. 4?
Knorr delic. t. A. III. *f.* 2.
Habitat in mari Americam auſtralem *alluente, et* mediterraneo, *anfractibus amplioribus et laxioribus, quam in labyrinthiformi, ſolidior et fere lapidea, ſtellarum centris ipſis radiatim lamellatis.*

Areola. 21. M. acaulis, ambulacris pinnatifidis, pulvillis anguſtis truncatis.
Pallas el. zooph. p. 295. *n.* 171. *β.* Madrepora ſimplex ſubpedunculata, ſtella criſpato laciniofa lamellis crenulatis.
Soland. et Ellis corall. p. 161. *n.* 36. *t.* 47. *f.* 4. 5. Madrepora (areolata) conglomerata, anfractibus dilatatis, diſſepimentis exeſis ſubinaequalibus, ambulacris duplicatis hinc dilatatis, lamellis denticulato crenulatis.
Cluſ. ex. l. 6. *c.* 10. *p.* 125. *Beſl. muſ. Locbn. p.* 87. *t.* 28. Fungus lapideus minor.
Petiv. pterigr. t. 20. *f.* 16. Corallium album fungoides ovale.
Sloane catal. p. 2. *jam.* 1. *p.* 56. *n.* 10. 11. *t.* 18. *f.* 3. Fungus lapideus undulatus.

Shaw afr. app. p. 47. *n.* 7. Fungus coralloides roſaceus maris rubri.

Rumpf amb. 6. *p.* 244. *t.* 87. *f.* 1. *Lang. lap. fig. p.* 52. *t.* 12. *f.* 4. *Ephem. Nat. Curioſ. Dec.* II. A. 3. *obſ.* 24. *p.* 78. *t.* 2. Amaranthus ſaxeus.

Valent. ind. 3. *t.* 52. *f.* CC. Amaranthus marinus.

Molin. Cabin. p. 220. *t.* 45. *n.* 7. Morille.

Aegenv. oryct. t. 22. *n.* 4. Cariophilloides.

Hill plant. p. 3. Mycedium cavatum undulatum.

Knorr delic. t. A. XI. *f.* 1. 2. Cerebrites.

Kundm. rar. p. 153. *t.* 9. *f.* 7.

J. Bauh. hiſt. 3. *p.* 801. *f.* 3.

Seb. muſ. 3. *t.* 108. *f.* 3. 5. *et t.* 112. *f.* 23-27.

Turgot. mem. inſtr. t. 22. *f.* C.

Habitat in mari, Americam *auſtralem et* Indiam *alluente, maeandritae* (*ſubtus tamen laevis*), *propius adhuc labyrinthiformi affinis, calyce, quam utcunque refert, in lacinias criſpato, exterius porcis crenato-muricatis crebro, intus cavo lamelloſo, centro inter lamellas demerſo pinnato.*

abdita. 22. M. ſubconglomerata, anfractibus ſtelliformibus angulatis obconicis, ambulacris ſimplicibus: lamellis anguſtis crenulato-denticulatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 162. *n.* 39. *t.* 50. *f.* 2.

Habitat - - - *an forſan mera favoſae varietas?*

phrygia. 23. M. anfractibus longiſſimis anguſtis, ambulacris perpendicularibus ſimplicibus, diſſepimentis ſimplicibus lamelloſis lobulatis, lamellis remotiuſculis. *Soland. et Ellis corall. p.* 162. *n.* 40. *t.* 48. *f.* 2.

Habitat in Oceano auſtrali, *ambulacris nunc rectis, nunc flexuoſis.*

repanda. 24. M. ambulacris incraſſatis, diſſepimentis ſimplicibus ſubſolutis, lamellis numeroſis: plurimis intus incraſſatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 162. *n.* 41.

Habitat - - -

ambigua. 25. M. anfractibus ſtelliformibus flexuoſisque, ambulacris incraſſatis, diſſepimentis ſimplicibus craſſiuſculis, lamellis diſtantibus. *Soland. et Ellis corall. p.* 162. *n.* 42.

Habitat - - -

daedalea. 26. M. anfractibus profundis brevibus, diſſepimentis ſubexeſis laceris, lamellis ſerrato-dentatis, ambulacris perpendicularibus. *Soland. et Ellis corall. p.* 163. *n.* 43. *t.* 46. *f.* 1.

Habitat in Oceano indico.

27. M.

gyroſa. 27. M. celluloſa, ambulacris duplicatis foliaceis, diſſepimentis ſimplicibus, lamellis foliaceis aequalibus. *Soland. et Ellis corall. p.* 163. *t.* 51.
Seb. muſ. 3. *t.* 109. *f.* 9. 10.
Habitat - - - congeneribus magis laevis, cellulis numeroſis cavernoſa.

clivoſa. 28. M. anfractibus baſi anguſtatis, diſſepimentis ſubexeſis aequalibus, ambulacris ſimplicibus craſſiuſculis, lamellis alternis abbreviatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 163. *n.* 45.
Habitat in mari, Americam *auſtralem alluente, rotundata, noduloſa.*

Cerebrum. 29. M. anfractibus baſi ſubrotundatis tortuoſis longiſſimis, diſſepimentis exeſis aequalibus, ambulacris ſimplicibus anguſtis. *Soland. et Ellis corall. p.* 163. *n.* 46.
Habitat - - - rotundata aequalis.

involuta. 30. M. anfractibus baſi dilatatis brevibus, diſſepimentis exeſis ſubaequalibus anguſtis, ambulacris ſimplicibus. *Soland. et Ellis p.* 164. *n.* 47.
Habitat - - -

implicata. 31. M. anfractibus rotundatis ſubperpendicularibus, diſſepimentis exeſis aequalibus latis, ambulacris duplicatis latis. *Soland. et Ellis corall. p.* 164. *n.* 48.
Habitat - - -

Cochlea. 32. M. anfractu ſpirali, ſtella ſimplici aut duplici: centro punctato, radiis ſerrulatis. *Spengler nov. act. ſoc. dan. Hafn.* 1. *p.* 240. c. *ic.*
Habitat ad Tranquebariae *littora, inter teſtacea et zoophyta, quaſi media, an hujus generis et familiae?*

††† Aggregatae, *indiviſae, ſtellis diſtinctis, ambulacris poruloſis, tuberculoſis.*

favoſa. 33. M. ſtellis anguloſis concavis coadunatis. *Amoen. acad.* 1. *p.* 96. *t.* 4. *f.* XVI.
Pall. zooph. p. 319. *n.* 187. Madrepora (favites) corporibus brevibus coadunatis ſtellis anguloſis cavis intus lamelloſis
Soland. et Ellis corall. p. 167. *n.* 61. *t.* 50. *f* 1. Madrepora aggregata conglomerata, anfractibus ſubſtelliformibus angulatis patulis, parietibus ſimplicibus, lamellis dentatis margine connatis elevatis.

 Bocc.

Bocc. muſ. 1. *t.* 5. *f.* 3. Aſtroites.
Forsk. Fn. aegypt. arab. p. 132. *n.* 2. 3.
Gualt. teſt. t. 19. *n.* 23.
Seb. muſ. 3. *t.* 112. *f.* 8. 10. 21. c.
Knorr delic. 1. *t.* A. IV. *f.* 2.
Habitat in Oceano indico, *alba, ad latera ſtriata, transverſim diſſecta rete groſſum monſtrans punctis pertuſum, maculasque, alias extimum pollicem latitudine aequantes, alias piſo minores radiatas.*

cavata. 34. M. ſubconglomerata, anfractibus ſtelliformibus angulatis, parietibus ſimplicibus anguſtis, lamellis denticulatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 167. *n* 62.
Habitat - - - an mera favoſae varietas?

bulliens. 35. M. ſtellis diſtantibus teretibus oblongisve inaequalibus margine elevatis, interſtitiis radiato-rugulоſis concaviuſculis. *Soland. et Ellis corall. p.* 167. *n.* 63.
Habitat - - -

Ananas. 36. M. ſtellis anguloſis convexis diſco concavis. *Amoen. acad.* 1. *p.* 92. *t.* 4. *f.* VIII. 2. IX.
Pallas el. zooph. p. 321. *n.* 189. Madrepora aggregata, corporibus obverſe conicis coadunatis, ſtellis ſcabris convexis centro cavis.
Soland. et Ellis corall. p. 168. *n.* 64. *t.* 47. *f.* 6. Madrepora aggregata, ſtellis ſubangulatis inaequalibus multiradiatis: marginibus convexis lamelloſis, lamellis denticulato-crenatis, interſtitiis concavis.
Helw. lithogr. t. 5. *f.* 22. Corallium album ſuperne figuris alteriformibus propemodum obliteratis.
Bocc. muſ. t 9. *f.* 7.
Brom. lith. ſpec. 2. *n.* 20.
Seb. muſ. 3. *t.* 109. *f.* 11.
Wolf. Haſſ. t. 10. *f.* 3. 4.
Volkm. Sil. 1. *t.* 18. *f.* 5. *et t.* 19. *f.* 3. a. b.
Knorr delic. 1. *t.* A. VI. *f.* 1.
Schroet. Einl. in Verſt. 3. *t.* 7. *f.* 3? *et t.* 9. *f.* 4.
Habitat in mari mediterraneo, *et* Americam *auſtralem alluente, frequens foſſilis, gibba, ramulis obovatis ſtella gibba radiata: diſco demerſo ſtriato terminatis, ad latera ſuturae ope connexis compoſita, transverſe diſſecta, rete album, maculis ſexangularibus annulum album includentibus, inter rete et annulum ſtriatis varium referens.*

37. M.

Hyades. 37. M. ſtellis ſubconfertis obconicis rotundis ſubangulatisque: parietibus craſſis poroſis, centris planiuſculis convexisque. *Soland. et Ellis corall. p.* 168. *n.* 65.
Habitat - - -

ſiderea. 38. M. ſtellis confertis rotundis ſubangulatisque: parietibus craſſis convexiuſculis, lamellis alternis margine ſubconnatis, centris ſimplicibus. *Soland. et Ellis corall. p.* 168. *n.* 66. *t.* 49. *f.* 2.
Habitat - - -

Galaxea. 39. M. ſtellis ſubconfertis impreſſis: parietibus craſſis planiuſculis ſubdiſtinctis, lamellis tenuiſſimis, centris ſubexeſis. *Soland. et Ellis corall. p.* 168. *n.* 67. *t.* 47. *f.* 7.
Habitat - - - lamellis quaternis ad centrum extenſis, tribus intermediis prope baſin conniventibus.

Plejades. 40. M. ſtellis ſubteretibus: marginibus acutis elevatis, interſtitiis concavis laeviuſculis hinc cavernoſiuſculis. *Soland. et Ellis corall. p.* 169. *n.* 68. *t.* 53. *f.* 7. 8.
Habitat - - -

papilloſa. 41. M. ſubaggregata, ſtellis cylindracee papilloſis: marginibus incraſſatis rotundatis obliquis. *Soland. et Ellis corall. p.* 169. *n.* 70.
Habitat - - - muricatae affinis, et forte primordium, papillis tamen contiguis et ſimplici cardine diſpoſitis.

radiata. 42. M. ſtellis cylindraceis margine elevatis, interſtitiis latis concavis ſulcato-radiatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 169. *n.* 71. *t.* 47. *f.* 8.
Pallas el. zooph. p. 321. *n.* 188. *β.*
Habitat - - -

latebroſa. 43. M. ſtellis ſubteretibus multiradiatis margine elevatis, interſtitiis radiato-ſulcatis ſubcoarctatis inaequalibus. *Soland. et Ellis corall. p.* 170. *n.* 72.
Sloan. jam. 1. *t.* 21. *f.* 4.
Habitat in mari Americam *auſtralem alluente.*

polygama. 44. M. ſtellis minutis confertis: immixtis majoribus perforatis fundo concavo-cylindrico. *Amoen. acad.* 4. *p.* 258. *t.* 3. *f.* 15.
Habitat in mari indico, *mytili margaritiferi teſtam interdum obducens, cruſtam niveam,* 2 *pollicum craſſitie, referens,*

ferens, ſtellis plurimis minutis obtuſiuſculis 12 *radiatis, paucioribus digiti minimi craſſitie, gibboſioribus, cavitate infra has ſtellas inani.*

arenoſa. 45. M. ſtellis contiguis planiuſculis ſubarenaceis.
Habitat in mari Algiriam *alluente, alba, ſtellis majuſculis ochraceis, interdum parum elevatis et verrucoſis.* Brander.

interſtincta. 46. M. ſtellis immerſis teretibus diſtantibus: interſtitio punctato. *Müll. zool. dan. prodr.* 3037.
Soland. et Ellis corall. p. 167. *n.* 60. *t.* 56. Madrepora ſtellis cylindraceis profundis diſtinctis, interſtitiis poroſis, corallio ſubexplanato duplicato.
Pallas el. zooph. p. 256. *n.* 158. Millepora caerulea.
Petiv. gaz. t. 10. *f.* 12. Coralloides philippenſis caerulea.
Habitat in mari indico, Americam *auſtralem*, Norwegiam *alluente, extrinſecus cineraſcens, intus obſolete cinerea.*

ſpongioſa. 47. M. foliacea ſubexplanata, ambulacris confragoſis ſupra obtuſatis, ſubtus planis, ſtellis infundibuliformibus profundis inaequalibus. *Soland. et Ellis corall. p.* 164. *n.* 49.
Habitat - - -

folioſa. 48. M. foliacea ſubexplanata, ambulacris ſuperne confragoſis verruculoſis inferne planiuſculis, ſtellis aequalibus parvis. *Soland. et Ellis corall. p.* 164. *n.* 50. *t.* 52.
Pallas el. zooph. p. 333. *n.* 196. Madrepora polymorpha laciniosa, laminis laceris ſcaberrimis, poris utrinque ſparſis minutis.
Rumpf muſ. 6. *t.* 87. *f.* 2.
Gualt. teſt. t. 42. *f.* b.
Seb. muſ. 3. *t.* 110. *f.* 7.
Turgot mem. inſtr. t. 22. A.
Muſ. Besler. t. 27.
Baier mon. rer. petr. t. 2. *f.* 3. 4.
Habitat in Oceano indico, *rarior, roſam explanatam interdum referens.*

poculata. 49. M. ſtellis obconicis: marginibus acutis hinc inde remotis, interſtitiis laevibus; lamellis undique granuloſis. *Soland. et Ellis corall. p.* 165. *n.* 51.
Pallas el. zooph. p. 319. *n.* 186. *β.*
Ellis corall. t. 32. *f.* A. 1. A. 3.
Habitat rariſſima - - - *ex griſeo alba.*

ſtellulata. 50. M. cylindris ſtellarum teretibus diſtantibus aequalibus margine elevatis; interſtitiis planiuſculis ſcabriuſculis, *Soland. et Ellis corall. p.* 165. *t.* 53. *f.* 3. 4.
Habitat - - -

aſtroites. 51. M. ſtellis confertiſſimis immerſis diſco concavo-cylindrico.
Pallas el. zooph. p. 322. *n.* 190. Madrepora (radians) aggregata ſolida, ſtellis confertis convexiuſculis, centri poro radiante, ſtriis ſcabriuſculis.
Soland. et Ellis corall. p. 165. *n.* 53. Madrepora ſtellis confertis impreſſis, interſtitiis poroſis, lamellis aceroſis ſcabriuſculis.
Brown jam. p. 392. Aſtrea aperturis cavernarum minimis, maſſa inaequali.
Seb. muſ. 3. *t.* 112. *f.* 12. 14.
Knorr delic. 1. *t.* A. X. *f.* 4.
Myl. ſax. ſubterr. 2. *t.* 2. *f.* 1.
Herm. marlogr. t. 11. *f.* 32.
Kundm. rar. nat. t. 10. *f.* 9-17.
Argenv. oryctol. t. 23. *f.* 4. 10. 19.
Habitat in mari, Americam *auſtralem alluente, frequens ſatis inter foſſilia maſſis ingentibus ſaepe obvia, alba, ſolida extrinſecus pallide griſea.*

ſtellata. 52. M. ſolida exterius ſcabra, ſtellis ſparſis convexis medio impreſſis.
Pallas el. zooph. p. 323. *n.* 191.
Habitat rarior in Oceano indico, *rupibus ſuperinducta, teneerrimis punctis ſcabra, extrinſecus ex griſeo cineraſcens.*

nodulosa. 53. M. ſtellis confertis obconicis, interſtitiis lamellisque aceroſis ſcabriuſculis, corallio ſubnoduloſo. *Soland. et Ellis corall. p.* 165. *n.* 54.
Seb. muſ. 3. *t.* 112. *f.* 18.
Habitat in - - -

acropora. 54. M. ſtellis confertis annularibus prominulis crenatis.
Habitat - - - *hemiſphaerica, ſtellis parvis, elevatis, fundo profundioribus.*

cavernoſa. 55. M. ſtellis immerſis hypocrateriformibus: limbo ſtriato, interſtinctis ſutura elevata.
Pallas el. zooph. p. 320. *n.* 188. Madrepora (aſtroites) aggregata, cylindris coadunatis, ſtellis cavis lamelloſis ambitu radiatis.

Soland.

Soland. et Ellis corall. p. 169. *n.* 69. *t.* 53. *f.* 1. 2. Madrepora (annularis) ſtellis teretibus aequalibus margine elevatis, interſtitiis plano-concavis radiatis.
Seb. muſ. 3. *t.* 112. *f.* 15. 19. 22.
Bocc. muſ. t. IX. 5. *f.* 4.
Kundm. rar. nat. t. 10. *f.* 6.
Knorr delic. 1. *t.* A. IV. *f.* 3.
Volkm. Sileſ. ſubt. 1. *t.* 18. *f.* 1.
Bourg. petrif. t. 4. *f.* 26. *et t.* 7. *f.* 36.
Argenv. oryct. t. 23. *f.* 9. 16.
Knorr Petref. 2. *t.* F. V. *n.* 2. *et t.* F. VI. *f.* 3.
Habitat in mari Americam *auſtralem alluente et* mediterraneo, *ſuturis rete pentagonum, ſtellis elevatius, ad latera ſtriatum referentibus, an forte varietas minor radiatae?*

punctata. 56. M. punctis ſtellaribus confertis conflatis e punctis denis.
Habitat in Oceano europaeo, *et* mari mediterraneo *rotunda, alba, friabilis, punctis ſtellaribus parvis inaequalibus.*

calycularis. 57. M. cylindris coadunatis, ſtellis excavatis, centro prominulo. *Spallanz. act. ſociet. ital.* 2.
Pallas el. zooph. p. 318. *n.* 186. Madrepora cylindris obconicis coadunatis, ſtellis crateriformibus lamelloſis, centro exeſo prominulo.
Brown. jam. p. 392. *n.* 2. Aſtrea aperturis cavernarum radiatis, centro ſpongioſo.
Cavolin. pol. rar. 1. *t.* 3. *f.* 1-5. *et* 3. *p.* 248.
β) *Cavolin. pol. mar.* 1. *p.* 57. *t.* 3. *f.* 6-8. Madrepora denudata.
Habitat in mari mediterraneo, *ſubrotunda fuſca, cylindris lateralibus ſaepe diſtinctis, exterius transverſim rugoſis; incola actinia, non meduſa, ſegnis, magna.*

truncata. 58. M. articulis turbinatis proliferis radio pluribus margine coadunatis, ſtellis truncatis: diſco concavo-cylindrico.
Amoen. acad. 1. *p.* 93. *t.* 4. *f.* X. 3.
Volkm. ſileſ. ſubt. 1. *p.* 121. *t.* 19. *f.* 1. a. b.
Knorr Petref. 2. 2. *t.* I**. *f.* 2. *et t.* G. I*. *f.* 2. *et* 3. *ſuppl. t.* VI. b. *f.* 3.
Habitat - - - hactenus modo inter foſſilia reperta, parum rugoſa, articulis longitudine et latitudine aequalibus ſummo margine coaleſcentibus.

ſtellaris. 59. M. articulis proliferis centralibus ſolitariis, ſtellis margine dilatato coadunatis.
Amoen. acad. 1. *p.* 94. *t.* 4. *f.* XI. 4.

Habitat - - - hactenus modo foſſilis inventa, frequens ad Gothlandiae *littora, caulibus ſimplicibus parallelis, erectis, digiti craſſitie, palmaribus, et longioribus, cortice obſolete ſtriato, articulis cyathiformibus, pollicem longis.*

Organum. 60. M. coralliis cylindricis laevibus diſtantibus combinatis: membranis deflexis.

Amoen. acad. 1. *p.* 96. *t.* 4. *f.* VI. 1.

Forsk. Fn. aegypt. ar. p. 134. *n.* 11.

Habitat in mari rubro, *frequentius foſſilis, potiſſimum ad littora* maris Balthici, *caulibus parallelis craſſitie culmi ſecalini, diaphragmatibus ſtellarum ſtriis radiatis, interdum deficientibus.*

divergens. 61. M. ſubgloboſa, cylindris divergentibus duplo diametri ultra ſuperficiem exſtantibus. *Forsk. Fn. aegypt. arab. p.* 136. *n.* 19.

Habitat - - - hactenus modo inter foſſilia obvia, nunc mera organi varietas?

muſicalis. 62. M. corallis cylindricis ſtriatis diſtantibus, combinatis membranis confertiſſimis transverſis.

Pallas el. zooph. p. 317. *n.* 185. Madrepora (Organum) aggregata, cylindris ſimplicibus anguloſis, ſtellis cruſta terminali connexis prominulis.

Soland. et Ellis corall. p. 165. *n.* 55. Madrepora aggregata, cylindris ſtellarum ſtriatis diſtantibus combinatis membranis transverſis.

Ellis act. angl. 53. *p.* 432. *t.* 20. *f.* 14.

Borlaſ. Cornub. p. 241. *t.* 27. *f.* 7.

Habitat in Oceano indico, *ad* Hiberniae *littora aliquando rejecta, lactea, maſſa ſaepe ingenti.*

denticulata. 63. M. ſtellis inaequalibus: lamellis margine elevatis; majoribus baſi proceſſu acutis, interſtitiis ſulco exaratis. *Soland. et Ellis corall. p.* 166. *n.* 56. *t.* 49. *f.* 1.

Habitat - - -

faveolata. 64. M. ſtellis ſubangulatis multiradiatis: parietibus hinc inde ſubduplicatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 166. *n.* 57. *t.* 53. *f.* 5. 6.

Habitat - - -

65. M.

Retepora. 65. M. ſtellis angulatis, lamellis filamentoſis, parietibus reticulatis denticulatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 166. *n.* 58. *t.* 54. *f.* 3-5.

Habitat - - -

rotuloſa. 66. M. ſtellis cylindraceis pauciradiatis, lamellis circa marginem erectis acutis, baſi ſpinula erecta acutis. *Soland. et Ellis corall. p.* 166. *n.* 59. *t.* 55.

Habitat - - -

ceſpitoſa. 67. M. corallis teretibus ſubramoſis ſtriatis approximatis, ſtellis turbinato concavis, reticulatis.

Pallas el. zooph. p. 315. *n.* 184. Madrepora (flexuoſa) aggregata, cylindris ſubramoſis linearibus ſtriatis apice truncatis ſtellatisque.

Imper. hiſt. nat. 818. Porus matronalis.

Aldrov. muſ. metall. p. 292. Pſeudocorallium album fungoſum.

Worm. muſ. p. 235. Millepora Imperati.

Mercat. metall. p. 134. Juncus lapideus.

Gualt. teſt. t. 61. Acropora ceſpitoſa albida ramoſa.

Habitat in mari mediterraneo, *alba, lapidea, maximae ſaepe molis, frequens ſatis inter foſſilia.*

flexuoſa. 68. M. coralliis cylindricis ſcabris flexuoſis approximatis, ſtellis convexis ſtriatis.

Amoen. acad. 1. *p.* 96. *t.* 4. *f.* XXIII. 5.

Habitat - - - *ad maris* Balthici *littora rejecta, an forſan mera ceſpitoſae varietas?*

faſciculatis. 69. M. coralliis rectis cylindricis glabris divergentibus.

Pallas el. zooph. p. 313. *n.* 183. Madrepora (cariophyllites) aggregata, ſtellis diſtinctis cylindraceis turbinatis lamelloſis.

Imperat. hiſt. nat. 817. Millepora.

J. Bauh. hiſt. 3. *p.* 795. Corallio affinis Madrepora.

Rumpf muſ. 6. *p.* 245. *t.* 87. *f.* 3. Cariophyllum ſaxeum.

Gualt. teſt. t. 106. *f.* G. Balanorum cylindraceorum glomus.

Shaw afr. app. p. 48. *n.* 17. Fungus tubulatus et ſtellatus.

Seb. muſ. 3. *t.* 108. *n.* 9. Madrepora tubuloſa, Acropora aliis.

Bonann. muſ. Kircher. t. 5. *f.* 1.

Boccon. muſ. t. 9. *n.* 5. *f.* 1.

Knorr delic. t. A. IV. *n.* 4.

Argenv. oryctol. t. 22. *f.* 6.

Bourg. petr. t. 4. *f.* 25. *et t.* 10. *f.* 47.

Volkm. ſil. ſubt. t. 17. *f.* 4.

Herm.

Herm. marlogr. t. 12. *f.* 10.
Habitat in Oceano indico, *alba, lapidea, ſolida, inaequalis, frequens inter foſſilia europaea.*

pectinata. 70. M. ſtellis orbiculatis: margine tumido dilatato radiato, interſtitiis punctatis.
Volkm. ſileſ. ſubt. 1. *p.* 121. *t.* 19. *f.* 2.
Knorr Petreſ. ſuppl. t. VI. g. *f.* 2.
Guett. mem. 2. *p.* 425. *et* 3. *p.* 509. *t.* 51. *f.* 2. Heliolitha.
Walch Naturf. 5. *p.* 45. *n.* 5.
Habitat - - - hactenus modo inter foſſilia, in Sileſia, *epiſcopatu* Baſileenſi, *et prope* Vaſuntium *reperta, ſtellis planis: lamellis circiter* 30 *inaequalibus denticulatis.*

rotularis. 71. M. polymorpha, ſtellis ſolitariis orbiculatis planis aequaliter radiatis: margine laevi plano vix prominulo.
Forsk. Fn. aeg. amb. p. 135. *n.* 15. Madrepora Serailia.
Guett. mem. 2. *p.* 421. *et* 3. *p.* 502. *t.* 47. *f.* 7.
Knorr Petref. II. 2. *t.* F. V. *f.* 1.
Walch. Naturf. 5. *p.* 47. *n.* 6.
Habitat in mari rubro, *aliis interdum marinis adnata, alba, ſolida, nunc ſubgloboſa, nunc explanata, ſtellarum diametro lineam circiter aequante.*

tubularis. 72. M. tubis cylindricis integerrimis prominulis in ſtellam inaequaliter radiatam expanſis.
Walch Naturf. 5. *p.* 48. *n.* 7.
Habitat - - - hactenus modo inter foſſilia occurrens tubis craſſitie pennae corvinae, ſtellis lamellis 6 *craſſioribus, interjectis inter ſingulas* 3 *minoribus.*

mammillaris. 73. M. ſtellis orbiculatis prominulis verruciformibus acuto excavatis.
Guett. mem. 3. *p.* 514. *t.* 54. *f.* 3.
Walch Naturf. 5. *p.* 50.
Schroet. Einl. in Verſt. 3. *t.* 6. *f.* 3.
Habitat - - - hactenus tantum foſſilis prope Trajectum *ad* Moſellam *et* Veſuntium *inventa, ſtellarum limbo nullo.*

patelloides. 74. M. glabra, ſtellis magnis multiradiatis elatiuſculis: centro exili.
Guett. mem. 3. *p.* 506. *t.* 48. *f.* 2-4.
Büttn. corall. ſubt. p. 24. *t.* 3. *f.* 2.
Knorr Petref. II. 2. *t.* F. VI. *f.* 4.
Habitat - - - hactenus modo inter foſſilia obvia, ſtellarum radiis craſſis, aequalibus, ſaepe ultra 35.

globularis. 75. M. ſtellis magnis rotundatis aequaliter radiatis: centro amplo pertuſo.
Kundm. rar. nat. t. 10. *f.* 7.
Walch Naturf. 5. *p.* 51.
Habitat - - -

Filum. 76. M. ſtellis rotundis magnis ſubconfertis explanatis: centro minimo vix excavato.
Scheuchz. lithogr. helv. p. 36. *t. n.* 49. Aſtroites majoribus ſtellis.
Walch Naturf. 5. *p.* 54.
Habitat - - - *prope* Baſileam *inter foſſilia reperta, ſtellarum diametro* 3-4 *linearum.*

perforata. 77. M. ſtellis confertis exilibus excavatis: lamellis perforatis.
Walch Naturf. 5. *p.* 54-58.
Habitat - - - *interdum hemiſphaerica diametro pedali, ſuperficie inaequali, ſtellarum radiis* 12, *an forſan varietas poritae?*

vermicularis. 78. M. ſtellarum radiis inaequalibus undulatis explanatis.
Lang. lap. fig. Helv. p. 60. *t.* 20.
Bourg. petref. t. 3. *f.* 19.
Volkm. ſileſ. ſubt. p. 119. *t.* 18. *f.* 4. *et?* 5.
Walch Naturf. 5. *p.* 58.
Habitat - - - *hactenus modo inter foſſilia occurrens, ſtellarum diametro* 5-6 *lineis aequali, radiis principalibus* 8, *nonnullis bifurcis, centro exili.*

arachnoides. 79. M. ſtellis confertis exilibus explanatis: radiis ſubundulatis brevibus aequalibus.
Plot. nat. hiſt. Oxf. t. 2. *f.* 7.
Hill. hiſt. of. foſſ. t. 7.
Guett. mem. 2. *p.* 435. *et* 3. *p.* 508. *t.* 49. *f.* 2.
Walch Naturf. 5. *p.* 59.
Scheuchz. litthogr. helv. f. 54.
Volkm. ſileſ. ſubt. p. 120. *t.* 18. *f.* 11.
Schroet. Einl. in Verſt. 3. *p.* 461. *t.* 9. *f.* 3.
Habitat - - - *hactenus modo inter foſſilia reperta, hemiſphaerica, ſtellarum radiis* 12 *ſeſe contingentibus.*

undulata. 80. M. ſtellis magnis elevatis: radiis elongatis arcuatis.
Bourg. petrif. 3. *f.* 23.
Guett. mem. 2. *p.* 441. 3. 491. *t.* 40. *f.* 1.
Walch Naturf. 5. *p.* 60.
Knorr Petref. II. 2. *t.* F. VI. *f.* 1.

Habitat

Habitat - - - hactenus modo inter foſſilia reperta, ſtellarum diametro, 5-6 lineas aequante, radiis ad 24.

ſolida. 81. M. ſtellis undique contiguis: marginibus coadunatis membranaceis. *Forſk. Fn. aeg. arab. p.* 131.

Habitat in mari rubro, *inſignes ſcopulos ſola conſtituens, dura, ad aedes ſtruendas calcemque urendam adhibita, ſtellis concavis, ſeminis ſinapi magnitudine, margine tenuiſſimo fragili, lamellis nunc radiatis, nunc marginem modo occupantibus, centro orbiculato, verrucarum ſerie aſpero.*

Monile. 82. M. ſtellis infundibuliformibus diſco vacuis lamellis et parietibus obtectis, lamellis aequalibus radiantibus denticulatis in alteram ſtellam continuatis. *Forſk. Fn. aeg. arab. p.* 133. *n.* 6.

Habitat - - - hactenus modo foſſilis prope Djiddam Arabiae *reperta, M. Ananas proxime affinis, ſtellis piſi magnitudine, centro ſemine ſinapi minore.*

daedalica. 83. M. ſtellis ſubhexagonis: parietibus unitis reticulatis interne et margine dentatis. *Forſk. Fn. aeg. arab. p.* 133. *n.* 7.

Habitat in mari rubro, *ſtellis magnitudine lentis, niveis, tenuiſſimis, intus dentatis.*

monoſtriata. 84. M. parietibus inter ſtellas antiquas in linguas lanceolatas ſcabras elatis. *Forſk. Fn. aeg. arab. p.* 133. *n.* 8

Habitat in mari rubro, *ſpongioſa, tenax, nivea, ſtellarum diametro linguis duplo minori.*

Contignatio. 85. M. planiuſcula orbiculata, ſtellis ad ambitum linearibus verſus centrum ſpectantibus, mediis ovatis divaricatis ſubcontiguis. *Forſk. Fn. aeg. arab. p.* 134. *n.* 9.

Habitat in mari rubro, *diametri interdum pedalis, an diſtincta hujus familiae ſpecies?*

Rus. 86. M. inaequalis ſpongioſo-papilloſa, ſtellis ſuperficialibus planiuſculis diſtantibus. *Forſk. Fn. aeg. arab. p.* 135. *n.* 14.

Habitat in mari rubro, *ſtellis ſubobſoletis, ſeminis ſinapi magnitudine.*

criſtata. 117. M. coralliis ventricoſo-conicis laevibus apicem verſus ſcabris, ſtellis angulato rotundatis labyrinthiformibus: lamellis alternatim brevioribus ſeriatis inſtructis. *Eſper Pflanzenth.* 3. *p.* 150. *n.* 24. *t.* 26.

Habitat ad Sinae *littora.*

cuſpidata. 118. M. coralliis conicis ſulcatis; ſtellis turbinatis: lamellis rectis elongatis acutis. *Eſper Pflanzenth.* 3. *p.* 145. *n.* 26. *t.* 28.
Habitat ad Sinae *littora.*

†††† Ramoſae, *ſtellis diſtinctis, ambulacris tuberculoſis poruloſis.*

porites. 87. M. ſubramoſa compoſita ſcabra, poris ſubſtellatis confertis.
Pallas el. zooph. p. 324. *n.* 192. Madrepora polymorpho-ſubramoſa convexa, ſtellulis minutis impreſſis punctato-ſcabris.
Imper. hiſt. nat. 802. *t.* 814. Corallium ſtellatum.
J. Bauh. hiſt. 3. *p.* 805. Corallium ſtellatum minus album.
C Bauh. pin. p. 366. Corallium album ſtellatum majus.
Moriſ. hiſt. plant. 3. *t.* 10. *n.* 12. Porus albus pumilus ramoſior creberrime ſtellatus.
Petiv. pterigr. t. 20. *f.* 15. Corallium poroſum typhoides ſtellulatum.
Turnef. inſt. p. 573. Madrepora alba ſtellata major.
Gualt teſt. t. 20. Madrepora alba braſſicam floridam referens.
Soland. et Ellis corall. p. 172. *n.* 77. *t.* 47. *f.* 1. Madrepora ramuloſa, ramis clavato complanatis, ſtellis contiguis (lamellarum loco) cuſpidato-tuberculatis.
Sloan. jam. p. 53. *t.* 18. *f.* 4.
Brown jam. p. 391. *n.* 3. 4.
Muſ. Gottw. p. 61. *t.* 47. *f.* 3.
Boccon. muſ. t. 9. *f.* 1. 4.
Knorr delic. t. A. I. *f.* 3.
Habitat in Oceano indico, *et* Americam *auſtralem alluente, albiſſima, extrinſecus ſaepe griſea vel ſordida, ramis patulis ſubdichotomis vel alternis, obtuſiſſimis, punctis prominentibus exaſperata.*

digitata. 88. M. ramis clavato-complanatis, ſtellis ſparſis ſexradiatis: margine ſuperiore porrecto fornicato. *Soland. et Ellis corall. p.* 170. *n.* 74.
Pallas el. zooph. p. 326. *n.* 193. Madrepora ramoſa ſcabra, ramis ſubclavato compreſſis, ſtellis creberrimis prominulis deorſum ſpectantibus.
Rumpf amb. 6. *p.* 240. *n.* 3. Lithodendrum digitatum.
Seb. muſ. 3. *t.* 109. *f.* 11.
Habitat in Oceano indico, *ad varietatem ramoſam poritae accedens, et media inter hanc et muricatam, alba, extrinſecus ex griſeo flaveſcens.*

89. M.

damicornis. 89. M. ramoſiſſima, ramis attenuatis ſubdiviſis, ſtellis paſſim crebris caecis ciliatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 170. *n.* 73.
Pallas el. zooph. p. 334. *n.* 197. Madrepora polymorpho ramoſiſſima, ramis ſubdiviſis attenuatis, poris crebris caecis crenatisque.
Imper. nat. hiſt. 626. Species corallii.
Moriſ. hiſt. plant. 3. *t.* 10. *f.* 11. Porus ſ. corallium aſtroites humilius, ramis alias latis et compreſſis, alias incertae figurae.
Mercat. metalloth. 6. *c.* 16. *p.* 124. Truncus corallites.
Shaw afr. app. p. 48. *n.* 33. 34. *t. n.* 33. Madrepora aſtroites ceratiformis.
Gualt. teſt. t. 104. b. Madrepora candida ramoſa, damae cornua referens, foraminibus rotundis in ſuperficie inſignita.
Rumpf amb. 6. *p.* 240. *t.* 86. *f.* 3. Lithodendrum littoreum.
Knorr delic. nat. t. A. I. *f.* 4.
Habitat in Oceano africano *et* indico, *verrucarum defectu a verrucoſa diſcernenda.*

verrucoſa. 90. M. ramoſiſſima, ramis obtuſatis; ramulis numeroſiſſimis ſimplicioribus verrucaeformibus, ſtellis ſparſis crebris ciliatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 172. *n.* 78.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1279. *n.* 32. *et O. Fabr. Fn. groenl. p.* 31. *n.* 433. Madrepora (damicornis) ramoſa compoſita verrucoſa poris ſparſis confertis immerſis margine ſolo crenatis.
Syſt. nat. X. *p.* 791. *n.* 9. Millepora damicornis.
J. Bauh. hiſt. 3. *p.* 805. Corallium candidius verrucoſum punctatum.
C. Bauh. pin. p. 366. Corallium album verrucoſum punctatum.
Tournef. inſ. p. 373. Madrepora verrucoſa punctata.
Weinm. phytanth. 2. *p.* 426. *f.* 2. Coralloides fiſtuloſa.
Habitat in Oceano africano *et* indico.

muricata. 91. M. compoſita ſubimbricata, ſtellis oblique truncatis prominentibus adſcendentibus.
Hort. Cliffort. 481. Millepora ramoſiſſima, punctis ſubtus ſemiovatis prominulis, ramis acutis.
Muſ. Teſſin. 118. Madrepora ſpinoſa.
Syſt. nat. X. *p.* 792. *n.* 14. Millepora muricata.
Pallas el. zooph. p. 327. *n.* 194. Madrepora polymorpho-ramoſa, ſtellis crebertimis cylindraceis prominulis.
Soland. et Ellis corall. p. 171. *n.* 76. *t.* 57. Madrepora ramulo-

muloſa, ramulis attenuatis, ſtellis prominentibus cylindraceis oblique truncatis.

Theophr. hiſt. pl. l. 4. *c.* 8. Thymum lapideum.

Aldrov. muſ. met. p. 278. Saccus concretus ex aquis ſtillantibus.

Cluſ. exot. l. 6. *c.* 7. *p.* 123. Planta ſaxea abrotanoides.

Worm muſ. p. 233. Corallium tuberoſum punctatum.

Beſl. muſ. t. 26. *f.* 4. Truncus lapidoſus.

muſ. Lochn. t. 23. Planta ſaxea alba.

J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 807. Abrotanoides ſaxea planta.

Moriſ. hiſt. pl. 3. *p.* 656. *f.* 15. *t.* 10. *n.* 3. *et* 9. Porus albus erectior ramoſus, tuberculis crebris ſurſum ſpectantibus, et porus albus cupreſſiformis.

Punh. pilgr. l. 3. *c.* 1. *ſ.* 5. *p.* 135. *et l.* 4. *c.* 6. *ſ.* 2. *p.* 448. 449. Corallium album.

Petiv. pterigr. t. 18. *f.* 7. *et* 18. Corallium poroſum muricatum, et Corallium poroſum typhoides muricatum.

Tournef. inſt. p. 573. Madrepora abrotanoides, et Madrepora erectior ramoſa, tuberculis crebris ſurſum ſpectantibus.

Shaw. afr. app. p. 48. *n.* 25-28. Madrepora abrotanoides.

Valent. ind. 4. *t.* 52. *f.* DD. Arbuſcula marina coralloides alba.

Rumpf amb. 6. *p.* 239. *t.* 86. *f.* 1. Lithodendrum calcareum.

Brown jam. p. 391. *n.* 5. Madrepora ramoſa major muricata et ſtellata, aperturis cavernarum minoribus depreſſis.

Eph. Nat. Cur. Dec. II. A. III. *p.* 78. *t.* 3. *f.* 1. Carana.

Lang. lap. fig. Helv. p. 57. *t.* 17. *n.* 1. 2. Corallium marinum ſquameum.

Weinm. phytanthoz. 2. *p.* 234. *t.* 426. *f.* 9. Coralloides gypſea lapidoſa.

Hill plant. p. 8. Madrepora ramoſiſſima poris minimis.

Forsk. Fn. aeg. arab. p. 137. *n.* 24. Millepora muricata.

Gualt. teſt. t. ante 20. Madrepora albida digitata.

Bonann. muſ. Kirch. p. 265. *ic. p.* 285. *n.* 8.

Sloan. cat. p. 2. *hiſt.* 1. *p.* 53. *n.* 4. *t.* 17. *f.* 4.

Seb muſ. 3. *t.* 116. *f.* 5.

Knorr delic. t. A. II. *f.* 1. 2.

Valent. muſ. 1. *p.* 104. *t.* 8. *f.* 8. 13.

Muſ. Gottwald. t. 48. *f.* 2. 3.

α) ramis longis acuminatis, absque ullis ramulis parvis.

Sloan. jam. 1. *p.* 51. *t.* 18. *f.* 3. Corallium album poroſum maximum muricatum.

Seb. muſ. 3. *t.* 114. *f.* 1.

β) ramis

β) ramis divaricatis: ramulis ſparſis brevibus acuminatis divergentibus.

γ) ramis ramulisque adſcendentibus rectis ſubaequalibus ceſpitoſis.

δ) ramis inferioribus decumbentibus anaſtomoſantibus: ramulis adſcendentibus acutis brevibus.

Muſ. Teſſin. p. 118. *n.* 1. Madrepora corymboſa.

Brown jam. p. 391. *n.* 6. Madrepora maxima compreſſa palmata et muricata.

Marſ. hiſt. mar. p. 154. *t.* 34. *n.* 169. *f.* 1. 2. *et t.* 35. *n.* 170. Madrepora conica, Abrotanoides Trionfatti.

Rumpf amb. 6. *p.* 240. *t.* 86. *f.* 2. Lithodendrum calcareum ſeſſile.

Moriſ. hiſt. pl. 3. *p.* 657. *ſ.* 15. *t.* 10. *f.* 10. *Tournef. inſt. p.* 573. Porus albidus compreſſus frondiporae ad inſtar cribriformis.

Shaw afr. app. p. 48. *n.* 30. Madrepora abrotanoides ramoſior tuberculis horizontaliter diſpoſitis.

Klein dub. p. 18. *t.* II. *f.* 1. Madrepora alba.

Kundm. rar. p. 159. *t.* 9. *f.* 10. 11. Saxum abrotanoides Cluſii.

Calceol. muſ. p. 12.

Muſ. Moſcard. l. 3. *c.* 2.

ε) ramis baſi in palmam coalitis; ramulis divergentibus.

Sloan. jam. cat. p. 2. *hiſt.* 1. *p.* 58. *n.* 5. *t.* 17. *f.* 3. Corallium poroſum album latiſſimum.

Davil. catal. ſyſtem. p. 18. *n.* 44-46. Cornes de Daim, et Charde Neptune.

Martin. n. Mannigf. 4. *p.* 10. *t.* 1. *f.* 1.

ζ) ramis ramulisque numeroſis divergentibus; cylindris ſtellarum turbinatis margine incraſſatis rotundatis.

Seb. muſ. 3. *t.* 108. *f.* 6.

Habitat in mari Indiam *et auſtralem* Americam *alluente, utplurimum alba*, γ) *rufeſcens.*

faſtigiata. 92. M. rudis ſubdichotoma faſtigiata, ſtellis exterius decorticatis.

Pallas el. zooph. p. 301. *n.* 175. Madrepora dichotoma faſtigiata, ſtellis terminalibus ſubturbinatis: lamellis integerrimis.

Seb. muſ. 3. *t.* 109. *f.* 1. *t.* 110. *f.* 3. *et t.* 116. *f.* 4.

Habitat in mari, Americam *auſtralem alluente, alba, in fruticulos ſaepe fere pedales excreſcens.*

ramea. 93. M. pinnata undulato ſtriata, ſtellis terminalibus. *Fn. ſuec.* 2216. *Müll. zool. dan. prodr.* 3042.

Pallas el. zooph. p. 302. *n.* 176. Madrepora ramoſo-ſubpinnata ferruginea, ſtellis terminalibus cylindraceis.
Tournef. inſt. p. 573. *t.* 340. Madrepora maxima arborea.
Worm. muſ. p. 233. Madrepora ramoſa Imperati.
Donat. adriat. p. 53. *t.* 6. *et act. angl.* 47. *p.* 105. *t.* 4. Madrepora, Porus matronalis.
Ginn. an. adr. 1. *p.* 8. *t.* 11. *f.* 5. Madrepora ramoſa.
Lobel hiſt. p. 651. Coralloides ſ. Corallii albi varietas.
Imperat. hiſt nat. p. 651. Porus matronalis ramoſus.
Besl. muſ t. 25. Corallium maximum truncatum.
J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 807. *et Shaw afr. app. p.* 48. *n.* 36. *t.* 36. Porus magnus.
C. Bauh. pin. p. 367 *et Moriſ. hiſt. pl.* 3. *p.* 656. *f.* 15. *t.* 10. *f.* 1. Corallio affinis Porus magnus.
Petiv. gazooph. t. 76. *n.* 7. Corallium flaveſcens ſtriatum nodoſum.
Rumpf amb. 6. *p.* 245. *t.* 87. *f.* 4. Anthophyllum ſaxeum.
Torrub. hiſt. nat. hiſp. t. 10. *f.* 13. Acropora alba.
Planc. Conch. m. not. t. 18. Fungites ſive Caryophyllus marinus.
D'Aubent. ic. miſc. t. 47. Porus magnus.
Bonann. muſ. Kirch. t 285. *f.* 6.
Knorr del. 1. *t.* A. VII. *f.* 2.
Habitat in mari atlantico, mediterraneo, norwegico, *ferruginea, ſaxea, fruticulis ad ſummum ſesquipedalibus.*

oculata. 94. M. tubuloſa glabra flexuoſa oblique ſubſtriata, ramis alternis, ſtellis immerſis bifariis.
Pallas el. zooph. p. 308. *n.* 179. Madrepora ramoſiſſima coaleſcens laevis, ramulis flexuoſis, ſtellis ad flexuras ramorum concavis margine ſtriatis.
Hill plant. p. 6. Madrepora glabra poris magnis.
Imper. hiſt. nat. 815. Corallium album fiſtuloſum.
Besler. muſ. t. 25. Corallium album indicum.
Valent. muſ. 1. *p.* 104. *t.* 8. Corallium album pelagicum.
J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 805. Corallium album oculatum officinarum.
Weinm. phytanthoz. 2. *p.* 233. *t.* 426. a. Corallium album.
Rumpf amb. 6. *p.* 233. Accabarium album verrucoſum.
Eph. nat. Cur. Dec. II. A. 3. *obſ.* 42. *p.* 78. *t.* 3.
Seb. muſ. 3. *t.* 116. *n.* 12.
Muſ. Gottwald. t. 48. *f.* 4. *et t.* 49. *f.* 1.
Turgot. mem. inſtr. t. 22. E.
Knorr delic. t. A. I. *n.* 2.

Black-

Blackwell. herb. ed. germ. t. 342.
Habitat in Oceano indico, *intus perforata, alba, corallium album officinarum, inter foſſilia europaea quoque obvium.*

virginea. 95. M. ſubdichotoma recta ſolida, ſtellis alternis eminentibus. *Müll. zool. dan. prodr.* 3041.
Hort. Cliff. p. 481. Madrepora ſimplex ramoſa, ramis teretibus laevibus ſolidiuſculis, lamellis integris.
Tournef. inſt. p. 573. Madrepora vulgaris.
Gualt. teſt p. 24. *n.* 3. (*ante t.* I.) Acropora alba foraminibus ſtellatis amplioribus.
Geſn. lap fig. p. 132. b. *n.* 2. Corallium verrucoſum.
Imper. hiſt. nat. p. 809. Corallium album.
Boccon. muſ. p. 256. *t.* 9. *n.* 5. *f.* 6. Corallium fiſtuloſum Imperati.
Petiv. gaz. t. 76. *n.* 8. Corallium album majus radiatum et ſtellatum.
Marſ. hiſt. mar. p. 139. *t.* 30. *n.* 140.
Argenv. oryctol. p. 324. *t.* 15.
Pontopp. Norw. 1. *p.* 282. *t.* 14. *f.* G.
Stroem. ſundm. 1. *p.* 144. *δ.*
act. Nidroſ. 4. *p.* 49. *t.* 8. *f.* 2-4.
Martin. n. Mannigf. 3. *p.* 419. *f.* 1. 2.
Habitat in mari mediterraneo, americano, norwegico, *lactea, digiti minimi craſſitie, ſpithamea, diffuſa.*

roſea. 96. M. ramoſiſſima roſea; ramis attenuatis, ſtellis minutis paſſim congeſtis efflореſcentibus. *Pallas el. zooph. p.* 312. *n.* 181.
Habitat in mari inſulam S. Dominici *alluente, ſolida, interdum flaveſcens, fruticulis ſemipalmaribus, an diſtincta ſatis a virginea?*

hirtella. 97. M. ſtellis undique alternis prominentibus: lamellis exſertis acutis. *Pallas el. zooph. p.* 313. *n.* 182.
Habitat rara in Oceano indico, *alba, virgineae affinis, magis tamen cavernoſa.*

limitata. 98. M. ramis ſubcomplanatis, ſtellis ſparſis ſexradiatis margine aequalibus. *Soland. et Ellis corall. p.* 172. *n.* 79.
Habitat - - - interſtitiis ſcabris, lineis ſubreticulatis exaratis.

botryoides. 99. M. ramis coacervatis craſſis faſtigiatis obtuſis, ambulacris reticulato-contragoſis. *Soland. et Ellis corall. p.* 172. *n.* 80.
Habitat - - -

granoſa. 100. M. ſubramuloſa criſtata ſubdigitata, ramis obtuſis, ambulacris omnibus acute carinatis undulatis, ſtellis aceroſis irregularibus. *Soland. et Ellis corall. p.* 173. *n.* 81.
Habitat - - -

prolifera. 101. M. ſubdichotoma reticulato-coaleſcens, ſtellis latere proliferis terminalibus concavis. *Müll. zool. dan. prodr.* 3040.
Pallas el. zooph. p. 307. *n.* 178. Madrepora ramoſiſſima coaleſcens, ſtellis turbinatis margine proliferis axillaribus terminalibusve.
Besl. muſ. Lochn. t. 25. Corallium immaturum cinereo colore.
Weinm. phytanthoz. 2. *p.* 234. *t.* 426. *f.* 1. Coralloides lapidoſa poroſa.
Seb. muſ. 3. *t.* 116. *f.* 3.
Muſ. Gottwald. t. 47. *f.* 7.
Edw. av. t. 94.
Pontopp. norw. 1. *p.* 282. *n.* 3. *t.* 14. *f.* A.
Stroem ſundm. 1. *p.* 144. C.
Act. nidroſ. 4. *p.* 34. *t.* 2. *f.* 1. 2.
Habitat in mari norwegico, *alba, ſolidiſſima, ſtellis infundibuliformibus; lamellis circiter octonis.*

ſeriata. 102. M. tereti-ſubulata, poris ſtellaribus longitudinaliter ſeriatis. *Pallas el. zooph. p.* 336. *n.* 198.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1283. *n.* 46. Millepora (lineata) cauleſcens dichotoma teres, poris multiplicatis ſeriatis.
Soland. et Ellis corall. p. 171. *n.* 75. *t.* 31. *f.* 1. 2. Madrepora ramuloſa, ramis attenuatis acuminatis, ſtellis longitudinaliter ſeriatis: margine ſuperiore porrecto fornicato ciliato.
Pallas el. zooph. p. 41. *n.* 8. *β*? Eſchara areolata.
Marſ. hiſt. mar. t. 32. *f.* 152.
Habitat in Oceano *orientali, alba, ſaxea, calami, rarius digiti craſſitie, diffuſa, ſubpedalis.*

Cactus. 103. M. ramis compreſſis divergentibus intricatis dichotomis margine carinatis: lateribus contigue ſtellatis. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 134. *n.* 13.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis inventa, pedalis ramis erectiuſculis transverſim ſeriatis.

corymboſa. 104. M. corymbi ramis apice craſſioribus ſtriato aculeatis, ſtellis terminalibus ſolitariis repando-lobatis. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 137. *n.* 20.

Habitat - - - - ramis digiti craſſitie, ſtellis pollicem amplis.

gemmaſcens. 105. M. ſtellis prominulis obconicis.
Müll. Linn. ſyſt. 6. *p.* 107. *t.* 23. *f.* 7.
Habitat in Oceano indico, *nivea, ſtellis gemmas referentibus.*

problematica. 106. M. ſtellis obliquis minutis immerſis diſtantibus: margine lato punctato.
Knorr delic. 1. *t.* A. X. *f.* 3.
Muſ. Gottw. t. 49. *f.* 5.
Habitat circa inſulas Antillas, *ſaxea, ſcabra, thalaſſina, brachii interdum craſſitie, et ad* 5 *pedes alta, ſtellarum interſtitiis lineatis.*

ſpuria. 107. M. ſubramoſa ſubdichotoma, tubis cylindricis trabeculis inordinatim diſpoſitis repletis.
Pallas el. zooph. ed. germ. p. 145. *n.* 35. kk.
Habitat - - - ochroleuca, an hujus generis?

infundibuliformis. 108. M. turbinata infundibuliformis ſubprolifera.
Pallas el. zooph. p. 332. *n.* 195. Madrepora (Crater) infundibuliformis ſtriata, intus ſparſa ſtellis prominulis antiquatis.
Hort. Cliffort. p. 480. Madrepora cyathiformis turbinata interius prolifera.
Syſt. nat. X. *p.* 789. Tubipora infundibuliformis.
Gualt. teſt. t. 42. Choana laxea criſpata rugoſa, minimis poris.
Tournef. inſt. p. 376. Eſchara magna pulla piliformis.
Habitat in Oceano indico, *muricatae affinis, alba, ſolida, boletum ſenio infundibuliformem referens; an hujus familiae?*

anguloſa. 109. M. dichotoma faſtigiata, ſtellis terminalibus turbinato-anguloſis: lamellis dentatis. *Pallas el. zooph. p.* 299. *n.* 174.
Seb. muſ. 3. *t.* 109. *f.* 2. 3.
Knorr del. 1. *t.* A. IV. *f.* 5.
Habitat in mari, Americam *mediam alluente, brevis, craſſa, celluloſa, laevis, alba.*

diſcoides. 110. M. diſciformis ſubpedunculata ſcabriuſcula: ſtellis marginalibus faſciculatis. *Pallas el. zooph. p.* 306. *n.* 177.
Habitat rariſſima in Oceano indico; *an hujus familiae?*

111. M.

Chaloidicum. 111. M. ſtellarum tubis prominentibus remotis cylindricis exterius et interius lamellatis. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 136. *n.* 17.
Habitat in mari rubro, *ſcabriuſcula; an hujus familiae?*

concamerata. 112. M. plana, ſtellis margine prominulis remotis: interſtitiis lamellatis. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 136. *n.* 18.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis reperta, ſtellarum lamellis introrſum minoribus, vix hujus familiae.

roſacea. 113. M. cauleſcens ramoſa, ramulis cylindricis adſcendentibus appreſſis: ſtellis terminalibus. *Eſper Pflanzenth. Lief.* 3. *p.* 115. *n.* 13. *t.* 15. *f.* 2-4.
Knorr del. nat. ſel. 1. *t.* A. 2. *f.* 2.
Habitat - - - roſea, alba vel cana.

338. MILLEPORA. *Animal* Hydra.

Corallium (utplurimum) ramoſum, poris turbinatis teretibus.

alcicornis. 1. M. compreſſa recta, poris ſparſis obſoletis.
Roy. lugdb. p. 526. Millepora plana ramoſiſſima ramorum faſtigio digitata.
Pallas el. zooph. p. 260. *n.* 161. Millepora ſolida depreſſa polymorpha laevis, poris minutiſſimis obſoletis ſparſis.
Soland. et Ellis corall. p. 141. *n.* 19. Millepora ramoſa ſolida compreſſa erecta polymorpha, poris ſparſis obſoletis.
J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 896. Corallium aſperum candicans adulterinum.
Worm. muſ. p. 232. Alis cornu figura corallium.
Moriſ. hiſt. pl. 3. *p.* 656. *f.* 15. *t.* 10. *n.* 24. *et* 27. Corallium album fragile polyſchides, ramuſculis contiguis dumoſum et Corallium album digitatum, ramis contiguis in latitudinem diſpoſitis.
Petiv. pterigr. t. 18. *f.* 13. Corallium poroſum latum planum.
Brown. jam. p. 390. *n.* 1. Corallium brachiatum maximum, ramis ſubcompreſſis aequalibus.
Geſn. lap. fig. p. 132. b. *n.* 1. *Chabr. ſtirp. p.* 573. Gypſum coralloides.
Rumpf amb. 6. *p.* 243. Lithodendrum ſaccharaceum album.
Lhwyd lithoph. p. 6. *n.* 92. 93. *t.* 3.
Seb. muſ. t. 106. *n.* 8. *t.* 114. *n.* 1. *t.* 116. *n.* 8.

Knorr

Knorr del. I. *t.* A. II. *n.* 3.
Edw. av. t. 94.
Habitat in mari indico, *et* Americam auſtralem *alluente, ſaepe alia corpora* v. g. *gorgonias, lagenam vitream, nucleos nucis cocos incruſtans, aut ſaxorum fruſta includens, nivea, laevis, ſolida, ſaxea, interdum fragilis, poris minimis remotis vix conſpicuis.*

caerulea. 2. M. plana ſcabra laminis craſſis varie tortuoſis ſubdiviſa: apicibus ſaepe lobatis porisque ſubſtellatis cylindricis utrinque inſtructis. *Solander et Ellis corall. p.* 142. *n.* 20. *t.* 12. *f.* 4.
Pallas el. zooph. p. 256. *n.* 158. Millepora plana laciniata irregularis ſcabra, poris utrinque cylindricis intus ſulcatis.
Pet. gaz. t. 10. *f.* 12. Coralloides philippenſis caerulea.
Habitat maſſis immenſis in Oceano indico, *milleporas madreporis nectens.*

aſpera. 3. M. ſubcompreſſa muricata, poris eminentibus hinc fiſſis. *Müll. zool. dan. prodr.* 3045. *Act. Nidr.* 4. *p.* 64. *t.* 2. *f.* 20-22.
Gualt. teſt. t. 55. Madrepora ramis denſe ſurculoſis palmatis criſpis verrucoſe hirſutis.
Marſ. hiſt. mar. t. 32. *f.* 152-157.
Habitat in mari mediterraneo, norwegico, *erecta, bifaria, teretiuſcula, poris ad ramos confertis latere inferiore fiſſis.*

ſolida. 4. M. turbinata, poris confertiſſimis angulatis.
Habitat - - - *ad* Gotlandiae *littora rejecta, pororum tubis intus ſeptis transverſis.*

truncata. 5. M. dichotoma erecta, ramis truncatis. *Müll. zool. dan. prodr.* 3043.
Stroem. ſundm. I. *p.* 142. ♂. *Act. Havn.* 10. *p.* 258. *t.* 9. *f.* 10. O. *Fabr. Fn. groenl. p.* 432. *n.* 435.
Pallas el. zooph. p. 249. *n.* 153. Millepora teres dichotoma, ramis divaricatis truncatis, poris undique crebris minutis.
Soland. et Ellis corall. p. 141. *n.* 18. *t.* 23. *f.* 1-8. Millepora cauleſcens dichotoma, ramis truncatis divaricatis, poris quincuncialibus operculatis.
Donat. adr. 55. *t.* 7. *et act. angl.* 57. *t.* 17. *f.* 1-8. Myriozoum.
Ginann. op. poſth. 2. *p.* 8. *t.* 1. *f.* 3. Madrepora.
Marſ. hiſt. mar. p. 145. *t.* 32. *n.* 154. Madrepora piſcatoribus Dengueni dicta.
Besl. muſ. Lochn. t. 23. Planta hirſuta forma corallii.

Cavolin.

Cavolin. pol. mar. 1. *t.* 3. *f.* 9-11. 21. *et* 3. *t.* 9. *f.* 7.
Habitat in mari mediterraneo, ſeptentrionali, *ex griſeo flaveſcens, et veluti vernice obducta, fragiliſſima, intus cineraſcens, ramis divaricatis ſubdichotomis, contiguis coaleſcentibus, poris quincuncialibus.*

miniacea. 6. M. minima, ſublobata rubra poris crebris minutis punctata.
Soland. et Ellis corall. p. 137. *n.* 12. Millepora rubra.
Pallas el. zooph. p. 251. *n.* 154. Millepora pumila ſubramoſa rubra, punctis crebris impreſſis minutis.
Brown. jam. p. 391. *n.* 1. Madrepora minima ſubverrucoſa rubra.
Habitat in mari mediterraneo, americano, indico, *baſi latiore aliis coralliis, teſtaceis, ſcopulis adhaerens, vix ultra ¼ pollicis alta, punctis minutis albis varia, apice poris exiliibus marginatis pertuſa.*

cervicornis. 7. M. ſubcompreſſa dichotoma utrinque cellifera, oſculis tubuloſis prominulis. *Soland. et Ellis corall. p.* 134. *n.* 8.
Pallas el. zooph. p. 252. *n.* 155. Millepora plana dichotoma, poris utrinque ordinatis ſcabris.
Marſ. hiſt. mar. p. 144. *t.* 32. *f.* 152. 153. Madrepora ramis compreſſis miniacea.
Imper. hiſt. nat. p. 820. Porus cervinus.
Bonann. muſ. Kircher. t. 286. *n.* 13.
Ginann. op. poſth. 2. *t.* 5. *f.* 14.
Borlaſ. Cornw t. 24. *f.* 7.
Habitat in mari mediterraneo, *rariſſima ad* Cornubiae *littora obvia, ex griſeo luteſcens, intus albida, exterius vernice quaſi obducta,* 5-6 *pollices alta.*

Skenei. 8. M. plana compreſſa ſubramoſa utrinque cellifera, cellulis ſeriatis alternis turbinatis galeatis; fauce hiante, labio inferiori denticulo unico praedito. *Soland. et Ellis corall. p.* 135. *n.* 9.
Habitat ad Scotiae *littora prope* Aberdaen, *ſcopulis affixa alba, vernice quaſi argentea fucata.* Skene.

pumila. 9. M. depreſſa, ramis ſparſis inordinatis retuſis undique poroſis ſcabriuſculis. *Pallas el. zooph. p.* 253. *n.* 156.
Marſ. hiſt. mar. t. 36. *f.* 175.
Habitat in mari mediterraneo, *teſtaceis ſcopuliſque affixa,* 3 *pollices alta, ramoſiſſima, pallide griſea, intus alba, ſolida.*

10. M.

compreſ-ſa. 10. M. caulescens ſubdichotoma compreſſiuſcula, ramis diſtantibus, poris undique prominulis ſcabris.
Habitat in mari mediterraneo. D. Kaehler.

lichenoides. 11. M. caulescens decumbens bifarie dichotoma, ramis denticulatis binis poroſis ſcabris. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 432. *n.* 436. *Müll. zool. dan. prodr.* 3046. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 138.
Pallas el. zooph. p. 245. *n.* 150. Millepora in plano dichotoma, ramis ſubparallelis denticulatis, ſupra poroſa.
Soland. et Ellis corall. p. 139. *n.* 16. Millepora (tubipora) proclinans in plano dichotoma, ramulis flexuoſis ſubparallelis denticulatis, ſupra poris prominulis ſubtus ſtriatis.
Ellis corall. t. 35. *f.* b B.
Seb. muſ. 3. *t.* 100. *f.* 10.
Marſ. hiſt. mar. t. 33. *f.* 162-164.
Ginann. adr. 1. *t.* 1. *f.* 4.
Boddaert zooph. t. 8. *f.* 2.
Habitat in mari mediterraneo, norwegico, *aliis zoophytis, fucis, ſaxis adhaerens, digiti circiter longitudine, lactea, fragiliſſima.*

violacea. 12. M. in plano ramoſa, ramulis adſcendentibus flexuoſis tereti-compreſſis: ſutura poroſa marginem ambiente. *Soland. et Ellis corall. p.* 140. *n.* 17.
Pallas el. zooph. 258. *n.* 159. Millepora pumila ſubramoſa violaſcens, ſuturis longitudinalibus poroſis.
Rumpf amb. 6. *p.* 243. Lithodendrum ſaccharaceum rubrum.
Habitat in mari indico *et* auſtrali, *nitida violacea,* 3 *pollices circiter alta, punctis elevatis aſpera, hinc inde verrucoſa, poris ad utrumque latus longitudinaliter ſeriatis.*

tubulifera. 13. M. ſolida ramoſa, poris tubuloſis ſparſis, ramis confluentibus extrema attenuatis ſcabris. *Pallas el. zooph. p.* 259. *n.* 160.
Marſ. hiſt. mar. p. 147. *t.* 31. *f.* 147. 148. Madrepora ramis conicis.
Habitat in mari ſiculo, *palma vix altior, alba, ſolida, trunco ramisque adultioribus laevibus.*

faſcialis. 14. M. membranacea ramoſa flexuoſa utrinque poroſa.
Pallas el. zooph. p. 42. *n.* 9. Eſchara lapidea lamelloſo-frondoſa: laminis conglomeratis, utrinque poris quincuncialibus.

Soland.

Soland. et Ellis corall. p. 133. *n.* 7. Millepora (taenialis) plana anguſta ramoſa utrinque poroſa, ramis flexuoſis coalitis.
R. j. ſyn. p. 31. Eſchara retiformis.
J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 809. Reticulum marinum.
Marſ. hiſt. mar. p. 148 *t.* 33. *f.* 160. *n.* 1-3.
Borlaſ. Cornw. t. 24. *f.* 6.
Ellis corall. p. 72 *t.* 30. *f.* 6.
Habitat in mari mediterraneo.

foliacea. 15. M. lamelloſa flexuoſa utrinque poroſa. *Soland. et Ellis corall. p.* 133. *n.* 6.
Ellis corall. p. 71. *t.* 30. *f.* a. A. B. C.
Habitat in mari ſeptentrionali, *teſtacea et ſaxa incruſtans,* 3 *pollices ad pedem usque longa.*

zeylanica. 16. M. membranis laciniofis concreſcentibus teneris, cellulis utrinque ſeriatis oblongis.
Pallas el. zooph. p. 44 *n.* 10. Eſchara zeylanica.
Habitat in Oceano indico, *alba.*

forniculoſa. 17. M. cruſtacea, cellulis ſeriatis fornicatis labiolo ringentibus, membrana praetenſa clauſis.
Pallas el. zooph p. 47. *n.* 12. Eſchara forniculoſa.
Habitat in mari, Americam auſtralem *alluente*, *aliis coralliis adhaerens*, *fluſtrae foliaceae facie*, *nonne potius celleporis adnumeranda?*

cruſtulenta. 18. M. cruſtaceo ſubfrondeſcens polymorpha, cellulis ſeriatis oblongis membrana clauſis, ſeptis integerrimis.
Pallas el. zooph. p. 39. *n.* 8. Eſchara cruſtulenta.
Baſter opuſc. ſubſ. 1. *l.* 2. *p.* 83. *t.* 7. *f.* 4. 5. Eſchara lapideſcens.
Seb. muſ. 3. *t.* 100. *f.* 2.
Habitat in Seelandiae Belgii *foſſis ſalſis lacubusque maritimis*, Mauritaniae *littore et* Oceano atlantico, *ex cineraſcente alba, in glomeres ſubgloboſos compacta.*

eroſa. 19. M. cruſtacea, cellulis detectis margine laterali pectinatis.
Pallas el. zooph. p. 38. *n.* 7. Eſchara eroſa.
Habitat in mari americano, *rupibus agglutinata*, *cellularum dentibus erectis ſubulatis*, *utrinque circiter* 4.

reticulata. 20. M. membranacea, ramis anaſtomoſantibus depreſſis linearibus, hinc poris prominentibus aſperis. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 433. *n.* 437.

Pallas

Pallas el. zooph. p. 241. *n.* 147. Millepora (frondipora) clathrata umbilicata undulato-polymorpha, ramulis altero latere verrucoſis poroſiſſimis.

Soland. et Ellis corall. p. 138. *n.* 15. Millepora ramoſa in planum expanſa ramis dichotomis bifariam anaſtomoſantibus ſupra ſcabris poris aſperis ſubtus laevibus.

Imper. hiſt. nat. p. 821. Frondipora, Porus frondoſus, cruſta marina.

J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 809. Frondipora.

Tournef. inſt. p. 576. Eſchara marina.

Mercat. metalloth. arm. 6. *c.* 10. *p.* 109. Alcyonium polyphyllum.

Ginann. op. poſth. 1. *p.* 9. *t.* 4. *f.* 8. Frondepora, Eſchara marina.

Argenv. oryctol. p. 367. *t.* 22. *f.* 5. Retepora lapidea ſ. Eſchara marina.

Bonann. muſ. Kircher. p. 266. *n.* 14. *t.* 43. *n.* 12.

Marſ. hiſt. mar. t. 34. *f.* 165. 166.

Roques de Maum. polyp. p. 72. *t.* 15. *f.* C.

Forsk. Fn. aeg. arab. p. 138. *n.* 29.

Habitat in mari mediterraneo, *rara in* mari Groenlandiam *alluente, levis, alba, fragiliſſima, horizontalis, convoluta, ramoſiſſima, poris ſupra acuminatis confertis ſcabra.*

cellulosa. 21. M. membranacea reticulata umbilicata turbinato-undulata, hinc poroſa pubeſcens. *Müll. zool. dan. prodr.* 3047.

Pontopp. hiſt. nat. Norw. 1. *t.* 14. *f.* F. *Stroem. ſundm.* 1. *p.* 142. a.

Act. Nidroſ. 4. *p.* 77. *t.* 3. *f.* 1. d. f. *et f.* 3.

Pallas el. zooph. p. 243. *n.* 148. *Spallanzan. act. ſoc. ital.* 2. Millepora (Retepora) reticulata umbilicata infundibuliformis criſpa, ſuperiore latere pubeſcens poroſaque.

Soland. et Ellis corall. p. 139. *n.* 14. Millepora (foraminoſa) reticulata infundibuliformis inordinate undulato-plicata, latere ſuperiori tantum poroſa.

Ellis corall. p. 72. *t.* 25. *f.* d. D. F. Retepora Eſchara marina.

Imper. hiſt. nat. p. 821. Retepora.

Raj. ſyn. p. 31. *n.* 1. Eſchara retiformis.

Rondel. aq. 2. *p.* 133. *Geſn. piſc.* 1575. *p.* 155. *J. Bauh. hiſt. pl.* 3. *p.* 809. *Tournef. inſt. p.* 576. Eſchara.

Argenv. oryctogr. t. 22. *f.* 2.

Rumpf amb. 6. *p.* 247. *t.* 87. *f.* 5. Reticulum marinum.

d'Aubent. ic. miſc. t. 23. Manchette de Neptune.

Bonann. muſ. Kircher. t. 286. *f.* 10.

Chabr. ſtirp. ic. 577.
Kundm. rar. nat. t. 12. *f.* 3.
Marſ. hiſt. mar. p. 149. *t.* 33. *f.* 161. *n.* 12.
Ginann. adr. p. 9. *t.* 4. *f.* 9.
Seb. muſ. 3. *t.* 100. *f.* 11. *et t.* 101. *f.* 5. 6.
Knorr delic. t. A. III. *f.* 3.
Borlaſ. Cornw. t. 24. *f.* 10.
Walch Naturf. 3. *t.* 5. *f.* 2.
Muſ. Gottwald. t. 48. *f.* 5.
Roques de Maum. polyp. t. 15. *f.* A. B.
Cavolin. pol. mar. 1. *t.* 3. *f.* 12-15.
Habitat in mari mediterraneo, indico, norwegico, *fundo, rupibus, fucis, gorgoniis adhaerens, ad* 3 *pollices alta, fragiliſſima, ſolidiuſcula, alba, extrinſecus griſea, incolis vivaciſſimis.*

clathrata. 22. M. umbilicata reticulata, ramulis planis dichotomis anaſtomoſantibus hinc poroſis. *Pallas el. zooph. p.* 145. *n.* 149.
Habitat in Oceano indico, *inter celluloſam et lichenoidem quaſi media, alba, centro ſolido ſeſſilis.*

Reticulum. 23. M. filis ramoſiſſimis anaſtomoſantibus cancellatis.
Habitat in mari mediterraneo, *concharum teſtis adhaerens, filis capillaribus, telae araneae in modum reticulatis.*

ſpongites. 24. M. caulefcens erecta, ramis angulatis imbricatis anaſtomoſantibus.
Muſ. Teſſin. 118. *t.* 11. *f.* 2. Corallium reticulatum.
Habitat - - - poris non conſpicuis, ſtatura ad ſpongiam accedens, pedem longa, ramis digitum craſſis.

coriacea. 25. M. ſubmembranacea ſemiorbicularis ſubhorizontalis, rarius poroſa.
Pallas el. zooph. p. 263. *n.* 162. Millepora alba ſolidiſſima folioſa, laminis ſeſſilibus ſemicircularibus congeſtis.
Imper. hiſt. nat. p. 840. Muſcus lapidoſus, nonnullis Halcyonium quintum Dioſcoridis.
Shaw afr. app. p. 47. t. *f.* 1. Alcyonium candidum cretaceum lamellatum maris numidici.
Bonann. muſ. Kircher. t. 289. *f.* 16.
Cavol. pol. mar. 3. *p.* 258. *t.* 9. *f.* 15.
Habitat in mari atlantico *et* numidico, *fucum cartilagineum ſaepe incruſtans, et in coralliis aliis concamerationum quaſi tecta efficiens, poris in pagina inferiori, ſed rarius ſparſis, vix hujus generis.*

26. M.

calcarea. 26. M. ramoſa albiſſima ſolida dichotoma, ramulis attenuatis coaleſcentibus. *Soland. et Ellis corall. p.* 129. *n.* 1. *t.* 23. *f.* 13.

Habitat in mari mediterraneo, *lactea*, 4 *pollices alta.*

polymorpha. 27. M. cruſtacea polymorpha ſolida, poris nullis. *Müll. zool. dan. prodr.* 3048. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 433. *n.* 438.

Pallas el. zooph. p. 265. *n.* 163. Millepora (calcarea) cruſtacea ramеſcens ſolidiſſima albiſſima laevis.

Soland. et Ellis corall. p. 130. *n.* 2. Millepora faſciculata ſolida, ramulis difformibus tuberculatis.

Ellis corall. p. 76. *t.* 27. *f.* c. Corallium pumilum album fere lapideum ramoſum.

Raj. ſyn. p. 32. *Boerh. hort. lugdb. ind.* 2. *p.* 3. Corallium album pumilum noſtras.

Petiv. pterogr. t. 18. *f.* 5. Corallium album noduloſum.

Moriſ. hiſt. pl. 3. *p.* 651. Corallium maritimum, calcareis rupibus adnaſcens.

Sloan. jam. 1. *t.* 18. *f.* 2. Corallium album pumilum.

Brown. jam. p. 390. *n.* 2. Corallium minimum ſubramoſum glabrum.

Royen prodr. lugdb. p. 521. *n.* 2. *et* 3. Iſis alba faſciculata ramis difformibus tuberculatis, et Iſis nuclei juglandis figura.

Besl. muſ. Lochn. t. 23. Alcyonium album.

Planc. Conch. t. 10. *f.* c. b. *et t.* 13-17. Petrobryum.

Bonann. muſ. Kircher. t. 289. *f.* 15.

Ginann. op. poſth. 1. *p.* 1. *t.* 1. *f.* 2.

Seb. muſ. 3. *t.* 108. *f.* 8. *et t.* 116. *f.* 6. 7.

Borleſ. Cornw. p. 239. *f.* 2-5.

Blackw. herb. (ed. germ.) 4. *t.* 343.

Habitat in omni oceano, *albiſſima, gypſo duriori, laevis, et cretaceo pulvere ſaepe conſperſa, palmi et quod excedit, altitudine, ramoſiſſima, Norwegis ad calcem coquendam adhibita.*

decuſſata. 28. M. cretacea lamellata, laminis varie decuſſantibus. *Soland. et Ellis corall. p.* 131. *n.* 3. *t.* 23. *f.* 9.

Habitat ad Luſitaniae *littora, maſſis* 5-6 *pollices diametro aequantibus.*

Alga. 29. M. laminis tenuibus ſemicircularibus horizontaliter folioſa. *Soland. et Ellis corall. p.* 131. *n.* 4. *t.* 23. *f.* 10-12. Millepora lichenoides.

Habitat ad Cornubiae *littora, rubra, purpuraſcens, flava aut albicans.*

pumicoſa. 30. M. multiformis fragilis ſcaberrima e cellulis mucronatis ſubgloboſis compoſita. *Soland. et Ellis corall. p.* 135. *n.* 10.
Ellis corall. p. 75. *t.* 27. *f.* f. F.
Habitat in mari Britannico, *ſertularias ſaepius incruſtans, ramulis cylindricis, cellulis alternis, nonne potius madreporae ſpecies?*

tubuloſa. 31. M. paraſitica, cellulis tubuliformibus: ſeriebus transverſe diſpoſitis. *Soland. et Ellis corall. p.* 136. *n.* 11.
Ellis corall. p. 74. *t.* 27. *f.* e. E.
Habitat in mari mediterraneo *et* ſeptentrionali, *ſertulariae falcatae adhaerens, purpuraſcens.*

pinnata. 32. M. dichotoma erecta, poris tubuloſis pinnulatim digeſtis. *Pallas el. zooph. p.* 242. *n.* 151.
Marſ. hiſt. mar. p. 152. *t.* 31. *f.* 167. *n.* 1. 3. 4. *et* 2. 3. 5. *et p.* 153. *t.* 34. *f.* 168. *n.* 1-3.
Habitat in mari mediterraneo, *recens cineraſcens, interdum viridis, ad pollicem usque alta, fragilis.*

liliacea. 33. M. reptans laciniata, poris ſupra transverſim ſeriatis tubuloſis. *Pallas el. zooph. p.* 248. *n.* 152.
Syſt. nat. X. *n.* 3. Tubularia ſerpens.
Planc. Conch. app. p. 112. *c.* 25. *t.* 18. *f.* n. N. Madrepora roſacea.
Marſ. hiſt. mar. p. 153. *t.* 34. *f.* 168. *n.* 4. 6.
Habitat in mari mediterraneo *et* Cornubiam *alluente, alba, proſtrata laciniis linearibus obtuſis, criſtis transverſis quaſi pectinatis, an diſtincta ſatis a tubuloſa?*

Carduneulus. 34. M. polymorpha membranacea concentrice rugoſa: tubulis centralibus trigono-pyramidalibus. *Cavolin. pol. mar.* 1. *p.* 71. *t.* 3. *f.* 19. 20.
Habitat in mari mediterraneo, *lentis magnitudine, alba, ſubpellucida cardui florem quodammodo referens, ſerpulis utplurimum adhaerens.*

339. CELLEPORA. *Animal* Hydra.

Corallium foraminulis arceolatis ſubmembranaceis.

ramuloſa. 1. C. dichotomo faſciculata, ramulis teretibus obtuſis, tubis confertiſſimis cylindricis. *Müll. zool. dan. prodr.* 3049.
Habitat in Oceano norwegico, *fragiliſſima, quaſi ex arena compoſita, ramoſiſſima.* Gunner.

ſpongites. 2. C. lamellis ſimplicibus undulato-turbinatis cumulatis, cellulis ſeriatis, oſculo marginato. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 434. *n.* 439.
Pallas el. zooph. p. 45. *n.* 11. Eſchara lapidea membranacea, lamellis ſimplicibus undulato-turbinatis cumulatis: cellulis ſeriatis.
Soland. et Ellis corall. p. 132. *n.* 5. Millepora fragiliſſima, cellulis ſeriatis, lamellis ſimplicibus tubuloſo-turbinatis varie coaleſcentibus.
Mercat. metalloth. 112. Adarce.
Imperat. hiſt. nat. 632. *et Gualt. teſt. t.* 70. 71. Porus anguinus.
Besl. muſ. t. 28. Lapis ſpongiae.
Bonann. muſ. Kircher. t. 11. *f.* k.
Cavolin. pol. mar. 1. *t.* 3. *f.* 16-18.
Habitat in mari mediterraneo, *etiam* boreali, Groenlandiam *alluente, lactea, griſea, vel rubra, ſtriata, nitida, cellularum oſculis calamorum organi muſici aperturas referentibus.*

pumicoſa. 3. C. corallio dichotomo erectiuſculo ſubcompreſſo ſcabro.
Pallas el. zooph. p. 154. *n.* 157. Millepora multiformis fragiliſſima e cellulis gibbis mucronatis coacervata.
Ellis cor. p. 75. *n.* 7. *t.* 27. *f.* F. *et t.* 30. *f.* DD.
Borl. Cornw. t. 24. *f.* 8.
β) *Marſ. hiſt. mar. t.* 31. 32. *f.* 149-151.
Planc. Conch. t. 27. *f.* I.
Habitat in mari indico, atlantico, mediterraneo, germanico, anglico, norwegico, *ad* Spitzbergen *usque.*

verrucoſa. 4. C. cellulis ſubrotundo-glomeratis ovatis: ore ſubtridentato. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 434. *n.* 440.
Syſt. nat. X. 1. *p.* 789. Tubipora verrucoſa.
Habitat in maris mediterranei *et* norwegici *fucis et teſtaceis, alba, punctis minutiſſimis poroſa.*

ciliata. 5. C. cellulis convexis: ore ſeptemdentato. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 434. *n.* 441.

Pallas el. zooph. p. 38. *n.* 6. Eſchara cruſtacea lapideſcens, cellulis ore ciliato ſeptemſpinoſis.

Habitat in maris mediterranei *et* ſeptentrionalis *fucis, cana, ciliorum in oſculis numero inconſtanti.*

hyalina. 6. C. cellulis ſubgloboſis diaphanis: ore obliquo ſimplici. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 435. *n.* 442.

Cavolin. pol. mar. 3. *p.* 242. *t.* 9. *f.* 8. 9.

Habitat in Oceano, *frequens fucorum, teſtaceorum millepo-rarum cruſta alba verrucoſa.*

nitida. 7. C. cellulis ſubcylindricis pellucidis annulatis: ore ſimplici terminali. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 435. *n.* 443.

Habitat in maris, Groenlandiam *alluentis, ulvis aliisque algis minoribus, alba, nitidiſſima, pellucida.*

annulata. 8. C. cellulis ovalibus ventricoſis punctato-annulatis: oſculo ringente ſubquadridentato. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 436. *n.* 444.

Pallas el. zooph. p. 48. *n.* 13? Eſchara (annularis) lapidea incruſtans, cellulis annulatim digeſtis cylindricis, oſculo biverrucoſo.

Habitat in Oceani *fucis, lepadibus, lapidibus, pulcerrima, cellulis glabris rubentibus.*

340. ISIS. *Animal* creſcens plantae forma.

Stirps lapidea articulata: articulis longitudinaliter ſtriatis ſubſtantia ſpongioſa vel cornea connexis, carne molliori poroſa atque celluloſa obductis.

Oſcula hydris oviparis obſeſſa.

Hippuris. 1. I. ſtirpe corallina: articulis ſtriatis, geniculis attenuatis. *Fn. ſuec.* 2220.

Hort. Cliffort. 480. Sertularia ramoſiſſima articulis ſulcatis.

Muſ. Teſſin. 118. Sertularia eadem.

Pallas el. zooph. p. 233. *n.* 140. Iſis articulata diffuſa alterne ramoſa, cortice craſſo laevi poroſo.

Soland. et Ellis corall. p. 105. *n.* 2. *t.* 3. *f.* 1-5. Iſis ſtirpe articulata lapidea ramulis ſparſis oſſe articulis cylindricis lapi-

lapideis albis ſulcatis, internodiis carneis nigris conſtrictis connexis, carne ſubalbida poroſa craſſa, oſculis in quincunces diſpoſitis, polypos octotentaculatos obtegentibus.

Cluſ. exot. 124. Hippuris ſaxea.

Rumpf amb. 6. *p.* 228. *t.* 84. Accabarium album.

Gualt. teſt. 118. *f.* 16. Lithophyton articulatum internodiis ſtriatis.

J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 788.

Aldrov. muſ. metall. p. 289. *n.* 2.

Olear. muſ. p. 69. *t.* 35. *f.* 4.

Beſl. muſ. p. 78. *t.* 23.

Bonann. muſ. Kircher. t. 42. *n.* 5.

Valent. ind. litt. t. 8. *f.* 2-4.

Valentyn ind. 3. *t.* 51. *f.* AAA.

Seb. muſ. 3. *t.* 105. *n.* 3. *et t.* 110. *n.* 12.

Knorr delic. t. A. I. *n.* 5.

Edw. av. t. 93.

β) Iſis elongata. *Eſper Thierpſl.* 1. *t.* 6.

Habitat in Oceano *omni, rupibus adhaerens, teſtacea et alia marina includens, articulis utplurimum albidis.*

dichotoma. 2. I. ſtirpe corallina: articulis laevibus, geniculis decorticatis.

Pallas el. zooph. p. 229. *n.* 143. Iſis articulata filiformis dichotoma diffuſa, cortice fulvo verrucoſo.

Petiv. gazoph. t. 3. *f.* 10. Hippuris coralloides carnea capenſis.

Seb. muſ. 3. *t.* 106. *f.* 4.

Habitat in Oceano indico *et* aethiopico, *circiter ſemipedalis, ſubflexuoſa, articulis ſubpellucide carneis, cortice cinnabarino, papillis convexis, in ramis ſuperioribus confertiſſimis, obſeſſo.*

ochracea. 3. I. ſtirpe corallina: articulis decorticatis, geniculis nodoſis.

Hort. Cliffort. 480. Lithoxylon ramoſum erectum articulatum rigidum, ramis ſaepius liberis oppoſitis compreſſis, geniculis craſſiuſculis.

Pallas el. zooph. p. 230. *n.* 144. Iſis articulata paniculato-dichotoma ramoſiſſima explanata, cortice hinc papilloſo.

Soland. et Ellis corall. p. 105. *n.* 1. Iſis ſtirpe erecto-ſtriata lapidea rubra dichotoma explanata ramoſiſſima articulata, geniculis nodoſis ſpongioſis fulvis, carne flaveſcente, oſculis ſtellatis, polypos octotentaculatos obducentibus.

Ellis act. angl. 50. *p.* 188. *t.* 3. Corallium rubrum indicum.

Rumpf amb. 6. *p.* 234. *t.* 85. *f.* 1. Accabarium rubrum.

Raj. hiſt. pl. 1. *p.* 63. Pſeudocorallium croceum.

 Boerh.

Boerh. ind. pl. 2. *p.* 4. Corallium geniculatum capillaceum, apice ramoſo, roſeum.
Moriſ. hiſt. pl. 1. *p.* 657. *n.* 14. Hippuris ſaxea fulvo-rubra Conckeniana.
Seb. muſ. 3. *t.* 104. *f.* 1. Accabaar ſ. Corallodendron vulgare rubrum.
Habitat in Oceano indico, *baſi rupibus adhaerens, ſaturate rubra, rariſſime praeter genicula ſpongioſa lutea, alba.*

Entrocha. 4. I. ſtirpe teſtacea tereti: articulis orbiculatis perforatis, ramis verticillatis dichotomis.
Habitat in pelago, ſtirpe *digiti craſſitie, confertiſſime articulata ex orbiculis planis centro perforato: foramine pentagono diſco utroque e centro ſubſtriato, ſuperficie exteriori ſ. corticuli inaequali, ordine tuberculorum cincto, (quae ramorum deciduorum cicatrices)*; ramis *tenuibus dichotomis, continuis nec articulatis, unde* Entrochi *et* Coralloides *ejusdem ſpeciei petrificata.*

Aſteria. 5. I. ſtirpe teſtacea articulata pentagona, ramis verticillatis: ſtella terminali dichotoma.
Ellis encrin. 1764. 4. *t.* 13. *f.* 14. Encrinus capite ſtellato ramoſo dichotomo, ſtipite pentagono equiſetiformi.
Guettard act. Pariſ. 1761. Palma marina e Martinica.
Act. angl. 52. *t.* 14.
Habitat in Oceano, Barbados *alluente.*
Ex hac derivanda frequentiſſime illa montium europaeorum petrefacta Aſteriae *dicta.*

coccinea. 6. I. pumila varie ramoſa, ramulis divaricatis, oſſe articulato lineari ſubſtriato ruberrimo, internodiis brevibus ſpongioſis fulvis, carne intus pallide roſea, extus cellulis elevatis verruciformibus coccineis: oſculis minimis. *Soland. et Ellis corall p.* 107 *n.* 3. *t.* 12. *f.* 5.
Habitat in Oceano indico, 2-3 *pollices alta, nitidiſſime coccinea, rarius alba.*

ANTI-

ANTIPATHES. *Animal* creſcens plantae facie.

Stirps intus cornea ſpinulis exiguis obſita, baſi explanata, extus carne gelatinoſa, verrucis polypiferis obducta.

ſpiralis. 1. A. ſimpliciſſima ſpiralis ſcabra. *Soland. et Ellis corall. p.* 99. *n.* 1. *t.* 19. *f.* 1-6.
Pallas el. zooph. p. 217. *n.* 141. Antipathes ſimpliciſſima attenuata flexuoſo-ſpiralis, ſpinulis ſeriatis ſcabra.
Syſt nat. XII. 2. *p.* 1290. *n.* 4. *β.* Gorgonia ſpirulis.
C. Bauh. pin. p. 366. Corallina nigra ſetacea circumvoluta.
*Pon. bald. ital. p.*230. Antipathis vel Corallinae quarta ſpecies.
Tournef. inſt. p. 574. Lithophyton nigrum ſetaceum circumvolutum.
Rumpf amb. 6 *p.* 202. *t.* 78. C. Palmjuncus anguinus.
Valentyn ind. 3. *t.* 52. *f.* BB. Tali aros ſ. funis aquatilis.
Ephem. Ac. Caeſ. Nat. Cur. Dec. 2. A. 3. *p.* 78. *t.* 4. *f.* 4.
Habitat in mari indico, mediterraneo, norwegico, *atra, rigidiſſima, fragilis, longiſſima, calami ſcriptorii craſſitie.*

Ulex. 2. A. ramoſiſſima ramis ſparſis patentibus hiſpidiſſimis attenuatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 100. *n.* 2. *t.* 19. *f.* 7. 8.
Habitat in mari indico, *ramis tuberculis ovatis cavis ex fuſceſcente luteis ſparſis, cornuum ad inſtar nunc ſurſum, nunc ad latera, nunc deorſum verſis, an ovariis? obſeſſis.*

ſubpinnata. 3. A. ramoſa pinnata hiſpida, pinnulis ſetaceis alternis, aliis rarioribus transverſim exeuntibus. *Soland. et Ellis corall. p.* 101. *n.* 3. *t.* 19. *f.* 9. 10.
Habitat in mari mediterraneo, *cinerea, ſpinulis ſuccineis.*

myriophylla. 4. A. incurva ramoſiſſima pinnata, pinnulis hinc ramoſis ſetaceis. *Soland. et Ellis corall. p.* 102. *n.* 4. *t.* 19. *f.* 11. 12.
Pallas el. zooph. p. 210. *n.* 135. Antipathes incurva ramoſiſſima pinnataque, ramis ſparſis divaricatis, pinnulis ramulculis ſetaceis, hinc ramoſis.
Cluſ. exot. l. 6. *c.* 5? Ericae facie frutex marinus.
Petiv. gaz. t. 35. *f.* 12. Myriophyllum indicum ramoſiſſimum.
Breyn prodr. 2. *p.* 35. *ic. p.* 33. *t.* 29. Lithophytum fuſcum ſubhirſutum ramis tenuiſſime diviſis et ſubdiviſis.
Rumpf amb. 6. *p.* 209. Erica marina tenuis.

Habitat in Oceano indico, *et* mari mediterraneo, *interdum ſeſquipedalis, aſperrima ex flavicante fuſca, lepades teſtaceasque affixa, ſibi ſaepius habens.*

alopecuroides. 5. A. ramoſa, ramis arcte paniculatis hiſpidis ſetaceis. *Soland. et Ellis corall. p.* 102. *n.* 5.
Habitat ad Carolinae ſeptentrionalis *littora, ad* 2 *fere pedes alta, griſea, intus ſplendens, nigra, baſi dilatata, ramis altero latere explanatis, ſulco medio exaratis.*

Cupreſſus. 6. A. ſimplex ſcabra paniculata, ramis recurvatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 103. *n.* 6.
Pallas el. zooph. p. 213. *n.* 138. Antipathes (cupreſſina) trunco ſimplici longiſſimo flexuoſo ramulis confertis recurvis ramoſiſſimis paniculato.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1290. *n.* 4. *α.* Gorgonia (Abies recta) ſimplex ſcabra paniculata, ramis recurvatis.
Syſt. nat. X. *n.* 7. Gorgonia (aenea) paniculata, ramis muricato-ſcabris.
Rumpf amb. 6. *p.* 207. *t.* 80. *f.* 2. Cupreſſus marina.
Seb. muſ. 3. *t.* 106. *f.* 1.
Habitat in Oceano indico, *ad* 2 *usque pedes longa, trunco pennae cygneae craſſitie, tomento griſeo hiſpida, intus aterrima.*

orichalcea. 7. A. aenea laevis, trunco ſimplici rigidiſſimo ramis ſpiraliter ſparſis dichotomis paniculato. *Pallas el. zooph. p.* 215. *n.* 139.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1290. *n.* 5. Gorgonia (aenea) paniculata, culmo flexuoſo, ramis alternis confertis dichotomis.
Rumpf amb. 6. *p.* 227. *t.* 80. *f.* 2.
Seb. muſ. 3. *t.* 100. *f.* 17-19.
Valentyn ind. 3. 2. *p.* 545. *col.* 1.
Habitat in Oceano indico, *ſubpedalis, rigidiſſima, rarior.*

dichotoma. 8. A. longiſſima dichotoma erecta. *Pallas el. zooph. p.* 216. *n.* 140.
Marſ. hiſt. mar. p. 105. *t.* 21. 22. *f.* 101. *et p.* 68. *t.* 40. *f.* 179. *n.* 1. 2.
Habitat in mari mediterraneo, *ad* 2 *usque pedes alta, teres, obſcura.*

clathrata. 9. A. ramoſiſſima intricata, ramulis confuſis ubique coaleſcentibus: junioribus ſetaceis. *Pallas el. zooph. p.* 212. *n.* 137.
Hort. Cliff. p. 479. *n.* 2. Iſis flexilis fruticoſa, caule ſubdiviſo, ramulis ſetaceis ſtrictis undique prominentibus.

Bocc.

Bocc. muſ p. 259. *t.* 9. Antipathes ſpinoſa exilis reticulata arborea indica, aut Antipathes exilis aſpalatoides.

Moriſ. hiſt. pl. 3. *p.* 652. *ſ.* 15. *t.* 10. *n.* 18. Fruticulus marinus aſperiuſculus, ramulis ferulaceis ſpinulis exeuntibus.

Habitat in Oceano indico, *lepadibus et milleporis ſaepe obſeſſa, ſemipedalis vel pedalis, intus atra.*

Flabellum. 10. A. explanata ramoſiſſima ſubdiviſa, ramulis bifariam ramoſis reticulatim cohaerentibus. *Pallas el. zooph. p.* 111. *n.* 136.

Rumpf amb. 6. *p.* 209. Ericae marinae affinis.

Habitat in Oceano indico, *undulato curvata, ſemipedalis fere diametri, atra, tenerrima ſcabritie hiſpida.*

pennacea. 11. A. ramoſa ſubincurva, ramis pinnatis: pinnulis ſetaceis creberrimis hiſpidis. *Pallas el zooph. p.* 209. *n.* 134.

Rumpf amb. 6. *p.* 209. Accabaar rutturuttu ſ. Erica marina craſſa.

Aldrov. muſ. met. p. 848. *ic.* 1. Peucites priſma.

Habitat in Oceano indico, *griſeo-ſcabra, intus atra, pedem fere alta, truncis pedem craſſitie aequantibus.*

ericoides. 12. A. ramoſiſſima hiſpidiſſima atra, ramis ſparſis, ramulis ubique crebris ſubulatis. *Pallas el. zooph. p.* 208. *n.* 133.

Rumpf amb. 6. *p.* 207. Cupreſſus marina prior.

Habitat in Oceano indico, *circiter pedalis, aterrima.*

foeniculacea. 13. A. ramoſiſſima, ramis ſetaceis decompoſito pinnatis. *Pallas el. zooph. p.* 207. *n.* 132.

Rumpf amb. 6. *p.* 208. *t.* 80. *f.* 3. Foenum marinum.

Habitat in mari mediterraneo, *pedem ſaepius excedens, atra.*

341. GORGONIA.

Animal creſcens plantae facie.

Stirps coriacea ſuberoſa, lignoſa, cornea, oſſea, teſtacea, fibris vitreis contexta vel lapidea, ſtriata, attenuata, baſi explanata, tecta carne molliori vaſculoſa et celluloſa; poſt exſiccationem ſpongioſa et friabili.

Oſcula polypifera, nutrimentum ſorbentia et ovipara.

lepadifera. 1. G. dichotoma, floribus ſparſis confertis reflexis campanulatis imbricatis. *Müll. zool. dan. prodr.* 3059. *Pontopp. Naturg. Norw.* 1. *p.* 252. *t.* 13. *f.* 11.

Pallas el. zooph. p. 204. *n.* 131. Gorgonia (Reſeda) alterne ramoſa diffuſa, cortice calyculis recurvis calloſis confertis coagmentato.

Soland. et Ellis corall. p. 84. *n.* 8. *t.* 13. *f.* 1. 2. Gorgonia dichotoma, oſculis confertis reflexis campanulatis imbricatis, carne ſquamulis albis obducta, oſſe in ramulis majoribus teſtaceo, in minoribus corneo.

Gunner. act. Nidroſ. 2. *p.* 321. *t.* 9. Gorgonia reſediformis.

Cluſ. exot. 122. *t.* 123. Planta reſedae facie.

Worm muſ. 329. Planta marina reſedae facie.

Besl. muſ. t. 24. Reſeda marina.

Baſt. op. ſubſ. 2. *p.* 130. *t.* 13. *f.* 1.

Habitat in mari norwegico, 1½-2 *pedes alta, pallida, cortice albo, baſi lapidea, ramis cartilagineis.*

verticillaris. 2. G. pinnata ramoſa, ramulis alternis parallelis, floribus verticillatis incurvis. *Müll. zool. dan. prodr.* 3060.

Pallas el. zooph. p. 177. *n.* 109. Gorgonia teres longa pinnata, pinnis alternis ſetaceis ſubramoſis, poris corniculatis verticillatis.

Soland. et Ellis corall. p. 83. *n.* 7. Gorgonia teres pinnata ramoſa, ramulis alternis parallelis, oſculis verticillatis incurvatis, carne ſquamulis albidis vitreis obtecta, oſſe e laminis ſubteſtaceis nitidis compoſito.

Ellis corall. p. 60. *t.* 26. *f.* S. T. V. Sea-Feather.

Marſ.

Marſ. hiſt. mar. 101. *t.* 20. *f.* 94-96.
Habitat in mari norwegico, mediterraneo, 2-3 *pedes alta, alba, junior flava, ramis flexilibus.*

Placomus. 3. G. bifaria ramis flexuoſis rarius anaſtomoſantibus, floribus conicis eminentibus. *Fn. ſuec.* 2223. *Müll. zool. dan. prodr.* 3061.
Pallas el. zooph. p. 201. *n.* 129. Gorgonia teres lignoſa dichotoma, cortice calyculis cylindricis coronatis.
Soland. et Ellis corall. p. 86. *n.* 10. Gorgonia plana dichotoma, ramis flexuoſis rarius anaſtomoſantibus, oſculis conicis ſetaceis eminentibus, oſſe ſubſtantia fere lignoſa.
Ellis corall. p. 67. *t.* 27. *f.* a A. A 1. A 2. A 3. Warted Sea-Fan.
Gunner act. Nidr. 3. *p.* 1. *t.* 1. Gorgonia flabelliformis.
Cluſ. exot. l. 6. *c.* 5. *p.* 122. Frutex marinus ericae facie.
Breyn. prodr. 3. *t.* 29. Lithoxylon fuſcum ſubhirſutum.
Raj. hiſt. pl. 1. *p.* 68. Corallina lignoſa ericae facie Parkinſoni.
Raj. ſyn. p. 32. Keratophyton flabelliforme cortice verrucoſo obductum.
Borl. corn. p. 238. t. *f.* 1. Flabellum marinum.
Marſ. hiſt. mar. p. 93. *t.* 17. *et p.* 157. *t.* 35. *f.* 171.
Pontopp. hiſt. nat. norw. 1. *p.* 273. *t.* 11. *n.* 2. 3.
Stroem. ſundm. 1. *p.* 145. *n.* 11. 1.
Habitat in pelago Europaeo, mari mediterraneo *et* indico, *erecta, 2 pluresve pedes alta, flava, punicea, rarius rubicunda vel cinerea, lignoſa.*

mollis. 4. G. coriacea dichotoma, corticis calyculis tubuloſis perpendicularibus. *Pallas el. zooph. p.* 203. *n.* 130.
Habitat in mari mediterraneo, *fere ſemipedalis ex fuſco violacea, ramis flagelliformibus, cortice fuſco.*

ſuccinea. 5. G. teres flavo-cornea dichotoma, cortice undique poris verruciformibus hiantibus. *Pallas el. zooph. p.* 200. *n.* 128.
Habitat - - - rariſſima, dimidium pedem ſuperans, rigidiſſima, cortice teſtaceo.

americana. 17. G. ramoſa pinnata, ramulis ſuboppoſitis, compreſſis, oſculis polypiferis in marginibus ſeriatim diſpoſitis, carne albido flaveſcente intus purpuraſcente, oſſe corneo.
Soland. et Ellis corall. p. 87. *n.* 11. *t.* 14. *f.* 3. Gorgonia pinnata.
Habitat in mari Americam *mediam alluente frequens, purpurea aut flava, ſetoſae affinis.*

18. G.

exſerta. 18. G. teres ſparſa ramoſa, ramulis alternis, polypis octotentaculatis exſertis, carne ſquamulis albis veſtita, oſſe ſubfuſco corneo. *Soland. et Ellis corall. p.* 87. *n.* 12. *t.* 15. *f.* 1. 2.

Habitat in mari Americam *auſtralem alluente, 2 circiter pedes alta, ramis albis.*

patula. 19. G. compreſſa tortuoſe ramoſa ſubpinnata ruberrima, oſculis diſtichis ſubrotundis haloni ſubalbido incluſis, oſſe ſubfuſco corneo. *Soland. et Ellis corall. p.* 88. *n.* 13. *t.* 15. *f.* 3. 4.

Habitat in mari mediterraneo.

cerato-phyta. 6. G. ſubdichotoma, axillis divaricatis, ramis virgatis biſulcatis, cortice rubro, poris bifariis.

Muſ. Teſſ. 118. Lithophytum ramis virgatis atris, cortice albido poroſo.

Pallas el. zooph. p. 185. *n.* 117. Gorgonia depreſſiuſcula dichotoma, ramis adſcendentibus, corticis purpuraſcentis poris diſtiche ſparſis ſimplicibus.

Soland. et Ellis corall. p. 81. *n.* 4. *t.* 12. *f.* 2. 3. Gorgonia dichotoma, axillis divaricatis, ramis virgatis adſcendentibus biſulcatis, carne purpurea, polypis niveis octotentaculatis diſtiche ſparſis, oſſe atro corneo ſuffulta

J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 806. Coralioides fruticoſa planta marina erectior.

C. Bauh. pin. 366. Corallina fruticoſa purpurea.

Geſn. lap. fig. p. 136. Lithophyton marinum rubri ſ. purpurei coloris.

Lobel hiſt. pl. p. 650. Corallina rubens antipathis facie, an Quercus marina foliis myricae Theophraſti.

Pluken amalth. p. 102. *t.* 454. *f.* 13. Fucus teres ramoſus, pini ſetis ſurſum rigentibus, cinerea quadam cruſta, velut gypſo, creberrimis foraminibus referta obductis.

Bocc. muſ. t. p. 8. Corallina fruticoſa.

Petiv. gaz. t. 31. *f.* 8. Coralloides epiſpongioſa, virgulis dilute purpureis.

Marſ. hiſt. mar. p. 99. *t.* 19. *n.* 83. Lithophytum quartum.

Catesb. Carol. 2. *t.* 13. Corallina fruticoſa erectior.

Turgot mem. inſtr. t. 23. *f.* B.

Seb. muſ. 3. *t.* 107. *n.* 3.

Ginann. adr. t. 8. *f.* 21?

Knorr delic. t. A. V. *n.* 2.

Muſ Gottw. t. 46. *f.* 1.

Forsk. Fn. aeg. ar. p. 128. *n.* 78.

Habitat

Habitat in mari mediterraneo, atlantico, Americam *auſtralem alluente, pedem circiter alta, carne purpurea, polypis albis.*

juncea. 20. G. ſimpliciſſima teres utrinque attenuata, oſſe corneo fuſco, carne ochracea biſulcata oſculis crebris linearibus notata. *Soland. et Ellis corall. p.* 81. *n.* 3.
Pallas el. zooph. p. 180. *n.* 112. Gorgonia ſimpliciſſima attenuata ſubflexuoſa, cortice craſſo rubro verrucoſo.
Plin. hiſt. m. t. 13. *c.* 25. Junci lapidei.
Rumpf amb. 6. *p.* 126. Palmjuncus albus.
Seb. muſ. 3. *t.* 105. *n.* 1. 2.
Habitat in mari Americano, *teſtaceis adhaerens, aurantia,* 3 *circiter pedes alta, dum viva, valde flexilis.*

flammea. 21. G. compreſſa ramoſa ſubpinnata, oſſe complanato corneo, carne miniata oſculis creberrimis parvis notata. *Soland. et Ellis corall. p.* 80. *n.* 2. *t.* 11.
Habitat circa promontorium bonae ſpei, *ignei coloris.*

Umbraculum. 22. G. flabelliformis ſubreticulata, ramis creberrimis teretibus divergentibus carne rubra verrucoſa obductis. *Soland. et Ellis corall. p.* 80. *n.* 1. *t.* 10.
Habitat in mari indico, *coloris lateritii, trunco brevi in* 2-3 *ramos ramoſos diviſo.*

purpurea. 23. G. ſubdichotoma, ramis divaricatis virgatis, cortice violaceo ſubverrucoſo. *Pallas el. zooph. p.* 187. *n.* 118.
Habitat in mari Americam *auſtralem alluente, teres, laevis, nigra, extremis flagellis flava.*

Saſappo. 24. G. dichotoma teres, ramis divaricatis virgatis, cortice rubro, cellulis undique piloſo-muricatis. *Pallas el. zooph. p.* 188. *n.* 119.
Rumpf amb. 6. *p.* 223. *t.* 83. Accarbaar Saſappo ſ. Virga ſanguinea.
Habitat in Oceano indico, *pedem longa, et longior, nigra, cornea, lepades frequenter ſibi affixas gerens.*

Palma. 25. G. plana multifida, laciniis ſubſimplicibus longiſſimis, corticis laevigati poris ſparſis ſimplicibus. *Pallas el. zooph. p.* 189. *n.* 120.
Cluſ. exot. l. 4. *c.* 12. *p.* 85. Chamaeripha peregrina.
Habitat in Oceano indico, 2, *interdum plures pedes longa, fuſca, cornea in extremis ramis flexiliſſima, cortice calcareo.*

26. G.

radicata. 26. G. homogenea ſuberoſa, poris ſparſis minimis, baſi multifida. *Pallas el. zooph. p.* 190. *n.* 121.
Seb. muſ. 3. *t.* 106. *n.* 6.
Habitat in mari, Africam *meridionalem alluente, ramoſiſſima, ſubdichotoma, griſea, ſuberi ſimili, trunco bipollicari ramoſo.*

ſuberoſa. 27. G. lignoſa dichotoma ramoſiſſima diffuſa, ramis compreſſis ſulco aratis, poris ſparſis ſubſtellatis. *Pallas el. zooph. p.* 191. *n.* 122.
Boerh. ind. h. Lugdb. 2. *p.* 8. *n.* 24. Arbor marina ramoſa ſuber perfecte referens cinerea ubique eleganter et ordinata ſerie pertuſa.
Soland. et Ellis corall. p. 93. *n.* 19. Gorgonia ramoſa ſubdichotoma, ramis longioribus craſſis teretibus adſcendentibus, carne miniacea ſpongioſa, oſculis ſubſtellatis in quincunces fere diſpoſitis, oſſe pallide rubro ſuberoſo.
Ellis corall. p 64. *t.* 26. *f.* P. Q.
Turgot mem. inſtr. t. 23. *f.* C.
Habitat in mari indico *et* Africam *meridionalem alluente, pallida, ſaepe tripedalis, cortice obſolete lateritio.*

coralloides. 28. G. lignea erecta ſubdichotoma difformis, cortice roſeo tuberoſo, poris verruciformibus ſtellatis. *Pallas el. zooph. p.* 192. *n.* 123.
Bocc. obſ. ep. 3. *t. p.* 15. Corallium lignum incruſtans.
Habitat in mari mediterraneo, *circiter ſubpedalis, pallide griſea tenaciſſima, oſculis flavis.*

elongata. 7. G. dichotoma divaricata cortice rubro poris papuloſis ſparſis ſubimbricatis.
Soland. et Ellis corall. p. 96. *n.* 23. Gorgonia dichotoma divaricata, ramis longioribus adſcendentibus, carne tetragona rubra craſſa, oſculis erectis ſecundum angulos ſubimbricatis, oſſe tenui corneo flaveſcente.
Pallas el. zooph. p. 179. *n.* 111. Gorgonia longiſſima recta dichotoma, cortice rubeſcente, verruculis poriferis quincuncialibus.
Habitat in mari atlantico, *pallida, fragilis, ad* 4 *fere pedes longa.*

ſcirpea. 29. G. ſimpliciſſima recta, baſi decompoſita folioſa, cortice molli verrucoſo. *Pallas el. zooph. p.* 182. *n.* 113.
Habitat in mari indico, *fuſca, apice attenuata, cortice* (*ſicco*) *cinereo.*

ſetacea. 30. G. ſimplex rigida, cortice calcareo-albo ſubverrucoſo. *Pallas el. zooph. p.* 182. *n.* 114.

Habitat in mari, Americam *alluente, nigricans.*

viminalis. 31. G. longiſſima depreſſa ramoſo-ſubpinnata, ramis divaricatis ſetaceis, cortice flavo, poris prominulis diſtichis. *Pallas el. zooph. p.* 184. *n.* 116.

Soland. el. Ellis corall. p. 82. *n.* 5. *t.* 12. *f.* 1. Gorgonia ramis ſubteretibus divaricatis ſetaceis ſparſis erectis, carne flava, polypis albis octotentaculatis diſtichis.

Mercat. metalloth. arm. 6. *c.* 18. 19. *p.* 128. 129. Iſidis Plocamum II. et III.

Habitat in mari mediterraneo, *ſeſquipedalis, tenuiſſima, cornea, ex fuſco lutea.*

muricata. 32. G. teres ramoſo-dichotoma diffuſa, cortice craſſo poris cylindricis arrectis muricato. *Pallas el. zooph. p.* 198. *n.* 127.

Soland. et Ellis corall. p. 82. *n.* 6. Gorgonia compreſſa ramoſa dichotoma, carne craſſa ſubalbida, oſculis cylindricis arrectis muricatis, oſſe ancipite corneo nigricante.

Petiv. pterigr. t. 18. *f.* 9. 10. Epicorallum virgulis muricatis majoribus et minoribus.

Tournef. inſtr. 1. h. *p.* 574. Lithophyton americanum minus album tuberculis ſurſum ſpectantibus obſitum.

Tournef. act. Pariſ. 1700. *p.* 34. *ic.* 1. Lithophyton americanum maximum pullum, tuberculis ſurſum ſpectantibus obſitum.

Boerh. ind. h. Lugdb. 2. *p.* 8. *n.* 12.

Catesb. carol. 3. *t.* 37.

Knorr delic. t. A. 6. *n.* 4.

Turgot mem. inſtr. t. 23. *f.* A.

Ginann. adr. 1. *p.* 16. *t.* 10. *f.* 23.

Habitat in archipelago americano, 2-3 *pedes alta, ex coriaceo cornea, nervo medullari albicante.*

verrucoſa. 8. G. bifaria, ramis flexuoſis, cortice calcareo albido: poris prominulis.

Pallas el. zooph. p. 196. *n.* 126. Gorgonia teres ſubdichotoma divaricata, cortice alba calcareo tuberculoſo.

Soland. et Ellis corall. p. 89. *n.* 14. Gorgonia in plano ramoſa flabelliformis, ramis teretibus flexuoſis, oſculis prominulis papilloſis albidis, oſſe tereti ſubſtantia lignoſo-cornea.

Geſn. lap. fig. ic. p. 135. b. *et p.* 137. Lithophyton marinum.

Lobel hiſt. p. 650. Corallinae Antipathis facie varietas, corallina alba.

Imperat. hiſt. nat. p. 653. *c.* 14. Fucus veſtimento nodoſo.

C. Bauh. pin. p. 366. Corallina alba nodoſa.

J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 808. f. *p.* 809. Coralloides granuloſa alba.

Worm. muſ. p. 234. Frutex verrucarius ſ. vermicularis.

Raj. hiſt. plant. 3. *p.* 7. Frutex marinus flabelliformis, cortice verrucoſo obductus.

Raj. ſyn. p. 32. Ceratophyton flabelliforme, cortice verrucoſo obductum.

Mercat. metalloth. arm. 6. *c.* 21. *p* 132. Iſidis palma.

Petiv. muſ. 10. Erica marina alba fruteſcens.

Tournef. inſt. 1. h. Lithophytum album nodoſum, et Lithophytum cortice verrucoſo albo.

Sloan. jam. cat. p. 3. *hiſt.* 1. *p.* 56. Corallina fruticoſa humilior et craſſior, ramis quaquaverſum expanſis, ſuperficie tuberculata.

Sloan. act. angl. v. 44. *n.* 478. *p.* 51. *t.* 2.

Boerh. ind. h. Lugdb. 2. *p.* 7. *n.* 4. 5.

Marſ. hiſt. mar. p. 91. 96. 104. *t.* 16. 18. 21.

Seb. muſ. 3. *t.* 106. *n.* 3.

Knorr delic. 1. *t.* A. V. *f.* 1.

Ginann. adr. 1. *p.* 14. *t.* 7. *f.* 20. 21.

Forsk. Fn. aeg. arab. p. 129. *n.* 81.

Act. angl. 50. *t.* 34. *f.* 19. a.

Cavolin. pol. mar. 1. *t.* 1.

Habitat in mari mediterraneo, *et* Americam *auſtralem* Cornubiam*que alluente*, *utplurimum ſaxo adhaerens*, *rarius lepadem calceolum obducens*, *exſiccata ſordide alba aut cinerea*, *ſeſquipedalis et altior.*

Antipathes. 9. G. paniculato-ramoſa ligno exterius flexuoſe ſtriato.

Pallas el. zooph. p. 193. *n.* 124. Gorgonia fruticans ramoſiſſima erecta, ramis alternis divaricato-adſcendentibus, cortice craſſo laevi, poris magnis ſparſis.

Lobel hiſt. p. 650. Antipathes ſ. Corallium nigrum Dioſcoridis.

C. Bauh. pin. p. 366. Corallium nigrum.

J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 804. Antipathes ſ. Corallium nigrum.

Tournef. inſt. p. 574. Lithophyton nigrum arboreum.

Boerh. ind. h. Lugd. 2. *p.* 6. *n.* 7. Keratophyton arboreum nigrum.

Valent. ind. litt. p. 501. *t.* 8. *f.* 1. a. Accabaar pohon.

Rumpf amb. 6. *p.* 196. *t.* 77. Accabaar item ſ. Corallium nigrum.

Seb.

Seb. ephem. Ac. C. N. C. Dac. 2. *ann.* 3. *obſ.* 24. *p.* 77. *t.* 3. Corallium nigrum ramoſum.
Valentyn ind. 4. *t.* 52. *n.* 51. *epit. p.* 28. Accarbaarium nigrum.
Seb muſ. 3. *t.* 104. *n.* 2. *et t.* 107. *n.* 4. Corallium nigrum.
Ginann. adr. 1. *p.* 17. *t.* 13. 14. *f.* 29.
Knorr delic. t. A. I. *f.* 1. *et t.* A. VI. *f.* 1.
Muſ. Gottwald. p. 63. *t.* 49. *f.* 4. 6.
Donat. monogr. t. 1. 2.
Habitat in Oceano indico, *et* mari mediterraneo, 2 *et plures pedes alta, cornea, aterrima, cortice ex griſeo cinereo,* Corallium nigrum *officinarum.*

anceps. 10. G. paniculata ſubdichotoma, cortice compreſſo calcareo margine poroſo.
Pallas el. zooph. p. 183. *n.* 115. Gorgonia teres ſubdichotoma diffuſa, cortice calcareo depreſſo-ancipiti marginibus poroſo.
Soland. et Ellis corall. p. 89. *n.* 15. Gorgonia ramoſa ſubdichotoma, carne depreſſo-ancipiti, marginibus oſculoſis, oſſe ſubtereti attenuato, ſubſtantia corneo ſubcoriacea.
Ellis corall. p. 68. *t.* 27. *f.* 9. *n.* 2. Sea-Willow.
Raj. ſyn. p. 32. Keratophyton dichotomum, caule et ramulis leviter compreſſis.
Petiv. pterigr. t. 18. *f.* 12. Epicorallum virgulis alatis.
Sloan. jam. catal. p. 4. *hiſt.* 1. *p.* 56. *n.* 15. *t.* 22. *f.* 4. Corallina fruticoſa ramulis et caulibus compreſſis quaquaverſum expanſis purpureis elegantiſſimis.
Catesb. Carol. 2. *t.* 34. Lithophytum compreſſum obſcure luteſcens, marginibus purpureis aſperis.
Habitat in mari Americam *et* magnam Britanniam *alluente, ad ſeſquipedem alta, recens eleganter violacea, poſt flava vel alba.*

nobilis. 33. G in plano ramoſa dichotoma ſubattenuata, carne miniacea lubrica molli vaſculoſa, oſculis octovalvibus conicis ſubhiantibus ſparſis, polypos albidos octotentaculatos bifariam cirratos exſerentibus, oſſe lapideo ruberrimo extus ſtriato et foveolato. *Soland. et Ellis corall. p.* 90. *n.* 16. *t.* 13. *f.* 3. 4.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1288. *n.* 6. Iſis ſtirpe corallina aequali continua, ſtriis obſoletis obliquis, ramis vagis.
Syſt. nat. X. 1. *p.* 797. Madrepora rubra.
Pallas el. zooph p. 223. *n.* 142 Iſis continua dichotoma ſubattenuata, cortice cartilagineo ſparſim papilloſo.

 Ellis

Ellis corall. p. 93. *t.* 35. *f. a.* Red Coral.
Royen prodr. p. 521. *n.* 1. Iſis rubra, ramis patulis tere-tiuſculis.
Donat. adr. p. 43. *t.* 5. Corallum rubrum.
Stapel in Theophr. p. 28.
Geſn. lap. fig. p. 132.
Aldrov. muſ. metall. p. 290.
J. Bauh. hiſt. pl. l. 39. *c.* 33.
C. Bauh. pin. p. 366.
Worm. muſ. p. 231.
Gans hiſt. corall. Froſt. 1669. *c. ic.*
Bonann. muſ. Kircher. p. 265. *t. p.* 284. *n.* 1.
Raj. hiſt. pl. 1. *p.* 60.
Calceol. muſ. p. 3. *ic.*
Boccon. obſ. 1674.
Tournef. inſt. p. 572. *t.* 339.
Marſ. hiſt. mar. p. 108. *t.* 22-29. *et p.* 168. *t.* 40. *f.* 180.
Mercat. metalloth. p. 114.
Knorr delic. t. A. *n.* 1. 2. *et t.* A. II. *n.* 4.
Seb. muſ. 3. *t.* 115. *f.* 1-7.
Ginann. op. poſth. p. 7.
Blackw. herb. ed. germ. 4. *t.* 341. a. b.
Cavolin. pol. mar. 1. *t.* 2.
Habitat in mari mediterraneo *et* rubro, *a cujus accolis in calcem uritur, et in varias figuras elaboratur*, corallium rubrum *officinarum, iſidi affinis, pedalis, ad ſummum altitudinis.*

craſſa. 34. G. teres dichotoma, ramis craſſis virgatis divaricatis adſcendentibus, carne violacea craſſa, oſculis prominulis aequidiſtantibus, polypos octotentaculatos marginibus cirratis exferentibus, oſſe ſubfuſco corneo. *Soland. et Ellis corall. p.* 91. *n.* 17.
Act. Pariſ. 1700. *p.* 34. *t.* 2. Lithophyton americanum maximum cinereum cortice punctato.
Hugh. barbad. t. 27. *f.* 1.
Habitat in mari, Americam *mediam alluente.*

pinnata. 11. G. compreſſiuſcula pinnata, ramis compreſſis ſimpliciſſimis, cortice rubro: poris oblongis. *Fn. ſuec.* 2224. *Müll. zool. dan. prodr.* 3062.
Hort. Cliffort. 489. Lithoxylon pinnato-ramoſum erectum compreſſum flexile, ramulis ſetaceis.
Pallas el. zooph. p. 174. *n.* 106. Gorgonia depreſſa ramoſa pinna-

pinnataque, pinnis ſuboppoſitis rigentibus, cortice miniato ſubverrucoſo.

Theophr. hiſt. pl. l. 4. *c.* 7. Palma pelagica.

Breyn. prodr. 3. *p.* 34. *t.* 30. Lithoxylon incruſtatum, ramis compreſſis ſetoſis pinnatis.

Seb. muſ. 3. *t.* 114. *f.* 3.

D'Aubent. ic. miſc. 48.

Habitat in mari, Africam meridionalem, Norwegiam *alluente*, $1\frac{1}{2}$-4 *pedes alta, cornea, fuſca, in ramulis lateſcens.*

ſanguinolenta. 35. G. depreſſa ramoſiſſima dichotomo-pinnata, corticis flavi poris diſtichis purpureis. *Pallas el. zooph. p.* 175. *n.* 107.

Tournef. inſt. 1. h. *p.* 574. Lithophytum flavum punctatum.

Habitat in mari atlantico, americano, *pedem et ultra longa, cornea, an vere diſtincta ab abietina?*

violacea. 36. G. depreſſiuſcula ramoſo-pinnata, cortice violaceo poris prominulis ſubquadrangulo. *Pallas el. zooph. p.* 176. *n.* 108.

Cluſ. exot. l. 6. *c.* 4. *p.* 21. *cur. poſt. p.* 47. Quercus marina Theophraſti.

Habitat in mari americano, *ſubſeſquipedalis, cornea, lepadem calceolum ſaepe ſibi adhaerentem habens.*

ſetoſa. 12. G. teres pinnata, ramulis ſparſis, cortice purpuraſcente.

Pallas el. zooph. p. 172. *n.* 105. Gorgonia (acerosa) teres ramoſo-pinnata, pinnis ſetaceis confertis inordinatis diffuſis, cortice laeviuſculo purpuraſcente, poris ſeriato-ſparſis.

Olear. muſ. t. 35. *f.* 1. *Besl. muſ. Lochn. t.* 24. Quercus marina Theophraſti.

Pon. bald. ital. p. 221. 228. Antipathes hirſutum.

J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 805. Antipathes hirſutum ſeu Corallium foliatum.

Raj. hiſt. pl. app. p. 1849. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *p.* 652. *t.* 10. *n.* 10. Pinus marina.

Sloan. jam. cat. p. 3. *hiſt.* 1. *p.* 57. *n.* 14. *t.* 22. *f.* 1-3. Corallina fruticoſa elatior, ramis quaquaverſum expanſis teretibus.

Tournef. inſt. 1. h. *p.* 575. Lithophytum erectum elatius ad tamariſcum accedens.

Catesb. Car. 2. *t.* 35. Lithophyton pinnatum purpureum aſperum.

Habitat in mari mediterraneo, *et* Americam *alluente, rectiſſima, ſaepe bipedalis, cortice vetuſto ſaepe cineraſcente, vel flavente albave tartaro incruſtato.*

petechizans. 13. G. ſubdichotoma ramoſiſſima cortice flavo biſulcato: poris rubris.

Pallas el. zooph. p. 196. *n.* 125. Gorgonia teres ramoſiſſima diffuſa, cortice flavo biſulcato verrucoſo, poris rubris.

Marſ. hiſt. mar. p. 103. *t.* 20. *f.* 89-93. Lithophyton ſeptimum.

Habitat - - - fere bipedalis, cornea, nigra, virgulis ſuccineis.

pectinata. 14. G. teres, ramis ſecundis parallelis ſimpliciſſimis, cortice rubro: poris gibbis ſparſis.

Pallas el. zooph. p. 179. *n.* 110. Gorgonia teres ſurculis ſecunde pectinatis, pinnis adſcendentibus parallelis longiſſimis acutis.

Soland. et Ellis corall. p. 85. *n.* 9. Gorgonia teres ramulis ſecundis parallelis adſcendentibus, carne rubra, oſculis creberrimis rotundis prominulis, oſſe duro albo fragili.

Seb. muſ. 3. *t.* 105. *f.* 1. a.

Habitat in Oceano indico, *rariſſima, albida, cortice rubro.*

abietina. 37. G. ramoſa pinnata, carne flava, oſculis purpureis diſtichis, oſſe corneo flaveſcente. *Soland. et Ellis corall. p.* 95. *n.* 23. *t.* 16.

Plukn. amalth. t. 542. *f.* 3.

Habitat ad Africae *occidentalis littora, pedem circiter alta, lepadibus interdum cooperta.*

calyculata. 38. G. dichotoma, ramulis craſſis arrectis, papillis truncatis, carne cineraſcente intus purpurea, oſculis majoribus calyciformibus confertis ſurſum ſpectantibus, hydris octotentaculatis cirratis, oſſe ſubfuſco corneo. *Soland. et Ellis corall. p.* 95. *n.* 21.

Habitat - - -

Briareus. 39. G. ſubramoſa teres craſſa baſi ſupra rupes late explanata, carne interne ſubalbida, externe cinerea, hydris majoribus octotentaculatis cirratis, oſſe ex aciculis vitreis purpureis inordinate ſed longitudinaliter compactis compoſito. *Soland. et Ellis corall. p.* 93. *n.* 20. *t.* 14. *f.* 1. 2.

Habitat in mari Americam *auſtralem alluente, calcyoniis affinis, trunco ampliſſimo.*

ventalina. 15. G. reticulata, ramis lateribus externe compreſſis, cortice rubro.

Hort. Cliff. p. 480. Lithoxylon retiforme, ramulis oppoſitis compreſſis.

Pallas

Pallas el. zooph. p. 165. *n.* 101. Gorgonia (Ventilabrum) reticulata, ramis compreſſis, cortice ruberrimo verrucoſo.
Rumpf amb. 6. *p.* 205. *t.* 89. *f.* 1. Flabella marina.
Habitat in Oceano indico, *nigra, junior fuſca.*

Reticulum. 40. G. reticulata, ramulis creberrimis teretibus cortice rubro verrucoſo. *Pallas el. zooph. p.* 167. *n.* 102.
Rumpf muſ. 6. *p.* 205. Flabellum multiplex.
Seb. muſ. 3. *t.* 105. *n.* 16. *et t.* 107. *n.* 6.
Habitat in Oceano indico, *ponderoſiſſima, ſpithama raro altior, griſea.*

Clathrus. 41. G. reticulata lignoſa, ramulis teretibus, cortice laevi: poris ſimplicibus. *Pallas el. zooph. p.* 168. *n.* 103.
Habitat - - - 2 fere palmorum altitudine, pallida, cortice tenui ex griſeo rubente.

Flabellum. 16. G. reticulata, ramis interne compreſſis, cortice flavo. *Müll. zool. dan. prodr.* 3058.
Hort. Cliff. 480. Lithoxylon retiforme, ramis parallele compreſſis.
Pallas el. zooph. p. 169. *n.* 103. Gorgonia reticulata, ramis creberrimis compreſſis, cortice flaveſcente laevi: poris ſimplicibus.
Soland. et Ellis corall. p. 92. *n.* 18. Gorgonia reticulata, ramis interne compreſſis, carne flava (interdum purpurea,) oſculis minutis ſparſis, polypis octotentaculatis, oſſe nigro corneo, in ramis majoribus tenuiter ſtriato.
Ellis corall. p. 61. *t.* 26. *f.* A. Flabellum Veneris.
Cluſ. exot. l. 6. *c.* 2. *et.* 3. *p.* 120. 121. Frutex marinus elegantiſſimus et Planta marina retiformis.
Worm. muſ. p. 234. *Besl. muſ. Lochn. t.* 24. *Olear. muſ. Gottorp. p.* 69. *t.* 35. *f.* 2. Frutex marinus elegantiſſimus Cluſii.
Bonann. muſ. Kirch. p. 266. *n.* 13. *fig. p.* 286. Frondipora.
Petiv. pterigr. t. 18 *f.* 8. Epicoralliuм reticulatum vulgare.
Mercat. metalloth. arm. 6. *c.* 20. *p.* 131. Iſidis Plocamum quartum.
Torrub. nat. hiſt. hiſp. t. 10. *f.* 12. Lithophytum arboreum nigrum.
Brown jam. p. 75. *n.* 1. 2. Keratophytum reticulatum.
Rochef. antill. c. 19. *act.* 13. *p.* 234. Arbre de mer.
J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 798.
Calceol. muſ. p. 16.
Boerh. ind. h. Lugdb. 2. *p.* 6. *n.* 1. 4. 5. 6.

 Marſ.

Marſ. hiſt. mar. p. 100. *t.* 19. *n.* 84.
Rumpf amb. 6. *p.* 224.
Turgot mem. inſtr. t. 23. *f.* D.
Knorr del. t. A. 12. *f.* 1. *et t.* A. 13. *f.* 1. 2.
Habitat in Oceano *omni, plures pedes interdum alta, et in magnam latitudinem expanſa, flexilis, cornea, nigra, cortice vetuſto, albicante, vel cinereo.*

342. ALCYONIUM. *Animal* plantae forma creſcens.
Stirps fixa, carnoſa, gelatinoſa, ſpongioſa vel coriacea: epidermide celluloſa poris ſtellatis ſoſculis pertuſa, hydras tentaculatas oviparas exſerentibus.

arboreum. 1. A. ſtirpe arborea, ramis obtuſis, poris papularibus. *Fn. ſuec.* 2225. *Müll. zool. dan. prodr.* 3077. *Act. nidroſ.* 4. *p.* 87. *t.* 11. *f.* 1-8. *Pontopp. Nat. Norw.* 1. *p.* 274. 275. *t.* 12. *n.* 4. 5.
Muſ. Teſſin. 120 *t.* 10. Lithoxylon norwegicum.
Pallas el. zooph p. 347. *n.* 202. Alcyonium ramoſum, poris papillaribus in tubera lateralia terminaliaque congeſtis.
Cluſ. exot. l. 6. *c.* 1. *p.* 119. Arbuſcula marina coralloides.
J. Bauh. hiſt. plant. 3. *p.* 797. Planta marina coralloides rubra.
Worm. muſ. p. 230. Planta marina coralloides.
Cupan. hort. cath. ſuppl. 1. *Tourf. inſt.* 1. *h. p.* 576. Alcyonium magnum durum arboreſcens.
Rumpf amb. 6. *p.* 222. Accabaar gabba-garbba ſ. Accarbaar hoazagu, Amboynenſibus Hualupia.
Koelreuter nov. comm Petrop. 7. *p.* 345. *t.* 13. 14. Corallium ſpongioſum leve, ramis tuberoſis nutantibus, tuberculis aggregatis.
Habitat in mari norwegico, albo, indico, *humanae interdum altitudinis, poroſiſſimum ſuberoſum, ex cinereo ferrugineum, intus magis flavicans, medulla albicante.*

exos. 2. A. ſtirpe arboreſcente coriacea coccinea ſuperne ramoſa, papillis ſtellatis.

Pallas

Pallas el. zooph. p. 349. *n.* 203. *Spallanzan. act. ſoc. ital.* 2. *p.* 603. *&c.* Alcyonium (palmatum) ſtipite ſimplici, extremo ſubramoſo papilloſoque.

Rondel. aq. 2. *Geſn. piſc. p.* 155. b. Manus marina.

J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 805. Palma ſ. manus marina quibusdam.

Barrel. ic. 1293. *n.* 1. *et* 1294. Fungus amanita marinus gilvo luteus et purpuraſcens.

Tournef. inſt. 1. *h. p* 596. Fucus manum referens.

Marſ. hiſt. mar. p. 85. 163. *t.* 11. *n.* 74. 75. *t.* 38. 39. Manus latronis aut leproſi.

Bohadſch mar. p. 114. *t.* 9. *f.* 6. 7. Penna ramoſa, pinnis carens, tentaculis in ramis poſitis.

Plan. act. Senenſ. 2. *p.* 222. *t.* 8. *f.* 6-8. Palma ſ. manus marina.

Petiv. pl. ital. t. 1. *f.* 2. 3.

Ginann. adr. 1. *p.* 45. *t.* 50.

Schaeffer Blumenpol. 1755. *t.* 3.

Habitat in maris mediterranei *fundo, teſtaceis ſcopulisque ad dimidium usque pedem excreſcens, digiti craſſitie, coriaceo-cartilagineum, laeve, inferne album, oviparum.*

Epipatrum. 3. A. ſtirpe cavata carnoſa rufeſcente.

Pallas el. zooph. p. 373. *n.* 221. *et miſc. zool. t.* 13. *f.* 1-4. Pennatula (Cynomorium) ſimplex, rhachi cylindrica craſſa granuloſa undique polypifera.

Soland. et Ellis corall. p. 65. *n.* 7. Pennatula (Cynomorion) ſtirpe brevi rugoſa acuta, rhachi craſſa cylindrica granuloſa undique polypifera.

Ellis cat. angl. 53. *t.* 21. *f.* 3-5. Finger-ſhaped Sea-Pen.

Rondel. piſc. 2. *p.* 130. Malum inſanum marinum.

Geſn. paral. 27. *Jonſton exang. t.* 20. Epipatrum.

Habitat in mari mediterraneo, *exalbidum,* 4 *circiter pollices longum, digiti virilis craſſitie; nonne cum agarico ad pennatulas relegandum?*

Agaricum. 4. A. ſtirpe filiformi, pileo reniformi.

Pallas el. zooph. p. 374. *n.* 222. Pennatula (reniformis) altero latere polypitera, ſtipite lumbriciformi.

Soland. et Ellis corall. p. 65. *n.* 8. Pennatula reniformis, ſtirpe lumbrici facie, altero latere polypifera.

Ellis act. angl. 53. *t.* 19. *f.* 6-10. Kidney-ſhaped purple Sea-Pen.

Habitat in mari Carolinam *alluente, purpureum, poris flavis.*

Digitatum. 5. A. acaule oblongum coriaceum rugoſum. *Fn. ſuec.* 2226. *Müll. prodr. zool. dan.* 3078. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 447. *n.* 462.

Pallas el. zooph. p. 351. *n.* 205. Alcyonium (lobatum) gryſeum cruſtaceo-tuberoſum lobatum, poris creberrimis impreſſis.

Soland. et Ellis corall. p. 175. *n.* 1. Alcyonium albidum carnoſo-ſpongioſum lobatum, oſculis ſtellatis undique notatum.

Ellis corall. p. 83. *t.* 32. *f.* aA. A. 2. Dead Man's Hand, or Dead Man's Toes.

Ellis act. angl. 53. *t.* 20. *f.* 10-13. Alcyonium Manus marina.

Raj. ſyn. 37. *n.* 2. *Breyn eph.* N. C. *cent.* 7. 8. *obſ.* 159. Alcyonium ramoſo digitatum, aſteriſcis undique notatum.

Rumpf muſ. p. 46. Tethya.

C. Bauh. pin. p. 366. Fucus Palma marinus.

Barrel. ic. 1293. 1294.

Juſſieu act. Pariſ. 1742. *p.* 294. *t.* 9. *f.* 1.

Baſter op. ſubſ. 1. *p.* 24. *t.* 3. *f.* 6. 7.

Habitat in Oceano europaeo, *teſtacea lapidesque incruſtans, extrinſecus e griſeo rubellum, pallidum, intus albidum.*

Schloſſeri. 6. A. ſubrotundum ſtupoſum, ſtellis radio pertuſis.

Pallas el. zooph. p. 355. *n.* 208. *ſpic. zool.* 10. *p.* 35. 37. Alcyonium cruſtaceum pulpoſum fuſcum, floſculis fulvis adnatis, petalis pertuſis.

Soland et Ellis corall. p. 177. *n.* 4. Alcyonium carnoſum lividum, aſteriſcis luteis radiis obtuſis ornatum.

Schloſſer act. angl. 49. 2. *p.* 449. *n.* 61. Alcyonium carnoſum aſteriſcis radiis obtuſis ornatum.

Rondel. aquat. 2. *p.* 130.

Geſn. piſc. p. 155. Uva marina.

Gaertner ap. Pallas ſpic. zool. 10. *p.* 37. *t.* 4. *f.* 1-5. Botryllus ſtellatus.

Borlaſ. cornub. p. 254. *t.* 25. *f.* 1-4.

Habitat in mari Cornubiam *alluente, fuſcum, vel cineraſcens, alia corpora obducens, ſtellarum radiis* 6-10 *aequalibus baſi concurrentibus, et ad baſin poro pertuſis.*

Lyncurium. 7. A. globoſum fibroſum flavum verrucoſum. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 5. *t.* 85. *f.* 1.

Pallas el. zooph. p. 357. *n.* 210. Alcyonium (Aurantium) globoſum fulvum, ſtellis extus verrucoſum intus fibris oſſeis faſciculanibus radiatum.

Marſ.

Marſ. hiſt. mar. p. 82. *t.* 14. *n.* 72. 73. Alcyones.
Planc. Conch. ed. 2. *p.* 44. *app.* 2. *p.* 114. *n.* 3. Alcyonium flavum durius.
Planc. act. Senenſ. 2. *p.* 218. *t.* 8. *f.* 1. 2. Tethyum plerumque ſphaericum, malum aurantium luſitanicum forma et colore referens, quod horizontaliter diſſectum fibras radiatim oſſeas oſtendit.
Donat. adr. p. 60. 64. *n.* 1. 2. *t.* 10. Tethya ſphaerica.
Habitat in mari mediterraneo, *et ad* promontorium bonae ſpei, *pomi aurantii magnitudine cartilagineum.*

Burſa. 8. A ſubgloboſum pulpoſum viride.
Pallas el. zooph. p. 352. *n.* 206. Alcyonium ſubgloboſum cavum viridiſſimum molle, papillis creberrimis hyalinis.
Imper. hiſt. nat. p. 633. Arantium marinum viride.
J. Bauh. hiſt pl. 3. *p.* 795 Alga pomum monspelienſium.
C. Bauh. pin. p. 368. *Raj. hiſt.* 1. *p.* 38 *ſyn. p.* 31. Burſa marina.
Marſ. hiſt. mar p. 80. *t.* 13. *n.* 69. Aurantium marinum.
Planc. Conch. ed. 2. *p.* 44. Arantia marina, C. Bauh.
Cavol. pol mar. 3 *p.* 261. *t.* 9. *f* 17.
Habitat in mari anglico *et* mediterraneo, *pomi mediocris magnitudine, coriaceum.*

Cydonium. 9. A. ſubrotundum ſpongioſum flavum laeve. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 448. *n.* 464. *Müll. zool. dan.* 3. *t.* 81. *f.* 3-5.
Pallas el. zooph. p. 359. *n.* 211. Alcyonium (Cotoneum) informe ſubgloboſum flavum intus rubrum fibroſo-ſpongioſum cavernoſumque.
Dioſcr. ὑλ. ιατρ. 5. *c.* 136. Ἀλκυόνιον 1.
Imper. hiſt. nat. p. 833. Halcyonium durum ſ. primum Dioſcoridis.
Rumpf amb. 6. *p.* 259. Veſpetum marinum.
Donat. adr. p. 56. *n.* 1. *t.* 9. Alcyonium primum Dioſcoridis.
Planc. Conch. ed. 2. *app. p.* 113. *c.* 18. *n.* 1. 2. *t.* 10. *f.* B-D. H.
Seb. muſ. 3. *t.* 96. *f.* 4.
Habitat in mari africano, mediterraneo, ſeptentrionali, *rupibus et coralliis affixum, a fluctibus agitatum demum liberum, in cavernis ſaepe nereidem hoſpitio excipiens.*

Ficus. 10. A. obovatum pulpoſum livens.
Pallas el. zooph. p 356. *n.* 209. Alcyonium tuberiforme pulpoſum, papillis crebris ſtellatis.

Soland.

Soland. et Ellis corall. p. 175. *n.* 2. Alcyonium (Pulmonana) pulpoſum lividum lobato-compreſſum, oſculis ſtellatis minimis obductum.

Ellis corall. p. 82. *t.* 17. *f.* b. B. Sea-Fig.

Imper. hiſt. nat. p. 839. Alcyonium tuberoſum forma ficus.

J. Baub. hiſt. pl. 3. *p.* 813. Alcyonium tuberoſum.

Mercat. metalloth. arm. 6. *c.* 6. *p.* 102. Alcyonium quintum antiquorum.

Raj. ſyn. p. 31. *n.* 3. Pulmo marinus alter Rondeletii.

Marſ. hiſt. mar. p. 87. *t.* 16. *f.* 79. Ficus ſubſtantiae inter ſpongiam et alcyonium mediae.

Mineralog. Beluſt. 4. *p.* 137. *tab. f.* 1-3.

Habitat in mari mediterraneo, *et* anglico, *rarior inter foſſilia, olivacei coloris, intus granuloſum.*

gelatinoſum. 11. A. polymorphum gelatinoſum. *Fn. ſuec.* 2228. *Müll. zool. dan. prodr.* 3082.

Pallas el. zooph. p. 353. *n.* 207. Alcyonium cineraſcente-hyalinum ramoſiſſimum, ramis teretibus ſubacutis.

Fabr. Fn. groenl. p. 447. *n.* 464. Alcyonium cineraſcente-hyalinum polymorphum.

Soland. et Ellis corall. p. 176. *n.* 3. Alcyonium luteum gelatinoſum polymorphum.

Ellis corall. p. 87. *t.* 32. *f.* D. *et Baſter op. ſubſ.* 1. *t.* 1. *f.* 5. s. Alcyonium ramoſum molle.

Planc. Conch. ed. 2. *p.* 115. *c.* 29. *t.* 10. *f.* A. Alcyonium digitatum gelatinoſum molle.

Parkinſ. theatr. 1304. Spongia ramoſa altera anglica.

Hudſ. flor. angl. p. 471. *n.* 26. Fucus gelatinoſus.

Johnſ. it: cantebr. p. 3. *f.* 3. *Gerard. emac. p.* 157. *Merret. pin. p.* 40.

Raj. ſyn. p. 49. *n.* 42. Fucus nodoſus et ſpongioſus.

Seb. muſ. 3. *t.* 98. *f.* 4.

Habitat in Oceano europaeo, mari *quoque* glaciali, *algis, lapidibus, ſertulariis, teſtaceis frequenter adhaerens.*

Manus Diaboli. 12. A. polymorphum protuberantiis obtuſis perforatis. *Müll. zool. dan. prodr.* 3079.

Seb. muſ. 3. *t.* 97. *f.* 3?

Habitat in Islandia, *lycopendi pulpam ſiccatam referens, extrinſecus laevis, ſupra protuberens digitis aliquot brevibus obtuſis perforatis apice tanquam penna, ad medium usque rami.*

Maſſa. 13. A. informe fulvum ſpongioſum patulum ſtellulis quinque radiatis: centro nigro. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 1. *t.* 81. *f.* 1. 2. *prodr.* 3083.
Habitat in mari norwegico.

Cranium. 14. A. tuberiforme album ſetoſum. *Müll. zool. dan. prodr.* 3080.
Pontopp. Nat. Norw. 1. *p.* 252. *t.* 13. *f.* 10.
Stroem. ſondm. 1. *p.* 148. *n.* 7.
Habitat in mari norwegico.

rubrum. 15. A. cruſtaceum molle miniatum punctis ſparſis ſaturatioribus. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 2. *t.* 82. *f.* 1-4. *prodr.* 3081.
Fabr. Fn. groenl. p. 447. *n.* 463.
Habitat in mari norwegico.

mammilloſum. 16. A. albidum coriaceum, mammillis convexis: centro cavo ſubſtellato, coadunatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 179. *n.* 5. *t.* 1. *f.* 4. 5.
Sloan. jam. 1. *t.* 21. *f.* 1-3. Lapidis aſtroitidis ſive ſtellaris primordia.
Habitat in mari Americam *mediam alluente.*

ocellatum. 17. A. ferrugineum coriaceum, cellulis ſubcylindricis rugoſis, apicibus radiatis et ocellatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 180. *n.* 6. *t.* 1. *f.* 6.
Habitat ad inſulam S. Dominici, *rupibus adhaerens, ſtellarum radiis* 12.

tuberoſum. 18. A. flaveſcens tuberoſum, apicibus ſaepe ſubdiviſis, poris tuboloſis confertis. *Soland. et Ellis corall. p.* 180. *n.* 7.
Habitat ad inſulam S. Mauritii, *rupibus adhaerens,* $2\frac{1}{2}$ *pollices longum,* $1\frac{1}{2}$ *altum.*

gorgonoides. 19. A. cinereum arenoſo-carnoſum, cellulis radiatis verruciformibus. *Soland. et Ellis corall. p.* 181. *n.* 8. *t.* 9. *f.* 1. 2.
Pallas el. zooph. p. 158. *n.* 100. Sertularia (Gorgonia) lignoſa ramoſa pinnata, pinnis pinnatis denticuliferis, cortice ramorum verrucoſo.
Habitat ad Curaſſao *inſulam, coralliis rupibusque adhaerens, cellularum radiis* 12.

asbeſtinum. 20. A. ſtirpe ſubſimplici teretiuſcula, poris undique ſparſis majuſculis oblongis. *Pallas el. zooph. p.* 344. *n.* 200.
Bocc. obſ. ap. 24. *ic. p.* 273. Alcyonium ſtuppoſum perforatum rubrum.

Petiv.

Petiv. gaz. t. 23. *f.* 2. 2. Porus ſpongioides, americana.
Habitat in mari, Americam *alluente, poroſiſſimum, albidum, intus roſeum.*

Alburnum. 21. A. album ramoſiſſimum attenuatum ſubdiviſum, poris tubuloſis terminalibus. *Pallas el. zooph. p.* 346. *n.* 201.
Habitat in mari indico, *ex lacteo pallidum, truncis digitum minimum craſſitie aequantibus, et dimidii fere pedis altitudinem aſſequentibus.*

papilloſum. 22. A. cruſtaceum, papillis magnis confertis convexis obſitum. *Pallas el. zooph. p.* 350. *n.* 204.
Marſ. hiſt. mar. p. 86. *t.* 15. *f.* 76-78. Boletus marinus.
Habitat - - - *ex griſeo ferrugineum, corio ſiccato ſimile.*

conglomeratum. 23. A. gelatinoſum convexum, dactylis conglomeratis: oſculis edentulis terminalibus.
Gaertn. ap. Pallas ſpic. zool. 10. *p.* 39. *t.* 4. *f.* 6. Botryllus conglomeratus.
Habitat in mari Cornubiam *alluente, rarior, fucis, praeſertim nodoſo et ſerrato adhaerens, albicans, cavitate centrali infundibuliformi, ovulis globoſis.*

aſcidioides. 24. A. cruſtaceum coriaceum, papillis ſparſis; oſculis duobus ſubdentatis.
Gaertn. apud Pallas ſpic. zool. 10. *p.* 40. *n.* 3. *t.* 4. *f.* 7. Diſtomus varioloſus.
Habitat in mari Cornubiam *alluente, fuco palmato adhaerens, dilute rubellum, vel ex croceo albicans, verrucis ſingulis orificio duplici minimo coccineo pertuſis.*

Synoicum. 25. A. ſtirpibus pluribus cylindricis carnoſo-ſtupoſis: orificio ad apicem ſtellato.
Phipps it. p. 199. *t.* 13. *f.* 3. Synoicum turgens.
Habitat ad Spitzbergae *littus ſeptentrionale.*

vermiculare. 26. A. viride ramoſum, ramis cylindricis obtuſis faſtigiatis. *Cavol. pol. mar.* 3. *p.* 264. *t.* 9. *f.* 16.
Habitat in rupibus inſulae Niſitae, *Neapoli obverſae.*

ſtellatum. 27. A. oſculis binis ſtellatis terminalibus. *Bommé act. Vliſſ.* 3. *p.* 306. *f.* 5. A. B.
Habitat in mari - - - *infundibuliforme, ſacco pellucido incluſum; an hujus generis.*

corniculatum. 28. A. oſculis quatuor ſtellatis, papillam mediam cingentibus, corniculisque quatuor erectis terminalibus. *Bommé act. Vliſſing.* 3. *p.* 307. *f.* 6.
Habitat in mari belgico, *an hujus generis?*

343. SPONGIA.

Animal fixum flexile polymorphum, torpidiſſimum contextum vel e fibris reticulutis, vel e ſpinulis gelatina viva veſtitis oſculis vel foraminibus ſuperficiei aquam reſpirans.

Ventilabra. 1. Sp. flabelliformis conformis ſtupoſa, venis lignoſis reticulatis, obtectis poris favagineis. *Müll. zool. dan. prodr.* 3084. *Pontopp. Nat. Norw.* 1. *p.* 251. *t.* 13. *f.* 8. *Stroem. ſundm.* 1. *p.* 146. *n.* 4. *Soland. et Ellis corall. p.* 188. *n.* 8.
Pallas el. zooph. p. 397. *n.* 247? Spongia (ſtrigoſa) ſuberoſa mollis, fronde plana lacinioſa, utroque latere poris clathrata.
Gunner act. nidr. 4. *p.* 74. *t.* 3. *f.* 1. 2. *et t.* 4. *f.* 3. 4. Spongia Ventilabrum.
Rumpf amb. 6. *p.* 253. *t.* 89? Baſtia marina.
Seb. muſ. 3. *t.* 95. *f.* 8. Planta marina foliacea et ſpongioſa, ſingulari modo ramoſa.
Ellis act. angl. 55. *p.* 289. *t.* 11. *f.* H. Sea-Fan Sponga.
Habitat in mari americano? norwegico, *figura et ramificatione Gorgoniae Flabelli, cortice ſpongiae.*

flabelliformis. 2. Sp. flabelliformis conformis orbiculata, fibris cartilagineis denſe reticulatis.
Hort. Cliffort. 480. Spongia flabelliformis, caule teretiuſculo, diſco compreſſo-plano vix diviſo.
Pallas el. zooph. p. 380. *n.* 226. Spongia rigida rara ſubatra flabelliformis plana rotundataque.
v. Royen prodr. h. lugdb. p. 522. *n.* 6. Spongia flabelliformis rigidiuſcula, fibris capillaribus denſiſſime reticulata.
Boerh. ind. h. lugdb. 1. *p.* 6. Keratophyton majus nigrum fibris tenuioribus denſiſſime reticulatum.
Rumpf amb. 6. *t.* 80. *f.* 1. Flabellum Aruenſe.
Petiv. gaz. t. 32. *f.* 1. Rete philippenſe nigrum, telis quadrangulis.
Seb. muſ. 3. *p.* 183. *t.* 95. *f.* 2. 4. Alcyonium irregulare rigidum membranaceum et celluloſum.

Habitat

Habitat in mari indico *et* rubro, *lepades aliquando immerſas habens, ambarum manuum amplitudine, aliquot linearum craſſitie.*

infundibuliformis. 3. Sp. infundibuliformis turbinata flexilis. *Müll. zool. dan. prodr.* 3085.
Pallas el. zooph. p. 395. *n.* 246. Spongia (foliaſcens) foliacea laciniata tenax, altero latere exeſo-ſcabra.
Gunner act. Nidroſ. 4. *p.* 78. *t.* 4. *f.* 5. Spongia infundibuliformis.
Rumpf amb. 6. *p.* 254. *t.* 90 *f.* 1. Spongia infundibuli forma.
Cluſ. exot l. 6. *c.* 11. *p.* 125. *Worm. muſ. p.* 236. Spongia elegans.
Petiv. pterigr. t. 9. *f.* 4. 6. Spongia foliata aſpera et Spongia infundibuliformis.
C. Bauh. pin. p. 369. Spongia forma infundibuli.
J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 802.
Muſ. Richt. p. 384. *t.* 14. *f.* F.
β) *Pallas el. zooph. p.* 386. *n.* 233. Spongia (crateriformis) infundibuliformis molliuſcula, membranaceo-celluloſa, extus villoſa, craſſior.
Mercat. metall. arm. 6. *c.* 2. *p.* 97. *ic. p.* 96. Alcyonium primum antiquorum.
Habitat in mari indico? mediterraneo, norwegico, *pedis latitudine, pallide griſea, officinali minus tenax, adultior ſaepe bifariam rupta et plana.*

fiſtularis. 4. Sp. tubuloſa ſimplex fragilis ſenſim ampliata.
Hort. Cliffort. 480. Spongia tubuloſa ſimplex cavernoſa.
Pallas el. zooph. p. 385. *n.* 232. Spongia tubuloſa ſimplex attenuata rigida extus tuberculoſa.
Sloan. jam. cat. p. 6. *hiſt* 1. *p.* 62. *t.* 24. *f.* 1. Spongia dura ſ. ſpuria maxima ramoſa fiſtuloſa.
Seb. muſ. 3. *t.* 95 *f.* 1. 7.
Habitat in Oceano indico, *brachii amplitudine,* 3-4 *pedes longa, ſiccata e fulvo nigricans.*

aculeata. 5. Sp. tubuloſa ramoſa tenax foraminulata ſubaculeata.
v. Royen prodr. h. Lugdb. 522. Spongia tubuloſa cavernoſa extus aculeata.
Pallas el. zooph. p. 392. *n.* 242. Spongia (villoſa) tenaciſſima cava extus muricata, intus laevis.
Sloan. jam. cat. p. 7. *hiſt.* 1. *p.* 63. *t.* 25. *f.* 4. Spongia dura ſ. ſpuria, apicibus acutis exſtantibus, intus cavernoſa.

Pluran.

Pluckn. phyt. t. 112. *f.* 4. Spongia marina fiſtuloſa maxima muricata.
Brown jam. p. 74. *n.* 5. Spongia fiſtuloſa major flexilis poroſa et prominulata.
β) *Petiv. pterigr. t.* 19. *f.* 9. Spongia typhoides.
Rumpf amb. 6. *p.* 255. *t.* 55. *f.* 2. Chirotheca marina.
Habitat in mari, Indiam *et auſtralem* Americam *alluente, pallide griſea, tenaciſſima.*

tubuloſa. 6. Sp. tubuloſa ramoſiſſima faſtigiata tenax.
Royen prodr. fl. Lugdb. 522. Spongia tubuloſa ramoſiſſima tenax faſtigiata.
Pallas el. zooph. p. 392. *n.* 241. Spongia (faſtigiata) tenera duriuſcula tenax tubuloſo-ramoſiſſima, ramis faſtigiatis truncatis.
Soland. et Ellis corall. p. 188. *n.* 9. *t.* 58. *f.* 7. Spongia tubuloſa ramoſa tenax, tubulis ſecundis arrectis, apicibus attenuatis.
Boerh. ind. h. Lugdb. 1. *p.* 9. Spongia ramoſa fiſtuloſa millepora.
Seb. muſ. 3. *t.* 97. *f.* 2.
Habitat in Oceano indico, 4-6 *pollices alta, ex luteo aurantia.*

coronata. 17. Sp. tubuloſa ſimplex minima apice ſpinulis radiatis coronata.
Soland. et Ellis corall. p. 190. *n.* 13. *t.* 58. *f.* 8. 9.
Habitat ad Angliae *littora, flaveſcens, corona apicis margaritacea.*

ciliata. 18. Sp. ſimplex tubuloſa conico-flexuoſa, ſurſum attenuata in apicem ciliatum. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 448. *n.* 466.
Habitat in Groenlandiae *littore, ulvis majoribus potiſſimum inhaerens,* 8 *lineas longa, alba, ſericea, exterius tomentoſa, rarius gemella.*

cancellata. 7. Sp. tubuloſa foraminulata, fibris cancellatis.
Habitat in Oceano, *ferruginea, rarioris texturae, quam congeneres, ſuperficie muricata, tubo digiti craſſitie, foraminibus lateralibus raris, latitudine pennae anſerinae.*

rubra. 19. Sp. tenax ſimplex carioſa obſcure rubra depreſſa ſubrotunda, tuberculis elevatis, poris aequalibus.
Habitat in mari rubro, *prope* Sues *lapidibus affixa.* Forskåhl.

nigra. 20. Sp. tenax globoſa aequalis farcta exterius nigra intus cinerea.
Habitat in mari rubro, *prope* Sues. Forskåhl.

officinalis. 8. Sp. foraminulata difformis ſubramoſa tenax tomentoſa. *Müll. zool. dan. prodr.* 3087. *Stroem. ſondm.* 1. *p.* 128.
Mat. med. 527. Spongia tenax ſubramoſa, ramis difformibus pertuſis.
Pallas el. zooph. p. 387. *n.* 234. Spongia polymorpho-compreſſa ſublobata tomentoſa porulenta.
Soland. et Ellis corall. p. 183. *n.* 1. Spongia multiformis tenax poroſiſſima lobata tomentoſa.
Ellis act. angl. 55. *p.* 288. *t.* 10. *f.* D. E. Common officinal Sponge.
Imperat. hiſt. nat. p. 828. *C. Bauh. pin. p.* 392. *Sloan. jam. cat. p.* 6. *hiſt.* 1. *p.* 62. *n.* 35. Spongia globoſa.
J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 818. Spongiae compreſſae ſchiacratae.
Tournef. inſt. 1. h. *p.* 575. Spongia ad uſum praeſtantiſſima, foraminibus exiguis pervia.
Cavolin. pol. mar. 3. *p.* 266.
Habitat in Archipelago, mari mediterraneo, rubro, indico? americano? norwegico? *cavernoſiſſima, ex fulvo griſea, teſtaceis, coralliis, arenae granulis interdum referta, intus tubuloſa.*

oculata. 9. Sp. foraminulata, ramoſiſſima erecta tenax, ramis teretiuſculis obtuſis. *Hort. Cliff.* 480.
Pallas el. zooph. p. 390. *n.* 239. Spongia ramoſiſſima mollis tenera flaveſcens, ramis teretiuſculis, poris ſparſis prominulis.
Soland. et Ellis corall. p. 184. *n.* 2. Spongia ramoſiſſima, mollis, ramis compreſſiuſculis adſcendentibus ſaepe confluentibus, poris prominulis bifarie diſpoſitis.
Ellis corall. p. 80. *t.* 32. *f.* f. F. *et act. angl.* 55. *p.* 288. *t.* 10. *f.* B. Branched engliſh Sponge.
Parkinſ. theatr. 1304. *Raj. ſyn. p.* 29. *n.* 1. Spongia ramoſa anglica.
Bocc. muſ. p. 258. *t.* 116. Spongia ramoſa oculata viridis fruticoſa.
Boerh. ind. h. Lugdb. 2. *p.* 8. Spongia ramoſiſſima oculata.
Seb. muſ. 3. *t.* 97. *f.* 5-7. Spongia erecta ramoſa mollis et ſubtilis.
C. Bauh. pin. p. 369. Spongioſus fucus.
Ruyſch theſ. an. 1. *t.* 5. Spongioides ramoſiſſima marina oculata.
Pontopp. nat. norw. 1. *p.* 276. *t.* 12.
Habitat frequens in mari britannico, *flaveſcens*, 5-10 *pollices alta.*

muricata. 10. Sp. foraminulata ramoſiſſima angulata tenax: poris cylindricis ſubulatis prominentibus aequalibus multifidis hiſpidis. *Muſ. Teſſin. p.* 118. *t.* 11. *f.* 1.*

Pallas el. zooph. p. 389. *n.* 237. Spongia ſuberoſa ramoſa, ramis divaricatis cylindricis undique villis creberrimis muricatis.

Soland. et Ellis corall. p. 185. *n.* 3. Spongia ſtirpe ſuberoſa ramoſa, ramulis cylindricis faſciculis villoſis undique muricatis.

Ellis act. angl. 55. *p.* 288. *t.* 11. *f.* F. Branched tuberculated Sponge.

Seb. muſ. 3. *p.* 188. *t.* 99. *f.* 7. Spongia ramis craſſiuſculis tenax, tota ſuperficie apiculis tenuibus mollibus denſe conſita.

Habitat ad Guineae *littora, frequens ibi in rupibus, griſea, trunco digitum, ramis calamum ſcriptorium craſſitie aequantibus.*

nodoſa. 11. Sp. foraminulata ſubramoſa difformis ſcabra tenaciſſima ramis nodoſa cavernoſa. *Royen. prodr. h. Lugdb.* 522.

Pallas el. zooph. p. 389. *n.* 238. Spongia (rubens) ſubramoſa difformis mollis, poris majuſculis ſparſis.

Sloan. jam. cat. p. 7. *hiſt.* 1. *p.* 63. *t.* 23. *f.* 5. Spongia minor et mollior medullae panis ſimilis, fibris tenuiſſimis.

Imperat. hiſt. nat. p. 838. Alcyonium foraminoſum ſ. quartum Dioſcoridis.

Mercat. metalloth. arm. 6. *c.* 8. *p.* 106. Tertium quinti generis Alcyonium.

Seb. muſ. 3. *t.* 96. *f.* 2.

Habitat in Oceano americano, *ex griſeo rubens vel albida, digiti craſſitie.*

tomentoſa. 12. Sp. poroſa ſubaculeata tomentoſa.

Soland. et Ellis corall. p. 187. *n.* 7. Spongia (urens) multiformis poroſa ſpinulis intertexta, teneriima mollis.

Ellis corall. p. 80. *t.* 16. *f.* d. d 1. D 1. *act. angl.* 55. *p.* 288. *t.* 10. *f.* A. Sponge like Crumb of breed.

Habitat ad magnae Britanniae, Americae *borealis*, Africae, Indiae *littora, Zoſterae aliisque plantis marinis adhaerens, oculatae ſimilis, recens aurantius molliſſima, ſiccata albida et urens tanto magis, ſi in clibano exſiccata ſit, intus micam panis referens, extrinſecus plena papillis poro pertuſis.*

bacillaris. 13. Sp. conformis cauleſcens erecta, ramis appreſſis porulosis. *O. Fr. Müll. zool. dan. prodr.* 3086.

Habitat in Oceano norwegico, *ſeſquipedalis, teres, pollicis craſſitie, officinalis conſiſtentia, magis tamen compacta, poris confertiſſimis, quaſi acicula minima pertuſis.*

dichotoma. 14. Sp. conformis dichotoma erecta diſticha bifaria cylindrica flexilis tomentoſa. *Müll. zool. dan. prodr.* 3088. *Pontopp. Nat. Norw.* 1. *p.* 251. *t.* 12. *f.* 7. *Stroem. ſondm.* 1. *p.* 146. *n.* 3. *Gunner. act. Nidroſ.* 4. *p.* 79. *t.* 5. *f.* 1. *et t.* 6. *f.* 1.

Pallas el. zooph. p. 388. *n.* 236. Spongia (cervicornis) ramoſiſſima tenax, ramis teretibus ſolidis ſubvilloſis.

Soland. et Ellis corall. p. 187. *n.* 6. Spongia ramoſa tenax, ramis dichotomis erectis teretibus ſuberoſis ſubvilloſis. *Ellis act. angl.* 55. *p.* 289. *t.* 11. *f.* I. Dichotomous branched Sponge.

Rumpf amb. 6. *t.* 86. *f.* 3? Lithodendrum littoreum.

Habitat in mari mediterraneo? indico? norwegico, *flaveſcens,* 5-6 *pollices alta, poris minutiſſimis referta.*

ſtupoſa. 21. Sp. ramoſa teres ſtupoſa atque villoſa. *Soland. et Ellis corall. p.* 186. *n.* 5.

Ellis act. angl. 55. *p.* 288. *t.* 10. *f.* C. Downy branched engliſh Sponge.

Habitat ad Angliae *littora flaveſcens,* 3 *pollices alta.*

criſtata. 22. Sp. plana compreſſa erecta mollis, poris prominulis ſuperne ſeriatim diſpoſitis. *Soland. et Ellis corall. p.* 186. *n.* 4.

Ellis act. angl. 55. *p.* 288. *t.* 11. *f.* G. Cock's Comb Sponge.

Habitat ad Angliae *littora, rupibus adhaerens, flavicans, utplurimum* 3 *pollices longa, et* 2 *alta.*

palmata. 23. Sp. palmata, digitis apice ſubdiviſis: poris prominulis inordinate diſpoſitis. *Soland. et Ellis corall. p.* 189. *n.* 10. *t.* 58. *f.* 6.

Habitat ad Angliae *littus, ex flavo rubella, mollis.*

prolifera. 24. Sp. multoties ramoſo-palmata, digitis diſtinctis. *Soland. et Ellis corall. p.* 189. *n.* 11. *t.* 58. *f.* 5.

Habitat ad Americae *borealis littus,* 5-6 *pollices alta, poris numeroſis minimis, intus reticulata, exterius ſpinuloſa.*

25. Sp.

botryoides. 25. Sp. tenerrima ramoſa, quaſi racemoſa, racemis cavis neriformibus: apicibus apertis. *Soland. et Ellis corall. p.* 190. *n.* 12. *t.* 58. *f.* 1-4.
Habitat ad Angliae *littus, candida, nitens.*

panicea. 26. Sp. amorpha albida mollis tenerrima ſubtiliſſime poroſa. *Pallas el. zooph. p.* 388. *n.* 235.
Raj. ſyn. p. 31. Alcyonium ramoſum molle, medullae panis intus ſimile.
Seb. muſ. 3. *t.* 96. *f.* 4. *et t.* 99. *n.* 3.
Habitat in mari, *inter* Angliam *et* Belgium *intermedio, fucis, tubulariis, ſertulariis intertexta; an diſtincta a tomentoſa.*

fulva. 27. Sp. amorpho-ſubramoſa rigidiſſima fulva. *Pallas el. zooph. p.* 383. *n.* 230.
Seb. muſ. 3. *t.* 95. *f.* 9. *et t.* 96. *f.* 1. Spongia rigida ſimplex ramoſa.
Habitat in mari americano, *gelatina inter febras fuſca.*

tubularia. 28. Sp. compreſſa ſeſſilis rigidula flaveſcens, tubulis longitudinalibus poroſa.
Pallas el. zooph. p. 383. *n.* 229. Spongia tubuloſa.
Habitat in mari americano, *ad rupes ſeſſilis, intus ſaepe nigricans.*

fibrilloſa. 29. Sp. polymorpha ſubcomplanata tenera, fibris divergentibus confertiſſimis contextis, poris ſparſis dentatis. *Pallas el. zooph. p.* 382. *n.* 228.
Habitat in Oceano indico, *griſea mollis, nunc flabelliformis, nunc lacinioſa, nunc cauleſcens.*

faſciculata. 30. Sp. rigida ſubgloboſa, faſciculis fibroſis prismaticis ramoſis faſtigiatis contexta. *Pallas el. zooph. p.* 381. *n.* 227.
Planc. Conch. ed. 2. *app.* 2. *p.* 117. *c.* 34. *t.* 15. E. Spongia hircina globoſa.
Habitat in mari mediterraneo, *fulveſcens, vel ex griſeo lutea.*

Baſta. 31. Sp. rigidiuſcula rara ſubatra undulato-lacinioſa, ſtipite tereti. *Pallas el. zooph. p.* 379. *n.* 225.
Rumpf amb. 6. *p.* 253. *t.* 89. Baſta marina, Baſta-laut.
Habitat in Oceano indico, *trunco ſaxis inſidente, craſſitie digiti.*

floribunda. 32. Sp. amorpha faſciculis ramoſis confluentibus paleaceo-tomentoſis apice craſſioribus obtuſis. *Pallas el. zooph. p.* 378. *n.* 224.
Habitat in Oceano indico, *palmaris et majoris adhuc altitudinis, braſſicae cauliflorae facie, griſea, rubris paleolis interſperſis.*

lichenoides. 33. Sp. amorpha, fibris mollibus rameſcentibus rariuſculis ſubconnexis. *Pallas el. zooph. p.* 378. *n.* 223.
Habitat in Oceano indico, *lichenis fruticuloſi habitu, alcyonii gelatinoſi facie.*

papillaris. 34. Sp. cruſtacea tenera mollis papilloſa: papillis perforatis. *Pallas el. zooph. p.* 391. *n.* 240.
Seb. muſ. 3. *t.* 97. *f.* 3.
Habitat in mari americano, *ex griſeo alba, gelatina fuſca.*

ſinuoſa. 35. Sp. cruſtacea tenera tenax, ſuperficie ſinubus creberrimis cavernoſa. *Pallas el. zooph. p.* 394. *n.* 243.
Habitat in Oceano indico? *varia corpora incruſtans, ex griſeo flaveſcens.*

cavernoſa. 36. Sp. amorpha ſeſſilis tenaciſſima cavernoſa, ſuperficie crebris papillis prominulis. *Pallas el. zooph. p.* 394. *n.* 244.
Habitat in mari americano, *pugni magnitudine et ultra, ex flaveſcente albida, intus interdum fulva.*

frondoſa. 37. Sp. frondoſo lacera tenax ſubreticulata altero latere laciniosa. *Pallas el. zooph. p.* 395. *n.* 245.
Turgot mem. inſtr. t. 24. *f.* A.
Habitat in Oceano indico, *griſea.*

agaricina. 38. Sp. compreſſa lobata ſeſſilis tomentoſo-reticulata exterius villis muricata. *Pallas el. zooph. p.* 397. *n.* 248.
Habitat in Oceano indico, *ex fuſco lutea.*

Tupha. 39. Sp. ramoſa rara mollis, ramis adſcendentibus ſubacutis undique villoſo muricatis. *Pallas el. zooph. p.* 398. *n.* 249.
Imper. hiſt. nat. p. 830. 831. Spongia forma arborea ſ. Tapha.
Marſ. hiſt. mar. p. 81. *t.* 14. *n.* 71. Typha marina.
Habitat in mari mediterraneo, *lanuginea.*

membranoſa. 40. Sp. amorpho-ſubramoſa membranis celluloſa exterius muricata purpuraſcente nigra. *Pallas el. zooph. p.* 398. *n.* 250.
Seb. muſ. 3. *t.* 95. *f.* 3.
Habitat in Oceano indico.

41. Sp.

compreſ-ſa. 41. Sp. ſimplex compreſſo-conica interne rima longitudinali fiſſa. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 448. *n.* 467.
Habitat in maris Groenlandiam *alluentis locis profundis erecta, pollicem longa, helvola.*

Pocillum. 42. Sp. cylindrica pedicellata, vertice pertuſo. *Müll. zool. dan. prodr.* 3091. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 449. *n.* 468.
Habitat in mari norwegico, *albida*, $1\frac{1}{3}$ *lineae longa, pocillum referens.*

coalita. 43. Sp. ramoſiſſima mollis tenera flava, ramis compreſſiuſculis. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 71. *t.* 120. *prodr.* 3090.
Habitat in mari norwegico.

plana. 44. Sp. expanſa cruſtacea flabelliformis. *Müll. zool. dan. prodr.* 3092.
Habitat in mari norwegico, *an diſtincta ſatis a reliquis ſpecies?*

cruciata. 45. Sp. alba pinnatifido-ramoſa compreſſa, ramis obtuſis villoſo muricatis. *Müll. zool. dan. prodr.* 3093.
Habitat in mari norwegico.

oſſiformis. 46. Sp. alba ſubramoſa, apice incraſſato lacunoſo. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 149. *ic. t.* 40. *rar. deſcr.* 1. *p.* 103. *prodr.* 3094.
Habitat in mari norwegico.

macida. 47. Sp. alba cruſtacea in aculeos producta. *Müll. zool. dan. prodr.* 2095.
Habitat in mari norwegico.

ficiformis. 48. Sp. foraminulenta rigida turbinata, apice perforata. *Poiret voyag. en Barbar.* 2. *p.* 61.
Habitat ad Barbariae *littora.*

lacuſtris. 15. Sp. conformis repens fragilis, ramis erectis teretibus obtuſis. *Fl. ſuec.* 1190.
Fl. lapp. 535. Spongia ramis teretibus obtuſis.
Raj. hiſt. 81. Spongia ramoſa fluviatilis.
Habitat in Sueciae, Angliae *lacubus, orygae et majori profunditate ſub aqua latens, in hujus poris ſparſis auctumno globulos caeruleſcentes ſeminum thymi magnitudine nitidos, in candelae flamma fulgurantes, an corpora peregrina? obſervavit* Cl. Blom, *Med. Dr.*

fluviatilis. 16. Sp. conformis erecta fragilis polymorpha. *Fl. ſuec.* 1191. *Müll. zool. dan. prodr.* 3089.

Pallas el. zooph. p. 384. *n.* 231. Spongia ramoſa filiformis viridiſſima fragilis.

Plukn. almag. p. 356. *t.* 112. *f.* 3. Spongia fluviatilis anfractuoſa perfragilis ramoſiſſima.

Rupp fl. jen. p. 308. *t.* 3. *f.* 1. Spongia fluviatilis ad confervam accedens.

Loeſ. fl. pruſſ. p. 172. *t.* 52. Muſcus aquaticus ceratoides.

Habitat in Europae, *etiam auſtralioris* Ruſſiae *aquis dulcibus, obſcure viridis, vix vitae animalis veſtigia exhibens, odoris piſculenti, granulis viridibus gelatinoſis poros interdum replentibus, vix ſatis diſtincta a lacuſtri.*

friabilis. 49. Sp. cinerea friabilis ſeſſilis amorpha, ſubramoſa. *Wartmann et Girtanner Naturf.* 22.

Habitat in lacu Bodamico, *piſcium eſca.*

canalium. 50. Sp. ramis dichotomis teretibus incurvatis. *Schroeter Naturf.* 23. *p.* 149. *t.* 2.

Habitat in aquaeductu Vinarienſi, *an hujus generis et regni?*

344. FLUSTRA. *Animal* affixum raro tubulis radicalibus.

Stirps membranacea foliacea, ex ſeriebus cellularum multifidis et divergentibus coalita, quaſi contexta.

Cellulae ringentes capitula hydrarum aemula fundo adnata exſerentes.

Ovaria bullulae ſupra cellulas.

foliacea. 1. Fl. foliacea ramoſa: laciniis cuneiformibus rotundatis. *Fn. ſuec.* 2231. *Müll. zool. dan. prodr.* 3051. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 436. *n.* 445. *Soland. et Ellis corall. p.* 12. *n.* 2. *t.* 2. *f.* 8.

Hort. Cliff. 480. Millepora membranacea flexilis ramoſiſſima, ramis diſtinctis planis obtuſis.

Pallas el. zooph. p. 52. *n.* 16. Eſchara cruſtaceo-frondeſcens ſpongioſa, fronde cuneiformi multifida retuſa, cellulis ringentibus arcuatis utrinque ſpinula auritis.

Ellis

Ellis corall. p. 70. *n.* 29. *f.* a. A. B. C. E. Broad-leaved Horn-wrack.
C. Bauh. pin. p. 367. Porus cervinus Imperati.
J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 799. Alga marina platyceratos poroſa.
Plukn. almag. p. 119. Corallinae affinis platyphyllos telam ſericeam textura ſimilans.
Moriſ. hiſt. pl. 3. *p.* 646. *ſ.* 15. *t.* 8. *f.* 16. Muſcus marinus ſcrupoſus albidus telam ſericeam textura ſua aemulans.
Raj. ſyn. p. 42. *n.* 9. *Tournef. inſt.* 1. *h. p.* 568. *t.* 334. Fucus telam lineam ſericeamve textura aemulans.
Juſſieu act. Pariſ. 1742. *p.* 298. *t.* 10. *f.* 3.
Habitat in Oceano *ſeptentrionali, et* mari mediterraneo *ad dimidium pedem usque longa, digitum minimum lata, ſubgriſea, utplurimum albeſcens, utrinque poroſa.*

truncata. 2. Fl. foliacea ſubdichotoma: laciniis linearibus truncatis. *Müll. zool. dan. prodr.* 3052.
Soland. et Ellis corall. p. 11. *n.* 1. Fluſtra foliacea dichotoma: laciniis linearibus truncatis, tubulis radicalibus inſtructa.
Pallas el. zooph. p. 56. *n.* 19. Eſchara (ſecurifrons) fronde radicata dichotoma margine prolifera, laciniis cuneiformibus bipartitis truncatis, cellulis longiſſimis ringentibus.
Ellis corall. p. 69. *t.* 28. *f.* a. A. B. Narrow-leaved Hornwrack.
Raj. ſyn. p. 43. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *p.* 646. *ſ.* 15. *t.* 8. *f.* 17. Fucus marinus ſcrupoſus albidus anguſtior compreſſus, extremitatibus quaſi abſciſſis.
Habitat in Oceano europaeo, *et* mari mediterraneo, 5 *circiter pollices longa, utrinque poroſa, fragilis, flaveſcens, vel ex flavicante fuſca, vel mediae tincturae, cellulis ex oblongo quadratis.*

piloſa. 3. Fl. foliacea varie ramoſa: poris infimo dente ſetaceo. *Fn. ſuec.* 2233. *Müll. zool. dan. prodr.* 3053.
Soland. et Ellis corall. p. 13. *n.* 3. Fluſtra foliacea varie ramoſa, poris ſetaceis.
Pallas el. zooph. p. 50. *n.* 15. Eſchara cruſtaceo-frondeſcens ſpongioſa, cellulis obconicis novemdentatis piliferisque.
Ellis corall. p. 73. *t.* 31. Irregular ſpongy foliaceous Coralline.
Amoen. acad. 1. *p.* 105. *n.* 20. *f.* 19. Millepora membranacea plana, punctis quincuncialibus.

Reaum. act. Pariſ. 1712. *p.* 42. *t.* 5. *f.* 10. Corallina.
Loefling act. Stockh. 1752. *p.* 118. *t.* 3. *f.* 1-4. Millepora cruſtacea plana adnata punctis quincuncialibus.
Seb. muſ. 3. *t.* 100. *f.* 10.
Habitat in Oceano *ſeptentrionali, et* mari mediterraneo, *fucos, ſertularias incruſtans, utrinque poroſa, albida, madida per integras noctes manu tractata egregie ſcintillans.*

chartacea. 7. Fl. papyracea utrinque cellifera: ſummitatibus ſecuris aciei inſtar truncatis. *Soland et Ellis corall. p.* 13. *n.* 4.
Habitat ad Angliae *littora, tenuis, ſubpellucida, dilute ſtraminea, interdum ſubdigitata, cellulis prominulis ex oblonga quadratis.*

carbaſea. 8. Fl. foliacea dichotoma, cellulis uno ſtrato diſpoſitis. *Soland. et Ellis corall. p.* 14. *n.* 5. *t.* 3. *f.* 6. 7.
Habitat ad Scotiae *littora, ex fuſceſcente lutea, cellulis majoribus medio ſubpellucidis, ſupra ovatis, medio anguſtatis, infra truncatis.*

bombycina. 9. Fl. frondeſcens, frondibus obtuſis dichotomis et trichotomis confertis radicantibus uno tantum ſtrato celluloſis. *Soland. et Ellis corall. p.* 14. *n.* 6. *t.* 4. *f.* b. B. B 1.
Habitat in Oceano Americam *mediam et* Indiam *alluente.*

verticillata. 10. Fl. adnata, ſaepe frondeſcens, frondibus linearibus ſubcompreſſis baſi attenuatis, cellulis turbinatis ciliatis, ſeriebus altera ſuper alteram diſpoſitis. *Soland. et Ellis corall. p.* 15. *n.* 7. *t.* 4. *f.* a. A.
Habitat in mari mediterraneo, *fucis adhaerens, cellulis ſemipellucidis punctulatis.*

dentata. 11. Fl. plano-foliacea adnata hinc cellulis ſubovalibus nitidis, oſculis dentatis inclinatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 15. *n.* 8.
Ellis corall. p. 73. *t.* 29. *f.* D. D 1. *et act. angl.* 48. *p.* 630. *t.* 22. *f.* 4. D.
Habitat ad magnae Britanniae *littora, fucis teſtaceisque adhaerens, alba, ſemipellucida.*

bullata. 12. Fl. adnata, cellulis ovatis exſtantibus albis, oſculis rotundis ſpinulis armatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 16. *n.* 9.
Ellis corall. t. 30. *f.* d. D.
Habitat ad Angliae *littora, fucos incruſtans.*

13. Fl.

arenoſa. 13. Fl. cruſtacea arenoſa lutoſa, poris ſimplicibus ſubquincuncialibus. *Soland. et Ellis corall. p.* 17. *n.* 10.
Pallas el. zooph. p. 37. *n.* 5. Eſchara (lutoſa) cruſtacea arenaceo-lutoſa, poris ſimpliciſſimis ſubquincuncialibus.
Ellis corall p. 74. *t.* 25. *f.* e. Engliſh ſande Millepora.
Raj. ſyn. p. 31. Eſchara millepora arenoſa anglica.
Habitat ad Angliae *littora, et in* mari mediterraneo, *ſicca perquam friabilis, an hujus generis; an lorica marina imperati?*

tomentoſa. 14. Fl. incruſtans mollis tomentoſa, cellulis inconſpicuis. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 24. *t.* 95. *f.* 1. 2.
Habitat in maris balthici *et* ſeptentrionalis *fucis et ſertulariis.*

dentata. 15. Fl. incruſtans, cellulis diſcretis ovalibus: marginibus oppoſitis tridentatis, ore marginato. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 24. *t.* 95. *f.* 1. 2.
Habitat in maris ſeptentrionalis *fucis, buccinis.*

tubuloſa. 16. Fl. adnata membranacea, cellulis ſimplicibus ovato-oblongis, oſculis tubuloſis erectis. *Soland. et Ellis corall. p.* 17. *n.* 11.
Habitat ad littora inſulae S. Dominici, *fucis adhaerens, ſemipellucida, obſcure flavicans.*

hiſpida. 17. Fl. frondeſcens ſpongioſa, frondibus ramoſis hinc muricatis, cingulis hiſpidiſſimis. *Pallas el. zooph. p.* 49 *n.* 14.
Habitat rariſſima in mari mediterraneo *ſubpollicaris, pallide griſea.*

frondiculoſa. 18. Fl. frondeſcens, frondibus obtuſis trichotomis confertis uno tantum ſtrato celluloſis. *Pallas el. zooph. p.* 55. *n.* 17.
Seb. muſ. 3. *t.* 96. *f.* 6.
Habitat in Oceano indico, *dimidii pugni magnitudine, albida, bullis griſeis.*

papyracea. 4. Fl. cruſtaceo frondeſcens, fronde cuneiformi multifida unilamellata, cellulis oblongo-rhombeis ſummitate ringentibus. *Pallas el. zooph. p.* 56. *n.* 18.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1301. *n.* 4. Fluſtra plano-foliacea ramoſa adnata hinc cellulis rhombeis.
Marſ. hiſt. mar. t. 6. *f.* 25. 26. Porus cervinus Imperati.
Cavol. pol. mar. 3. *p.* 247 *t.* 9. *f.* 10.
Habitat in mari mediterraneo, *lichenis umbilicati ſtatura, flaveſcens, altera pagina ſcabriuſcula.*

hirta. 19. Fl. plana coriacea adnata, hinc cellulis coarctatis diſtantibus ciliatis.
O. *Fabr. Fn. groenl. p.* 438. *n.* 448. Fluſtra hiſpida.
Habitat frequens in maris Groenlandiam *alluentis fucis nodoſis, fulva, cellulis anguſtis, ſicca, fragilis.*

membranacea. 5. Fl. plano-foliacea indiviſa adnata, hinc cellulis quadrangulis oblongis. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 163. *t.* 117. *f.* 1. 2. *prodr.* 3054. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 337. *n.* 446.
Soland. et Ellis corall. p. 18. *n.* 12. Fluſtra plano-foliacea indiviſa adnata, hinc cellulis quadrangulis oblongis, ad angulos ſuperiores prominulis mucronatis.
Habitat in mari anglico, balthico, *maxime* ſeptentrionali, *lapidibus, teſtaceis, fucis adhaerens, tenuiſſima, cinerea, vel albicans.*

lineata. 6. Fl. plano foliacea indiviſa adnata, hinc cellulis ovalibus. *Müll. zool. dan. prodr.* 3055. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 437. *n.* 447.
Habitat in Oceani *fucis, membranaceae ſimillima, at cellulis ovalibus, approximatis, octodentatis transverſim ſeriatis, ſpatio inter ſingulas ſeries latitudine cellularum vacuo.*

345. TUBULARIA. *Animal* vegetans radicatum, capite tentaculis criſtato, ovula generans.

Stirps tubuloſa cornea ſimpliciſſima vel ramoſa, imo affixa, apice animal exſerens.

cornucopiae. 9. T. tubo ſimplici inferne attenuato flexuoſo rugoſoque. *Pallas el. zooph. p.* 80. *n.* 37.
Cavol. pol. mar. 3. *p.* 250. *t.* 9. *f.* 11. 12.
Habitat in maris americani *et* mediterranei *coralliis, lutea, per totam longitudinem rugis annulata, ſparſa vel aggregata.*

indiviſa. 1. T. culmis ſimpliciſſimis geniculis contortis.
Pallas el. zooph. p. 81. *n.* 38. Tubularia (calamaris) tubulis

lis aggregatis ſimplicibus laeviuſculis infra implexis ſub-proliferis.

Soland. et Ellis corall. p. 31. *n.* 1. Tubularia tubulis ſimpliciſſimis aggregatis, ſurſum leviter dilatatis, baſi attenuatis implexis.

Ellis corall. p. 31. *n.* 2. *t.* 16. *f.* C. *et act. angl.* 48. *t.* 17. *f.* D? Corallina tubularia calamos avenaceos referens.

Bocc. muſ. p. 258. *t.* 6. *f.* 5. Fucus vermiculatus.

Raj. ſyn. p. 31. *n.* 4. Adianti aurei minimi facie planta marina.

Lhwyd act. angl. 28. *p.* 275. *t.* 6. *f.* 7. Adiantum aureum marinum.

Juſſieu act. pariſ. 1742. *p.* 296. *t.* 10. *f.* 2.

Baſter op. ſubſ. 1. *t.* 2. *f.* 3. 4.

Habitat in mari europaeo, *et* mari mediterraneo, *tubulis culmorum avenaceorum craſſitie*, 2-2½ *pollices longis, corneis, rigidulis, ex luteo griſeis, laevibus.*

ramoſa. 2. T. culmis ramoſis, geniculis contortis. *Fn. ſuec.* 2229.

Pallas el. zooph. p. 84. *n.* 41. Tubularia (trichoides) tubulis ſimplicibus longis tenuiſſimis alterne ramoſis paſſimque annulatis.

Soland. et Ellis corall. p. 31. *n.* 2. Tubularia tubulis ramoſis, axillis ramulorum contortis.

Müll. zool. dan. prodr. 3067. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 441. *n.* 451. Fiſtularia ramoſa.

Ellis corall. p. 31. *n.* 3. *t.* 16. *f.* A. *et t.* 17. *f.* A. Corallina tubularia gracilis et ramoſa, axillis ramulorum contortis.

Habitat in Oceano europaeo, *tubulorum mollium ſordide griſeorum aliquot pollices interdum longitudine aequantium ſegetibus denſiſſimis.*

ramea. 10. T. tubis compoſitis ramoſis: ramis ramulisque alternis. *Pallas el. zooph. p.* 83. *n.* 40.

Habitat in mari mediterraneo, *tubulis rigido-corneis ex fuſco griſeis.*

fiſtuloſa. 3. T. culmis dichotomis articulatis: impreſſionibus rhombeis. *Fn. ſuec.* 2232. Fluſtra fiſtuloſa.

Pallas el. zooph. p. 61. *n.* 21. Cellularia (Salicornia) geniculata dichotoma, articulis oblongo-cylindricis, cellulis undique rhombeis.

Soland. et Ellis corall. p. 26. *n.* 13. Cellaria farciminoides.

Ellis

Ellis corall. p. 46. *t.* 23. Bugle Coralline.
Raj. hiſt. p. 65 *J. Bauh. hiſt. pl.* 3. *p.* 811. *Tournef. inſtr. h. p.* 570. Corallina fiſtuloſa fragilis craſſior.
Pluckn. phytogr. t. 26. *f.* 3. Corallina fiſtuloſa, fragilis, internodiis praelongis laevibus albis, farciminum modo concatenatis.
Barrel. pl. ic. 1275. *n.* 7. Muſcus polygonoides ſalicorniae forma, ſ. bifidus major.
Ellis corall. p. 46. *n.* 1. *t.* 23. *f.* A.
β) *Raj. hiſt. p.* 66. *J. Bauh. hiſt. pl.* 3. *p.* 811. *Tournef inſt.* 1. *h. p.* 570.
Petiv. pl. ital. t. 2. *f.* 9. Corallina fiſtuloſa fragilis ſubtilior.
Boccon. muſ. p. 255. Muſcus corallinus rotundus exilis articulatus ramoſus italicus.
Barrel. pl. 1275. *n.* 8. Muſcus polygonoides tenuior.
Habitat in mari europaeo, mediterraneo, atlantico, 3 *circiter pollices alta, fili groſſioris craſſitie, interdum tripla, pallide griſea.*

fragilis. 4. T. culmis dichotomis, articulis compreſſis.
Pallas el zooph. p. 430. *n.* 12. Corallina (tubuloſa) tubuloſa ſubannulata dichotoma divaricata.
Pluckn. almag. p. 118. *phytogr. t.* 168. *f.* 4. Corallina fiſtuloſa flexilis geniculata mollis americana, ſegmentis latis et compreſſis.
Sloan. jam. cat. p. 5. *hiſt.* 1. *p.* 61. *n.* 28. *t.* 30. *f.* 10. Fucus marinus coralloides minor fungoſus albidus teres, ſegmentis in ſummitate planis.
Habitat in mari americano, *corallinae facie, tubulis culmi graminei craſſitie, albis vel viridulis, fragiliſſimis, papyraceo-calcareis.*

muſcoides. 5. T. culmis ſubdichotomis totis annuloſo-rugoſis. *Fn. ſuec.* 2230.*
Pallas el. zooph. p. 82. *n.* 39. Tubularia tubulis aggregatis ſimplicibus radiatis hinc inde annuloſis.
Soland. et Ellis corall. p. 31. *n.* 2. Tubularia (Larynx) tubulis ſimplicibus aggregatis, hinc inde annuloſo-rugoſis inferne attenuatis.
Müll. zool. dan. prodr. 3068. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 441. *n.* 451. Fiſtularia ramoſa.
Ellis corall. p. 30. *n.* 1. *t.* 16. *f.* 6. *act angl.* 48. *t.* 17 *f.* C.
Baſter op. ſubſ. 1. *p.* 28. *t.* 2 *f.* 3. *f.* 3. 4. *et t.* 3. *f.* 2-4. Corallina tubularia laryngi ſimilis.
Seb. muſ. 3. *t.* 106. *f.* 7.

Habitat

Habitat in mari europaeo *et* mediterraneo, *ab oniſco phthiſico ſaepe devaſtata, pallide griſea, tubulis pollice vix longioribus, filo vix craſſioribus.*

papyracea. 11. T. tubulo papyraceo maximo, alternatim ramoſo. *Pallas el. zooph. p.* 88. *n.* 45.

Habitat in Oceano indico, *erecta, intus albiſſima, craſſitie aequali calami anatini; an hujus generis?*

Penicillus. 12. T. tubulis aggregatis ſimplicibus radicatis apice proliferis penicillatisque. *Pallas el. zooph. p.* 87. *n.* 44.

Habitat in mari americano, *tubulis albis, ſemipellucidis, pollice fere longioribus, craſſitie calami avenacei, totis annuloſis, an hujus generis?*

Acetabulum. 6. T. culmis filiformibus, pelta terminali ſtriata radiata calcarea.

Syſt. nat. X. 1. *p.* 793. *n.* 17. Madrepora Acetabulum.

Hort. Cliff. p. 480. Sertularia caule ſimplici, umbraculo orbiculato peltato.

Pallas el. zooph. p. 430. *n.* 13. Corallina (Androſace) tubuloſa ſimplex pelta terminali radiata.

Lobel ic. p. 387. Androſaces, Cotyledon folioſum marinum.

C. Bauh. pin. p. 367. Androſaces petrae innaſcens.

Besl. muſ. t. 27. Herba marina androſaces.

Tournef. inſt. 1. h. *p.* 569. *t.* 338. Acetabulum marinum.

Mercat. metallotb. arm. 6. c. 23. 24. *p.* 135. 136. Plantula lapidea ſcutulata.

Donat. adr. p. 28. *n.* 2. *t.* 3. Callopilophorum Matthioli.

Cavol. pol. mar. 3. *p.* 254. *t.* 9. *f.* 14.

β) *Brown. jam.* 74. *t.* 40. *f.* A. Acetabulum caule ſimplici, cyatho ſtriato et quaſi ſubcalyculato.

Habitat in mari mediterraneo, americano, *alba, mollis, ſiccitate fragiliſſima, lapidibus, teſtaceisque adnata, tubulis ſimpliciſſimis, fili craſſitie, ſubbipollicaribus; nonne potius corallinis adſcribenda?*

Splachnea. 7. T. culmis capillaribus ſimpliciſſimis, pelta terminali laevi membranacea.

Habitat in mari mediterraneo, *cornei coloris, tubulis pluribus ex eadem radice ſetae equinae craſſitie, 2 pollices altis, flexilibus, pelta flexili.*

13. T.

Huic generi inſerendum quoque videtur ens organicum, a Wartmanno *et* Girtannero *in ſpongia friabili notatum.*

Coryna. 13. T. ſubramoſa filiformis papyracea geniculata capſulis ovato-acuminatis ore dilatabili pertuſis et tentaculis cylindricis armatis terminata.

Gaertn. apud Pallas ſpic. zool. 10. *p.* 40. *t.* 4. *f.* 8. Coryne puſilla.

Habitat ad Belgii *et* Angliae *littora, ſine radiculis fucis et ſertulariis adhaerens, arenacea vel ſaturate rubra, baſi anguſtior, neque capite neque tentaculis retractilibus, capſulis per omnem ſuperficiem perforatis pro tentaculis hyalinis apice globoſis, ad baſin oviferis.*

affinis. 14. T. ſimplex ſubannulata mollis: tentaculis oris papillam retractilem cingentibus attenuatis. *Pallas ſpic. zool.* 10. *p.* 36. 41. *t.* 4. *f.* 9.

Habitat ad Angliae Holſatiae*que littora, fucis gregatim adhaerens, Corynae affinis, capſulis tentaculis muricatis, ad baſin ſaepe ovigeris.*

Fabricia. 15. T. ſtellata, cirris pinnatis, ſex radiis os cingentibus. *Müll. zool. dan. prodr.* 3066. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 440. *n.* 450. *f.* 12.

Habitat in Norwegiae *et* Groenlandiae *littore, ſaepius in fiſſuris rupium, extra tubulum ingredi neſcia, ſub fluxu maris cirros ſupra tubulum expandens, vix 6 lineis longior, tubulo erecto, verme triplo longiore, griſeo, viridi vel albo, verme ſordide viridi, cauda tamen pallida cirriſque albis, transverſim ſulcato tereti medio craſſiore.*

longicornis. 16. T. cirris duobus ſetaceis tubulo decuplo longioribus. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 3070. Fiſtularia longicornis.

Habitat - - - -

multicornis. 17. T. cirris ultra viginti centro candido, corpore tereti hyalino, tubulo macido.

Müll. zool. dan. 3. *p.* 15. *t.* 90. *f.* 1-3. *prodr.* 3071. Fiſtularia multicornis.

Habitat - - - -

campanulata. 8. T. criſta lunata, orificiis vaginae annulatis, corpore intra vaginam abſcondito. *Blumenb. Naturg. p.* 441. *n.* 2.

Syſt. nat. X. *p.* 817. Hydra campanulata.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1303. *n.* 8. Tubularia reptans, tubis campanulatis.

Pallas el. zooph. p. 85. *n.* 43. Tubularia (gelatinoſa) mollis griſea linearis alterne ramoſa.

Roeſel

Roeſel Inſ 3. polyp. p. 447. t 73-75. Federbuſch-polypen.
Habitat in Europae *aquis ſtagnantibus, cirris fere* 60.

repens. 18. T. criſtata, cirris utrinque radiatis, vagina porrecta, tubulo opaco procumbente. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 16. *n.* 150. *zool. dan. prodr.* 3064.
Fn. ſuec. 2219. Tubipora corallio repente filiformi dichotomo, tubis flexilibus cylindricis erectis diſtantibus.
Schaeff. Armpol. 1754. *t.* 1. *f.* 1. 2.
Habitat in Europae *magis borealis aquis ſtagnantibus, nymphaeae folia cauleſque ſaepe obſidens, gelatinam albam ſimulans, tubulis ſubcylindricis fuſcis, baſi anguſtatis, apice craſſioribus, verme ipſo hyalino.*

reptans. 19. T. criſta lunata, corpore extra vaginam tractili. *Blumenb. Naturg. p.* 440. *n.* 1.
Pallas el. zooph. p. 85. *n.* 42. Tubularia (cryſtallina) mollis hyalina multifido-palmata, laciniis polypiferis.
Trembl. polyp. 3. *p.* 209. *t.* 10. *f.* 8. 9. Polypi criſtati.
Baker microgr. p. 308. *t.* 12.
Bäck act. Stockh. 8. *p.* 203. *t.* 6. *f.* 5. 6.
Habitat in aquis Europae *ſtagnantibus, hyalina, mollis, ciliis circiter* 60.

Sultana. 20. T. criſta infundibuliformi ad baſin ciliata. *Blumenb. Naturg. p.* 441. *n.* 3.
Habitat in Goettingae *ſtagnis, cirris circiter* 20 *faſtigiatis.*

ſtellaris. 21. T. criſtata, cirris pectinatis, tubulo fuſco annulato erecto.
Müll. hiſt. verm. I. 2. *p.* 18. *zool. dan. prodr.* 3065.
Habitat in maris balthici *fuco, minimo aquae motu territa cirros ſubtiliſſimos candidos pro lubitu flexiles et extenſiles in tubulo duplo longiori recondens.*

ſimplex. 22. T. cirris octo linearibus, tubulo conico hyalino. *Müll. verm.* I. 2. *p.* 19. *von Würm. p.* 153.
Müll. zool. dan. prodr. 3069. Fiſtularia ſimplex.
Habitat frequens in maris norwegici *fuco nodoſo, tubulis erectis ſolitariis, verme hyalino, cirris albis, aqua leviſſime mota in vaginam, ea fortius mota vagina in tubulum retracta.*

Spallanzani. 23. T. cirris quinis plumoſis utrinque pectinatis, tubulo cylindrico corneo inferne incurvo. *Spallanz' act. ſoc. ital.* 2.
Habitat in maris mediterranei *locis pacatioribus.*

membranacea. 24. T. tentaculorum fiſtuloſorum ordine duplici concentrico, tubulo membranaceo contractili viſcido cylindrico incolam ſuperante. *Spallanz. act. ſoc. ital.* 2.

Habitat in maris mediterranei *locis magis pacatis; utrum hujus, an diſtincti generis?*

346. CORALLINA. *Animal* creſcens habitu plantae.

Stirps fixa e tubis capillaribus per cruſtam calcaream poroſam ſeſe exſerentibus compoſita.

Rami ſaepe articulati ſemper ramuloſi vel divaricati, liberi vel conglutinati et connexi.

tridens. 9. C. trichotoma articulata: articulis compreſſis planis trilobis. *Soland. et Ellis corall. p.* 109. *n.* 1. *t.* 20. *f.* a.

Habitat in mari Americam *alluente.* Greg.

Opuntia. 1. C. trichotoma, articulis compreſſis ſubreniformibus.

Hort. Cliff. 480. Sertularia ramoſiſſima, articulis reniformibus.

Pallas el. zooph. p. 420. *n.* 2. Corallina trichotoma articulata, articulis planis reniformibus concatenatis.

Soland. et Ellis corall. p. 110. *n.* 2. *t.* 20. *f.* b. Corallina trichotoma articulata, articulis compreſſis undulatis reniformibus.

Ellis corall. p. 53. *t.* 25. *f.* b. B. B. 1. Articulated Coralline of Jamaica.

Pluckn. alm. p. 118. *phytogr. t.* 26. *f.* 1. Corallina latifolia ſ. opuntia marina Cortuſi.

Petiv. pterigr. t. 20. *f.* 19. Corallina opuntioides minor.

Sloan. jam. cat. p. 4. *hiſt.* 1. *p.* 57. *n.* 16. *t.* 20 *f.* 2. Corallina opuntioides, ramulis denſioribus et foliis magis ſinuatis atque corrugatis.

Bocc. muſ. 1. *p.* 219. Muſcus marinus candidus denticulatus

C Bauh. pin. p. 364. Fucus folio ſubrotundo.

J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 862. Scutellaria ſ. opuntia marina.

Imper. hiſt. nat. p. 854. Sertolaria.

Cluſ. hiſt. plant. 2. *p.* 250.

Habitat

Habitat in mari americano, mediterraneo, *alba*, *in illo ramoſiſſima articulis minoribus*, *in hoc minus ramoſa articulis majoribus.*

Monile. 10. C. trichotoma articulata, articulis inferioribus compreſſis convexis cuneiformibus oblongis, ſuperioribus ſubcylindricis. *Soland. et Ellis corall. p.* 110. *n.* 3. *t.* 20. *f.* C.
Habitat ad Jamaicae *littora.*

incraſſata. 11. C. trichotoma articulata, articulis compreſſis convexo-planis cuneiformibus. *Soland. et Ellis corall. p.* 111. *n.* 4. *t.* 20. *f.* d. d 1-3. D 1-6.
Ellis corall. p. 53. *t.* 25. *f.* A. a.
Habitat ad Jamaicae *inſularumque vicinarum littora.*

Tuna. 12. C. trichotoma articulata, articulis compreſſis planis ſubrotundis. *Soland. et Ellis corall. p.* 111. *n.* 5. *t.* 20. *f.* e.
Parkinſ. theatr. p. 1294. *f.* 12. *Marſ. hiſt. mar. p.* 65. *t.* 7. *f.* 31. Opuntia marina.
Habitat in mari mediterraneo.

Nodularia. 13. C. trichotoma ramoſiſſima, articulis craſſis cuneiformibus, diviſurarum latioribus, terminalibus tricuſpidatis ovatisve. *Pallas el. zooph. p.* 421. *n.* 3.
Imper. hiſt. nat. p. 652. Nodularia alba.
C. Bauh. pin. p. 364. Muſcus coralloides, ſquamulis loricatus.
Habitat in mari mediterraneo, *ſeſquipedalis, craſſiſſima, lapidoſa; alba.*

ſquamata. 14. C. trichotoma, articulis ſtirpium rotundato-compreſſis cuneiformibus, ramulorum compreſſis planis, ultimis complanatis ancipitibus acutis. *Soland. et Ellis corall. p.* 117. *n.* 18.
Fn. ſuec. 2235. Corallina bipinnata, articulis obovatis compreſſis.
Ellis corall. p. 49. *t.* 24. *n.* 4. *f.* c. C. Upright engliſh Coralline with Spear-like Heads and flat Joints.
Habitat ad Cornubiae *littora*, *coloris thalaſſini.*

loricata. 15. C. trichotoma articulis compreſſis convexiuſculis cuneiformibus: lateribus angulatis, ultimis ſublobatis: lobis parvis obtuſis. *Soland. et Ellis corall. p.* 117. *n.* 19.
Habitat in mari mediterraneo, *officinali major et quadruplo craſſior.*

palmata. 16. C. trichotoma, articulis compreſſis convexiuſculis cuneiformibus apice ſubcorniculatis: ultimis latis lobis digitiformibus inſtructis. *Soland. et Ellis corall. p.* 118. *n.* 20. *t.* 21. *f.* a. A.

Habitat in mari Americam *alluente, nitens, nivea.*

elongata. 17. C. trichotoma, articulis ſtirpium ſubtereti-cuneiformibus, ramorum cylindricis, ſummis obtuſiuſculis, nonnullis capitatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 119. *n.* 22.

Ellis corall. p. 49. *t.* 24. *f.* 3. Slender trailing engliſh Coralline.

Habitat ad Cornubiae littora, *rubella vel purpuraſcens, officinali gracilior.*

ſubulata. 18. C. trichotoma, articulis ſtirpium ancipitibus cuneiformibus ex apice utriusque lateris proliferis, ramulis brevibus ſubulatis: articulis teretibus. *Soland. et Ellis corall. p.* 119. *n.* 23. *t.* 21. *f.* b. B.

Habitat in mari, Americam *mediam alluente, alba, anguſtiſſima, tenerrima, complanata.*

granifera. 19. C. trichotoma, articulis ſtirpium compreſſis cuneiformibus, ramulorum ſubteretibus, ovariis ovalibus pedunculatis oppoſitis, interdum proliferis. *Soland. et Ellis corall. p.* 120. *n.* 24. *t.* 21. *f.* c. C.

Habitat in mari mediterraneo, *ad* Africae *littora, tenera, coloris thalaſſini.*

officinalis. 2. C. ſubbipinnata, articulis ſubturbinatis. *Fn. ſuec.* 2234. *Müll. zool. dan. prodr.* 3056. *act. Havn.* 10. *t.* c. *f.* 7.

Pallas el. zooph. p. 422. *n.* 4. Corallina bipinnata articulis ovatis, ſuperioribus compreſſis, terminalibus ovato-lanceolatis planis.

Soland. et Ellis corall. p. 118. *n.* 21. *t.* 23. *f.* 14. 15. Corallina trichotoma articulis ſtirpium ſubcompreſſis ſubcuneiformibus, ramulorum cylindricis, terminalibus nonnullis capitatis.

Ellis corall. p. 48. *t.* 24. *n.* 2. *f.* a. A. A. 1. A. 2. B. B. 1. B. 2. Coralline of the ſhops.

Lobel ic. 2. *p.* 240. *Chabr. ſtirp. p.* 577. *J. Bauh. hiſt. pl.* 3. *p.* 818. *Raj. hiſt. p.* 65. *ſyn. p.* 33. *n.* 1. *Tournef. inſt.* 1. h. *p.* 577. *t.* 338. A. *Dale harvic.* 338. *pharmac. p.* 112. *Ruſſel aq. mar. tit. f.* 3. Corallina.

Tabernaem. herb. p. 813. Corallina altera.

Parkinſ. theatr. 1296. Corallina alba officinarum.

Johnſ.

Johnſ. merc. bot. p. 30. *it. cantabr.* 2. *p.* 3. *Merret. pin. p.* 30. Corallina pennata longior.

Pluckn. alm. p. 118. *phytogr. t.* 48. *f.* 4. Corallina magis erecta pennata eburneo nitore candicans.

Moriſ. hiſt. pl. 3. *p.* 651. *ſect.* 15. *t.* 9. Corallina ſ. muſcus marinus tenui capillo, ſpermophoros.

C. Baub. p. 363. Muſcus maritimus ſ. Corallina officinarum.

Barrel. ic. 1276. *n.* 1. Muſcus corallinus filicinus.

Seb. muſ. 3. *t.* 100. *f.* 13-15.

Habitat in Oceano europaeo, *et* mari mediterraneo, 4 *et plures pollices longa, fili groſſioris craſſitie, alba, vireſcens, flavicans, vel rubella, inter vermifuga relata.*

pinnata. 20. C. ramis pinnatis continuis furfuraceis. *Soland. et Ellis corall. p.* 117. *n.* 17.

Habitat ad inſularum Bahamenſium *littora.*

rubens. 3. C. dichotoma capillaris faſtigiata: articulis ſuperioribus elevatis. *Fn. ſuec.* 2238.

Pallas el. zooph. p. 426. *n.* 7. Corallina filiformis dichotoma faſtigiata, articulis omnibus cylindricis.

Soland. et Ellis corall. p. 123. *n.* 28. Corallina dichotoma filiformis, articulis ſtirpium teretibus, dichotomiae claviformibus, inferioribus nonnullis bicornibus.

Ellis corall. p. 50. *t.* 24. *n.* 5. *f.* c. E. Reddiſh Hair-like Coralline.

Cavol. pol. mar. 3. *p.* 257. *t.* 9. *f.* 16.

Habitat in mari, Angliam *alluente et* mediterraneo, *ad* 2 *pollices longa, rubra.*

criſtata. 21. C. filiformis dichotoma faſtigiata, articulis teretiuncŭlis diviſurarum ſuperiorum clavatis. *Pallas el. zooph. p.* 425. *n.* 6. *Müll. zool. dan. prodr.* 3057.

Soland. et Ellis corall. p. 121. *n.* 26. Corallina dichotoma capillaris, articulis teretibus, ramulis faſciculatis criſtatis, diviſuris penultimis et extremis ovariferis.

Ellis corall. p. 51. *t.* 24. *n.* 7. *f.* F. F. Creſted or Cock's Comb Coralline.

Pluckn. almag. p. 119. *phytogr. t.* 168. *f.* 3. *Sloan. jam. cat. p.* 4. *hiſt.* 1. *p.* 58. *n.* 19. *t.* 20. *f.* 5. Corallina marina capillacea.

J. Baub. hiſt. pl. 3. *p.* 811. Corallinis affinis ſ. muſcus marinus tenui capillo.

C. Baub. pin. p. 363. Muſcus capillaceus, multifido folio, albidus.

Imper. hiſt. nat. p. 652. Villus petraeus ſ. Muſcus marinus.
Barrel. ic. 1296. *f.* 2. Muſcus coralloides cruſtatus.
Habitat in mari ſeptentrionali, mediterraneo, americano, *dimidium ad ſeſquipollicem longa, utplurimum rubens aut purpuraſcens, ſaepe alba, interdum viridis aut flaveſcens.*

ſpermophoros. 22. C. dichotoma capillaris inferne pinnata, articulis cylindricis. *Syſt. nat.* X. 1. *p.* 807.
Soland. et Ellis corall. p. 122. *n.* 27. Corallina dichotoma capillaris, articulis ſubteretibus, diviſuris penultimis et ultimis ovariferis, corniculis terminalibus ſetaceis.
Ellis corall. p. 51. *t.* 24. *n.* 8. *f.* g. G. Seed-bearing Coralline.
Moriſ. hiſt. pl. 3. *p.* 651. *ſ.* 15. *t.* 9. *f.* 9. Corallina muſcoſa.
β) *Ellis corall. t.* 24. *n.* 9. *f.* h. H. H 1.
Habitat ad Cornubiae *littora, utplurimum lactea, vix ultra pollicem longa.*

corniculata. 4. C. dichotoma inferne pinnata, articulis bicornibus. *Fn. ſuec.* 2236.
Pallas el. zooph. p. 424. *n.* 5. Corallina inferne pinnata, extremitate dichotoma.
Soland. et Ellis corall. p. 121. *n.* 25. Corallina dichotoma, articulis ſtirpium bicornibus, ramulorum teretibus.
Ellis corall. p. 50. *t.* 24. *n.* 6. *f.* d. D. White ſlender jointed Coralline.
Habitat ad Cornubiae *littora, et (articulis omnibus bicornibus) in* mari Americam *mediam alluente, in diviſuris extremis interdum ovarifera.*

fragiliſſima. 5. C. dichotoma, articulis filiformibus divaricatis apice baſique latioribus.
Pallas el. zooph. p. 429. *n.* 11. Corallina dichotoma rigida erecta, articulis longis cylindricis coarticulatis.
Soland. et Ellis corall. p. 123. *n.* 29. *t.* 21. *f.* d. Corallina dichotoma, articulis cylindricis aequalibus laevibus, ramis erectis.
Sloan. jam. cat. p. 2. *hiſt.* 1. *p.* 53. *t.* 20. *f.* 1. Corallium minimum capillaceum.
Habitat in mari indico, mediterraneo *et* Americam mediam *alluente, lactea, fragiliſſima, bipollicaris et longior.*

fruticuloſa. 23. C. dichotoma, ramis teretibus continuis furfuraceis: apicibus attenuatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 116. *n.* 16. *t.* 22. *f.* 5.
Habitat ad inſularum Bahamenſium *littora.*

indurata. 24. C. dichotoma, ramis ſubcontinuis teretibus laevibus divaricatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 116. *n.* 15. *t.* 22. *f.* 7.
Habitat ad inſularum Bahamenſium *littora.*

lichenoides. 25. C. dichotoma, ramis continuis rugoſiuſculis ſuperne complanatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 116. *n.* 14. *t.* 22. *f.* 8.
Habitat ad inſularum Bahamenſium *littora, coloris thalaſſini.*

rugoſa. 26. C. dichotoma, articulis annulato-ruguloſis ſubcontinuis cylindricis; apicibus compreſſis. *Soland. et Ellis corall. p.* 115. *n.* 13. *t.* 22. *f.* 3.
Pluckn. phytogr. t. 168. *f.* 4. Corallina geniculata mollis americana, ſegmentis latis et compreſſis.
Sloan. jam. hiſt. 1. *p.* 61. *t.* 20. *f.* 10. Fucus marinus coralloides minor fungoſus albidus teres, ſegmentis in ſummitate planis.
Habitat ad Jamaicae *littora.*

marginata. 27. C. dichotoma, ramis ſubcontinuis laevibus complanatis: marginibus ſubinflexis. *Soland. et Ellis corall. p.* 115. *n.* 12. *t.* 22. *f.* 6.
Habitat ad inſulae Bahamenſis *littus, fibris tenerrimis.*

cylindrica. 28. C. dichotoma, articulis cylindricis ſubaequalibus laevibus. *Soland. et Ellis corall. p.* 114. *n.* 11. *t.* 22. *f.* 4.
Habitat in mari, Americam *mediam alluente.* Greg.

oblongata. 29. C. dichotoma, articulis oblongis ſubcompreſſo-cylindricis. *Soland. et Ellis corall. p.* 114. *n.* 10. *t.* 22. *f.* 1.
Habitat in mari, Americam *mediam alluente, inter obtuſatam et cylindricam media.*

obtuſata. 30. C. dichotoma, articulis oblongo-ovatis utrinque rotundatis ſubcompreſſis. *Soland. et Ellis corall. p.* 113. *n.* 9. *t.* 22. *f.* 2.
Habitat ad inſularum Bahamenſium *littus.*

lapideſcens. 31. C. dichotoma, articulis cylindricis villoſis. *Soland. et Ellis corall. p.* 112. *n.* 8. *t.* 21. *f.* g. *et t.* 22. *f.* 9.
Habitat - - - villis ſubtilibus, brevibus, rubellis, verticillatim ex poris corticis calcarei progerminantibus.

barbata. 6. C. dichotoma, articulis cylindricis, ramulis apice barbatis. *Pallas el. zooph. p.* 428. *n.* 9. *Soland. et Ellis corall. p.* 112. *n.* 7.

Ellis corall. p. 54. *t.* 25. *f.* c. C. Roſary or Bead-Coralline of Jamaica.

Pluckn. almag. p. 118. Corallina fiſtuloſa jamaicenſis candida cum internodiis breviſſimis, noſtratibus Bead-bandſtring.

Sloan. jam. cat. p. 4. *hiſt.* 1. *p.* 58. *n.* 17. *t.* 20. *f.* 3. Corallina major, nervo craſſiori fuciformi intermedia breviora nectente.

Habitat ad Jamaicae *littus, tripollicaris et longior, fili groſſioris craſſitie.*

Roſarium. 32. C. dichotoma, articulis ſubmoniliformibus inferioribus cylindricis. *Soland. et Ellis corall. p.* 111. *n.* 6. *t.* 21. *f.* h. H. H. 1-3.

Sloan. jam. cat. p. 4. *hiſt.* 1. *p.* 58. *n.* 18. *t.* 20. *f.* 4. Corallina nervo tenuiori fragiliorique internodia longiora nectente.

Brown. jam. p. 390. *n.* 3. Corallium brachiatum et articulatum, articulis cylindraceis, nervo tenuiore connexis.

Habitat ad Jamaicae *et vicinarum* inſularum *littus, barbatae affinis.*

cuſpidata. 33. C. ſubtetrachotoma, articulis cylindricis: geniculis tendinaceo glutinoſis, ramulis acutis. *Soland. et Ellis corall. p.* 124. *n.* 30. *t.* 21. *f.* f.

Habitat in mari Americam *mediam alluente, nitidiſſima, alba,* 3 *circiter pollices alta.*

Tribulus. 34. C. ſubpentachotoma, articulis ancipitibus: geniculis tendinaceo-glutinoſis. *Soland. et Ellis corall. p.* 124. *n.* 31. *t.* 21. *f.* e.

Habitat in mari, Americam *mediam alluente, albida, cuſpidatæ craſſior et latior.*

Flabellum. 35. C. ſtipite ſimplici incruſtato, ramis omnibus conglutinatis, fronde flabelliformi incruſtata ſubundulata. *Soland. et Ellis corall. p.* 124. *n.* 32. *t.* 24.

Habitat in mari Americam *mediam alluente, figura et colore a vireſcente fuſco ad lacteum varians, nunc folium reniforme pollicem altum, petiolo dilatato referens, nunc lobata et undulata* 1-5 *pollices alta et lata.*

36. C.

Dubiam, et vexatam a multis animalem corallinae indolem probabilem reddit conſtans, qua obducitur, cortex calcareus poroſus, et ſumma ſpecierum nonnullarum cum milleporis agnatas.

conglutinata. 36. C. ſtipite ſimplici ſubincruſtato, ramis dichotomis omnibus conglutinatis, fronde flabelliformi nuda. *Soland. et Ellis corall. p.* 125. *n* 33. *t.* 25. *f.* 7.
Habitat ad inſularum Bahamenſium *littus*, 1½ *pollicem alta, coloris thalaſſini.*

Phoenix. 37. C. ſtipite ſimplici incruſtato, fronde oblonga, ramis undique faſciculatis erumpentibus complanato-connatis. *Soland et Ellis corall. p.* 126. *n.* 34 *t.* 25. *f.* 2. 3.
Habitat ad inſularum Bahamenſium *littus*, *lactea*, 3½ *pollices alta.*

Penicillus. 7. C. culmo ſimplici, ramis faſciculatis faſtigiatis dichotomis flexilibus continuis.
Amoen. ac. 4. *p.* 257 *t.* 3. *f.* 1. Hydra glomerata.
Pallas el. zooph. p. 428. *n.* 10. Corallina culmo ſtupposo ſimplici, apice penicillato, ramulis confertis dichotomis filiformibus.
Soland. et Ellis corall. p. 126. *n.* 35. *t.* 25. *f.* 4-6. Corallina ſtipite ſimplici incruſtato, ramis faſciculatis faſtigiatis dichotomis filiformibus articulatis.
Seb. muſ. 1. *t.* 1. *f.* 10.
Habitat in mari Americam *medium alluente*, 1-4 *pollices longa, utplurimum alba, filamentorum tubularium ope teſtaceis adhaerens.*

Peniculum. 38. C. ſtipite ſimplici membranaceo ruguloſo, ramis faſciculatis faſtigiatis dichotomis articulatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 127. *n.* 36. *t.* 7. *f.* 5 8. *et t.* 25. *f* 1.
Habitat in mari Americam *alluente, ſurſum dilatata, tubulorum ope adhaerens.*

terreſtris. 8. C. brachiata, articulis cylindricis, fructificationibus lateralibus pedunculatis transverſim ruguſis.
Pallas el. zooph. p. 427. *n.* 8. Corallina oppoſita ramoſa, articulis cylindricis, fructificationibus lateralibus pedunculatis transverſim oblongis.
Meeſe flor. friſ. p. 75. *n.* 503. *t.* 1. Lichen fruticuloſus ramoſus articulatus, articulis longis cylindricis, peltis pedunculatis.
Habitat in Friſiae *ericetis, vix aliquot lineas alta, vix vera, diſtincta, perfecta, bujus generis et regni ſpecies.*

347. SERTULARIA. *Animal* creſcens plantae habitu.
Stirps emittens e cellulis vel denticulis calyciformibus hydras.

* *ſtirpe tubuloſa cornea, denticulis calyciformibus obſita, baſi affixa, veſiculis hydras, ova vel prolem vivam continentibus inſtructa.*

rosacea. 1. S. paniculata, denticulis oppoſitis, tubuloſis truncatis, ramis alternis, veſiculis coronato-ſpinoſis. *Soland. et Ellis corall. p.* 39. *n.* 7.
Pallas el. zooph. p. 129. *n.* 78. Sertularia (Nigellaſtrum) alterne-ramoſa, calyculis oppoſitis tubuloſis, ovariis ovatis truncato-ſexſpinoſis.
Ellis act. angl. 48. *t.* 23. *f.* 5. *et corall. p.* 8. *t.* 4. Lily or Pomgranate flowering Coralline.
Seb. muſ. 3. *t.* 69. *f.* 6.
Habitat in Oceano, *et* mari mediterraneo, *alba, tenera, teſtaceis aliisque zoophytis affixa.*

pumila. 2. S. denticulis oppoſitis mucronatis recurvatis, ovariis obovatis, ramis vagis.
Pallas el. zooph. p. 130. *n.* 79. Sertularia ſubſimplex articulata, calyculis oppoſitis recurvis ſubmucronatis, ovariis ovatis, ore marginato.
Soland. et Ellis corall. p. 40. *n.* 8. Sertularia denticulis oppoſitis mucronatis recurvatis, ovariis ſubrotundis.
Ellis corall. p. 9. *t.* 5. *n.* 8. *f.* a. A. *act. angl.* 48. *t.* 23. *f.* 6. FF. *et* 57. *t.* 19. *f.* 11. Sea-Oak Coralline.
Raj. ſyn. p. 37. *n.* 19 Corallina pumila, repens minus ramoſa, denticulis bijugis.
Reaum. act. Pariſ. 1711. *p.* 279. *t.* 11. *f.* 4. MM.
Seb. muſ. 3. *t.* 100. *f.* 1.
Cavolin. pol. mar. 3. *p.* 216. *t.* 8. *f.* 8-10.
Habitat in Oceano, *fucis, praeſertim ſerrato adhaerens.*

operculata. 3. S. denticulis oppoſitis mucronatis erectiuſculis, veſiculis obovatis operculatis, ramis alternis. *Soland. et Ellis corall. p.* 39. *n* 6.
Pallas el. zooph. p. 132. *n.* 80. Sertularia (usneoides) dichotoma, calyculis oppoſitis bidentatis erectiuſculis, ovariis ovatis operculatisque.

Ellis

Ellis corall. p. 8. *t.* 3 *n.* 6. *f.* b. B. Sea-Hair.

Plukn. almag. p. 119. *phytogr. t.* 47 *f.* 11. *Tournef. inſt. p.* 570. *Raj ſyn. p* 36. *n.* 13. Corallina muſcoſa denticulata procumbens, caule tenuiſſimo, denticellis bijugis.

Raj. hiſt. pl. 3 *p.* 79 Muſcus marinus denticulatus procumbens denticulis bijugis.

Moriſ. hiſt. pl 3 *p.* 650. *ſ.* 15. *t.* 9. *n.* 2. 3. Muſcus marinus lendiginoſus minimus, arenacei coloris et Muſcus marinus procumbens, caule tenuiſſimo, denticellis bijugis.

Bocc. muſ. t. 6. *f.* 8.

Seb. muſ. 3. *t.* 102. *f.* 3.

Habitat in mari europaeo, americano, mediterraneo, *radicibus ſuis in teſtaceis, rarius in fucis defixa, ſurculis ad* 5 *pollices longis, denticulis bicuſpidatis, utrinque ſeta brevi munitis.*

tamariſca. 4. S. denticulis ſuboppoſitis truncato ſubtridenticulatis, veſiculis obovatis bidentatis, ramis alternis. *Fn. ſuec.* 2240.

Pallas el. zooph. p. 129 *n.* 77. Sertularia ſparſe ramoſa, calyculis oppoſitis tubuloſis ſubdenticulatis, ovariis ovato-biſpinoſis, ore tubuloſo.

Soland. et Ellis corall. p. 36. *n.* 1. Sertularia alternatim ramoſa, denticulis oppoſitis tubuloſis crenatis, ovariis ovato truncatis bidenticulatis, ore tubuloſo.

Ellis corall. p. 4. *t* 1. *n.* 1. *f.* a. A. Sea-Tamariſk.

Habitat in mari ſeptentrionali, *in teſtaceis reptans, congenerum maxima, abietinae affinis, ad* 4 *fere pollices longa.*

abietina. 5. S. denticulis ſuboppoſitis tubuloſis, veſiculis ovalibus, ramis pinnato alternis. *Fn. ſuec.* 2241. *Müll. zool. dan. prodr.* 3072. O. *Fabr. Fn. groenl. p.* 442. *n.* 453.

Pallas el. zooph. p. 133. *n.* 81. Sertularia pinnata, pinnis alternis, calyculis ſuboppoſitis ovato-tubuloſis, ovariis oblongis.

Soland. et Ellis corall. p. 36. *n.* 2. Sertularia alternatim pinnata, denticulis ſuboppoſitis ovato-tubuloſis, ovariis ovalibus.

Ellis corall. p. 4. *t.* 1. *n.* 2. *f.* 6. B. Sea-Fir.

Royen prodr. h. Lugdb. p. 524. *n.* 7. Sertularia ramoſiſſima, articulis membranaceis ovatis alternatim ex ſinu alterius enaſcentibus.

Tournef. inſt. p. 571. *Raj. ſyn. p.* 35. Corallina marina abietis forma.

Imper. hiſt. nat. p. 652. Pennaria marina.

Lobel ic. 2. *p.* 250. Muſcus coralloides albus alter.

C. Bauh.

C. Bauh. pin. p. 365. Abieti ſimilis maritima.
Parkinſ. theatr. p. 1301. Abies marina.
Cluſ. hiſt. 35. *Ger. amac.* 1574. Abies marina belgica.
F. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 799. Muſci marini genus foliis pinnatis.
Raj. hiſt. pl. 1. *p.* 78. *Pluckn. almag. p.* 119. *phytogr. t.* 48. *f.* 5. Corallinae affinis abies marina dicta ſ. Muſcus marinus major argute denticulatus.
Moriſ. hiſt. pl. 3. *ſ.* 15. *t.* 9. *p.* 653. Muſcus marinus filicis folio C. B.
Marſ. hiſt. mar. p. 76. *t.* 17. *f.* 59. Muſcus phyllitidi ſimilis.
Baſter op. 2. *t.* 7. *f.* 2. 3.
Habitat in mari europaeo, mediterraneo *et?* indico, *teſtaceis utplurimum adhaerens, crebro ſerpulis obſeſſa, ad* 5 *pollices longa.*

nigra. 43. S. pinnata nigricans, calyculis ſuboppoſitis minutis, veſiculis magnis ſecundis ovato-quadrangulis. *Pallas el. zooph. p.* 135. *n.* 82.
Habitat in Oceano indico? americano? *ad* Cornubiae *littora, mytilo margaritifero ſaepe affixa, ad* 4 *pollices longa.*

fuſceſcens. 44. S. pinnata fuſceſcens, calyculis ſuboppoſitis tubuloſis, veſiculis crebris ſecundis minutis trituberculatis.
Pallas el. zooph. p. 136. *n.* 83. Sertularia pinnata.
Baſt. op. ſubſ. 1. *l.* 1. *t.* 1. *f.* 6.
Habitat in mari Cornubiam *alluente, nigrae affinis et ex griſeo fuſca.*

obſoleta. 45. S. pinnata, pinnis alternis calyculis utplurimum octofariam per quincunces diſpoſitis ovato-ſubcordatis. *Lepechin. act. Petrop.* 1778. 2. *p.* 137. *t.* 7. *f.* B.
Habitat in mari glaciali, *potiſſimum ad littora ſabuloſa promontorii* Canin Nos, *ad* 5 *pollices alta, cornei coloris, articulis ſuperiora verſus obſoletioribus, tandem obſoletiſſimis.*

Pinus. 46. S. pinnata, pinnis ſubalternis cylindricis ob caliculos utplurimum ſexfariam diſpoſitos echinatis, veſiculis utricularibus turgidis ſubdiaphanis: oſculo ſimplici. *Lepechin. act. Petrop.* 1780. 1. *p.* 223. *t.* 9. *f.* 1. 2.
Habitat circa Promontorium Canin Nos maris albi, *fibrillarum ope teſtaceis aut lapillis affixa, cornea.*

cupreſſoides. 47. S. paniculata, ramis dichotomis ſparſis, calyculis vix oſculo prominulo ſimplicibus oblique truncatis, veſiculis ovatis;

ovatis; oſculo ſubtubuloſo, trunco ramisque articulatis: commiſſuris bianuulatis. *Lepechin. act. Petrop.* 1780. I. *p.* 224. *t.* 9. *f.* 3. 4.

Habitat in mari albo, *circa* promontorium Canin Nos, *cupreſſinae affinis, ſubdiaphana ſlavicans, vix dimidium pedem longa.*

cupreſſina. 6. S. denticulis ſuboppoſitis alternis ſubacutis, veſiculis obovatis, ramis paniculatis longiſſimis.

Pallas el. zooph. p. 141. *n.* 89. Sertularia caule paniculato, ramulis dichotomis ſparſis, calyculis ſuboppoſitis mucronatis, ovariis biſpinoſis.

Soland. et Ellis corall. p. 38. *n.* 5. Sertularia denticulis ſuboppoſitis oblique truncatis, ramis paniculatis ſparſis longioribus, ovariis obovatis.

Ellis corall. p. 7. *t.* 3. *n.* 5. *f.* a. A. Sea-Cypreſs.

Seb. muſ. 3. *t.* 101. *f.* 2.

Habitat in maris europaei, *praeſertim* britannici *profundis.*

argentea. 48. S. denticulis ſuboppoſitis mucronatis, veſiculis ovalibus, ramis alternis paniculatis. *Syſt. nat.* X. I. *p.* 809. *n.* 7. *Soland. et Ellis corall. p.* 38. *n.* 4.

Ellis corall. p. 6. *t.* 2. *n.* 4. Squirrel's Tail.

Mercat. pin. p. 29. Corallina comis ad inſtar caudae vulpinae ſparſis.

Raj. ſyn. p. 36. *n.* 7. *Pluckn. alm. p.* 119. *phytogr. t.* 84. *f.* 3. Corallina muſcoſa alterna vice denticulata, ramis in creberrima capillamenta ſparſis.

Bocc. muſ. p. 259. *t.* 6. *f.* 9. Muſcus albus denticulatus maritimus fruticans et exilis ramoſus.

Moriſ. hiſt. pl. 3. *p.* 650. *ſert.* 15. *t.* 9. *n.* 4. Muſcus marinus minor, denticulis alternis bijugis.

Baſter op. ſubſ. I. *t.* I. *f.* I. 2.

Habitat in Oceano europaeo *et* americano, *a cupreſſina vere diſtincta, confervam geniculatam ramoſiſſimam pedalem referens.*

rugoſa. 7. S. denticulis alternis obſoletis, veſiculis rugoſiſſimis tridentatis, ramis vagis. *Soland. et Ellis corall. p.* 52. *n.* 24. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 443. *n.* 454.

Pallas el. zooph. p. 126. *n.* 75. Sertularia ſurculis minutis racemoſis, calyculis paucis ovatis rugoſiſſimis, ovariis rugoſis tridentatis.

Ellis corall. p. 26. *t.* 15. *n.* 23. *f.* a. A. Snail-trefoil Coralline.

Habitat

Habitat in mari europaeo, *fluſtrae foliaceae aliisque ſertulariis adhaerens.*

halecina. 8. S. denticulis alternis obſoletis, calycibus biarticulatis, veſiculis ovalibus, caulibus coadunatis. *Fn ſuec.* 2242. *Müll. zool. dan. prodr* 3073. O. *Fabr. Fn. groenl. p.* 443. *n.* 455.
Pallas el. zooph. p. 113. *n* 64. Sertularia ſcruposa ramoſo-pinnata, ramulis alternis calyculis tubuliformibus, ovariis ſparſis oblongis.
Soland. et Ellis corall. p. 46. *n.* 15. Sertularia ramoſa pinnata, ramulis alternis denticulis tubiformibus biarticulatis, ovariis ovalibus, pedunculis lateraliter coadunatis.
Ellis corall. p. 17. *t.* 10. *act. angl.* 48. *t.* 17. *f.* E. F. G. Herring-bone Coralline.
Raj. ſyn p. 36. *n.* 15. Corallina ſcruposa pennata, cauliculis craſſiuſculis rigidis.
Seb. muſ. 3. *t.* 100. *n.* 16.
Edw. glean. t. 286.
Habitat in mari europaeo, atlantico, mediterraneo, indico, *in teſtaceis reptans, cornea, ex griſeo luteſcens.*

Thuja. 9. S. denticulis diſtichis appreſſis, veſiculis obovatis marginatis, ſtirpe dichotoma diſticha. O. *Fabr. Fn. groenl. p.* 444. *n.* 456.
Pallas el. zooph. p. 140. *n.* 88. Sertularia caule ſimplici paniculato, ramis creberrimis dichotomis acutis, calyculis diſtichis adpreſſis, ovariis ovatis.
Soland. et Ellis corall. p. 41. *n.* 9. Sertularia denticulis diſtichis alternis appreſſis, ovariis ovatis marginatis, caule angulato rigido paniculato, ramulis creberrimis dichotomis attenuatis.
Ellis corall. p. 10. *t.* 5. *n.* 9. *f.* b. B. *et in front.* Bottle bruſh Coralline.
Raj. ſyn. p. 50. *n.* 47. *Sibb. Scot. ill.* 2. *p* 56. *t.* 1. Fucus equiſeti facie, oſtreae teſtae adnatus.
Seb. muſ. 3. *t.* 100. *f.* 17-19. *et t.* 106. *f.* 2. a. Corallina equiſeti forma.
Habitat in mari ſeptentrionali, mediterraneo, *antipathi cupreſſo ſimilis, ad ½ pedem longa.*

Myriophyllum. 10. S. denticulis ſecundis acutis, veſiculis ſecundis cylindricis imbricatis, ſurculis ſemipinnatis incurvatis. *Fn. ſuec.* 2243.
Pallas el. zooph. p. 153. *n.* 96. Sertularia ſimplex pinnata, rhachi interrupta, pinnis ſecundis incurvis, calyculis campanulatis ſtipulatisve.

Soland.

Soland. et Ellis corall. p. 44. *n.* 13. Sertularia pinnata, pinnis alternis, rhachi nodoſa, nodulis externe arcuatis diſtantibus, denticulis ſecundis truncatis ſtipulatisque.

Ellis corall p. 14. *t.* 8. Pheaſant's tail Coralline.

Barrel. ic. plant. 1292. *f.* 2. *Petiv. pl. ital. t.* 2. *f.* 11. Corallina fruticoſa pennata.

C. Bauh. pin. p. 363. Muſcus maritimus, filicis folio.

Moriſ. hiſt. pl. 3. *p.* 650. Muſcus marinus pennatus, ramulis et capillamentis falcatis.

Zanich. monogr. Venet. 1714. *Ginann. adr. t.* 11. *f.* 24. Myriophyllum pelagicum. Aniſocalicum.

Donat. adr. p. 24. Aniſocalicum.

Habitat in Océano, mari mediterraneo, *pallida, ſubcoriacea; 3 circiter pollices longa, rhachin pennae referens, a latere anteriore ſulco exarata, pennata radiis e ſulco alternis, ſimplicibus, approximatis, alterno divaricatis, parallelis, aequalibus, articulatis incurvis, veſiculis ſolitariis e ſingulis radii articulis, a latere incurvato, cylindricis, pellucidis, ramo approximatis, bractea ſubulata ſe dimidio brevioribus.*

hypnoides. 49. S. ſurculis pinnato-ramoſis pinnulatis: pinnulis creberrimis, calyculis ſecundis campanulatis dentatis roſtratisque. *Pallas el. zooph. p.* 155. *n.* 97.

Habitat in Oceano indico, *ſemipedalis, ex fuſco cornea, radiculis luteſcentibus intricatis.*

ſpecioſa. 50. S. pinnata rigida, pinnis ſubſecundis incurvis, calyculis campanulato effuſis dentatis ſtipulatisque. *Pallas el. zooph. p.* 152. *n.* 95.

Habitat in Oceano indico, *ex fuſco cornea, ſurculis creberrimis* 3-4 *pollicum, radiculis tubuloſis faſciculatim implexis gorgoniae adhaerens.*

falcata. 11. S. denticulis ſecundis imbricatis truncatis, veſiculis ovatis, ramis pinnatis alternis. *Fn. ſuec.* 2244.

Pallas el. zooph. p. 144. *n.* 90. Sertularia flexuoſa alternatim ramoſa, ramis pinnatis, calyculis ſecundis contertis tubuloſis, veſiculis ovatis ſparſis.

Soland. et Ellis corall. p. 42. *n.* 11. Sertularia denticulis ſecundis imbricatis truncatis, ovariis ovato-oblongis, ramis pinnatis alternis, caule flexuoſo.

Ellis corall. p. 12. *t.* 7. *n.* 11. *f. a. A. et in front. centr.* Sickle-Coralline.

Raj.

Raj. ſyn. 3. *p.* 36. *n.* 16. *Moriſ. hiſt* 3. *p.* 650. *ſ.* 15. *t.* 9. *f.* 2. *Plukn. alm. p.* 119. *phytogr. t.* 47 *f.* 12 *Tournef. inſt.* 1. h. *p.* 570. Muſcus ſ. Corallina muſcoſa pennata, ramulis et capillamentis falcata.

Merr. pin. p. 81. *Johnſ. merc. bot* 2. *p.* 26. *phyt. brit. p.* 78. Muſcus marinus ſpiralis pennatus

β) *Syſt. nat.* X. 1. *p.* 813 *n* 29. Sertularia ſtipulata.
Ellis corall. t. 38. *f.* 5. 6.

Habitat in Oceano, *et* mari indico, 3 *pollices ad* ½ - 1½ *pedem longa, tubulis capillaribus radicularum vices agentibus.*

Pluma. 12. S. denticulis ſecundis imbricatis campanulatis, veſiculis gibbis criſtatis, ſurculis pinnatis alternis lanceolatis. *Fn. ſuec.* 2245. *Soland. et Ellis corall. p.* 43. *n.* 12.

Pallas el. zooph. p. 149. *n.* 93. Sertularia ſurculis pinnatis falcatis, calyculis ſecundis campanulatis, ovariis gibbis annulatim muricatis criſtatisque.
Ellis corall. p. 13. *t.* 7. *n.* 12. *f.* b. B. Podded Coralline.
Seb. muſ. 3. *t.* 101. *f.* 1. Corallina falciformis.
Bocc. muſ. p. 257. *t.* 6. *f.* 6. Pinnaria marina Imperati.
Mercat. metall. arm. 6. *c.* 19. *p.* 129.
Cavol. ſin. pol. mar. 3. *p.* 210. *t.* 8. *f.* 5.

Habitat in Oceano *omni, radiculis in circulo diſpoſitis fucis adhaerens.*

echinata. 13. S. denticulis oppoſitis ſecundis campanulatis, veſiculis gibbis criſtatis, ſurculis pinnatis alternis lanceolatis. *Fn. ſuec.* 2246.*

Pallas el. zooph. p. 152. *n.* 94. Sertularia pinnata, ramulis bifidis, calyculis oppoſitis ſemicampanulatis, ovariis reticulato-muricatis.

Habitat in mari Sueciam *alluente.*

antennina. 14. S. denticulis verticillato-quaternis ſetaceis, veſiculis oblique truncatis verticillatis, ſtirpibus ſubſimplicibus. *Fn. ſuec.* 2245.

Pallas el. zooph. p. 146. *n.* 91. Sertularia ſurculis ſubſimplicibus verticillatis, ſetulis ſecunde calyculatis, ovariisque axillaribus pedunculatis oblique truncatis.
Soland. et Ellis corall. p. 45. *n.* 14. Sertularia ſurculis ſubſimplicibus verticillatis, ſetulis denticulis ſecundis calyciformibus, ovariis axillaribus pedunculatis oblique truncatis.
Ellis corall. p. 15. *t.* 9. Lobſter's Horn-Coralline or Sea-Board.

Raj.

Raj. ſyn. 3. *p.* 34. *n.* 10. *Petiv. pl. it. t.* 2. *f.* 10. Corallina altaci corniculorum aemula.
Dodon. pempt. p. 476. Muſcus marinus ſecundus.
Bocc. muſ. p. 258. *t.* 6. *f.* 2. Fucus vermiculatus aſper alter, ſ. Polytubuli arterioſi maritimi aſperiuſculi.
Pluckn. almag. p. 119. *phytogr. t.* 48. *f.* 6. Corallinae affinis non ramoſa, arenacei coloris, altacorum corniculi inſtar geniculata.
Raj. hiſt. pl. p. 79. Muſcus marinus equiſetiformis non ramoſus.
Ginann. opuſc. 16. *t.* 11. *f.* 25. Myriophyllum non ramoſum.
Tournef. inſt. 1. h. *p.* 570.
Barrel. pl. ic. 1292. *n.* 3.
β) *Raj. ſyn. p.* 35. *n.* 11. Corallina ramoſa cirris obſita.
Ellis act. angl. 48. *t.* 22.

Habitat in Oceano, *ſaepe fere pedalis, flava, radiculis tubuloſis tenuiſſimis, capillaceis, flaveſcentibus, veſiculis ſolitariis ad ſetarum articulos a latere interiore vel ſuperiore.*

verticillata. 15. S. denticulis obſoletis, veſiculis campanulatis denticulatis erectis, pedunculis longiſſimis contortis quaternis.
Pallas el. zooph. p. 115. *n.* 66. Sertularia ſcrupoſa ſubramoſa, calyculis campanulatis pedunculatis verticillatisque.
Soland. et Ellis corall. p. 53. *n.* 21. Sertularia ſubramoſa, denticulis campanulatis pedunculatis margine dentatis ſuberectis verticillatisque, ovariis ovato-tubuloſis.
Ellis corall. p. 23. *t.* 13. *n.* 20. *f.* a. A. Horſe-tail Coralline with bell-ſhaped Cups.

Habitat in Oceano, *plures pollices longa, tenera et fragilis, denticulis glutinoſis.*

gelatinoſa. 51. S. ſcrupoſo-gelatinoſa ramoſiſſima, ramis decompoſitis divaricatis ſparſis, calyculis campanulatis. *Pallas el. zooph. p.* 116. *n.* 67.
Raj. ſyn. p. 34. *n.* 7. Corallina confervoides gelatinoſa alba, geniculis craſſiuſculis pellucidis.

Habitat in mari Belgium *alluente, geniculatae affinis,* ½ *pedem longa, ex griſeo fuſca, cortice hyalino.*

volubilis. 16. S. denticulis obſoletis, veſiculis campanulatis dentatis alternis, pedunculis longiſſimis contortis ſolitariis. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 444. *n.* 457.

 Pallas

Pallas el. zooph. p. 121. *n.* 70. Sertularia (uniflora) calyculis ſolitariis campanulatis, pedunculis radicatis longiſſimis contortis.

Soland. et Ellis corall. p. 51. *n.* 22. *t.* 4. *f.* e. f. E. F. Sertularia denticulis campanulatis dentatis alternis, pedunculis longiſſimis contortis, ovariis ovatis interdum transverſe rugoſis.

Ellis corall. p. 24. *t.* 14. *n.* 21. *f.* a. A. *act. angl.* 48. *t.* 22. *f.* 2. Small cumbing Coralline with bell-ſhaped cups.

Ellis act. angl. 57. *p.* 437. *t.* 19. *f.* 9. Sertularia uniflora.

Baſt. opuſc. ſubſ. 1. *t.* 2. *f.* 2. a. b. d. *et f.* 3. 4. c. e. *et f.* 7. a. b. c.

Habitat in Oceano, *aliis congeneribus adnata, fluſtris, fucisve, tenera, albida.*

Syringa. 17. S. denticulis obſoletis, veſiculis cylindricis pedunculo integerrimo.

Pallas el. zooph. p. 122. *n.* 71. Sertularia calyculis ſolitariis cylindricis, pedunculis calyculo brevioribus contortis.

Soland. et Ellis corall. p. 52. *n.* 23. Sertularia (repens) dendiculis cylindricis oblique truncatis alternis, pedunculis contortis denticulis brevioribus.

Ellis corall. p. 25. *t.* 14. *f.* b. B.

Habitat in Oceani europaei *ſertulariis, teſtaceis, flaveſcens.*

Cuscuta. 18. S. denticulis obſoletis, veſiculis ovatis axillaribus, ramis oppoſito ſimplicibus. *Soland. et Ellis corall. p.* 53. *n.* 27.

Pallas el. zooph. p. 125. *n.* 74. Sertularia repens geniculata oppoſita ramoſa, veſiculis axillaribus ovalibus.

Ellis corall. p. 28. *t.* 14. *n.* 26. *f.* c. C. Climbing Dodder-like Coralline.

Müll. zool. dan. 3. *p.* 62. *t.* 117. *f.* 1-3.

Habitat in mari anglico, *fucis adhaerens.*

puſtuloſa. 52. S. articulata ſparſim et alternatim ramoſa, geniculis ſuperne obſolete denticulatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 54. *n.* 28.

Ellis corall. p. 54. *t.* 27. *f.* b. B. Dichotomous tubular Coralline.

Habitat ad littora inſulae Wight, *tenera, ad* 4 *pollices longa.*

fruteſcens. 53. S. ramoſa tubuloſa pinnata, pinnulis ſetaceis alternis arrectis, denticulis ſecundis cylindrico-campanulatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 55. *n.* 29. *t.* 6. *f.* a. A.

Habitat

Habitat ad Angliae *littora, durior congeneribus, nigra, ramis fuſcis.*

Pinaſter. 54. S. ſimplex pinnata, pinnis alternis, denticulis oppoſitis baſi cauli appreſſis, apice tubuloſis incurvis, veſiculis ſecundis majoribus ovato-quadrangulis: angulis mucronatis, ore tubuloſo. *Soland. et Ellis corall. p.* 55. *n.* 30. *t.* 6. *f.* b. B.
Habitat - - -

Pennatula. 55. S. ſimplex pinnata, pinnis incurvis articulatis, denticulis ſecundis campanulatis corniculo truncato ſuffultis: marginibus crenatis, ſpinis duabus oppoſitis inſtructis. *Soland. et Ellis corall. p.* 56. *n.* 31. *t.* 7. *f.* 1. 2.
Habitat in Oceano indico, *ex luteſcente fuſca,* 5-6 *pollices longa.*

Filicula. 56. S. ramoſiſſima pinnata ſtirpe flexuoſa, ramulis ex angulis alternis, denticulis ovato-tubuloſis ſingulis ad axillas erectis, veſiculis obverſe ovatis apice tubulatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 57. *n.* 32. *t.* 6. *f.* c. C.
Habitat ad Angliae *littora, tenerrima, abietinae affinis.*

quadridentata. 57. S. ſimplex articulata repens, denticulis quaternis oppoſitis ventricoſis, articulis ſubturbinatis baſi contortis. *Soland. et Ellis corall. p.* 57. *n.* 33. *t.* 5. *f.* g. G.
Habitat ad Africae *littora, fuco lendigero adhaerens.*

ſpicata. 58. S. ſtirpe tubuloſa paniculata annulata, ramulis creberrimis trichotomis ad annulos verticillatim diſpoſitis, denticulis ternis cylindricis caecisque terminalibus, veſiculis ovatis axillaribus. *Soland. et Ellis corall. p.* 58. *n.* 34.
Habitat - - -

Evanſii. 59. S. ramoſa, ramis oppoſitis, denticulis brevibus oppoſitis, veſiculis ramoſis lobatis oppoſitis ex tubulo reptante enaſcentibus. *Soland. et Ellis corall. p.* 58. *n.* 35.
Habitat ad Angliae *littora, gracillima,* 2 *pollices alta, fucis adhaerens, flava, veſiculis fulvis.* Evans.

muricata. 60. S. articulata, denticulis pedunculatis ex ſingulis articulis alternis, veſiculis ſubgloboſis criſtatis muricatis pedunculatis ex tubulis radiciformibus enaſcentibus. *Soland. et Ellis corall. p.* 59. *n.* 36. *t.* 7. *f.* 3. 4.
Habitat ad Scotiae *littora.*

ſecundaria. 61. S. minima alba, ſtirpe incurva, denticulis ſecundis campanulatis, veſiculis axillaribus. *Cavol. pol. mar.* 3. *p.* 226. *t.* 8. *f.* 15. 16.

Habitat in mari mediterraneo, *vix* 3 *lineas alta, ſetae tenerrimae craſſitie.*

miſenenſis. 62. S. ramoſiſſima dichotoma, denticulis alternis tenuiſſimis divaricatis, veſiculis ovalibus pedunculatis axillaribus. *Cavolin. polip. mar.* 3. *p.* 187. *t.* 7. *f.* 1. 2.

Habitat in mari mediterraneo, circa promontorium Miſenenſe, *tenella, apicem verſus pellucida, a cancro lineari infeſtata.*

racemoſa. 63. S. ſtirpe recta tereti ramoſa opaca, cornea, denticulis ſparſis pellucidis, veſiculis racemoſis, ramis ſubarcuatis. *Cavolin. pol. mar.* 3. *p.* 160. *t.* 6. *f.* 1. 2.

Habitat in mari mediterraneo, *potiſſimum ad promontorium* Miſenenſe.

Uva. 19. S. ſubramoſa denticulis obſoletis, veſiculis ovatis racemoſis, ramis vagis. *Soland. et Ellis corall. p.* 53. *n.* 26.

Pallas el. zooph. p. 123. *n.* 72. Sertularia (acinaria) reptans ſubramoſa, calyculis terminalibus oblongis, ovariis veſicularibus.

Ellis corall. p. 27. *n.* 25. *t.* 15. *f.* C. Grape Coralline.

Habitat ad Seelandiae *et* magnae Britanniae *littora, fucis aliisque zoophytis adhaerens, veſiculis hyalinis, nucleo albo.*

lendigera. 20. S. denticulis obſoletis, calycibus ſecundis cylindricis parallelis paſſim congeſtis, ſtirpibus filiformibus. *Fn. ſuec.* 2248.

Pallas el zooph. p. 124. *n.* 73. Sertularia geniculata dichotoma implexa, calyculis cylindricis ad genicula congeſtis parallelis.

Soland. et Ellis corall. p. 52. *n.* 25. Sertularia articulata ſubdichotoma implexa, denticulis cylindricis ſecundis parallelis ad genicula minoribus.

Cavolin. pol. mar. 3. *p.* 229. *t.* 9. *f.* 1. 2. Sertolara lendinoſa.

Ellis corall. p. 27. *t.* 15. *n.* 24. *f.* b. B. Nit-Coralline.

Raj. ſyn. p. 38. *n.* 3. Fucoides lendigerum, capillamentis cuſcutae inſtar implexis.

Habitat ad magnae Britanniae, Belgii, Italiae *littora, fucis aliisque zoophytis adhaerens.*

geniculata. 21. S. denticulis alternis contortis, veſiculis obovatis ſubroſtratis, ſtirpe geniculata flexuoſa. *Fn. ſuec.* 2. *n.* 2249.

Fn. ſuec. 1. 2241. Sertularia flexuoſa.

Pallas el. zooph. p. 117. *n.* 68. Sertularia ſubſimplex geniculata mollis, calyculis alternis ſubturbinatis, ovariis axillaribus ovato-truncatis.

Soland. et Ellis corall. p. 49. *n.* 20. Sertularia denticulis alternis calyciformibus, pedunculis contortis, ovariis ovato-truncatis axillaribus.

Ellis corall. p. 22. *t.* 12. *n.* 19. *f.* b. B. *act. angl.* 48. *t.* 22. *f.* 1. Knotted Sea-thread Coralline.

Cavolin. pol. mar. 3. *p.* 205. *t.* 8. *f.* 1. 2. Sertolara genicolata.

Loefl. act. Stockh. 1752. *p.* 114. *t.* 3. *f.* 5-10. Madrepora plantaeformis mollis, caule flexuoſo, ramis alternis turbinatis.

Müll. zool. dan. 3. *p.* 3. *p.* 61. *t.* 117. *f.* 1-4.

Habitat in mari ſeptentrionali, mediterraneo, *ſtirpibus ſemipollicaribus.*

dichotoma. 22. S. denticulis obſoletis, veſiculis obovatis axillaribus, pedunculis intortis, ſtirpe dichotoma geniculata.

Pallas el. zooph. p. 119. *n.* 69. Sertularia (longiſſima) longa alterne ramoſa, ramis ſubdiviſis, calyculis terminalibus campanulatis, ovariis axillaribus.

Soland. et Ellis corall. p. 48. *n.* 19. Sertularia longiſſima ramoſa dichotoma, denticulis campanulatis, pedunculis annuloſis contortis, ovariis ovatis axillaribus.

Ellis corall. p. 21. *t.* 12. *n.* 18. *f.* a. c. A. C. Sea-thread Coralline.

Cavolin. pol. mar. 3. *p.* 194. *t.* 7. *f* 5-7.

Habitat in mari ſeptentrionali *et* mediterraneo, *pedem ſaepe longa, junior, albida, adultior teſtacea.*

ſpinoſa. 23. S. denticulis obſoletis, calyculis ovato-ſubulatis, ramis dichotomis ſpinoſis.

Pallas el. zooph. p. 114. *n.* 65. Sertularia (ſericea) ſcrupoſa gelatinoſa ramoſa, ramulisque creberrimis teneris dichotomis hirſuta.

Soland. et Ellis corall. p. 48. *n.* 18. Sertularia mollis ramoſa pellucida, ramulis creberrimis teneris dichotomis in ſpinas terminatis, denticulis obſoletis ſecundis diſtantibus, ovariis veſiculaeformibus.

Ellis corall. p. 20. *t.* 11. *f.* n. 17. *f.* b. d. B. C. D. Silk-Coralline.

Habitat in mari europaeo, mediterraneo, 8 *ſaepe pollices longa.*

pinnata. 24. S. denticulis obſoletis, veſiculis oblongis, ſtirpe ſimplici pinnata lanceolata.

Pallas el. zooph. p. 148. *n.* 92. Sertularia (ſetacea) ſimplex pinnata, pinnis alternis arrectis, calyculis remotiſſimis ſecundis, ovariis oblongis axillaribus.

Soland. et Ellis corall. p. 46. *n.* 16. Sertularia ſimplex pinnata et articulata, pinnis alternis arcuatis, denticulis ſemicampanulatis ſecundis, ovariis ovatis confertis ore coronatis.

Cavolin. pol. mar. 3.

Ellis corall. p. 19. *t.* 11. *n.* 16. *f.* a. A. Sea-Briſtles.

Raj. ſyn. p. 38. *n.* 6. *et p.* 39. *n.* 7. Fucoides ſetaceum.

Habitat in mari anglico *et* indico, 3 *pollices alta, veſiculis racemoſis.*

ſetacea. 64. S. ſimplex pinnata, pinnis alternis ſubincurvatis, denticulis obſoletis remotiſſimis ſecundis, veſiculis oblongo tubulatis axillaribus. *Soland. et Ellis corall. p.* 47. *n.* 17.

Syſt. nat. X. 1. *p.* 813. *n.* 28. Sertularia ſetacea.

Cavolin. pol. mar. 3. *p.* 228. Sertolara pennata.

Ellis corall. t. 38. *f.* 4.

Habitat in mari ſeptentrionali *et* mediterraneo, 1½ *pollicem alta, pinnata duplo anguſtior.*

polyzonias. 25. S. denticulis alternis ſubdenticulatis, veſiculis obovatis polyzoniis, ſtirpe ramoſa. *Fn. ſuec.* 2250.

Pallas el. zooph. p. 127. *n.* 76. Sertularia (ericoides) ſubramoſa, calyculis alternis ovatis ſubdenticulatis, ovariis ovatis rugoſis.

Soland. et Ellis corall. p. 37. *n.* 3. Sertularia ſparſe ramoſa, denticulis ovatis alternis, ovariis obovatis transverſe rugoſis.

Cavolin. pol. mar. 3. *p.* 224. *t.* 8. *f.* 12-14. Sertolara polyzonia.

Ellis corall. p. 5. *t.* 2. *n.* 3. *f.* a. b. A. B. Great Tooth Coralline.

Raj. ſyn. p. 35. *n.* 13. Corallina minus ramoſa, alterna vice denticulata, denticulis lineis transverſis externe ſtriatis.

Seb. muſ. 3. *t.* 102. *n.* 4. *et t.* 103. *n.* 6.

Habitat in mari *fere omni, marinis variis adhaerens.*

Pennaria. 26. S. denticulis ſecundis, ſtirpe contorta bipinnata.

Cavolin. pol mar. 3. *p.* 134. *t.* 5. *f.* 1-6.

Habitat in mari indico? mediterraneo, *ceſpitoſa rupibus, lepadibus &c. adhaerens, ſetae porcinae craſſitie, ſurſum ſenſim,*

ſenſim, at lente attenuata, recta adſcendens, cornea, flexilis, fuſca, ramis albidis, denticulis albis ſurſum verſis, aeque diſtantibus, 10 circiter in ſingulis ramis, ovariis ovalibus in ſingulis denticulis uno vel binis.

Lichenaſtrum. 27. S. denticulis obtuſis bifariam imbricatis, veſiculis obovatis ſecundis parallelis, ſtirpe pinnata, ramis dichotomis.

Soland. et Ellis corall. p. 42. *n.* 10. Sertularia (Lonchitis) articulata pinnata, denticulis alternis diſtichis appreſſis, ovariis ovatis operculatis.

Pallas el. zooph. p. 138. *n.* 85. Sertularia ramoſa pinnataque, calyculis diſtichis appreſſis, ovariis ſecundis ovato-campanulatis minoribus.

Ellis corall. p. 11. *t.* 16. Sea-Splean wort or Polypody.

Habitat in Oceano indico, mari hibernico, *et inter* Aſiam *borealem et* Americam *intermedio, ramis bifariam imbricatis.*

cedrina. 28. S. denticulis ſubcylindricis tubuloſis quadrifariam imbricatis, ramis vagis quadrangulis ſurſum incraſſatis.

Pallas el. zooph. p. 139. *n.* 86. Sertularia ſubramoſa, calyculis ſubcylindricis quadrifariam imbricatis.

Habitat in mari Camtſchatcam *circumfluente, ſqualens, ramis dichotomis obtuſis, quadrifariam imbricatis.* Steller.

purpurea. 29. S. denticulis ſubovatis tubuloſis quadrifariam ſubimbricatis, veſiculis erectis campanulatis, ramis dichotomis quadratis.

Pallas el. zooph. p. 140. *n.* 87. Sertularia dichotoma quadrangularis, calyculis ſubovatis tubuloſis quadrifariam ſubimbricatis, ovariis erectis campanulatis.

Habitat in mari Camtſchatcam *alluente, tota ex atro purpurea, faſtigiata.*

articulata. 65. S. articulata pinnata, calyculis appreſſis, veſiculis ſecundis ovatis operculatisque majuſculis. *Pallas el. zooph. p.* 137. *n.* 84.

Habitat in mari atlantico, *in teſtaceis reptans, bipollicaris, lutea, an diſtincta ſpecies?*

filicina. 66. S. ſcrupoſa ramoſa pinnata pennulataque, pinnulis e rhachis ſulco alternis, calyculis ſecundis imbricatis, veſiculis articulatis. *Pallas el. zooph. p.* 156. *n.* 98.

Habitat in Oceano indico, *pallida, rigida,* 3 *pollices longa, et longior, an eadem cum* Pennaria?

fruticans. 67. S. ſcrupoſa lignoſa ramoſa pinnataque, pinnulis ſetaceis alternis, calyculis ſecundis ſemicampanulatis. *Pallas el. zooph. p.* 157. *n.* 99.
Habitat in mari americano? *ceſpitoſa teſtaceis inſidens, ex luteſcente griſea ligneo-ſuberoſa,* 6 *pollices longa.*

** *ſtirpe cruſtacea, lapideſcente, e cellulis ſeriatis compoſita, ovariis diſtinctis nullis, ſed earum loco bullulis,* Cellariae, *vel* Cellulariae.

Burſaria. 30. S. denticulis oppoſitis compreſſis faſtigiatis, ramis dichotomis. *Fn. ſuec.* 2252.
Pallas el. zooph. p. 65. *n.* 23. Cellularia ramoſa articulata, cellulis bijugis pellucidis carinatis, tubuloque adnato ſubclavato auctis.
Soland. et Ellis corall. p. 25. *n.* 9. Cellaria ramoſa articulata, cellulis oppoſitis pellucidis carinatis, tubulo adnato ſubclavato auctis.
Ellis corall. p. 41. *t.* 22. *n.* 8. *f.* a. A. Shepherd's purſe Coralline.
Habitat in mari anglico, *fucis adhaerens, minuta, flexilis, hyalina.*

loricula-ta. 31. S. denticulis oppoſitis oblique truncatis obſoletis, ramis dichotomis erectis. *Fn. ſuec.* 2253.
Pallas el. zooph. p. 64. *n.* 22. *Soland. et Ellis corall. p.* 24. *n.* 8. Cellularia ramoſiſſima articulata grytea, cellulis bijugis oblique truncatis.
Ellis corall. p. 40. *t.* 21. *n.* 7. *f.* b. B. Coat of Mail Coralline.
Pluckn mant. 56 Corallina geniculata mollis, internodiis rotundis brevioribus.
Raj. ſuppl. 15. Muſcus coralloides mollis elatior ramoſiſſimus.
Habitat in mari anglico, *antiquas ſaepe ſertularias cingens, ſeſquipollicaris.*

faſtigiata. 32. S. denticulis alternis acutis, ramis dichotomis erectis faſtigiatis. *Fn. ſuec.* 2254. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 445. *n.* 458.
Pallas el. zooph. p. 66. *n.* 24. Cellularia (plumoſa) mollis fibroſa, ramoſiſſima, ramulis dichotomis faſtigiatis.
Soland. et Ellis corall p. 21. *n.* 1. Cellaria (plumoſa) cellulis unilateralibus alternis extrorſum acutis, ramis dichotomis erectis faſtigiatis.
Ellis corall. p. 33. *t.* 18. Soft-feathered Coralline.
Cavolin. pol. mar. 3. *p.* 237. *t.* 9. *f.* 3. 4. Sertolare faſtigiate.

Raj.

Raj. ſyn. p. 37. *n.* 20. *et p.* 330. Corallina pumila erecta ramoſior et Fucus minimus hirſutus, fibrillis herbaceis ſimilis.
Habitat in mari anglico.

aviculаria. 33. S. denticulis ſecundis ſuboppoſitis mucronato-appendiculatis, calycibus globoſo-mucronatis ſeſſilibus, ramis dichotomis continuis faſtigiatis.

Pallas el. zooph. p. 68. *n.* 26. Cellularia latiuſcula dichotoma faſtigiata, cellulis ore galeato biſetis, nectariis marginalibus.

Soland. et Ellis corall. p. 22. *n.* 3. Cellaria latiuſcula dichotoma erecta, cellulis unilateralibus alternis biſetis, ore galeato, appendiculis inſtar avium capitum marginalibus.

Ellis corall. p. 36. *t.* 20. *n.* 2. *f.* a. A. Bird's-head Coralline.

Habitat in mari *inter* Angliam *et* Belgium Germaniam*que intermedio, fluſtris affinis, fragilis, ſordida, ex cinereo griſea,* ½-1½ *pollicem longa, cellularum ſeriebus longitudinalibus* 3-5.

neritina. 34. S. denticulis alternis ſecundis acutis, ramis dichotomis inaequalibus erectis.

Pallas el. zooph. p. 67. *n.* 25. Cellularia mollis dichotoma gryſea, cellulis alternis extrorſum mucronatis interjectisque galericulis labiatis albis.

Soland. et Ellis corall. p. 22. *n.* 2. Cellaria dichotoma ferruginea, cellulis alternis unilateralibus extrorſum mucronatis, ovulis ſubteſtaceis nitidis interjectis, oſculis margine ſubfuſco cinctis.

Ellis corall p. 35. *t.* 19. *et act. angl.* 48. *p.* 115. *t.* 5. *f.* a. A.

Habitat in mari mediterraneo *et* Americam *mediam alluente, mollis, cellularum ſerie duplici.*

ſcruposa. 35. S. denticulis alternis angulatis ſpinoſis, ramis dichotomis reptantibus. *Fn. ſuec.* 2255.

Pallas el. zooph. p. 72. *n.* 30. *Soland. et Ellis corall. p.* 23. *n.* 5. Cellularia reptans lapidoſa dentata dichotoma, cellulis alternis unilateralibus.

Ellis corall. p. 38. *t.* 20. *n.* 4. *f.* c. C. Creeping ſtony Coralline.

Habitat in mari indico, mediterraneo, americano, europaeo, *fragiliſſima, linearis, pallida, cellularum ordine duplici.*

Cellariae *fluſtris et corallinis affines, per eburneam et cornutam, quibus veſiculae diſtinctiſſimae, cum ſertulariis cohaerent.*

pilosa. 68. S. dichotoma faſtigiata lapidoſa, cellulis alternis obliquis: ore praelongo ſubſolitario.
Pallas el. zooph. p. 72. *n.* 29. Cellularia piloſa.
Habitat in mari mediterraneo, *ſcrupoſae affinis, vix* 4 *linearum.*

criſpa. 69. S. ramoſiſſima dichotoma elongata criſpa, articulis depreſſis ovatis uno latere celliferis.
Pallas el. zooph. p. 71. *n.* 28. Cellularia criſpa.
Seb. muſ. 3 *t.* 101. *n.* 8.
Habitat in Oceano orientali, *grandis, flexiliſſima, pallide griſea.*

floccoſa. 70. S. ramoſiſſima dichotoma faſtigiata, articulis ſubcuneiformibus uno latere celliferis.
Pallas el. zooph. p. 70. *n.* 27. Cellularia floccoſa.
Habitat in Oceano indico, *inſignis, albida, geniculis ſubgriſeis flexilibus.*

reptans. 36. S. denticulis alternis bidentibus, ramis dichotomis reptantibus. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 445. *n.* 459.
Pallas el. zooph. p. 73. *n.* 31. Cellularia repens dichotoma articulata, cellulis unilateralibus bijugis, ore ſubciliato.
Soland. et Ellis corall. p. 23. *n.* 4. Cellaria reptans dichotoma articulata, cellulis alternis unilateralibus, oſculis biſetis.
Ellis corall. p. 37. *t.* 20. *n.* 3. *f.* b. B. Creeping Coralline.
Raj. ſyn. app. p. 330. Muſcus coralloides pumilus ramoſus.
Habitat in mari europaeo, *fluſtrae foliaceae fucisque adhaerens, ſcrupoſae affinis, alba, vel pallide griſea,* ½ - ¾ *pollicis.*

paraſitica. 37. S. denticulis verticillatis turbinatis ciliatis paraſiticis. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 447. *n.* 461.
Cavolin. pol. mar. 3. *p.* 181. *t.* 6. *f.* 8-13. Sertolara paraſſita.
Habitat in mari ſeptentrionali *et* mediterraneo, *aliis ſertulariis corallinisque adhaerens, obſcure rubra, ramis translucentibus, denticulis terminalibus, adultioribus ovigeris; an hujus tribus?*

ciliata. 38. S. denticulis alternis ciliatis infundibuliformibus, ramis dichotomis erectis. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 446. *n.* 460.
Pallas el. zooph. p. 74. *n.* 32. Cellularia molliuſcula dichotoma, faſtigiata, cellulis binatis alternis turbinatis, ore patulo ciliato.

Soland.

Soland. et Ellis corall. p. 24. *n.* 6. Cellaria cellulis alternis ciliatis, ore obliquo patulo, ramis dichotomis erectis.
Ellis corall. p. 38. *t.* 20. *n.* 5. *f.* d. D. Ciliated Coralline.
Habitat in mari anglico, norwegico, *aliis ſertulariis, fucis, ſpongiis adnata, albida,* 4-5 *lineas alta.*

eburnea. 39. S. cellulis alternis truncatis prominulis, veſiculis gibbis roſtratis, ramis patulis. *Soland. et Ellis corall. p.* 24. *n.* 7.
Pallas el. zooph. p. 75. *n.* 33. Cellularia veſiculifera erecta dichotoma articulata, articulis linearibus, poris tubuloſis alternis.
Ellis corall. p. 39. *t.* 21. *n.* 6. *f.* a. A. Tufted Ivery Coralline.
Cavolin. pol. mar. 3. *p.* 240. *t.* 9. *f.* 5-7. Sertolara d'avorio.
Habitat in mari europaeo, mediterraneo, *aliis marinis adhaerens, ad pollicem usque alta, alba.*

cornuta. 40. S. denticulis alternis truncatis ſpinis adjectis, veſiculis gibbis roſtratis, ramis alternis.
Pallas el. zooph. p. 76. *n.* 34. Cellularia (falcata) veſiculifera erecta articulata ſubpinnataque, cellulis ſolitariis tubuloſis curvatis, ſeta longiſſima ad os.
Soland. et Ellis corall. p. 25. *n.* 10. Cellaria veſiculifera ramoſa articulata, cellulis ſimplicibus tubuloſis curvatis altera ſuper alteram, ſeta ad oſculum longiſſima.
Ellis corall. p. 42. *t.* 21. *n.* 10. *f.* c. C. Goat's-horn Coralline.
Habitat in maris europaei *et* mediterranei *fucis, lapidoſa, albiſſima, vix* 4 *lineis longior.*

loricata. 41. S. denticulis ſecundis concatenatis ore ſubtus cornuto, ramis alternis.
Pallas el. zooph. p. 77. *n.* 35. *Soland. et Ellis corall. p.* 25. *n.* 11. Cellularia (chelata) fragiliſſima dichotoma, cellulis corniformibus concatenatis, ore marginato, ſpina infera.
Ellis corall. p. 42 *t.* 22. *n.* 9. *f.* b. B. Bull's-horn Coralline.
Habitat in mari anglico, mediterraneo, *gorgoniis, fucis adhaerens, exigua, veluti vitrea.*

anguina. 42. S. denticulis nullis, ſurculis ſimpliciſſimis clavatis obtuſis, apertura laterali.
Pallas el. zooph. p. 78. *n.* 36. Cellularia tubulis ſolitariis ſubclavatis, apertura laterali.
Soland. et Ellis corall. p. 26. *n.* 12. Cellaria cellulis ſimpliciſſimis, tubulis obtuſis clavatis, apertura laterali.
Ellis corall. p. 43. *t.* 22. *n.* 11. *f.* c. C D. Snake Coralline.
Cavolin. pol. mar. 3. *p.* 221. *t.* 8. *f.* 11.

Habitat

Habitat in mari ſeptentrionali *et* mediterraneo, *alba, molliſſima, flexiliſſima, fucis aliisque marinis adhaerens, ſcandens, formam varians, ſertulariam hydrae nectens.*

cereoides. 71. S. articulata ramoſa, articulis ſubcylindricis, oſculis cellularum undique prominulis. *Soland. et Ellis corall. p.* 26. *n.* 14. *t.* 5. *f.* b. B. C. D. E.

Habitat in mari mediterrâneo *ad* Barbariae *littora*, 3 *pollices alta, exalbida, lapidoſa, aggregata, articulis* $\frac{3}{4}$ *pollicis longis.*

tulipifera. 72. S. ſtirpe articulata lapidea ſubdiaphana, articulis clavatis, cellulis ternis dentatis connexis ex apicibus articulorum exeuntibus et ſaepe terminantibus. *Soland. et Ellis corall. p.* 27. *n.* 15. *t.* 5. *f.* a. A.

Habitat ad Jamaicae, inſularum*que* vicinarum *littora, fuco adhaerens, candidiſſima,* $\frac{1}{2}$ *pollicem alta.*

Flabellum, 73. S. lapidea articulata ramoſa dichotoma, articulis ſubcuneiformibus uno latere celluloſis. *Soland. et Ellis corall. p.* 28. *n.* 16. *t.* 4. *f.* c. C.

Habitat ad inſularum Bahamenſium *littora, ceſpitoſa, alba,* 2 *circiter pollices alta, articulis altero latere convexis ſtriatis, altero complanatis celliferis, cellulis* 3*plici ſerie diſpoſitis.*

cirrata. 74. S. lapidea articulata ramoſa dichotoma incurvata, articulis ſubciliatis ovato-truncatis uno latere planis celliferis. *Soland. et Ellis corall. p.* 29. *n.* 17. *t.* 4. *f.* d. D.

Habitat in Oceano indico, 2 *circiter pollices alta, articulis altera parte convexis ſtriatis, altera complanatis celliferis, cellularum per tubulos flexiles connexarum in ſingulis articulis ſerie duplici, oſculis ovalibus.*

ternata. 75. S. ramoſa dichotoma articulata repens, articulis angulatis ſubturbinatis, cellulis ternis unilateralibus. *Soland. et Ellis corall. p.* 30. *n.* 18.

Habitat in mari ſcotico, *lapidoſa, ſemipellucida.*

filiformis. 76. S. dichotoma filiformis, articulis linearibus quadrilateris, cellulis oblongis.

Pallas el. zooph. p. 63. *n.* 21. *β.* Cellularia filiformis.

Habitat in Oceano indico, *pallide griſea, confertiſſima, digiti longitudine, an forſan varietas tubulariae fiſtuloſae?*

77. S.

opuntioi-des. 77. S. geniculata, ramis ternatis, articulis cylindraceis, poris undique prominulis.

Pallas el. zooph. p. 61. *n.* 20. Cellularia opuntioides.

Habitat in Oceano orientali, *ſeſquipollicaris, erecta, ramoſiſſima, alba lapidea, poris in quincunces diſpoſitis.*

350. PENNATULA. *Animal* natans liberum multiforme, oſſiculo ſuffultum, baſi nuda, hydras tentaculis radiatis oviparis ſuperne exſerens.

coccinea. 8. P. ſtirpe tereti radicata, lateribus papilloſis hydrigeris, ſummitate clavata. *Lepech. act. Petrop.* 1778. 2. *p.* 136. *t.* 7. *f.* A.

Habitat in maris albi, *potiſſimum ad ſinum* Candalacenſem, *profundiſſimis, inter alcyonia et pennatulas quaſi media, mollis, ſanguinea aut miniata, ſeſquipollicem longa, digiti auricularis craſſitie, rugoſa, papillis ſeriatis.*

griſea. 1. P. ſtirpe carnoſa, rhachi laevi, pinnis imbricatis plicatis ſpinoſis. *Modeer nov. act. Stockh.* 1786. 4. *n.* 5. §. 10.

Pallas el. zooph. p. 367. *n.* 214. Pennatula penniformis, ſtipite tereti ad pennam bulboſo, pinnis oviferis acute dentatis, dentibus multifloris.

Soland. et Ellis corall. p. 62. *n.* 3. Pennatula ſpinoſa.

Rondel. aquat. p. 129. *Geſn. nomencl. p.* 273. *Aldrov. zooph. l.* 4. *c.* 8. *t.* 18. *f.* 35. *Jonſt. exang. l.* 4. *c.* 5. *t.* 20. Penna marina.

Seb. muſ. 3. *p.* 39. *t.* 11. *f.* 8. Penna marina phoſphorica.

Barrel. ic. t. 1316. *Petiv. pl. it. t.* 1. *f.* 8. Penna marina ſpinoſa griſea obſoleta.

Albin. annot. acad. 1. *p.* 77. *t.* 6. *f.* 1. 2. Penna marina alba.

Bohadſch mar. p. 109. *t.* 9. *f.* 1-3. Penna marina griſea.

Ellis act. angl. 53. *t.* 21. *f.* 6-10. Grey Sea-Pen.

β) *Modeer nov. act. Stockh.* 1786. 4. *n.* 5. §. 12. Pennatula palmata.

Habitat in mari adriatico, 8 *circiter pollices longa, ſupra dilatato-globoſa, noctu lucens, rhachidis dorſo late lanceolato laeviuſculo, radiis imbricatis, margine anteriori undulatis, lobulis a latere ſpina armatis margine obtuſe crenatis, crenulis lateraliter calyculo obſoleto poriformi.*

2. P.

phoſphorea. 2. P. ſtirpe carnoſa, rhachi ſcabra, pinnis imbricatis. *Fn. ſuec.* 2260. *Amoen. acad.* 4. *p.* 256. *Müll. zool. dan. prodr.* 3075. *Modeer nov. act. Stockh.* 1786. 4. *n.* 5. §. 18.
Soland. et Ellis corall. p. 61. *n.* 1. Pennatula (britannica) ſtirpe carnoſa tereti, rhachi ſcabra, polypis tentaculatis ordine ſimplici.
Imperat. hiſt. nat. p. 650. *Seb. muſ.* 3. *t.* 6. *f.* 1. *J. Bauh. hiſt. pl.* 2. *p.* 790. *Ginann. adr. t.* 55. *f.* 114. *Tournef. inſt.* 1. *h.* 1. *p.* 569. Penna marina.
Geſn. nomencl. p. 273. Penna alia.
Aldrov. zooph. l. 4. *c.* 8. *t.* 18. *f.* 36. Penna marina ſanguinei coloris.
Jonſt. exang. l. 4. *c.* 5. *t.* 20. Penna marina alia.
Barrel. icon. 1313. 1314. Penna marina carnea et purpurea.
Planc. Conch. c. 18. *t.* 8. *f.* E. D. Penna marina ſ. Mentula alata minor.
Bohadſch mar. t. 8. *f.* 5. Penna roſea.
Pontopp. Dan. atl. t. 30. *f.* 1-3. *et nat. Norw. p.* 196. *t.* 17. *f.* 1-3. Pinna pennacea.
Albin. annot. ac. 1. *t.* 6. *f.* 3-5? Penna marina rubra.
C. Bauh. pin. p. 363. Muſcus pennae ſimilis.
Shaw afr. app. p. 5. Fucus pennam referens.
Petiv. pl. ital. t. 1. *f.* 5. 6.
Ellis act. angl. 53. *p.* 426. *t.* 19. *f.* 1-5.
Habitat in Oceano *omni, noctu egregie lucens, ad* 4 *pollices longa, ex flavicante rubra, ſtirpe aequali, villoſa, rhachis dorſo ex lineari lanceolato, confertim paleaceo-denticulato, radiis ſubincumbentibus, calyculis ſetoſo-ſpinoſis ſecundis.*

filoſa. 3. P. ſtirpe ſubcarnoſa, rhachi utrinque pennata, baſi tentaculis duobus filiformibus. *Modeer nov. act. Stockh.* 1786. 4. *n.* 5. §. 21.
Salvian. aquat. p. 128. Vermiculus.
Boccon. muſ. 1674. *p.* 286. *t.* 286.
Ellis act. angl. 53. *t.* 20. *f.* 15.
Habitat in maris mediterranei *xiphiis,* 4-6 *pollices longa, ſtipite ſemitereti, rugoſo-imbricato, bicirrato, radiis ſetarum aemulis confertis.*

rubra. 4. P. ſtirpe carnoſa, rhachi pennata, pinnis imbricatis laevibus. *Modeer nov. act. Stockh.* 1786. 4. *n.* 5. §. 13.
Pallas el. zooph. p. 368. *n.* 215. Pennatula penniformis ovalis, ſtipite tereti, rhachi, ovifera, pinnis lacero-dentatis. *Soland.*

Soland. et Ellis corall. p. 61. *n.* 2. Pennatula (italica) ſtirpe carnoſa tereti, rhachi patula verrucoſa, ſpina brevi ad baſin dorſi cujusque pinnae.

Ellis act. angl. 53. *t.* 21. *f.* 1. 2. Red Sea-Pen.

Bohadſch mar. p. 101. *t.* 8. *f.* 1-3. Penna rubra.

β) *Modeer nov. act. Stockh.* 1786. 4. *n.* 5. §. 16. Pennatula ſtupata.

Habitat in mari mediterraneo, *ad* 6 *pollices longa, albida punctis rubris lineisque croceis varia, ſtirpe elongata obovata, rhachi ſubulata, radiis incumbenti-imbricatis, dorſo ad baſin confertiſſime granulatis, ventre calyculis inermibus ad apicem ſerie duplici.*

mirabilis. 5. P. ſtirpe filiformi, rhachi diſtiche pennata: pinnis lunatis remotis alternis. *Fn. ſuec.* 2261. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 38. *t.* 11. *f.* 1-3. *rar. deſcr.* 1. *p.* 23. *prodr.* 3074. *Soland. et Ellis corall. p.* 63. *n.* 4.

Pallas el. zooph. p. 370. *n.* 216. Pennatula ſimplex alba, calyculis recurvis alternis octodentatis.

Ellis act. angl. 53. *t.* 20. *f.* 17.

Muſ. Ad. Fr. 1. *p.* 96. *t.* 19. *f.* 4.*

Amoen. acad. 4. *p.* 256.*

Habitat in mari atlantico, americano, norwegico; *fulva,* 3-4 *pollices longa, vix calami ſcriptorii craſſitie, ſenſim attenuata, ſtipite laevi utrinque ſerrulato, rhachi lineari, radiis remotis alternis, calyculis teretibus, apice ſetoſo ſpinoſis.*

Sagitta. 6. P. ſtirpe filiformi, rhachi utrinque approximata pennata, apice nudo. *Modeer nov. act. Stockh.* 1786. 4. *n.* 5. §. 23. 24.

Soland. et Ellis corall. p. 64. *n.* 6.

Ellis act. angl. 53. *t.* 20. *f.* 16.

Amoen. acad. 4. *p.* 257. *t.* 13. *f.* 13.

Habitat in Pelagi *lophiis hiſtrionibus, utrum diſtincta ſpecies, an junior mirabilis?*

antennina. 7. P. ſtirpe ſubtetragona ſetiformi hinc pinnata, floſculis confertis. *Modeer nov. act. Stockb.* 1786. 4. *n.* 5. §. 30.

Pallas el. zooph. p. 372. *n.* 219. Pennatula (quadrangularis) ſimplex rhachi quadrangulari altero latere polypifera. *Soland.*

Pennatulae motae, aut poſt mortem contrectatae lucem phoſphori aemulam ſpargentes noctu, locum mutantes, ceterum alcyoniis perquam affines per Epipetrum et agaricum, et p. phalloidem intermediae his nectuntur, huic generi adjudicanda quoque videtur Amphisbaena marina a Johnſtonio *de piſc. t.* 8. *et de ſerpent. p.* 25. *memorata, et a* Seba *muſ.* 1. *t.* 90. *f.* 3. *adumbrata.*

Soland. et Ellis corall. p. 63. *n.* 5. Pennatula ſtirpe ſimplici, rhachi quadrangulari, lateribus tribus polypifera.
Ellis act. angl. 53. *p.* 431. *t.* 20. *f.* 4. Pen of Peacock Fiſh.
Bohadſch mar. p. 112. *t.* 9. *f.* 4. 5. Penna piſcis pavonis piſcatorum.
Habitat in mari mediterraneo, *ad* 10 *pollices ultra* 2 *pedes longa, flavicans, rubro punctata, ſtirpe elongata ſubattenuata, radiis e calyculis ſeſſilibus confertis ſecundis.*

ſtellifera. 9. P. ſimplex aequalis, apicem verſus hydris ſolitariis. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 133. *n.* 66. *t.* 35. *f.* 1-3. *rar. deſcr.* 1. *p.* 88. *prodr.* 3076.
Habitat in mari norwegico, *rariſſima, carnoſa, rubella, ad* 4 *pollices longa, diametro* 2-3 *linearum, inferne incraſſata obtuſa, ſuperne hydras* 5 *alternas exſerens.*

phalloides. 10. P. ſimplex rhachi cylindrica obtuſo-punctata undique hydrigera. *Pallas el. zooph. p.* 373. *n.* 220. *miſcell. zool. p.* 179. *t.* 15. *f.* 5-9.
Habitat in Oceano indico, *ad* ½ *pedem longa cineraſcens, rhachi craſſitie digiti infantilis, oſſiculo quadrangulari.*

arundinacea. 11. P. ſtirpe quadrangula longiſſima. *I. Fabr. it. norw. p.* 349. *Modeer nov. act. Stockh.* 1786. 4. *n.* 5. §. 28.
Habitat in mari norwegico, *ad* 4 *pedes longa, ſtipite lineari, radiis e calyculis ſolitariis cylindricis, deciduis, confertis, erectis, tubuloſis utrinque petiolo tenui inſidentibus.*

ſcirpea. 12. P. ſimplex lineari attenuata, rhachi tereti altero latere polypifera. *Pallas el. zooph. p.* 372. *n.* 218. *Modeer nov. act. Stockh.* 1786. 4. *n.* 5. §. 29.
Habitat in Oceano, *ſeſquipedalis, ſtirpe carnoſa craſſiore terete, rhachi longiore, oſſiculo ſubflexili.*

juncea. 13. P. ſimplex linearis, rachi truncata, rugis diſtichis transverſis polypiferis. *Pallas el. zooph. p.* 371. *n.* 217. *Modeer nov. act. Stockh.* 1786. 4. *n.* 5. §. 25.
Rumpf muſ. p. 43 *n.* 1. Sagitta marina alba.
amb. 6. *p.* 256. Sagitta marina alia.
Seb. muſ. 3. *t.* 114. *f.* 2.
Habitat in Oceano indico, *ad* 2 *pedes longa, alba, inferne carnea, radiis ex fulvo alboque miſtis, ſtipite* 5-6 *pollices longo, molli, vermiculari, rachi* 4*plo* 5*plo longiori, oſſiculo albo, fragiliſſimo.*

grandis. 14. P. penniformis lineari-lanceolata, ſtirpe tereti laeviſſima, pinnis lacero-dentatis. *Pallas el. zooph. p.* 366. *n.* 213. *Modeer nov. act. Stockh.* 1786. 4. *n.* 5. §. 15.

Rumpf muſ. p. 43. 44. *n.* 2. Sagitta marina nigra.

Habitat in Oceano indico, *pedem longa, et longior, ex cinereo vireſcens, oſſe fragili utrinque attenuato, tangentem manum interdum urens, pinnis imbricatis, lucem cineream in tenebris ſpargens.*

argentea. 15. P. lanceolata pennae facie, ſtirpe laevi tereti, pinnis creberrimis imbricatis dentatis virgatis. *Soland. et Ellis corall. p.* 66. *n.* 9. *t.* 8. *f.* 1-3.

Habitat in Oceano indico, *noctu egregie lucens, pede ſaepe longior, nitens, pinnis albo nigroque ſtriatis.*

Encrinus. 16. P. ſtirpe quadrangulari attenuata longiſſima oſſea, membrana calloſa veſtita, hydris oviparis apice in umbellam congeſtis. *Soland. et Ellis corall. p.* 67. *n.* 10.

Pallas el. zooph. p. 365. *n.* 212. Pennatula ſtipite oſſeo quadrangulo contorto, corporibus tereti-attenuatis apice floreſcentibus, in umbellam congeſtis.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1317. *n.* 1. Vorticella compoſita, floribus octoradiatis, ſtirpe ſimpliciſſima contorto-oſſea.

Syſt. nat. X. 1. *p.* 80. Iſis Encrinus.

Ellis act. angl. 48. *p.* 305. *t.* 12. *corall. p.* 96. *t.* 37. Cluſter-polypi.

Mylius monogr. 1753. 4. *c. fig.* Zoophyton groenlandicum.

Act. Petrop. 1766. *p.* 425. *t.* 11. *f.* 7.

Habitat in mari groenlandico, 6 *pedes longa, et longior, hydris umbellae* 20-30, *cylindricis, ſingulis apice* 8 *tentaculatis, radiis ſerrato-pinnatis; an protypus encrinitae?*

349. HYDRA. *Animal* baſi ſe affigens contractile. *Os* terminale tentaculis cinctum.

* *marinae, animali carnoſo oblongo tereti viviparo, ore dilatabili,* Actiniae Elliſii.

Cereus. 5. H. tentaculis denudatis numeroſiſſimis, corpore longitudinaliter ſulcato. *Gaertn. act. angl.* 52. *p.* 78. *t.* 1. *f.* 1.

Soland. et Ellis corall. p. 2. *n.* 1. Actinia Cereus.

Habitat ad Cornubiae *littora, fuſca, tentaculis thalaſſinis, apice roſeis.*

Bellis. 6. H. calyciflora verrucoſa, tentaculis retractilibus variegatis. *Gaertn. act. angl.* 52. *p.* 79. *t.* 1. *f.* 2.
Soland. et Ellis corall. p. 2 *n.* 2. Actinia Bellis.
Habitat ad Cornubiae *littora, mollis, incarnata, verrucis albis, in purpureum, violaceum fuſcum extrinſecus colorem vergens, tentaculis pellucidis inaequalibus, aliis pallide cinereis fuſco maculatis, aliis badiis albo maculatis, diſco ſtellato, fuſco, flavo, cinereo alboque radiato.*

gemmacea. 7. H. diſciflora, tentaculis retractilibus ſubdiaphanis, corpore cylindrico glandulis miliaribus longitudinaliter ſtriato. *Gaertner act. angl.* 52. *p.* 82. *t.* 1. *f.* 4.
Soland. et Ellis corall. p. 3. *n.* 3. Actinia gemmacea.
Habitat ad Cornubiae *littora, in rupium fiſſuris, ad baſin rubella, ceterum ex albo flavo et cinereo miſta, glandulis medii ordinis albis, tentaculis albidis.*

Meſembryanthemum. 8. H. diſciflora, tentaculis retractilibus, extimo diſci margine tuberculato. *Gaertner act. angl.* 52. *p.* 83. *t.* 1. *f.* 5.
Soland. et Ellis corall. p. 4. *n.* 4. Actinia Meſembryanthemum.
Habitat ad Angliae *littora, aeſtate rubra, colore auctumno in obſcure viridem vel fuſcum transeunte, tentaculis et tuberculis diſci rubris, caeruleis, albis, aut variegatis.*

ſociata. 9. H. tenuis tubaeformis, capitulo ſubgloboſo tentaculato, ex tubulo carnoſo adhaerente prolifera.
Ellis act. angl. 57. *p.* 436. *t.* 19. *f.* 1. 2. *Soland. et Ellis corall p.* 5. *n.* 5. *t.* 1. *f.* 1. 2. Actinia ſociata.
Hugh. nat. hiſt. Barbad. p. 296. Clester's of Waterbottles?
Habitat in mari, Americam *mediam alluente.*

Aſter. 10. H. ſtirpe craſſa carnoſa ſubcylindrica laevi truncata tentaculis radiata.
Ellis act. angl. 57. *p.* 436. *t.* 19. *f.* 3. *Soland. et Ellis corall. p.* 6. *n.* 6. Actinia Aſter.
Habitat in mari, Americam *mediam alluente.*

11. H.

Haec tribus actiniis jungit hydras, molluſcis zoophyta; huc ſpectare quoque videntur Veretillum Apuleji, *ſive Priapus marinus* Valisneri *op.* 3. *p.* 442. *ſ. Cucumis marinus* Barrelier *pl. ic.* 1293. *n.* 2. *ſ. Hydra Bohadſch mar. c.* 4. *t.* 6. *ſ. mentula marina.* Planc. *Conch. min. not. ed.* 2. *app p.* 108. *c.* 17. *t.* 8. *et ejusdem p.* 99. *c.* 6. *t.* 6. *f.* D. E. F. *Echinus coriaceus.*

Anemone. 11. H. carnoſa complanata, diſco ſubhexagono tentaculis plurimis cincto.

Ellis act. angl. 57. *p.* 436. *t.* 19. *f.* 4. 5. *Soland. et Ellis corall. p.* 6. *n.* 7. Actinia Anemone.

Habitat in mari, Americam *mediam alluente.*

Helianthus. 12. H. carnoſa complanata hypocrateriformis, diſco rotundo tentaculis plurimis praedito.

Ellis act. angl. 57. *p.* 436. *t.* 19. *f.* 6. 7. *Soland. et Ellis corall. p.* 6. *n.* 8. Actinia Helianthus.

Habitat in mari, Americam *mediam alluente.*

Dianthus. 13. H. laevis ſubcylindrica, diſco quinquepartito foliaceo tentaculis exiguis albis ornato, oſculo elevato ſtriato.

Ellis act. angl. 57. *p.* 436. *t.* 19. *f.* 8. *Soland. et Ellis corall. p.* 7. *n.* 9. Actinia Dianthus.

Habitat ad Angliae *littora, flava; an eadem cum actinia plumoſa?*

Calendula. 14. H. ſtirpe ſubturbinata, diſco tentaculis petaliformibus cincto.

Soland. et Ellis corall. p. 7. *n.* 10. *t.* 1. *f.* 3. Actinia Calendula.

Hugh. nat. hiſt. Barb. p. 293. *t.* 24. *f.* 1. Animal Flower.

Habitat ad inſulas Barbados; *an hujus generis?*

Doliolum. 15. H. quinquelatera cineraſcens, angulis obſoletioribus papillis bifariam aſperis, diſco convexiuſculo tentaculis viginti.

Pallas miſc. zool. p. 152. *t.* 9. *f.* 10-12. *et t.* 10. Actinia Doliolum.

Habitat ad caput bonae ſpei, *ſubdecaëdra, utroque fine truncata, poſteriori magis attenuata, tentaculis bipartitis fuſcis villoſo-granulatis.*

** *vagae, lineares, gelatinoſae, nudae, tentaculis ſetaceis, prolibus lateralibus (auctumno ovis) deciduis, in aquis dulcibus habitantes.*

gelatinoſa. 16. H. minuta gelatinoſa lactea cylindrica, tentaculis duodecim corpore elongato brevioribus. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 25. *t.* 95. *f.* 1. 2.

Habitat gregaria in fucorum facie inverſa.

viridis. 1. H. tentaculis ſubdenis brevioribus.

Pallas el. zooph. p. 31. *n.* 3. Hydra (viridiſſima) corpore viridiſſimo, cirrhis viridibus corpore brevioribus.

 Müll.

Müll. hiſt. verm. I. 2. *p.* 13. *n.* 147. *zool. dan. prodr.* 2783. Hydra viridiſſima, cirris corpore brevioribus.
Leeuwenh. act. angl. 23. *n.* 283. *p.* 1494. *n.* 4.
Ledermüll. microſc. t. 67. *f.* e. f.
Trembl. polyp. I. *p.* 22. *t.* I. *f.* I.
Roeſel inſ. 3. *polyp. p.* 531. *t.* 88. 89.
Schaeff. grün. Armpolyp. Regensb. 1755. *t.* I. *f.* 10-15. *t.* 2. *f.* 10-12. *et t.* 3. *f.* 4-8.
Habitat in Europae aquis ſtagnantibus, *et* rivulis, *ſub plantis aquaticis primo vere et auctumno potiſſimum conſpicua, tentaculis* 8-10.

fuſca. 2. H. tentaculis ſuboctonis longiſſimis. *Soland. et Ellis corall. p.* 9. *n.* 1.
Pallas el. zooph. p. 29. *n.* 1. Hydra (oligactis) corpore caudato gryſeo, cirrhis multoties longioribus.
Ellis corall. t. 28. *f.* C.
Trembl polyp. I. *p.* 22. *t.* I. *f.* 3. 4.
Roeſel inſ. 3. *polyp. p.* 505. *t.* 84. (α). 85-87. (β).
Schaeff. polyp. 1754. *t.* 3. *f.* I.
Habitat in Europae aquis dulcibus, *ex fuſco griſea, antrorſum ſubattenuata, tentaculis ad ſummum* 8, *tenuiſſimis contractis ſetaceis albidis.*

griſea. 3. H. tentaculis ſubſeptenis longioribus.
Pallas el. zooph. p. 30. *n.* 2. Hydra (vulgaris) corpore poſtice attenuato gryſeo, cirrhis vix duplo longioribus.
Müll. hiſt. verm. I. 2. *p.* 14. *n.* 148. *zool. dan. prodr.* 2784. Hydra aurantia, cirris corpore vix duplo longioribus.
Soland. et Ellis corall. p. 9. *n.* 2. Hydra (vulgaris) tentaculis longioribus ſubſeptenis, corpore luteſcente poſtice attenuato.
Ellis act. angl. 57. *p.* 430. *t.* 19. Freſh-water Polype.
Roeſel inſ. 3. *polyp. p.* 473. *t.* 78-83. Polypus aurantius.
Trembl. polyp. I. *p.* 22. *t.* I. *f.* 2.
Lederm. microſc. t. 67. *f.* m.
Baker microſc. t. 7. *f.* 3-7.
Habitat in Europae rivulis aquisque ſtagnantibus *purioribus, tentaculis interdum* 12, *plantis aquaticis*, e. g. *ſio adhaerens.*

4. H.

Hydrae *poſterioris hujus tribus gregariae, ſemipellucidae, teſtibus* Roeſelii, Trembleyi, Bonneti, Blumenbachii, Lichtenbergii *experimentis, vi prolifica inſigni ſpectabiles.*

pallens. 4. H. tentaculis ſubſenis mediocribus.

Pallas el. zooph. p. 32. *n.* 4. Hydra (attenuata) corpore flaveſcente ſurſum attenuato.

Müll. hiſt. verm. I. 2. *p.* 14. *n.* 149. *zool. dan. prodr.* 2785. Hydra pallida, cirris corporis longitudine.

Roeſel inſ. 3. *polyp. p.* 465. *t.* 76. 77. Polypus ſtramineus.

Habitat rarior in Europae ſtagnis *purioribus, tenerrima, griſea paulo major, tentaculis albidis.*

V. INFUSORIA.

Vermes minimi ſimpliciores.

BRACHIONUS. *Corpus* contractile, teſta tectum, ciliis rotatoriis.

urceolaris. 1. Br. teſta apice multidentata, baſi mutica, cauda ſimplici. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 131. *n.* 142. *zool. dan. prodr.* 2571.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1319. *n.* 12. Vorticella ſimplex pedunculata, ore dentato.
Pallas el. zooph. p. 91. *n.* 47. Brachionus (capſuliflorus) ſimplex calyculatus, capſula depreſſa poſtice crenata, oris labio ſuperiore ſexdentato.
Hill anim. p. 11. Brachionus corpore breviori campaniformi, cauda brevi.
Fn. ſuec. p. 537. *Müll. fl. Fridrichsd. p.* 238. Tubipora Urceus.
Joblot microſc. I. 2. *p.* 68. *t.* 9?
Baker microſc. p. 338. *t.* 12. *f.* 7-10.
Schaeff. grün. Armpol. t. 1. *f.* 8. k. *t.* 2. *f.* 7-9.
Habitat frequens in Europae aquis ſtagnantibus, *Auguſto potiſſimum, et oculo quidem nudo tanquam punctum mobile albicans conſpicuus, oviparus et viviparus, ciliis uncinatis.*

Patella. 2. Br. univalvis, teſta apice bidentata baſi emarginata, cauda biſeta. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 130. *n.* 142. *zool. dan. prodr.* 2570.
Joblot microſc. I. 2. *t.* 4. *f.* F. G?
Habitat in Europae aquis paluſtribus, *per totam hiemem conſpicua, teſta plana, cryſtallina, ovato-orbiculari, capite, trunco caudaque diſtinctis.*

cirratus. 3. Br. bivalvis, teſta apice mutica abbreviata baſi bicorni, cauda longa biſeta. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 132. *n.* 143. *zool. dan. prodr.* 2172.
Joblot microſc. 2. *p.* 54. *t.* 6. *f.* 10. A. B. C. D.
Habitat in Europae aquis, *teſta corpore breviore, urceolari major, ventricoſus ſubpellucidus, capite conico utrinque barbato, trunco ovato.*

tripus. 4. Br. bivalvis, teſta apice mutica baſi tricorni, cauda duplici. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 133. *n.* 144. *zool. dan. prodr.* 2573.

Habitat

Habitat paulo rarior in aquis aſſervatis, *urceolari minor, pellucidiſſimus fere triqueter, organo rotatorio duplici.*

uncinatus. 5. Br. bivalvis, teſta apice mutica rotundata baſi unidentata, cauda bifeta. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 134. *n.* 145. *zool. dan. prodr.* 2574.

Habitat in Europae foſſis aquoſis, *congeneribus minor, antrorſum unco armatus, cauda* 4-5 *articulis compoſita, teſta utrinque rotundata et aperiunda.*

mucronatus. 6. Br. bivalvis, teſta apice baſique bidentata, cauda ſpina duplici. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 134. *n.* 146. *zool. dan. prodr.* 2575.

Habitat ſat frequens in aquis Europae, *lemna coopertis, organi rotatorii medio mucronato, caudae ſpinis pellucidis mobilibus, teſta cryſtallina, oblongiuſcula, utrinque truncata.*

cernuus. 7. Br. pedunculo piloſo, capitulis cernuis. *Pallas ſpic. zool.* 10. *p.* 37. *t.* 4. *f.* 10.

Habitat gregarius in tubularia fiſtuloſa.

calyciflorus. 8. Br. ſimplex calyculatus, teſta poſterius crenata, oris labio ſuperiore quadridentato. *Pallas el. zooph. p.* 93 *n.* 48.

Baker microgr. p. 304. *t.* 12. *f.* 4-6. Animalculum teſta notulisque inſtructum tertium.

Habitat - - - *vagus.*

tubifex. 9. Br. teſta tubuloſa punctata, corpore oppoſite prolifero, limbo lobato ciliatoque. *Pallas el. zooph. p.* 91. *n.* 46.

Schaeff. monogr. 1755. *cum tab.* Blumenpolypen der ſüſsen Waſſer.

Habitat in Europae ſtagnis, *an hujus generis?*

quadridentatus. 10. Br. teſta ventricoſa apice quadridentata, organo rotatorio duplici, baſi bicorni, cauda longa ſimplici. *Hermann Naturf.* 19. *p.* 47. *t.* 2. *f.* 9.

Baker microgr. t. 12. *f.* 11-13.

Habitat in Europae aquis ſtagnantibus, *lemnae ſaepe adhaerens caudae ope, celerrime natans, teſta pellucidiſſima.*

Patina. 11. Br. teſta orbiculari mutica integra, organo rotatorio duplici, cauda brevi ſimplici. *Hermann Naturf.* 19. *p.* 48. *t.* 2. *f.* 10.

Eichhorn Naturg. Waſſerm. t. 1. *f.* 2. 4.

Habitat in Europae ſtagnis, *in quibus* lemna, hydrocharis *vegetat.*

348. VORTICELLA. *Corpus* contractile nudum, ciliis rotatoriis.

* *pedunculatae.*

racemoſa. 1. V. compoſita, pedunculo rigido: pedicellis ramoſiſſimis longis. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 128. *n.* 140. *zool. dan. prodr.* 2568.
Habitat in aquis e ſtagno Embderupenſi Hafniam *deductis, hieme conſpicua, ſtipite elongato ſubtiliſſimo, rariſſime tota ſimul in motum agitata.*

polypina. 2. V. compoſita ovato-truncata, pedunculo reflexili ramoſiſſimo. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 123. *n.* 137. *zool. dan. prodr.* 2569.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1317. *n.* 2. Vorticella compoſita, floribus concatenatis, ſtirpe paniculata ſubdigitata.
Syſt. nat. X. 1. *p.* 816. Sertularia corpuſculis concatenatis pellucidis hyalinis, panicula ſubdigitata.
Pallas el. zooph. p. 98. *n.* 55. Brachionus (ramoſiſſimus) vegetans, ſtirpe retortili ramoſiſſima, corpuſculis campanulatis.
Ellis corall. t. 13. *f.* b. B. c. C. Corallina omnium minima.
Baſter opuſc. ſubſ. 1. *l.* 1. *t.* 3. *f.* 1. a. b. c. Minima polyporum ſpecies.
Trembl. act. angl. 44. *p.* 639. *t.* 1. *f.* 5. 6.
Habitat frequens in mari balthico, mediterraneo, *aliis, fucis adhaerens, oculo nudo tanquam punctum album apparens, motu duplici ſpontaneo agitata.*

Anaſtatica. 3. V. compoſita oblonga oblique truncata, pedunculo ſquamoſo rigido. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 127. *n.* 139. *zool. dan. prodr.* 2567.
Syſt. nat. XII. 1. *p.* 1317. *n.* 3. Vorticella compoſita, floribus campanulatis, ſtirpe multiflora rigeſcente.
Fn. ſuec. 2221. Iſis Anaſtatica.
Pallas el. zooph. p. 99. *n.* 56. Brachionus vegetans, ſtirpe retortili umbellata, radiis racemoſis, corpuſculis campanulatis.
Amoen. acad. 2. *p.* 64. *n.* 4. 5.
Trembl. act. angl. 44. *p.* 637. *t.* 1. *f.* 7-9.
Brady act angl. 49. *p.* 248. *t.* 7. *f.* 1-6.
Degeer act. Stockh. 1746. *t.* 6. *f.* 4. 5.
Needh. microſc. t. 7. *f.* 2-5.
Schaeff. monogr. 1754. *t.* 1. *f.* 3. 4.

Habitat

Habitat in Europae aquis dulcibus, *teſtaceis plantisque inſidens, quarum ſuperficiem exaſperat, ramulis in umbellam ex umbellulis conſlatum expanſis, capitulis in ſingulis pedicellis* 5-10, *pellucidiſſimis, ovato oblongis, corpuſculis* 5-6 *ſubſphaericis repletis.*

conglomerata. 4. V. compoſita, capitulis eroſo-dentatis, ſtirpe multiflora, craſſitie pennae columbinae.
Amoen. acad. 4. *p.* 257. *t.* 3. *f.* 1.
Habitat in Oceano indico.

pyraria. 5. V. compoſita inverſe conica, pedunculo ramoſo. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 126. *n.* 138. *zool. dan. prodr.* 2566.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1318. *n.* 5. Vorticella compoſita, floribus muticis obovatis, tentaculis bigeminis, ſtirpe ramoſa.
Pallas el. zooph. p. 102. *n.* 59. Brachionus (pyriformis) vegetans, ſtirpe ſetacea extremitate dichotoma faſtigiata, corpuſculis ovatis utrinque bitentaculatis.
Hill. hiſt. an. t. 1. 2. Macrocercus corpore utrinque anguſtato et truncato, cauda longiſſima.
Roeſel. inſ. 3. *polyp. p.* 606. *t.* 98. *f.* 1. *et* 2. d. e.
Habitat in Europae aquis ſtagnantibus, *ceratophyllo potiſſimum adhaerens, rigida, ſetacea, elongata.*

operculata. 71. V. compoſita, capitulis muticis ovalibus ſtirpe ramoſa.
Pallas el. zooph. p. 104. *n.* 62. Brachionus vegetans, ſtirpe articulata ramoſiſſima, corpuſculis ovalibus piſtillo ciliato operculatis.
Roeſ. inſ. 3. *polyp.* 609. *t.* 98. *f.* 5. 6. Pſeudopolypus operculatus.
Baker microgr. p. 351. *t.* 13. *f.* 13. 14.
Ledermüll. microſc. t. 88. *f.* W.
Habitat in Europae aquis ſtagnantibus, *ramoſiſſima.*

tuberoſa. 12. V. ſtirpe dichotoma, capitulis turbinatis bi-vel trituberculatis.
Pall. el. zooph. p. 105. *n.* 63. Brachionus tuberoſus.
Baker microgr. p. 350. *t.* 13. *f.* 10-12.
Habitat in Angliae ſtagnis, *rigida, capitulorum tuberculis convexis radiatis.*

hians. 14. V. ſimplex citriformis, pedunculo retortili. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 135. *n.* 137. *zool. dan. prodr.* 2565.
Wrisb. anim. inſuſ. p. 417. *f.* 1. B. C. K. I. *et* G. F. E. *f.* 2. *f.* 13. B. F. C. H.

Habitat in vetuſtis infuſionibus *et* ſimetis, *ex minimis hujus generis, pedunculo relicto ſaepe in aquis vagans, capitulo pomi interni forma, in apice interdum hiante, pedunculo capitulo triplo longiore, cauda corpore ſextuplo breviore.*

Bellis. 15. V. ſimplex hemiſphaerica, margine contractili. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 123. *n.* 136. *zool. dan. prodr.* 2564.
Habitat rarior in aqua foſſarum Europae, *convallariae facie, at minor, capitulo flavicante diſco lato ciliisque marginis bellidis florem referente, pedunculo longo, pellucido, tenuiſſimo, ad apicem bifido.*

umbellaria. 8. V. ſimplex globoſa, granis nigricantibus, pedunculo rigido. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1318. *n.* 8. Vorticella compoſita, floribus ciliatis globoſis muticis, ſtirpe umbellata.
Müll. hiſt. verm. I. 1. *p.* 122. *n.* 135. *zool. dan. prodr.* 2563. Vorticella acinoſa.
Pallas el. zooph. p. 100. *n.* 37. Brachionus (acinoſus) vegetans, ſtirpe rigida dichotoma, corpuſculis truncatis fimbriato-ciliatis, acinis opacis.
Trembl. act. angl. 43. *p.* 171. *t.* 11. *f.* 5-7.
Baker microgr. p. 348. *t.* 13. *f.* 6. 7.
Roeſel inſ. 3. *polyp. p.* 614. *t.* 100.
Ledermüll. microſc. t. 88. *f.* t. n.
Habitat in Europae aquis ſtagnantibus, *capitulis flaveſcentibus punctis opacis diſtinctis, coarctatorum baſi hyalina, pedunculo octuplo longiore, interdum apice bifido.*

berberina. 9. V. ſimplex ovalis, ſtirpe ramoſa rigida, granis albida. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1319. *n.* 9. Vorticella compoſita, floribus ovalibus muticis, ſtirpe ramoſa.
Pallas el. zooph. p. 103. *n.* 60. Brachionus (berberiformis) vegetans, ſtirpe deorſum attenuata, ſubramoſa, corpuſculis terminalibus oblongis muticis.
Trembl. act. angl. 43. *p.* 179. Polypi bipertientis altera ſpecies paulo minor.
Roeſel inſ. 3. *polyp. p* 613. *t.* 99. Pſeudopolypus beriformis.
Ledermüll. microſc. t. 88. *f.* q. ſ.
Habitat in Europae *aquis.*

digitalis. 10. V. ſimplex cylindrica uniſulcata ſemiclauſa, ſtirpe ramoſa. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1319 *n.* 10. Vorticella compoſita, floribus cylindricis uniſulcatis ſemiclauſis, ſtirpe ramoſa.
Pallas el. zooph. p. 104. *n.* 61. Brachionus vegetans ſtirpe umbel-

umbellata, corpuſculis oblongo-truncatis, longitudinaliter uniſulcatis.

Roeſel inſ. 3. *polyp. p.* 607. *t.* 98. *f.* 4. Pſeudopolypus corniculum chartaceum referens.

Habitat in Europae ſtagnis, *ſtirpe brevi.*

faſciculata. 16. V. ſimplex viridis campanulata: margine reflexo, pedunculo retortili. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 121. *n.* 134. *zool. dan. prodr.* 2562.

Habitat in Daniae confervis fluviatilibus, *primo vere conſpicua, numeroſiſſima, gelatinoſa, capitulo opaco, baſi pedunculoque longiſſimo, tenuiſſimo hyalinis.*

annularis. 17. V. ſimplex truncata, pedunculo apice retortili. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 121. *n.* 133. *zool. dan. prodr.* 2561.

Habitat in ſtagnorum Daniae *teſtaceis, nudo oculo viſibilis, capitulo inverſe conico, pedunculo longiſſimo, rigido inſidente.*

nutans. 18. V. ſimplex turbinata, pedunculo retortili. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 120. *n.* 132. *zool. dan. prodr.* 2560.

Habitat in Daniae ſtagnis, *ſtratiotae et teſtaceis adhaerens, oculo nudo non uſurpanda, capitulo apice albo, quaſi annulo lucido cincto, baſi hyalino, pedunculo longo tenui.*

gemella. 19. V. ſimplex ſphaerica, capitulo gemino. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 120. *n.* 131. *zool. dan. prodr.* 2559.

Habitat in teſtis monoculorum *inter* confervas marinas degentium, *oculo nudo inviſibilis, capitulis hyalinis punctis obſcuris repletis.*

nebulifera. 20. V. ſimplex ovata, pedunculo reflexili. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 119. *n.* 130. *zool. dan. prodr.* 2558.

Habitat in maris balthici conferva polymorpha, *oculo nudo inconſpicua, pedunculo baſi dilatato, in medio bipartito.*

Convallaria. 11. V. ſimplex campanulata pedunculo retortili. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 118. *n.* 129. *zool. dan. prodr.* 2557.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1319. *n.* 11. Vorticella ſimplex gregaria, flore campanulato mutico: tentaculis bigeminis, ſtirpe fixa.

Pallas el. zooph. p. 97. *n.* 54. Brachionus (campanulatus) gregarius, pedunculo ſetaceo retortili unifloro, corpuſculo campaniformi.

Trembl.

Trembl. act. angl. 43. *p.* 474. Polypi bipertientis tertia ſpecies.

Baker micrógr. p. 339. *t.* 13. *f.* 1. d. e. Animalcula campanacea.

Roeſel inſ. 3. *polyp. p.* 597. *t.* 97. Pſeudopolypus parvus ſocialis crateriformis.

Ledermüll. microſc. t. 88. *f.* 1.

Cavol. pol. mar. 3. *p.* 253. *t.* 9. *f.* 13.

Habitat in Europae aquarum dulcium *teſtaceis, cerathophyllo, lemna, capitulis oculo inermi puncta minima albida referentibus, pedunculo ſimplici, ſetaceo, longiſſimo, an eadem, quam* Cavolini *in mari mediterraneo veneris teſtae adhaerentem,* Schranck *in infuſo granorum avenae conſpexit?*

lunaris. 21. V. ſimplex hemiſphaerica, pedunculo retortili. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 117. *n.* 128. *zool. dan. prodr.* 2556.

Habitat in Daniae ſtagnorum *lemna minori, capitulo pedunculo* 8-10*plo breviori, apertura dimidium lunae aequante: margine protuberante flexuoſo, ciliorum faſciculo in horizontalem et perpendicularem partito.*

Globularia. 22. V. ſimplex ſphaerica, pedunculo retortili. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 117. *n.* 127. *zool. dan. prodr.* 2555.

Hill hiſt. an. t. 1. *f.* 1. Macrocercus corpore rotundo, cauda tenuiſſima.

Habitat frequens in Daniae ſtagnorum *monoculo quadricorni, capituli apertura diametrum non ſuperante, ciliis quaſi pectinatis coronata, pedunculo vix quadruplo longiori.*

inclinans. 23. V. ſimplex deflexa, pedunculo brevi, capitulo retractili. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 116. *n.* 126. *zool. dan. prodr.* 2554.

Müll. von Würm. p. 70. 71.

Habitat in aquis Daniae dulcibus, *naidibus adhaerens, oculo nudo inconſpicua, hyalina, ſyringam, ex qua fumus nicotianae hauritur, referens, capitulo pendulo anterius truncato; pedunculo duplo longiore.*

ringens. 24. V. ſimplex obovata, pedunculo minimo, orificio contractili. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 116. *n.* 125. *zool. dan. prodr.* 2553.

Müll. von Würm. p. 70. 71.

Habitat in Daniae ſtagnis, *naidibus adhaerens, oculo nudo non uſurpanda, hyalina, erecta, pyrum, contractu pomum citreum potius referens, capitulo in aperturae contracti-*

tractilis medio quaſi operculato, pedunculum non contractilem quadruplo ſuperante.

ſtellata. 13. V. ſimplex repens, orificio decemfido, pedunculo capillari. *Habitat in* Oceano africano, *plantis ſubmarinis inſidens, alba, perennans, capilli craſſitie, rarius unum alterumve ramum protrudens, pedunculo erecto, molli, 3 lineas longo, capite ſubcampanulato, ſeminis thymi magnitudine, an hujus generis?*

piriformis. 25. V. ſimplex obovata, pedicello minimo retractili. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 115. *n.* 124. *zool. dan. prodr.* 2552.
Hill hiſt. an. t. 1. *f.* 2. Brachiurus corpore ovato.
β) *Schaeff. grün. Armpol. t.* 1. *f.* 8. h.
Habitat in Europae ſtagnorum *monoculis, oculo nudo inconſpicua, hyalina, capitulo pedicellum quadruplo ſuperante.*

citrina. 26. V. ſimplex multiformis, orificio contractili, pedunculo aequali. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 114. *n.* 123. *zool. dan. prodr.* 2551.
Habitat in Daniae aquis ſtagnantibus, *trichodae bombardae affinis, capitulo majori moleculis flavo virentibus farto, baſi pellucidiſſimo, pedunculo curvato.*

cyathina. 27. V. ſimplex crateriformis, pedunculo retortili. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 131. *n.* 63. *t.* 35. *ſer.* 1. *rar. deſcr.* 1. *p.* 85. *prodr. app. p.* 281.
Habitat in aqua marina aſſervata, *hyalina, vaga, pedunculo tenuiſſimo, longo, corpus ſubſphaericum ventricoſum 2-4plo ſuperante.*

putrida. 28. V. ſimplex, apice retractili, pedunculo rigido. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 132. *n.* 64. *t.* 35. *f.* 2. *rar. deſcr.* 1. *p.* 86. *prodr. app. p.* 281.
Habitat in aqua marina aſſervata putrida, *ſegnis, gelatinoſa, hyalina, oblonga, ventricoſa, orificio clauſo in papillam prolongata, pedunculo corpore vix duplo longiori.*

patellina. 29. V. ſimplex patinaeformis, pedunculo retortili. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 133. *n.* 65. *t.* 35. *f.* 3. *rar. deſcr.* 1. *p.* 87. *prodr. app. p.* 281.
Habitat in aqua marina *aliquantiſper aſſervata, hyalina, vivida, oculo nudo non uſurpanda, celerrime natans, intus moleculas 2 craſſiores, globuloſque 3-4 oſtendens, pedunculo tenui corpore quadruplo longiori.*

** cau-

** *caudatae.*

floſculoſa. 30. V. aggregata oblongo-ovata, diſco dilatato pellucido. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 113. *n.* 122. *zool. dan. prodr.* 2550.
Habitat in Daniae paludoſis, *ceratophyllo adhaerens, Septembre, et primo vere potiſſimum conſpicua, oculo nudo globulum flaveſcentem offerens, diſco capitis in abdomen hyalinum retractilis reniformi hyalino, cauda acuminatiſſima abdomine duplo longiori, nunc laevi, nunc annulis rugoſa.*

ſocialis. 31. V. aggregata clavata, diſco obliquo. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 112. *n.* 121. *zool. dan. prodr.* 2549.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1321. *n.* 7. *Müll. fl. Fridrichsd. p.* 238. Hydra mutica toroſa rugoſa.
Pallas el. zooph p. 96. *n.* 53. Brachionus aggregatus, corpore toroſo mutabili caudato oblique truncato, diſco reniformi.
Roeſel inſ. 3. *polyp. p.* 585. *t.* 94. *f.* 1-6. *et t.* 95. 96. Pſeudopolypus ſocialis clavaeformis.
Brady act. angl. 49. 1. *p.* 249. *t.* 7. *f.* 1.
Ledermüll. microſc. t. 88. *f.* f. g.
Habitat in Europae aquis ſtagnantibus, *ceratophyllo ſaepius adhaerens.*

ſtentorea. 32. V. tubaeformis, limbo ciliato. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 111. *n.* 120. *zool. dan. prodr.* 2548.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1321. *n.* 6. Hydra tentaculis ciliaribus, corpore infundibuliformi.
Pallas el. zooph. p. 95. *n.* 52. Brachionus ſimplex nudus infundibuliformis, limbo ciliato.
Trembl. act. angl. 43. *p.* 180. Polypi infundibuliformes virides, caerulei et albidi.
Baker microgr. p. 340. *t.* 13. *f.* 1. f. g. Animalculum infundibuliforme.
Roeſel inſ. 3. *polyp. p.* 594. *t.* 94. *f.* 7. 8. Pſeudopolypus tubiformis.
Ledermüll. microſc. t. 88. *f.* d. e. i.
Habitat in Europae aquis dulcibus, *hyalina, in tubam quaſi ſtentoream elongata.*

hyacinthina. 33. V. ſimplex involucrata, aperturae limbo multidentato.
Pallas el. zooph. p. 93. *n.* 49. Brachionus hyacinthinus.
Baker microgr. p. 302. *t.* 12. *f.* 2.
Habitat - - - *vaga, oblonga, cauda attenuata, an hujus generis et tribus?*

34. V.

auriculata. 34. V. nuda, cauda biſeta parvula. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 111. *n.* 119. *zool. dan. prodr.* 2547.
Habitat in Daniae aquis dulcibus *purioribus*, *pellucida*, *cylindrica*, *retrorſum anguſtior*, *apertura utrinque in auriculam dilatata*, *lacinula media ſubtriangulari*, *motu per diagonalem celeri.*

furcata. 35. V. apertura mutica, cauda ſimplici bifida. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 110. *n.* 118. *zool. dan. prodr.* 2546.
Ledermüll. microſc. p. 88. *t.* 48.
Habitat vulgaris in Europae aquis dulcibus, *cylindrica*, *interaneis pellucidiſſimis*, *caudae cruribus quieſcenti junctis.*

Senta. 36. V. apertura ſpinoſa, cauda apice fiſſa. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 109. *n.* 117. *zool. dan. prodr.* 2545.
Habitat in Europae aquis lemna *coopertis*, *pellucida*, *varie plicata*, *antrorſum truncata*, *organo rotatorio ſimplici*, *inteſtino luteſcente.*

Catulus. 37. V. cylindrica, apertura mutica, cauda reflexa. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 148. *n.* 116. *zool. dan. prodr.* 2544.
Joblot microſc. I. 2. *t.* 13. *f.* X.
Habitat in Daniae aqua paluſtri, *in varias directiones natans*, *craſſiuſcula*, *ſulcis longitudinalibus exarata*, *organo rotatorio minutiſſimo, cauda breviſſima exſertili biſeta.*

Felis. 38. V. cylindrica mutica, cauda ſpinis duabus longis terminata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 108. *n.* 115. *zool. dan. prodr.* 2543.
Habitat in Daniae aquis, *lemna tectis*, *toroſa*, *anteriore ſui parte ſe contrahens*, *ſpinis caudae pellucidis tertiae corporis ipſius longitudinis.*

vermicularis. 39. V. cylindrica annulata, proboſcide exſertili. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 107. *n.* 114. *zool. dan. prodr.* 2542.
Joblot microſc. I. 2. *p.* 80. *t.* 11. *f.* A-Z.
Habitat rarior in Daniae aquis *lemna coopertis*, *elongata*, *carnoſa*, *mutabilis*, *annulis* 8-9 *rugoſa*, *apice nunc obtuſa*, *nunc* 2 *mucronibus terminata*, *proboſcide articulata bifida*, *cauda ſpinis* 2 *pellucidis terminata.*

macroura. 40. V. organo rotatorio duplici, cauda gracili triplici ſpina terminata. *Hermann Naturf.* 19. *p.* 57. *t.* 2. *f.* 23.
Baker microgr. p. 380. *t.* 12. *f.* 1.
Habitat in Europae aqua paluſtri, *rotatoriae affinis*, *at tota hyalina.*

41. V.

rotatoria. 41. V. cylindrica, organo rotatorio duplici. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 106. *n.* 113. *zool. dan. prodr.* 2541.

Pallas el. zooph. p. 94. *n.* 50. Brachionus ſimplex nudus oblongus, capite diſcreto bilobo, lobis ciliatis.

Hill hiſt. an. t. 1. 2. Brachionus corpore conico toruloſo, cauda tricuſpidi.

Goeze Hannöv. Magaz. 1772. *et Beſch. berl. Naturf.* 2. *p.* 287.

Leeuwenh. cont. arc. nat. p. 386. *f.* 1. 2.

Joblot microſc. 2. *p.* 96. *t.* 5. *f.* A-E. K.

Baker microſc. p. 348-379. *t.* 11. *f.* 1-14.
expl. p. 95. *t.* 6-8.

Habitat in Europae aquis ſtagnantibus, *vere et auctumno in vegetabilium infuſo frequens, cordis et interaneorum motu diverſo, viſibili, flavicans.*

*** *cauda pedunculoque orbae.*

crataegaria. 6. V. ſubgloboſa conferta. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 105. *n.* 112. *zool. dan. prodr.* 2540.

Syſt. nat. XII. *p.* 1318. *n.* 6. Vorticella compoſita, floribus muticis globoſis: tentaculis binis, ſtirpe ramoſa.

Pallas el. zooph. p. 101. *n.* 58. Brachionus vegetans, ſtirpe rigida brevi dichotoma, corpuſculis confertis ovalibus ore bitentaculatis.

Roeſel inſ. 3. *polyp. p.* 604. *t.* 98. *f.* 2. aa. *et f.* 3. Pſeudopolypus fructus crataegi forma, tentaculis binis.

Baker micrögr. p. 357. *t.* 13. *f.* 15. 1. 2. 3. Animalculum moriforme.

Ledermüll. microſc. t. 88. *f.* o. p.

Habitat in Europae ſtagnis, *Aprili ſaepe caudae monoculi quadricornis adhaerens, corpuſculis plerumque acaulibus, ſeſſilibus, coacervatione morum referentibus.*

canaliculata. 42. V. dilatata pellucida, latere inciſo. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 104. *n.* 111. *zool. dan. prodr.* 2539.

Habitat in aqua confervae fluviatili infuſa, *poſtquam haec virorem exuerat, gregaria, alba, pellucida, interaneis obſcuris.*

naſuta. 43. V. cylindrica, crateris medio mucrone prominente. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 102. *n.* 110. *zool. dan. prodr.* 2538.

Habitat parcior in Daniae aquis *inter lemnam, nudo oculo inconſpicua, pellucida, formam pro lubitu mutans, motu multiplici, organo rotatorio medium corpus cingente.*

crateriformis. 44. V. ſubquadrata. *Müll. hiſt. verm.* I. I. *p.* 101. *n.* 109. *zool. dan. prodr.* 2537.
Hill. hiſt. an. p. 6. *t.* 1. *f.* 2. Craſpedarium corpore ſubovato.
Habitat in foſſis Daniae aquoſis lemna obductis, *et frequens in* aqua graminibus infuſa, *oculo nudo inconſpicua, vivaciſſima, pellucidiſſima, ut veſiculas tamen* 8-10 *in medio diſtinguere liceat, organo rotatorio utrinque in faſciculum ciliorum unito.*

truncatella. 45. V. cylindrica truncata, ciliis confertis. *Müll. hiſt. verm.* I. I. *p.* 100. *n.* 108. *zool. dan. prodr.* 2536.
Hill hiſt. an. p. 6. *t.* 1. Craſpedarium corpore cylindrico.
Habitat haud frequens in aquis Daniae *lemnam ferentibus, limacina craſſior, hyalina, moleculis nigricantibus farta, poſterius obtuſa, antrorſum truncata, aperturae margine toto ciliis ornato.*

limacina. 46. V. cylindrica truncata, ciliis bigeminis. *Müll. hiſt. verm.* I. I. *p.* 100. *n.* 107. *zool. dan. prodr.* 2535.
Habitat in Daniae aquis ſtagnantibus, *teſtaceorum tentaculis orique inſidens, oculo nudo inconſpicua, hyalina.*

cornuta. 47. V. inverſe conica viridis opaca. *Müll. hiſt. verm.* I. I. *p.* 99. *n.* 100. *zool. dan. prodr.* 2534.
Habitat in Daniae paludibus, *Decembri potiſſimum obvia, craſſa, formae mutabilis, ſitu obliquo vacillando incedens.*

cincta. 48. V. trapeziformis nigro viridis opaca. *Müll. hiſt. verm.* I. I. *p.* 98. *n.* 105. *zool. dan. prodr.* 2533.
Habitat in Daniae paludibus, *oculo nudo inviſibilis, circa centrum lente rotata, formae irregularis.*

polymorpha. 49. V. multiformis viridis opaca. *Müll. hiſt. verm.* I. I. *p.* 98. *n.* 104. *zool. dan. prodr.* 2532. *Beſch. berl. Naturf.* 2. *p.* 20. *t.* 1.
Habitat - - - oculo nudo punctum agiliſſimum viride oſtendens.

viridis. 50. V. cylindrica uniformis viridis opaca. *Müll. hiſt. verm.* I. I. *p.* 97. *n.* 103. *zool. dan. prodr.* 2531.
Habitat in Daniae aquis purioribus, *Septembri praeſertim obvia, lente ſaepe in linea recta, ſaepiſſime per circulum in aqua mota, oculo nudo punctum parvum viride repraeſentans.*

nigra. 51. V. trochiformis nigra. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 96. *n.* 102. *zool. dan. prodr.* 2530.
Habitat in Daniae pratis inundatis, *Auguſto occurrens vacillando fere continue in ſummo aquae mota, oculo nudo puncta minima nigra ſiſtens.*

TRICHODA. *Vermis* nudo oculo inconſpicuus, pellucidus, altera parte crinitus.

* *acaudatae.*

Patella. 1. Tr. univalvis, anterius et poſterius ſetis inaequalibus porrectis. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 95. *n.* 101. *zool. dan. prodr.* 2529.
Habitat rara in Daniae aqua paluſtri, *vacillando natans, pulpoſa, ſuperius et inferius ſetis, pedum quaſi vices agentibus hirta, valvula orbiculari cryſtallina, anterius ſubemarginata.*

Inquilinus. 2. Tr. vaginata folliculo cylindrico hyalino, pedicello retortili. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 31. *n.* 8. *t.* 9. *n.* 2. *rar. deſcr.* 1. *p.* 17. *prodr. app. p.* 281.
Habitat in aqua marina puriſſima, *crateriformis, moleculis obſcuris farta, pedicello filiformi, vagina corpore triplo vel quadruplo longiori, rarius pedunculata; an forſan cum Patella diſtincti generis?*

Anas. 3. Tr. elongata, apice colli ſubtus elongato. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 95. *n.* 100. *zool. dan. prodr.* 2528.
Joblot microſc. t. 4. *f.* l. n. m?
Habitat in aquis purioribus, *moleculis obſcuris impleta, complanata, latitudine quintuplo longior, lente vagans.*

Larus. 4. Tr. antrorſum dilatata, dorſo gibbo. *Hermann Naturſ.* 20. *t.* 3. *f.* 61.
Müll. zool. dan. prodr. add. p. 281. *n.* 4. Trichoda Anas.
Habitat in palude populi foliis putreſcentibus *plena, lente et corpore ad latus curvato natans.*

Urſula. 5. Tr. planiuſcula elongata aequalis anterius crinita. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 94. *n.* 99. *zool. dan. prodr.* 2527.
Habitat in foeni *aliorumque* vegetabilium infuſis putridis, *ſaepe* muceſcentibus, *per aquam vagans, latitudine ſua ſextuplo longior flexuoſa, aequalis teretiuſcula.*

6. Tr.

Sannio. 6. Tr. incurvata, ſupra ciliata infra truncata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 94. *n.* 98. *zool. dan. prodr.* 2526.
Habitat rara in aquis, *in quibus* lemna *naſcitur, ludionem referens, at cirris ventris nullis, capitis lateralibus utrinque duobus, mobilibus, pendulis, pilis in margine truncato 3-4 breviſſimis.*

Linter. 7. Tr. ovato-oblonga, utroque fine prominula. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 93. *n.* 97. *zool. dan. prodr.* 2525.
Habitat in aqua licheni coriario Groenlandorum infuſa, *centro vacillando feſtino motu agitata, interdum ſurſum deorſumque gyrata, utroque fine aequalis, globulorum ſerie utrinque duplici vel triplici.*

Pubes. 8. Tr. ovato-oblonga gibba, antrorſum depreſſa. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 92. *n.* 96. *zool. dan. prodr.* 2524.
Habitat in aquis lemnam *ferentibus, Decembri per eas vagans, ſupra poſterius macula nigra ab interaneis notata, apice obtuſo pilis minimis, ſetis nullis obſeſſo.*

Cypris. 9. Tr. obovata, poſteriora verſus ſuperne ſinuata, anterius crinita. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 91. *n.* 95. *zool. dan. prodr.* 2523.
Habitat in aquis lemna tectis, *quovis momento retrogrado motu agitata, monoculum cypridem referens, compreſſa, frontis capillis baſi latiuſculis.*

Cyclidium. 10. Tr. ovata, apice hiante, baſique crinita. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 90. *n.* 94. *zool. dan. prodr.* 2522.
Joblot microſc. I. 2. *t.* 2. *f.* 3. *t.* 8. *f.* 9. *et t.* 10. *f.* 19.
Habitat vulgaris in aqua vegetabilibus *infuſa, margine vacillando incedens, latere plano promota, antrorſum anguſtior, globulis diverſi voluminis, retrorſum obſcurioribus, repleta.*

Urinarium. 11. Tr. ovata, roſtro breviſſimo crinito. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 90. *n.* 93. *zool. dan. prodr.* 2521.
Joblot microſc. I. 2. *p.* 65. *t.* 8 *f.* 2-4?
Habitat rarior in aqua foeno *infuſa, vacillando mota, depreſſa, veſiculis molecularibus impleta, roſtri ciliis breviſſimis.*

Lepus. 12. Tr. ovata, apice crinito, baſi ſetoſa. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 89. *n.* 92. *zool. dan. prodr.* 2520.
Habitat in fimetis, infuſionibusque tum animalibus tum vegetabilibus, *abundante, latice fluctuans, margine utrin-*

que ſurſum flexo, parciore lente procedens, et omni momento comitatim a via deflectens, compreſſa, antrorſum punctis 2-3 lucidis mobilibus.

Caloitium. 13. Tr. latiuſcula oblonga, anterius corniculis micantibus. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 89. *n.* 91. *zool. dan. prodr.* 2519.
Habitat in aqua vegatabilibus infuſa, *aequalis, planiuſcula, utrinque obtuſa, moleculis nigricantibus impleta, anterius corniculis* 2 3 *punctisque lucidis mobilibus* 3-5, *poſterius ſetis breviſſimis inſtructa.*

Silurus. 14. Tr. oblonga, anterius et poſterius crinita, dorſo ciliato. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 88. *n.* 90. *zool. dan. prodr.* 2518.
Habitat copioſa in aqua conferva plena, *et aliquandiu in vaſculo ſervata, opaca, ſubincurvata, complanata, ſaepe ovata, punctis inaequalibus lucidis et opacis plena, pilis ciliisque undique mobilibus.*

Mytilus. 15. Tr. ſubclavata, utroque fine latiori hyalino ciliato. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 87. *n.* 89. *zool. dan. prodr.* 2517. *Hermann Naturf.* 20. *p.* 51. *t.* 3. *f.* 12.
Habitat in aqua, *potiſſimum* paluſtri, *paulo diutius aſſervata, celerrime natans multumque aquam continue hauriens, vorticellae affinis, immaculata, utroque fine quaſi ex* 2 *laminis conflata, rotundata, medio interaneis nigricantibus, quibus veſiculae pellucidae interjacent, obſcura.*

Urnula. 16. Tr. urceolaris anterius crinita. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 87. *n.* 88. *zool. dan. prodr.* 2516.
Habitat rariſſima in aqua *lemna obtecta, lente incedens, vorticellae facie, membranacea, poſterius obtuſa, medio latiuſcula, anterius truncata, moleculis veſicularibus et nigricantibus repleta, pilis aequalibus brevibus.*

Lynceus. 17. Tr. ſubquadrata, roſtro adunco: ore crinito. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 86. *n.* 87. *zool. dan. prodr.* 2515.
Habitat in aqua *ante* 3 ſeptimanas regelata, *a* Mullero *in copula deprehenſa, in lineam rectam vix* 2-3 *corporis diametros progreſſa, confeſtim ſe paulisper recipiens, retroque in circulum mota, monoculum lynceum referens, membranacea, compreſſa, roſtro porrecto infra truncato, pilorum faſciculo pendulo, interaneis tubuloſis eximie conſpicuis.*

Semiluna. 18. Tr. ſemiorbicularis, anterius ſubtus crinita. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 85. *n.* 86. *zool. dan. prodr.* 2514.

Habitat

Habitat in aqua lemnae infuſa, *lento, convulſivo quaſi motu agitata, complanata, figuram lunae in primo quadrante conſtitutae, prae ſe ferens, pilis raris breviſſimis.*

Orbis. 19. Tr. orbicularis anterius emarginata crinita. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 85. *n.* 86. *zool. dan. prodr.* 2513.

Habitat rara in aquis, *cimicem referens, at major et planior, tota e meris moleculis veſicularibus conflata.*

Cimex. 20. Tr. ſupra convexa ſubtus plana crinita. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 84. *n.* 85. *zool. dan. prodr.* 2512. *Goeze Beſch. berl. Naturf.* 3. *p.* 377. *t.* 8. *f.* 7-12.

Joblot microſc. I. 2. *p.* 78. *t.* 2. *f.* 3. *t.* 8. *f.* 99.

Habitat frequens in aqua fimetorum *et* vegetabilibus infuſa, *colpodas devorans, rapaciſſima, natans et ambulans, lynceo affinis, at ovalis, interaneis pellucidiſſimis indiſtinctis, interdum gibba et poſterius opaca.*

Charon. 21. Tr. cymbiformis, fronte crinita. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 83. *zool. dan. prodr.* 2511.

Habitat in aqua maris, *lynceo duplo major, undulatim mota, anterius ſetis* 2-3 *porrectis, in medio ſolitariis mobilibus inſtructa.*

Tinea. 22. Tr. clavata anterius crinita, poſterius groſſa. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 83. *n.* 84. *zool. dan. prodr.* 2510.

Habitat in aqua foeno infuſa, *poſt* 3 *demum ſeptimanas conſpicua, lepore triplo minor, lente pilis continue micantibus incedens, teres, ſubpellucida, anterius anguſta, tineam referens.*

trigona. 23. Tr. convexa anterius ciliata poſterius eroſa. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 82. *n.* 83. *zool. dan. prodr.* 2509.

Habitat rarior in aquis, *ſub lemna vacillando incedens, pilis breviſſimis.*

Angulus. 24. Tr. angulata apice crinita. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 81. *n.* 82. *zool. dan. prodr.* 2508.

Habitat rara in aqua foeno infuſa, *interrupte per circulum mota, elongata, teretiuſcula, quaſi infracta, pilis brevibus, interaneis non diſcernendis.*

Pullaſter. 25. Tr. ovata anterius ſinuata, fronte criſtata baſi crinita. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 81. *n.* 81. *zool. dan. prodr.* 2507.

Habitat in aquis ſub lemna, *pulici affinis, ſed minor, ſupra pellucida punctis nigricantibus vacua, anterius ſinuata*

fronte truncata, totaque capitis ſuperficie pilis aſpera, diſtincta.

Pulex. 26. Tr. ovata anterius inciſa, fronte baſique crinitis. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 80. *n.* 80. *zool. dan. prodr.* 2506.

Habitat rarior in aqua ſub lemna, *quoties* 3-4 *greſſusproceſſit, unum mox retrogradiens, Colpodam cucullum referens, erecta, convexiuſcula, pellucida, moleculis nigricantibus undique referta, fronte obtuſa pilis rarioribus inſtructa, quibus alternatim vibrat.*

Pellionella. 27. Tr. cylindrica anterius crinita poſterius ſetoſa. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 80. *n.* 79. *zool. dan. prodr.* 2505.

Habitat in aqua vegetabilibus *infuſa, lente incedens, medio paulo craſſior, utrinque obtuſa.*

Camelus. 28. Tr. anterius crinita craſſiuſcula medio utrinque emarginata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 80 *n.* 78. *zool. dan. prodr.* 2504.

Habitat rara in aqua, *vegetabilibus infuſa, in qua lente movetur pilis quaſi oſcillantibus, anterius ventricoſa, dorſo medio in* 2 *quaſi tubercula diviſo.*

Acarus. 29. Tr piriformis, anterius ſubtus crinita, poſterius pedata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 79. *n.* 77. *zool. dan. prodr.* 2503.

Habitat rara in aqua lemna *tecta, utplurimum per circulum mota, vivida, conica, moleculis nigricantibus impleta, anterius hyalina, apice attenuato, ſubtus ciliis longis radiato, ſubtus cirris* 4 *mobilibus, longis, curvatis inſtructa.*

Bomba. 30. Tr. mutabilis anterius pilis ſparſis. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 78. *n.* 76. *zool. dan. prodr.* 2502. *Schranck oberdeutſch. Beytr.* 1787. *p.* 146. *t.* 1. *f.* L.

Habitat frequens in aquis, ubi lemna *vegetat, granatae affinis, at major et flaveſcens, vivaciſſima, craſſa, moleculis lateſcentibus repleta.*

Granata. 31. Tr. ſphaerica, centro opaco, peripheria crinita. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 78. *n.* 75. *zool. dan. prodr.* 2501.

Habitat in aquis lemna coopertis, *grandinellae et cometae affinis, at vita ſedentaria, nucleo obſcuro, interaneis non diſcernendis, ciliis totum marginem occupantibus diametro brevioribus diſtincta.*

Cometa. 32. Tr. ſphaerica, anterius crinita, globulo appendente. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 77. *n.* 74. *zool. dan. prodr.* 2500.

Habitat

Habitat in aqua puriſſima, *auctumno conſpicua, vorticellarum pedunculatarum more circumnatans, tota pellucida.*

Grandinella. 33. Tr. ſphaerica pellucida ſuperne crinita. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 77. *n.* 73. *zool. dan. prodr.* 2499.
Habitat in aqua puriſſima, *et* vegetabilibus *infuſa, interaneis vix diſcernendis, ſetis* 2, 3 *pluribusve in puncto ſuperficiei.*

Sol. 34. Tr. globularis undique radiata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 76. *n.* 72. *zool. dan. prodr.* 2498.
Joblot microſc. I. 2. *p.* 64. *t.* 7. *f.* 15.
Habitat in aqua *per* 3 *ſeptimanas aſſervata, radiis ex tota ſuperficie prodeuntibus innumeris ſubtiliſſimis, diametro longioribus interaneis malecularibus ſimilaribus.*

Syncaſter. 35. Tr. ſubquadrata roſtro obtuſo, diſco pedicellis micantibus. *Müll. zool. dan.* I. 1. *p.* 33. *ic.* 1. *t.* 9. *n.* 3. *rar. deſcr.* 1. 3. 19. *prodr. app. p.* 281.
Habitat in aquá marina aſſervata, *minima.*

Rattus. 36. Tr. oblonga carinata, anterius pilis breviſſimis, poſterius ſeta longa ſimplici. *Müll. zool. dan. prodr. app. p.* 281. *Hermann Naturf.* 20. *p.* 163. *n.* 47. *t.* 3. *f.* 47.
Habitat in aqua ſtagnante, *inter lemnas, aequabiliter mota, interaneis in gibbo dorſi conſpicuis.*

ciliata. 37. Tr. ventricoſa, poſterius crinibus pectinata. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 73. *f.* 13-15. *rar. deſcr.* 2. *p.* 100.
Habitat in aqua mytilli edulis, *leucophram fluidam referens, flavicans, craſſa, reniformis, vel triangularis, ciliis undique cincta, crinibus totum marginem poſteriorem occupantibus, intermediis longioribus.*

ſulcata. 38. Tr. ovato ventricoſa apice acuminata, ſulco ventrali utrinque crinito. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 73. *f.* 16-20. *rar. deſcr.* 2. *p.* 100.
Habitat in aqua inter valvulas mytili edulis *retenta, ignitam referens, at major, flavicans, anterius pallida absque ciliis.*

** *caudatae.*

transfuga. 39. Tr. latiuſcula anterius crinita poſterius ſetoſa, altero latere ſinuata, altero mucronata. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 29. *ic.* *t.* 9. *n.* 1. *rar. deſcr.* 1. *p.* 16. *prodr. app. p.* 281.

Habitat in aqua marina, *aliquandiu aſſervata, in dorſo utplurimum natans, primo antrorſum procedens, mox convulſivo quaſi motu retrogradiens, inter congeneres magna, duplo longior, quam lata, ad latus et retrorſum conſpicuis interaneis, anterius rotundata, pilis interdum in 2 faſciculos junctis, dorſo ultra medium convexo, in caudam latam depreſſam ſubtetragonam oblique truncatam terminata, ſub qua ſetae 4 pluresve flexuoſae.*

Delphinus. 40. Tr. oblonga, anterius crinita, poſterius cauda reflexa truncata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 75. *n.* 71. *zool. dan. prodr.* 2497.

Habitat in aqua foeno infuſa, *poſt* 2 *ſeptimanas conſpicua, lateribus planis potiſſimum mota, complanata, cauda dimidia corporis longitudine apice dilatata: angulo ſuperiore prominulo.*

Ludio. 41. Tr. cirrata, ſupra crinita, cauda ſurſum extenſa. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 75. *n.* 70. *zool. dan. prodr.* 2496.

Habitat rariſſima in aquis Daniae *nemoralibus, lepida, vivida, nunc in gyrum circumacta, nunc per lineam angulatam vacillans, punctulata, anterius clavata, poſterius anguſtior, baſi verſus anteriora oblique truncata, ciliis cirrisque mobiliſſimis.*

Muſculus. 42. Tr. ovalis anterius crinita, poſterius ſubtus caudata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 71. *n.* 69. *zool. dan. prodr.* 2495.

Habitat in aqua foeno infuſa, *poſt plures demum ſeptimanas conſpicua, lentius mota, complanata, pilis raris breviſſimis, cauda ſpinam referente, interdum triplo minor et vivacior.*

Piſcis. 43. Tr. oblonga anterius crinita, poſterius in caudam exquiſitam extenuata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 73. *n.* 68. *zool. dan. prodr.* 2494.

Habitat in aquis lemna plenis, *per ſeptimanam aſſervatis, lente mota, complanata, aequalis ubique latitudinis, moleculis flaveſcentibus plana, anterius obtuſa: pilis rarioribus et breviſſimis, poſterius hyalina.*

Cuniculus. 44. Tr. oblonga anterius crinita, poſterius ſubacuminata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 73. *n.* 67. *zool. dan. prodr.* 2493.

Habitat rarior paulo in aquis purioribus, *motu vagatorio, complanata, moleculis et veſiculis nigricantibus repleta, anterius obtuſo: ciliis breviſſimis, poſteriori apice hyalino.*

45. Tr.

Clavus. 45. Tr. anterius rotundata crinita, poſterius acuminato-caudata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 72. *n.* 66. *zool. dan. prodr.* 2492.
Habitat in paludoſis, *lente mota, clavum referens, pilis anterius raris, paſſim mobilibus.*

Pupa. 46. Tr. aculeata fronte crinita, cauda inflexa. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 72. *n.* 65. *zool. dan. prodr.* 2491.
Habitat rara in aquis *cum* lemna, *culicis pupam referens, lente in circulum mota, teretiuſcula, capitis pilis breviſſimis, in inferiore ejus regione veſicula hyalina, cauda obliqua.*

Clava. 47. Tr. clavata, fronte crinita, cauda reflexili. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 71. *n.* 64. *zool. dan. prodr.* 2490.
Habitat rarior in paludoſis Daniae, *Novembri conſpicua, cypridi affinis, at triplo major, pilis anticis longis, poſteriori parte anguſtiore nuda.*

CERCARIA. *Vermis* nudo oculo inconſpicuus, pellucidus, caudatus.

* *depreſſae.*

Pleuronectes. 1. C. orbicularis, cauda uniſeta. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 70. *n.* 63. *zool. dan. prodr.* 2488.
Habitat in aqua *per* 6 *ſeptimanas aſſervata, vacillando mota, membranacea, albida (a morte virens), anterius punctis* 2 *ſubapproximatis nigris, cauda ſubtili acuta: interaneis in medio orbicularibus, majori unico pellucidiſſimo.*

tenax. 2. C. membranacea anterius craſſiuſcula truncata, cauda triplo breviore. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 69. *n.* 62. *zool. dan. prodr.* 2487.
Habitat in aqua ſordibus dentium infuſa, *poſt* 4 *dies apparens, celeri gyro in varias directiones vagans, lente paulo major, obovata.*

Cyclidium. 3. C. ovalis poſterius ſubemarginata, cauda exſertili. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 68. *n.* 61. *zool. dan. prodr.* 2486.
Habitat frequens in aquis purioribus, *ad angulum acutum vacillando, per diagonalem guttulae currendo mota, pellucidiſſima, margine nigricante, cauda latente, interaneis veſicularibus pellucidis.*

 ** *ſub-*

*** ſubtrigonae.*

tripus. 4. C. brachiis deflexis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2489.
Habitat in aqua marina.

**** teretes.*

Lemna. 5. C. mutabilis, cauda annulata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p* 67. *n.* 60. *zool. dan. prodr.* 2485.
Habitat in aqua paludoſa, *lente incedens, et incedendo mirifice ſe contrahens formamque mutans, pyriformis, oblonga, elongata, reniformis vel triangularis, cauda brevi craſſa annulata, aut flexuoſa tereti, absque annulis.*

Lupus. 6. C. cylindrica elongata toroſa, cauda ſpinis duabus. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 67. *n.* 59. *zool. dan. prodr.* 2484.
Habitat rara in aquoſis lemnam ferentibus, *congeneribus duplo vel triplo major, Vorticellae ſeli affinis, et organo rotario nullo, et apice ſubtus in mucronem terminato diſcernenda, muſculoſa contractilis, capite trunco dimidio majore, apice deorſum in uncum parvum producto.*

Podura. 7. C. cylindrica, poſterius acuminata ſubfiſſa. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 66. *n.* 58. *zool. dan. prodr.* 2483.
Habitat in Daniae paludoſis lemna coopertis, *Novembri et Decembri obvia, poduras pullas referens, corpus circa axin volvendo in quamvis plagam incedens, capite halecem referens, trunco formae pro lubitu mutabilis, inteſtinis nigris ſpiralibus repleto.*

Catellus. 8. C. tripartita, cauda biſeta. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 65. *n.* 57. *zool. dan. prodr.* 2482.
Habitat in aqua *per annum ſervata, et in aqua per ſeptimanam flores nutriente, abdomine capite duplo longiori cauda latiori.*

Gyrinus. 9. C. rotundata, cauda acuminata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 64. *n.* 56. *zool. dan. prodr.* 2481.
Hill. hiſt. an. t. 1. 3. Macrocercus corpore globoſo, cauda craſſiore.
Leeuwenh. ep. phyſ. 41. *f.* 5.
Fraenk. Samml. 4. *p.* 227. *n.* 1. *f.* a. *p.* 372. *t.* 3. *f.* a. b.
Ledermüll. an. ſperm. f. 1. 2?
Baker microſc. expl. t. 10. *f.* 1?
β) *Hill anim. hiſt. t.* 1. 4?
Habitat rara in aqua partibus animalibus infuſa, *candida, gelatinoſa, absque omni interaneorum veſtigio, anterius*

ſub-

ſubgloboſa, poſterius teres elongata, interdum utrinque compreſſa, natando caudam inſtar gyrini vibrans.

BURSARIA. *Vermis* ſimpliciſſimus membranaceus cavus.

Hirundinella. 1. B. excavata mucronata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 63. *n.* 55. *zool. dan. prodr.* 2480.

Habitat in aquis nemoralibus, *Julio et Auguſto circa lemnam copioſiſſima, lente volutata, brachiisque extenſis hirundines in aëre circumvolitantes mentiens, linea duplici ſubelevata transverſa inaequalis, margine in quatuor mucrones plagas oppoſitas ſpectantes, 2 laterales aequales breviores expanſo.*

Truncutella. 2. B. ventricoſa apice truncata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 62. *n.* 54. *Müll. zool. dan. prodr.* 2479.

Habitat in Daniae foſſis aquoſis paludibusque nemoralibus, *foliis fagi putreſcentibus repletis, vere copioſa, nudo oculo uſurpanda, albida, lente ſe ab uno latere ad alterum volvendo per lineam ſpiralem in aquae ſuperficiem adſcendens, ovata,* $\frac{1}{2}$ *lineae magnitudine, apice hiante, ovis ſaepius in fundo* 3-5 *ſphaericis, rufis.*

GONIUM. *Vermis* nudo oculo inconſpicuus ſimpliciſſimus, complanatus angulatus.

polyſphaerium. 1. G. orbiculare pellucidum moleculis ſphaericis innumeris. *Schranck oberd. Beytr.* 1. *p.* 145. §. 5. *t.* 2. *f.* I. K.

Habitat in aqua ſtagnante puriore, *Julio conſpicua, innumeris globulis conſtans, tunicae communi incluſis, pellucidiſſimis, ex vireſcente flava, pectorali multo minus.*

truncatum. 2. G. obtuſangulum poſterius arcuatum. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 61. *n.* 52. *zool. dan. prodr.* 2477.

Habitat haud frequens in aquis puris, *pulvinato multo majus, lente procedens, antrorſum linea recta terminatum, ſubtus linea breviori in angulum obtuſum truncatum, cruribus arcu unitis, interaneis obſcure vireſcentibus, in medio veſiculis 2 majoribus hyalinis.*

lunatum. 3. G. rectangulum poſterius arcuatum. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 62. *n.* 53. *zool. dan. prodr.* 2478.

Habitat

Habitat frequentius, truncato minus, interaneis vireſcentibus, intermedia veſicula majore hyalina.

pulvinatum. 4. G. quadrangulare opacum, pulvillis quatuor. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 61. *n.* 51. *zool. dan. prodr.* 2476.
Habitat in fimetis, *ad angulum acutum lente vibrando motum, in* 4 *quaſi areolas diviſum.*

pectorale. 5. G. quadrangulare pellucidum, moleculis ſedecim ſphaericis. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 60. *n.* 50. *zool. dan. prodr.* 2475. *act. Stockh.* 1781. *p.* 21. *kl. Schr.* 1. *p.* 15. *f.* 1-3.
Goeze apud Bonnet inſectol. p. 376. *t.* 4. *f.* 8.
Pelliſſon Beſch. berl. Naturf. 1. *p.* 339.
Beſeke leipz. Magaz. 1784. 3. *p.* 319.
Schranck Beytr. z. Naturg. p. 107. *t.* 4. *f.* 23-27.
Habitat in Europae aquis puris, *alternatim dextram ſiniſtramque verſus ultra circuli quadrantem ſe volvendo progrediens, moleculis motu ovalibus, ſubvirentibus, unionum inſtar pectoralis ſummi pontificis membranae quadrangulae incluſis.*

COLPODA. *Vermis* nudo oculo inconſpicuus, ſimpliciſſimus, pellucidus, complanatus, ſinuatus.

Hippocrepis. 1. C. toroſa medio anguſtata ſemilunaris vireſcens. *Hermann Naturf.* 20. *p.* 169. *n.* 59. *t.* 3. *f.* 60.
Habitat in aqua inundante, aſſervata, *formae conſtantis agilis, continue mota.*

Meleagris. 2. C. mutabilis, anterius uncinata poſterius complicata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 59. *n.* 49. *zool. dan. prodr.* 2474.
Habitat rara in aquis cum lemna, *varie ſe plicando lente mota, apice in uncum flexo, anterius hyalina, poſterius moleculis repleta.*

Cucullus. 3. C. ovata anterius inciſa. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 58. *n.* 48. *zool. dan. prodr.* 2473.
Joblot microſc. I. 2. *t.* 2. *f.* 2-7. *t.* 3. *f.* F. G. P. *t.* 4. *f.* a. c. *f.* p. g. A. B. *t.* 5. *f.* 5. S. *f.* 6. V. *f.* 7. *et t.* 6. *f.* 2. 4. 5. 6.
Ledermüll. microſc. p. 88. *t.* 48. *f.* 1.
Wrisberg an. infuſ. p. 59. *f.* 4. D. E. F. G. O. *f.* 10. C. D. E. F. G. H. *et f.* 12.
Spallanz. anim. infuſ. p. 128. 129. *t.* 1. *f.* 3. 4.

Schranck

Schranck Beytr. z. Naturg. p. 17. *t.* 1. *f.* 21.
Goeze Beſch. berl. Naturf. 3. *p.* 376. *t.* 8. *f.* 1-6.
Habitat vulgaris in aqua foeno *aliisque* vegetabilibus infuſa, *in varias directiones vivide mota, ventricoſa, pellucidiſſima, antrorſum infra apicem in roſtrum utplurimum obtuſum ſinuatum, veſiculas pellucidas, junior nullas, adultior* 8-24 *continens, ſobolem.*

Ren. 4. C. craſſa medio ſinuata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 57. *n.* 47. *zool. dan. prodr.* 2472.
Joblot microſc. I. 2. *p.* 65. *t.* 8. *f.* 3. A. B. C.
Habitat in aqua foeno infuſa, *decem horis elapſis comparens, celeriter vacillando mota, flaveſcens, aut cryſtallina ſubobſcura, teres, interaneis molecularibus farta.*

Roſtrum. 5. C. oblonga anterius uncinata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 57. *n.* 46. *zool. dan. prodr.* 2471.
Habitat haud frequens in aquis lemnam ferentibus, *lente et horizontaliter mota, ſaepe in alteram paginam praeceps projecta, moleculis nigricantibus repleta, poſterius obtuſa.*

Lamella. 6. C. elongata membranacea, anterius curvata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 56. *n.* 45. *zool. dan. prodr.* 2470.
Habitat rariſſima in aquis, *margine acuto vagando vacillans, cryſtallina, pellucidiſſima anguſta, poſterius obtuſa.*

PARAMECIUM. *Vermis* nudo oculo inconſpicuus, ſimplex, pellucidus, complanatus, oblongus.

Hiſtrio. 1. P. ovato-oblongum, anterius punctis mobilibus nigris. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 55. *n.* 44. *zool. dan prodr.* 2469.
Habitat inter confervas aquarum dulcium, *motu convulſivo retractili agitatum, punctis anterius* 4-5 *omni momento locum mutantibus notatum.*

Aurelia. 2. P. oblongum anterius in longitudinem plicatum. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 54. *n.* 43. *zool. dan. prodr.* 2468. *Hermann Naturf* 20. *t.* 3. *f.* 41. a.
Hill hiſt. anim. t. 1. 3. Paramecium corpore ſublongo medium verſus anguſtato.
Wrisberg an. infuſ. f. 7. a. E.
Habitat in foſſis lemna plenis, *Junio obvia, et copioſa aqua vegetabilibus infuſa, ſecundum lineas rectas vacillans, majuſcula,*

juſcula, membranacea, latitudine quadruplo longior, anterius obtuſa, hyalina, poſterius moleculis variae magnitudinis repleta, plica a medio ad apicem anteriorem producta.

caudatum. 3. P. utroque fine acuminatum, medio latiore moleculis referto. *Hermann Naturf.* 20. *p.* 157. *n.* 38. *t.* 3. *f.* 38.
Habitat in aquis ſub lemna, *motu lento aequabili agitatum.*

anceps. 4. P. cauda ancipite, capite obtuſo. *Hermann Naturf.* 20. *p.* 157. *n.* 39. *t.* 3. *f.* 39.
Habitat in aqua, hydrocharide *referta, motu lento aequabili laterali directionem ſpiralem ſequens.*

acutum. 5. P. cauda ancipiti, capite acuto. *Hermann Naturf.* 20. *p.* 158. *n.* 40. *t.* 3. *f.* 40.
Habitat in lemna aquarum ſtagnantium, *minus agile, caudam continue motitans.*

CYCLIDIUM. *Vermis* nudo oculo inconſpicuus ſimpliciſſimus, pellucidus, complanatus, orbicularis vel ovatus.

Pediculus. 1. C. ovale convexum ſubtus planum. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 54. *n.* 42. *zool. dan. prodr.* 2467.
Trembl. polyp. 1. *p.* 282. *t.* 7. *f.* 10. 11.
Goeze Beſch. berl. Naturf. 2. *p.* 281. *t.* 8 *f.* 13.
Habitat in hydra fuſca *et* pallente, *corpori tentaculisque adhaerens, Julio potiſſimum et Auguſto occurrens, motu formaque multiplici varians, gelatinoſum, albidum, utroque fine depreſſum truncatum.*

Nucleus. 2. C. ovale, poſterius acuminatum. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 53. *n.* 41. *zool. dan. prodr.* 2466.
Hill hiſt. anim. t. 1. 4? Cyclidium corpore ovato.
Habitat rara in aqua vegetabilibus infuſa, *figura nucleum uvarum referens, compreſſum, diſtincte marginatum, anterius convexo-obtuſum interaneis veſicularibus, anterius et poſterius ab altero latere obſcurioribus.*

roſtratum. 3. C. ovale anterius mucronatum. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 53. *n.* 40. *zool. dan. prodr.* 2465.

Habitat

Habitat in aqua vegetabilibus infuſa, *complanatum, pellucidiſſimum, intus canali caeruleo ab apertura in 2 crura diviſo, ad medium corporis, infra medium lineolis 2 transverſis.*

radians. 4. C. ovatum, interaneis manifeſtis. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 52. *n.* 39. *zool. dan. prodr.* 2464. *Hermann* Naturf. 20. *p.* 151. *t.* 3. *f.* 27. i.

Hill. hiſt. an. t. 1. *f.* 3. Cyclidium corpore elliptico.

Spallanz. an. infuſ. t. 1. *f.* 2-6.

Habitat haud frequens in aqua vegetabilibus infuſa, *inter ovatum et orbicularem medium, pellucidiſſimum, planum, margine nigricante, interaneis veſicularibus hyalinis, materiae caeruleae incluſis.*

Glaucoma. 5. C. ovatum, interaneis aegre conſpicuis. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 51. *n.* 38. *zool. dan. prodr.* 2463. *Hermann Naturf.* 20. *p.* 148. *t.* 3. *f.* 27. b?

Habitat in aqua ultra 6 menſes hiemales *in* vaſe aperto ſervata, *in abundante aqua motu celere circulari et diagonali, quemadmodum gyrini, agitatum, utrinque planiuſculum, inteſtinis caeruleſcentibus.*

Milium. 6. C. ellipticum cryſtallinum. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 50. *n.* 37. *zool. dan. prodr.* 2462.

Habitat in aqua variis ſtirpibus infuſa, *poſt plures ſeptimanas copioſiſſimum, ſparſum, milii ſemina referens, motu celeri micatorio interrupto agitatum, pellucidiſſimum, puncto anteriori et poſteriori nigricante.*

Bulla. 7. C. orbiculare hyalinum. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 49. *n.* 36. *zool. dan. prodr.* 2461.

Hill hiſt. anim. t. 1. 2. Cyclidium corpore orbiculari ſubfuſco.

Wrisberg anim. infuſ. f. 1. b. *et f.* 2. i?

Habitat paſſim in aqua foeno infuſa, *motu lento ſemicirculari agitatum, interaneis globularibus, margine ſolo obſcuriore.*

VIBRIO.

VIBRIO. *Vermis* nudo oculo inconſpicuus, ſimpliciſſimus, teres, elongatus.

* *pellucentes.*

Columbus. 1. V. craſſus poſterius acuminatus, collo ſubfalcato. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 49. *n.* 35. *zool. dan. prodr.* 2460.
Habitat rarus in aquis, *lente motus, congeneribus major, avem aquaticam referens, trunco ſubtriquetro, moleculis flaveſcentibus repleto, antrorſum lato, collo breviori aequali, hyalino, apice obtuſo.*

Faſciola. 2. V. anterius attenuatus, medio latiuſculus, poſterius acutus. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 48. *n.* 34. *zool. dan. prodr.* 2459.
Habitat rarior in aqua gelu ſoluta, *lente faſciolae inſtar incedens, feſtine autem utrumque finem alternatim ſurſum deorſumque movendo, totumque ſimul corpus cylindri in modum circumagendo, interaneis punctorum aemulis mediis.*

Utriculus. 3. V. teres anterius anguſtatus truncatus, poſterius ventricoſus. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 48. *n.* 33. *zool. dan. prodr.* 2458.
Habitat in aqua marina putrida, *etiam* fluviatili *per menſes in* vaſculo ſtagnante, *utrem figura referens concitatim vacillans, vagandoque collum hyalinum, apice truncatum quovis momento citiſſime in utrumque latus motitans, ventre interaneis repleto: puncto interdum ad baſin pellucido.*

Malleus. 4. V. linearis, baſi globulo, apice linea transverſa. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 47. *n.* 32. *zool. dan. prodr.* 2457.
Habitat copioſus in putei aquis, *albus,* T *latinum referens, alternatim motus et quieſcens.*

Cygnus. 5. V. ventricoſus, collo adunco. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 47. *n.* 31. *zool. dan. prodr.* 2456.
Habitat in aqua ſtagnante, *congenerum inertiſſimus, collum modo exſerens et retrahens, exilis, pellucidiſſimus, poſterius acutus, trunco anteriori parti aequali, moleculis obſcuris et inteſtinis pellucidis repleto, cauda triplo breviore.*

Anſer. 6. V. ellipticus, collo longo, tuberculo dorſali. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 46. *n.* 30. *zool. dan. prodr.* 2455.
Habitat in aquis, quae lemnam ferunt, *lento motu, colli flexuoſo vivaciori, ſaepe ſpirali agitatus, inter falcem et Proteum medius, ab illa collo longiori tuberculo dorſi huic vicino,*

vicino, ab hoc colli apice aequali diſcernendus, teres moleculis refertus, poſterius hyalinus, canalibus intra margines colli caeruleſcentibus.

Falx. 7. V. gibboſus, poſterius obtuſus, collo falcato. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 46. *n.* 29. *zool. dan. prodr.* 2454.

Habitat in paludoſis lemna refertis, *latere plano ſurſum vergente progrediens, colloque immobili falcis formam mentiens, pellucidus ſupra planus, ſubtus gibbus, moleculis minimis globulisque* 2 *hyalinis impletus, collo teretiuſculo, hyalino, trunci fere longitudine, attenuato.*

Proteus. 8. V. ellipticus, collo longiſſimo: apice nodoſo. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 45. *n.* 28. *zool. dan. prodr.* 2453.

Pallas el. zooph. p. 94. *n.* 51. *et p.* 417. *n.* 2. Brachionus ſimplex mutabilis, tentaculo longiſſimo retractili, ore ciliato, et Volvox polymorpho-mutabilis, totus e moleculis homogeneis compoſitus.

Baker microgr. p. 270. *t.* 10. *f.* 110. a-f.
microſc. t. 10. *n.* XI. *f.* 1-6.

Roeſ. inſ. 3. *polyp. t.* 101. *f.* A-T?

Habitat rarus in aqua diutius *in* vaſculo ſervata viroreque vegetabili plena, *vividus, colli motu continuo, corporis lento, formae mutabilis, poſterius moleculis obſcuris repletus, collo corpore duplo et triplo longiore, pellucidiſſimo.*

** *gelatinoſi.*

Inteſtinum. 9. V. teres anterius anguſtatus. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 44. *n.* 27. *zool. dan. prodr.* 2452.

Habitat in Daniae paludoſis, *lente progrediens, lacteus, utroque fine obtuſus, anteriorem ſaepius in ſe retrahens, verſus poſteriorem ova* 4-5 *ſphaerica oſtendens.*

Undula. 10. V. filiformis flexuoſus. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 43. *n.* 26. *zool. dan. prodr.* 2451. *Hermann Naturf.* 20. *p.* 150. *t.* 3. *f.* 27. g.

Leeuwenh. epiſt. phyſ. 41. *f.* 5.
arcan. nat. 96? Anguilla.

Habitat in aqua lemna cooperta aſſervata, *vivaciſſimus, adſcendendo, deſcendendo, recta pergendo progrediens, teres, Lineola longior, Vermiculo multoties minor, interaneis nullis conſpicuis, nunquam recta extenſus.*

 11. V.

Vermiculus. 11. V. tortuoſus. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 42. *n.* 25. *zool. dan. prodr.* 2450.

Leeuwenh. op. omn. p. 56. (*in ranarum ſtercore*)
arcan. nat. p. 18. *f.* 5.

Habitat rarus in aqua paluſtri, *Novembri obvius, undulatim at lentiſſime motus, interdum at laborioſe recta extenſus progrediens, quieſcendo nonnunquam complanatus, lacteus, teres, elongatus, apice obtuſus, retrorſum acuminatus.*

Serpentulus. 12. V. aequalis utrinque ſubacuminatus. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 42. *n.* 24. *zool. dan. prodr.* 2449.

Hill hiſt. anim. t. 1. Enchelis corpore utrinque attenuato graciliori.

Fränk. Samml. 4. *p.* 227. *n.* 1. *f.* b-f.

Spallanz. microſc. p. 189. *f.* 2. 12.

Habitat in aqua vegetabilibus infuſa per ſeptimanas aſſervata, *ſerpentis more motus, at ſaepe recta extenſus, et tranquillus, brevior anguillula, et ſerie punctorum minimorum longitudinali notatus.*

Anguillula. 13. V. aequalis ſubrigidus. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 41. *n.* 23. *zool. dan. prodr.* 2448. *Naturf.* 19. *p.* 161.

Mundus inviſib. in amoenit. acad. Coruclum vermiculo ſimile.

Roffredi Journ. de phyſique 1775. *Jan. t.* 1. *f.* 7. 1778. *Nov. p.* 401. Anguille vulgaire.

Needham microſc. t. 5. *f.* 7. *et Hamb. Mag.* 1. *p.* 399.

Spallanz an. infuſ. p. 189. *f.* 12.

v. Gleichen microſc. p. 61. *t.* 28. *f.* 6.

Eichhorn kl. Waſſerth. p. 72. *t.* 8. *f.* A.

β) *Roffredi journ. de phyſ. Jan.* 1775. *t.* 1. Anguille de blad rachitique.

γ) *Roffredi journ. de phyſ.* 1776. *Jan. p.* 72. *Mart. p.* 372. 436. Anguille du faux ergot.

T. Fontana ſuggio d'oſſerv. ſopra il falſo ergoſt e la tremella. Flor. 1775.

Habitat in ſedimento vegetabili, parietes vaſorum, *in* quibus aqua ſtagnat, obveſtiente, *aut* frumenti granis rhachiticis vel cornutis infuſa, *pellucidiſſimus, absque conſpicuis interaneis, ut tamen interdum linea media transverſa, rarius corpuſcula bina ovata, rariſſime longitudinalis globulorum ſeries oculo armato occurrat, oviparus.*

14. V.

aceti. 14. V. ſubrigidus, cauda longiore tenuiore acuminata: mucrone retractili ad baſin prominente. *Goeze Naturf.* 1. *p.* 1. 9. *p.* 179. 18. *p.* 38. *t.* 3. *f.* 12-19. *et apud Bonnet org. Koerp. p.* 59.
Müll. Naturf. 19. *p.* 162.
Roffredi journ. de phyſ. 1775. *t.* 1. *f.* 5. 1776. *Jan. p.* 71. *Mart. p.* 382. Anguille du vinaigre.
Borell. obſerv. microſc. 1. *p.* 7.
Leeuwenh. op. omn. p. 3. *f.* 1-0.
Baker microſc. t. 10. *f.* 8. 9.
Joblot microſc. I. 2. *t.* 1.
Power microſc. p. 30.
Hoon microſc. t. 25. *f.* 2.
Unzer phyſ. Schr. p. 260.
Biſchoff n. opt. Beytr. p. 24-26. *et Beytr. z. Opt. p.* 40.
Fraenk. Samml. 4. *p.* 277. *n.* 2. *f.* g. o.
Habitat in aceto aliisque acidis mitioribus, *aëri opportunis, quibus congelatis obrigeſcit, regelati ad motum redit, evaporatione diſſipatis, quemadmodum alia infuſoria, dilabitur et perit, nunquam reviviſcens, niſi pulviſculis a vi aëris defendentibus involutus fuerit, exuvias deponens, Julio auctumnum verſus viviparus, in ſerum usque auctumnum oviparus, fertiliſſimus, ſexibus diſtinctis, filiformis, vivax, pellucidus, utroque fine quam maxime, et vacuo, medio granulis repleto.*

glutinis. 15. V. filiformis, dorſi clypeo obſcuro annulo albido cincto, capite clavato. *Goeze Naturf.* 9. *p.* 181. *Müll. Naturf.* 19. *p.* 162.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1326. *n.* 1. Chaos (redivivum) filiforme utrinque attenuatum.
Roffredi journ. de phyſ. 1775. *Mart. f.* 4. 1776. *p.* 383.
Ledermüll. microſc. p. 33. *t.* 17. *f.* 1.
Habitat in glutine bibliopegorum, *aliisque viſcidis frumentaceis, atmoſphaerae contactui obviis, fertilitate, motu, vita, propagatione v. aceti ſimilis, at multo tardior, brevior, cauda minus acuta.*

marinus. 16. V. filiformis aequalis. *Müll. Naturf.* 19. *p.* 163.
Habitat in aqua marina, *an vere diſtinctus ab anguillula?*

Bacillus. 17. V. linearis aequalis utrinque truncatus. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 40. *n.* 22. *zool. dan. prodr.* 2447.
Leeuwenh. arc. nat. p. 40. *f.* F. *et p.* 315. *f.* C. D.

 Joblot

Joblot microſc. I. 2. *p.* 67. *t.* 8. *f.* 12. 14.

Habitat in aqua foeno infuſa diu ſervata, paluſtri, lemnam ferente, foetente *languidus, ſerpens, recta ſemper linea prorediens, gordio lacteo ſimilis, ſed ſubtiliſſimus, ut monade lente dimidio ſit anguſtior, quamvis ſextuplo et decuplo longior.*

Lineola. 18. V. linearis obſcurus. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 39. *n.* 21. *zool. dan. prodr.* 2446.

Habitat in aqua vegetabilibus infuſa, *poſt aliquot dies copioſiſſima, bacillo tricies minor, ipſa monade termone fere minor, motu tremulo continuo agitatus.*

LEUCOPHRA. *Corpus* undique ciliis albicantibus, motu argenti inſtar ſplendentibus cinctum: oculo nudo non conſpicuum.

fluida. 1. L. ſubreniformis ventricoſa. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 73. *f.* 1-6. *rar. deſcr.* 2. *p.* 97.

Habitat in aqua mytili edulis, *flavicans, craſſa, moleculis farta, in quas ſenſim fatiſcunt, formae mutabilis, ovatae, oblongae, vel ſubtriangularis.*

acuta. 2. L. nigra acuminata. *Müll. zool. dan. rar. deſcr.* 2. *p.* 97.

Habitat - - -

fluxa. 3. L. ſinuata reniformis. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 73. *f.* 7-10. *rar. deſcr.* 2. *p.* 99.

Habitat in aqua mytili edulis, *oblonga, flavicans, altera parte obtuſa, ciliis undique cincta, altera in conum producta, in plurimis in moleculas diffluentem.*

Armilla. 4. L. teres annularis. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 73. *f.* 11. 12. *rar. deſcr.* 2. *p.* 99.

Habitat rarior in aqua mytili edulis, *altero fine pauliſper incraſſato et in annuli formam curvato farcimen referens.*

5. L.

Plures adhuc Leucophrae *ſpecies in aqua fluviatili et marina, in naidis, lumbrici, ranae inteſtinis occurrunt, hactenus nondum cura ſatis definitae.*

nodulata. 5. L. ovato-oblonga depreſſa, ſerie nodulorum duplici. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 80. *f.* a-e. *rar. deſcr.* 2. *p.* 124.
v. Gleichen microſc. p. 59. *t.* 27. *f.* 1. *et t.* 28. *f.* 11. Knopthierchen, Perlenthierchen.
Habitat in lumbrici terreſtris *et* naidis littoralis inteſtinis, *pellucidiſſima, argentei ſplendoris, partitione transverſali propaganda, junior ovalis, adultior oblonga, apice truncata, ac rimula orificium ſimulante notata, ciliis motu tremulo agitatis.*

BACILLARIA. *Corpus* ex bacillis cylindricis ſitu parallelo, ceterum varia directione digeſtis compoſitum.

paradoxa. 1. B. *Müll. kl. Schrift.* 1. *p.* 1. *f.* 1-8.
Habitat in littoris Havnienſis ulva latiſſima, *conſtans* 5-40 *et ultra bacillis brevibus, cylindricis; longitudine diametrum* 12*es ſuperante, intus membranula flavicante punctis lucidis ſparſis* 2-3 *notata refertis, quieto animali in parallelepipedum junctis, facile in lineam rectam, angulatumque pro lubitu animalis diſponendis, in qua ſinguli bacilli eundem ſemper obtinent locum.*

ENCHELIS. *Vermis* nudo oculo inconſpicuus, ſimpliciſſimus, cylindricus.

* *pellucidae.*

Pyrum. 1. E. inverſe conica, poſterius hyalina. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 38. *n.* 20. *zool. dan. prodr.* 2445.

Habitat haud frequens in aqua lemnam ferente, *diu ſervata, feſtine currendo et recurrendo per guttulae diametrum ſe volutans, vivida, pellucida, anterius ventricoſa, obtuſa, moleculis mobilibus farta.*

Spathula. 2. E. cylindrica ſtriata, apice hyalino ſpatulata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 38. *n.* 19. *zool. dan. prodr.* 2444.

Habitat rara in aquis, *in* quibus lemna *vegetat, vacillando mota, pellucidiſſima, ſtriis ſecundum longitudinem exarata, globulos 2 hyalinos utplurimum includens.*

Papula. 3. E. cylindrica, apice papillari. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 37. *n.* 18. *zool. dan. prodr.* 2443.

Habitat in fimetis, *ultimis anni menſibus obvia, circa axin longitudinalem rotando mota, moleculis ſubſphaericis mobilibus antrorſum confertis impleta, utroque fine obtuſa, antrorſum ventricoſa, obſcura, poſterius pellucida: apertura circulari.*

Fritillus. 4. E. cylindrica anterius truncata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 37. *n.* 17. *zool. dan. prodr.* 2442. *Hermann Naturf.* 19. *p.* 55. *t.* 8. *f.* 21.

Habitat in aqua gramini foenove infuſa, *rarior poſt multas demum ſeptimanas conſpicua, motu vacillatorio guttulae diametrum confeſtim percurrens, interdum per temporis momentum in gyrum acta, pellucidiſſima, poſterius convexo-obtuſa.*

Ovulum. 5. E. cylindrico-ovata hyalina. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 36. *n.* 16. *zool. dan. prodr.* 2441.

Habitat in fimetis, *ſolitaria inter monadum myriades, pellucidiſſima.*

Fuſus. 6. E. cylindrica, utroque fine anguſtiori truncata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 36. *n.* 15. *zool. dan. prodr.* 2440.

Habitat

Habitat in aquis purioribus, *lente mota, inteſtino longitudinali ſubflexuoſo, liquore caeruleſcente et moleculis nigricantibus repleto.*

Epiſtomium. 7. E. cylindrico-elongata, apice gracili globoſo. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 35. *n.* 14. *zool. dan. prodr.* 2439.

Habitat in aqua foetente, *utplurimum per diametrum guttae vacillans, congenerum fere minima, teres, poſterius obtuſa, anterius ſubacuminata.*

Seminulum. 8. E. cylindrica aequalis. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 35. *n.* 13. *zool. dan. prodr.* 2438.

Habitat in aqua dies aliquot ſervata, *alternatim deſcendendo et adſcendendo mota, latitudine duplo longior, interaneis anterius pellucidis, poſterius obſcuris.*

** *opacae.*

nebuloſa. 9. E. ovato-cylindrica, interaneis manifeſtis. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 34. *n.* 12. *zool. dan. prodr.* 2437.

Habitat cum Cyclidio Glaucomate *in eadem* aqua, *at triplo major, multoque rarior, anteriorem corporis partem elevando mota, anterius anguſtior, interaneis opacis.*

Farcimen. 10. E. cylindrica curvata utrinque truncata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 34. *n.* 11. *zool. dan. prodr.* 2436.

Joblot microſc. I. 2. *p.* 33. *t.* 5. *f.* 2. M.

Habitat rara in aqua diu ſervata, *incedendo literam S referens, latitudine quadruplo longior, aequalis, interaneis opacis.*

viridis. 11. E. ſubcylindrica anterius oblique truncata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 34. *n.* 10. *zool. dan. prodr.* 2435.

Habitat copioſa in aqua plures ſeptimanas ſervata, *omni momento dextrorſum et ſiniſtrorſum mota, poſterius obtuſa, interaneis obſcuris non diſtinctis.*

352. VOLVOX. *Vermis* nudo oculo inconſpicuus, ſimpliciſſimus, pellucidus, ſphaericus.

Bulla. 1. V. ſubovalis. *Martiniere journ. de phyſ.* 1787. *Oct. p.* 265. *t.* 2. *f.* 12.

Habitat in aqua, *in* vitro aſſervata, *bullam ſaponis referens, in gyrum continuo acta, nunc ſolitaria, nunc gregaria.*

Pileus. 2. V. hemiſphaericus ſubtus excavatus membranaceus. *Schranck oberd. Beytr.* 1. *p.* 144. §. IV. *t.* 2. *f.* G. H.

Habitat in aqua, *inter congeneres major, dilute vireſcens, in gyrum ſaepius acta.*

Globator. 3. V. ſphaericus membranaceus. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 32. *n.* 9. *zool. dan. prodr.* 2434.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1325. *n.* 3. *Fn. ſuec.* 2266. Volvox globoſus.

Pallas el. zooph. p. 417. *n.* 1. Volvox globoſus immutabilis, foetubus ſparſis.

De Geer act. Stockh. 1761. *p.* 111. *t.* 3. *f.* 1-5.

Roeſel inſ. 3. *polyp. p.* 67. *t.* 101. *f.* 1-3.

Leeuwenh. cont. arc. nat. p. 149-152. *f.* 2.

Baker act. microſc. p. 418. *c.* 13. *t.* 12. *f.* 27.

Habitat in Europae aquis ſtagnantibus, *primo vere et aeſtate copioſiſſimus, in* aqua foeno infuſa *hieme quoque obvius, viridis, aetate albidus et aurantius, globulis minoribus ſaturate viridibus foetus, circa axin lente motus, nudo oculo conſpicuus, membrana conſtans pellucida, moleculis rotundis centro pellucidis immobilibus in ſuperficie obſita, globulos* 8-30-40 *magnitudine diverſos includens, qui membrana dehiſcente prodeunt, propriam agentes vitam, aliosque iterum includentes et pari ratione enitentes, ut liberis, nepotibus, et pronepotibus ſaepe gravidum dixeris animalculum.*

dimidiatus. 4. V. inceſſu hemiſphaericus.

Wilk. act. Stockh. 1762.

Habitat ſaepius in caudis larvarum ranae temporariae, *dum in aqua ſe volutat, hemiſphaericus, dum quieſcit, globoſus; an vere diſtincta a reliquis hujus generis ſpecies?*

Sphaerula. 5. V. ſphaericus, moleculis ſimilatibus rotundis. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 31. *n.* 8. *zool. dan. prodr.* 2433. *Schranck oberd. Beytr.* 1. *p.* 141. §. III. *t.* 2. F. *Hermann Naturf.* 20. *p.* 154. *n.* 33. *t.* 3. *f.* 33.

Habitat haud frequens in Europae aquis ſtagnantibus, *lente a dextra ad ſiniſtram vix ultra quadrantem circuli, et mox rurſus dextrorſum motus, e punctis circiter* 60 *pellucidis homogeneis conflatus, nunc hyalinus, nunc ex vireſcente flavicans.*

Uva. 6. V. orbicularis, moleculis ovatis pellucidis ſuccineis puncto connexis. *Hermann Naturf.* 20. *p.* 148. *t.* 3. *f.* 27. f.

Habitat in aqua paluſtri, *motu vivaci, aequabili, circa axin rotando agitatus, moleculis* 8-10 *conſtans.*

Lunula. 7. V. hemiſphaericus, moleculis ſimilaribus lunatis. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 30. *n.* 7 *zool. dan. prodr.* 2432.

Habitat rarus in Daniae aqua paluſtri, *primo vere obvius, continue motus, tum lente totum corpus rotando, tum moleculis ſingulis concitate agitatis, hyalinus, moleculis innumeris.*

Conflictor. 8. V. ſphaericus ſubopacus, interaneis mobilibus. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 29. *n.* 6. *zool. dan. prodr.* 2431.

Habitat in fimetis, *rarius vere quidem* obvius, *in* aqua vegetabilibus infuſa, *hieme, vorticellis pleriſque major, flaveſcens, margine nigricans, dextrorſum et ſiniſtrorſum lente per intervalla rotatus, moleculis innumeris minutiſſimis in circulo contentis continue motis, et absque omni conſpicuo ordine vehementer quaſi conſligentibus, aqua deficere incipiente, in figuram ovato oblongam vel cylindricam, poſteriore parte ſaepe trigonam tranſiens, nunc pellucidus interaneis vacuus, nunc vacillando aut gyrando corpus per aquas latas, molecularum rotatione decuplo celeriore, aqua penitus deficiente totus quieſcens, et humore omni tandem diſſipato, in moleculas informes effuſus, ſenſim evanidas.*

Pilula. 9. V. ſphaericus, interaneis immobilibus vireſcentibus. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 28. *n.* 5. *zool. dan. prodr.* 2430.

Habitat in aquis purioribus, lemnam minorem *ferentibus, Decembris medio frequens, lente et feſtine circa axin rotatus, conflictore minor.*

Globulus. 10. V. globoſus, poſterius ſubobſcurus. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 28. *n.* 4. *zool. dan. prodr.* 2429.

Habitat in aqua vegetabilibus infuſa, *ſubovalis, monade lente decuplo major, volutando, vel eodem loco lente motus, vel celeriter currens, interaneis veſicularibus poſterius obſcurioribus.*

MONAS. *Vermis* nudo oculo inconſpicuus ſimpliciſſimus pellucidus puncti aemulus.

Mica. 1. M. circulo notata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 27. *n.* 3. *zool. dan. prodr.* 2428.

Habitat paſſim in aquis purioribus, *vacillando mota, hyalina, circulo ovali, medio, mobili.*

Lens. 2. M. hyalina. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 26. *n.* 2. *zool. dan. prodr.* 2427.

Hill hiſt. anim. t. I. 1. Cyclidium corpore orbiculari pellucidiſſimo.

Leeuwenh. arc. nat. p. 40. *f.* E.

Joblot microſc. I. 2. *t.* 5. *f.* 8. Z.

Baker microſc. expl. t. 10. *f.* 1-3.

Ledermüll. microſc. p. 115. *t.* 60.

Wrisberg anim. infuſ. f. 1-4.

Spallanz. an. inf. f. 11.

Habitat per myriades in omni aqua, *rarior in* puriſſima, *etiam in* dentium ſordibus, *eodem in loco per intervalla tremulo motu agitata, dein lente incedens, demum vivacior totum guttulae oceanum percurrens, figura inter ovatum et ſphaericum media, interaneorum veſtigio nullo, aggregata, maſſas veſiculares membranaceas fingens.*

Termo. 3. M. gelatinoſa. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 25. *n.* 1. *zool. dan. prodr.* 2424.

Habitat

Habitat in aqua animalibus aut vegetabilibus infuſa, *brevi, antequam foetet, comparens, omnium animalium ſimpliciſſimum, minimum.*

Sed

Animadverti immenſum Opus DEI
non poſſe hominem *aſſequi,*
quamvis laborioſe quaerat.

ECCL. XVIII. 2-5.

Pauca haec vidimus operum DEI,
Multa abſcondita ſunt minora his majora.

o JEHOVA!

Omnia iſta ANIMANTIA in TE ſperant,
ut des illis Eſcam tempore ſuo;
TE ipſis dante illam colligunt,
aperiente manum Tuam ſatiantur bono;
TE recipiente Spiritum eorum pereunt,
et in Pulverem revertuntur
TE emittente ſpiritum Tuum creantur,
et renovas faciem Terrae.
Gloria Domini erit in Secula,
et laetatur Jehova operibus ſuis
Canam JEHOVAE in diebus vitae meae,
reflectam Sapientiae EJUS radios, quamdiu ſuperero.

David Pſalm CIV. 27.

RUDOLPHIPOLI,
LITTERIS BERGMANNIANIS.

INDEX